

یخناب م ابند کے برجل لمبٹد اندن کی اجازت جن کوئی اشاعت حاصل ہے اُردوم بنرم بہ کرکے لمبع وسٹ نع کی گئی ہے۔

امنحان سيند- ١ - التهاب قصبندار بيدا ورنوعي سسراينس - ٢١ -نوباب برتيدد ٢٠٠ يشعبي النهاب ٢٠٠ - تمدد الشعب ٢٣٠ -حمة الغش اوردمه مالت حساميت - مم -تسدد - 48 فيشول كانفاخ - ١٨- ببوط - ١٥ - ازيما - ١٥ - ذات الرسيب - ١٨ فريد ليندركا وات الربية عبى ذات الربيم - ٨٨ - خراج - مم٠١ ليغيش - ١٠٥ - كنگرين - ١١٠ - رئوي ندرن -١١٣ يشك خواش و میسول سنے تمر- ۸م ۱- ربوی سلادیت وعلقیت - ۱۵۰ - درول صدري نومايه لمات - ١٥٦ - ذات الجنب اورتعين الصديد-١٦٣ استسقاء الصدر - صدر دمویت - کیلوسس صدری - ۱۸۱-استرواح الصدد-٧٨- والغرامي تق ١٩٠ النها كيسط-١٩٢-ع و و تا مهم م ناك كله اوركان كامراض (مبى نقطة نظره) ركام - 192 - مزمَن النباب الانف - ٢٠١ - النبالل جاف - ٢٠٣ - النبالل جاف - ٢٠٠ - النبال حاف - ٢٠١ - دعاف - ٢٠١٠ -بلع**وى لوزلات -٢١٢ - لسانى لوزات -٢١٣ ـ**مرمن لتها البلعوم-م ٢١ - خلف لبلعوم خراج - ٢١٥ - النهاب ينجره - ٢١٦ - يكر-٢٢١

آتشک - ۲۲ سلعات اجبام خربید - ۲۲۵ یفسلات مغیره گال ۲۲۸ شیشنج مزار - ۲۳۴ - پیدائشی حنجری صرم و - مدم سیت - ۲۳۰ کان - ۲۳۹ - التهاب لازن الوسطی - ۲۳۲ -

امرانس عضائے دوران خون مران الم اللہ عنا ما اللہ عنا اللہ

قلب كامتمان - ٢٠١٠ - قالمبيت جيد كي نمين -٢٩١٠ - لاشعاب ۲۶۵ نېښکوږي - ۲۶۸ نېښ ورېږي - ۲۷۷ قعل فلب کې غیرطبعی حالتیں ۔ ۲۰۹ ۔ جونی بیتیا عد گی تیلبی مسدودی اور آیڈ سٹوکس کا علائمید-۲۸۳ - بیش ازوقت ضربان - ۲۸۹ - فلب کا كثيرالوقوع فعل - ٢٩٥ - سا ده دوري مؤت القلب -٢٩٧ إ زيني رفرند _ اس - اذبن كا ريشكي انقباض - ٣٠٠ نيض مترسبادل -قليل الونوع نعل -١٦٣ يبلين كارتيكي انقباض في تحليج امراض تعويض - ١٦٦ - ميش يرورش - ٢١٧ - اتساع - ٣٢١ ينويفي كالل م ٢٠ - التهاب عضلة قلب - انحطا طعضلة قلب ٣٢٥ - انشقاق -قلب كا انورسا - ۱۳۳۷ - نوماليدگيال ا ورطفيليات - همي رومانزي ۳۳۷ -زفن -۲ ۳۵ - ما دالتهاب درون قلبه - مزمن الَهَاسب درون قلبد - ۹ ه۳ - اور طی ضبیق - اور طی با زروی -۳۶۳ میرانی مرض - ۳۶۸ -مطرانی ضبن - ۳۷۲ - بمبنی مصاعی مرض سیخیف اندارا ورئوبزية عن تقب كيمزمن مرض كاملاج - ١ ٢٩٠ خبيث التهاب ورول قليه - ٣٩٠ - طلائمية جيد- ٣٩٨ - يماكنني تشووت يم بم - التهاب تأمور- ١٠٠ - مزمن تفسيقي لرتها تبايموس تأموري اجتماع آب - عام - تأموري جوائي اجتماع آب ينأموري اجماع الدم- ذبحة صدريه - ١٩ م - دموى عوق كے امراض سارى شراي فى التهاب - ٢٦٩ - مزمن شراي فى انحلماً طات - ٣٣٧-شريانى مىلابت - ٢٣٧ - بندفتار شريانى ٢٩٨ - عرمان متوقف ٥١٨م - حرتى وجع الجوارح - ٨١مم - انورسما - ١٩٨٩ - اورطى كا

بدائش تضایق - مرض میناد - مهم - النهاب الورید - ۱۹۲م -علقیت اورسدادیت - ۲۲م - موتی عصبانی افیما - ۱ عم -

امرافزاعضائيم المرافزاعضائيم

٨٨٨ - فلا في - ١٨٨ - مرى كاتسدد - ٩٨٨ - فوا ذكا عدم ارتخاء. ۳ وم عطف ۵ وم معدد اوراننا عشری کے امرامل معت كا امتخان - لاشعاعيس - ٩٦٧ - امنخا ني خذا - ٩٩٩ - سودم ضم ٢٠٥ بلع الهوا- ٢٠ م يتقوط المعدد يه ٢٠ ٥ - مشيريا بيُ تَحَ - دوري تَحَ ۵۲۷ - معده اوراننا عشري كاحاد اتباع - ۲۸ ۵ - ما دالتهالمعة ۵۳۰ مضمی قرمه - ۲۲ ۵ - معدی میائی اورمهائی قرص - ۲۹۵ -مزمن اتساع - ۵۵ - معده کا ربیت محمد ی انقباض - س ۵۵-پدائشيمش رورشي ضيق - مرطان معده - م ه ه - خير خبيي العاً-قبض - ٢٦ ه - قنال فذا في تسمر الدم - ٦٩ ه - اسبال ياء -نزف معوى - قولنج - ٥٠٥ معولى النهاب - ٥٠٥ - فذا كي سم-امعا ءكه امراض شيحمي مرض - ٧ م ٥ - قلنموني التهاب الامعاء ل التهاب لقولون - ١٠ ٥ - التهاب زائده - ٢٩ ٥ - عطفيت -۳۰ - تدرن نوباليدين اوراً تشك - ۹۰۹ معوى تيدد-۹۰۹ انغادالامعاء-١١٦ - برش بروگ كا مرض - ١٢١ - جكرك ا مراض - كبدى وظبيفه اوروكليني كاشفات - ٩٢٣ - يرقان - ٩٢٣ استسقا شِهِي - ١٣٥ - جرك امراض - ١٣٩ معمولي سارى كبدى يرقان - مم و مجركا ما د تنخ - ٣ م ٢ كمست ٢ تفك وزيدن عمه -نوباليدي - ١٥٨-كبرشيم- ١٥٩-كردكيدى التهاسيد النهاب وربدالباب - ع ٢٦٠ - صغرالوي آله كا وطبيعي متحا- ٧٤٠ التهاب مراره - ١٥٣ مين مكرائ صفال ١٤٧ تقيمي التهاسب-قنات ہائے صفرا۔ ۱۸۱- بنقراس کے وطینی کاشفات -۱۸۲ و

مادالتهاب بنقراس ، ۱۰ - مزمن النهاب بنقراس - ۹۹ - تنگ نوطیه اوردویرات - ما دالتهاب باریطون - ۱۹۲ - زیر دایا فرامی خراج - مزمن النهاب باریطون - تدرنی النهاب باریطون - ۲۹۰ -باریطی نی انصبا بات اورنوبالیدین - ۲۰۵ -

692121B

خون طحال اورلمفائی نظام کے امراض ۔

امتحان نون - ۱۵ - بجرگوین الدموی (قلتی) عدم دمویت - ۲۹ - افخریت الدموی (قلتی) عدم دمویت - ۲۹ - افخریت الدموی عدم دمویت - ۲۹ - افخریت الدموی عدم دمویت - ۲۹ - فیزاتی خلویت الدموی عدم دمویت به ۲۳ - بخون الدموی عدم دمویتی هم ۵ - آنلاف الدموی عدم دمویتی - ۲۹ م ۵ - بفرن آنویت - ۲۹ م ۵ بخری آنویت - ۲۹ م ۵ بخری آنویت - ۲۹ م ۵ بخری آنویت اور سلف بهموگلوین دمویت بریؤورا - ۲۹ م منویت بریؤورا - ۲۹ م منویت اور ترشد می تربیف اور ترشد می تربیف اور ترشد می تویت - ۲۹ م ۵ منویت اور ترشد می تویت اور ترشین اور ترشیم کا تویت مرض - آبین آنویت اور ترشیمن کا مرض - آبین آنویت اور ترشیمن کا مرض - آبین آنویت اور ترشیمن کا مرض - آبین آنویت مرض - آبین آنویت کا مرض - آبین آنویت کا مرض - آبین آنویت - ۲۹ مرض با جکن - ۲۹ مرض

9-26299

تحول ورا ندونی افراز کے امراض اساسی تحل - ۹۹ - نیابیل شکری - ۸۰ - خلاف کی فہرتیں - ۹۳ -قلیل کر دموست - ۸۵ - خدہ در قبیہ مقامی الحدیث یا انفرادی لحدث گائٹر - جونی گائٹر - ۱۵۸ - قائت - ۹۷۸ - زدرتی خدد بیش زدر قربیت ۱۵۰ - کزر - ۱۵۸ - خدہ نیموسیہ - ۵۵۸ - فوق الکلیکیے - ۸۵۸ وفق ایکرین - ۱۸۸ سلعات - ۸۸۸ - غدہ تخامیہ - ۸۸۸ - فریابطیس ملبخ -۱یکرین - ۱۸۸ سلعات - ۸۸۸ - غدہ تخامیہ - ۸۸۸ - فریابطیس ملبخ -۱یکرین - ۱۸۸ سلیات - ۹۰۸ - فریمی - ۱۰۹ - تعبی - ۹۰۹ - المعالم المعالم

QR PCTICE OF MEDIC

معائمته (inspection) مسينه كوساميخ بيجيد، اوراويرسي و يجينير بعض غیرطبی امورمن الاً مختلف قیم کے مبلدی تورانا سند (eruptions) و بسیلم (empyema) کے بڑا نے علمات کے ندرات (scars) یا بندوق کے زخموں کے ندبات اورور يدون كى كلانى ويح ماسكت رس اسى طرح سينه كى كل وحركات ا كوئى تغير موجود بوتو و و مى مثناخت كيا ماسكتا ہے ۔ وريدول كى كلائى كے متملق يه ضروري بي كريميولي موئى وريدول كے اور اُن وريدوں تمي ورميان موممول كم سبت زیاده او پری واقع بول اتباز کیاجائے کیونکہ اول الذکراورو، اجوت

(venæ cavæ) کے داخلی تِستد د (obstruction) بیر دلاد ت کرتی ہمں' اور آخرالڈکر كوئى امرا منساتى البمين نهي ركمتين - ابك مندرست بالغ كے سببہ بين بن أمور كو وكلما ما ہے و وحب و بل بس : سینہ کی شکا کسی فدر حیثی بینوی ہوتی ہے ' سینے اسس کا بیش نسی (antero posterior) تطرعضی قطر کے نسبت بہنت کے موتا ہے۔ نہ کی زیادہ چوٹرائی' اس کے زیرین حصتے ہیں بوتی ہے۔ نیقوی مٹیال (clavicles) ممض خبیف طور پر اُ بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اور محض خبیف سانشیب اور ینچے سٹ فہ ہی کو نئی نشیب ہوتا ہے۔ تبطنی کاممل و قوع جو بھتی بیلی بیزیا اس کے ہالائی ہُ زیریں کنارے پر ہوتاہے۔ زاویہ (شراسیفی زاوید :epigastric angle) ه ف تا ه ١٠ در جركا بمو تا ہے - اس كارا س غفروف سيفي (ensiform cartilage) ك مقام پر ہوتا ہے اور اس کے ہر جانب ساتویں اور اٹھوں ضلعی کریاں ہوتی ہیں۔ عظم الكُتف (scapula) صدرك يحيك حصف في حريبي طور برمتوا فق موتاب اورنتوكه سيد صا بموتا ہے تيہي (inspiration) يعفسانس اندر تينے مين سيند كا محيط الاتا الا انخ بمیلنا ما بینے، وونوں ما نبوں کی حرکت مشاکل (symmetrical) مونی ما ہے' ن منینی زاویچ ڈا موجا اچاہئے'اورفصّ (sternum) کو آگے ٹرصر کا اورنیچے کی ٹیکیوں واوَيرٌا عُدْما الْمَيْ الْمِيا الْمِيْ لِينَا مِن اللَّهِ مِي اللَّهِ مِن مِن مِن مُعلَى فَضَا وُل كواني حَك محض وراہی تیجھے سٹنا ما ہسئے۔

معائنہ کے ذریعہ سینہ کی شکل کی غیر طبعی حالتیں نوط کی جاتی ہیں 'اور یا الب فرانی اللہ اللہ (emphysema) میں فرانی ہوسکتی ہیں : ۔ (الف) امراض منشق ۔ نقاح (emphysema) میں سینہ مجمول سے زیادہ کا وہ اور شراسینی زاویہ نعبتہ ڈیاوہ جوڑا ہوتا ہے کیسیوٹر کی لیفیت (fibrosis) میں جب کہ معتامی لیفیت (phthisis) میں جوتی ہے 'معتامی انقانی کی وجہ سے جو کہ عمو گا ایک یا دو مرے راس پر واقع ہوتا ہے 'سین فیرختاکل بوجا ہے ۔ (ب) ایسے امراض عظام جیسے کہ وہ تشوات (deformities) جوکا ہے ۔ (ب) ایسے امراض عظام جیسے کہ وہ تشوات (pickets) ہوجا ہے ہیں۔ جوکا ہی ہوجا نے ہیں۔ جوکا ہی ہوجا نے ہیں۔ کا فرو ہو کہ بیستور دوجا تی افرانی ظام ہر کرے ۔ بالعموم شعبی البتہاب (bronchitis) اور شعبی فواست الرب

121

(broncho-pneumonia) بمی ان تشوا ت کے سلارے میں حصر لیتے میں حوکدک کا نیچر ہوتے ہیں رہب) مکن ہے کہ نوعم روضو عول میں قلب کی سیشس پر ورسشس (hypertrophy) ما من ميلوم و لوارسية كا ايك مقامي أبعار سداكردي-سینهٔ کامحیط ایک نبیتہ کے نا یہ سے اور عرصی اور پیش بینی قطرا یک قطر ہما (callipers) کے ذریعہ ما صل ہو تانے سینے کی شکل ایک نیاء یہ (cyrtometer) سے عاصل موسکتی ہے جو زم و معات کے دو لمبے کر وں پرشتمل ہو تاہے اورس میں ان کڑوں کے ایک طرف کے ہرے باہم ڈھیلے کڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ معائنہ سے بھ مدر کی سشکل اور تشاکل کی تبدیلیوں کے علاوہ حرکات ننفس کی ن*وعت بھی نوٹ کرسکتے ہیں ت*نفس کاطبعی تواتر بالنوں میں فی منٹ تقریباً یندرہ یا اٹھارہ ہوتاہے۔ بچوں میں پرنسبتہ بہت زیا وہ تبز ہوتا ہے۔ یہ تواتر میں باز اید ہوسکتا ہے ا ورعمر کے ساتھ بدلتا ہے۔ ربو تی یا دوسرے میلا دیمے مرض ف نشموں میں حرکات تنغس معمول کی نشبت مست یا زیا وہ تیز' عیرعمیق یا بَقِ تَرُ كُرُ وريا قوى تر بونسكتے بيں اور مكن سے كہ وہ غير نتظم يا بيقاعدہ بول-بَكُو (dyspnoea) ايك سربرياتي اصطلاح ہے ' تُونيمولي موني ساني' shortness)'' (of breath كوظامر كرف كے لئے استمال كى جاتى ہے اور يدم يعن كا إينا احال ہے کہ مزید تنغنی کو مشش کی مزورت ہے۔ (الف) تنغنی شرح کی زیادتی (مُنتجب تنفس: polypnœa) (ب أنغير منظامت كي زيادتي (بييش تنفس (hyperpnæa)، (ج) مجمع عظروں کے اندراور با ہر مواک جائے آنے می رکاوٹ (افسل ا حي م المري (obstructive dyspnæa) موجود موسكتي سے آخرالدكر مورت میں بدوقت یا تودورات میں (inspiration) میں اشہاتی کو وورات میں اسمان میں اسمان اسمان اسمان میں اسمان اسمان اسمان اسمان میں اسمان اسم expiratory می (نوپی میر) (expiration) می (نوپی میر) (dyspnoea: :dyspnæa) بنایت نمایا برسکتی ہے ۔ اگر مریض کوزیا دو بہولت کے ساتھ

مانس لين كي لي مجبوراً بينمنا يرك بياك ببت سى ربوى اورهبى امرض كى

صورت میں موتاہے تو اس طالت کو انتصابی تنفس (orthopnæa) کیتے ہیں۔ بیطرہ منفس (bradypnœa) یا نفسی شرح کی تخفیف میں کے ساتھ بلند جزری ہموا یا ئی جاتی ہے طبعی حالت میں نیز النہا بر د ماغ (encephalitis) کے بعد ہمونا بیان کی جاتی ہے (1) -

بعد بونا بیان کی جاتی ہے (۱)
ید و بلینا ہی اہم ہے کہ آینفس کاعل زیادہ ترسینہ کے بالائی حصے سے

انجام کو بینویا ہے جسیا کئے رتوں میں عام بوتا ہے 'یا زیریں عصے سے' جومُردوں

کی ممتاز خصوصیت ہوتی ہے ۔ اب معائمہ میں شکی دیواروں برجی نظر ڈالنی

چاہئے 'جن سے گویا جی ہے جا جرکا فعل ظاہر بوتا ہے 'یعنی جب جا جربیقبض ہوا

ہوتو شکی دیواری آگے کو بڑھ آتی ہیں اور جب وہ مُرتِیٰ (relaxed) ہوتا ہے تو شکی دیواری تیکھے کو بڑھ آتی ہیں اور جب وہ مُرتِیٰ کاغیر متناسب استعمال

اس امر بردلالت کرتا ہے کہ اس کے دو سرے حصے میں مرض ہے ۔ معائمہ 'کوئی سانس لینے میں اور میں کے دو سرے حصے میں مرض ہے ۔ معائمہ 'کوئی سانس لینے میں اور میں کے دو سرے حصے میں مرض ہے ۔ معائمہ 'کوئی سانس لینے میں اور مریف کے ذور سے اندر سانس لینے (شہیق :inspiration)

بس (Cheyne-Stokes respiration) جاین اِ سٹوکس تنفس (Cheyne-Stokes respiration) ہے۔ اُن کے مصرصیت بہے کہ اس میں تنفس کی زیا و تی (بلیش تنفس تنفس انفسی ترکات کی غیرموجودگی (علم تنفس hyperpnæa:

·····
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

شکل ۸ ۔ چین اسٹوکس نفس برس منی (curve) کو بائیں طرف سے وائیں طرف پڑ صاجا ہے ' اور وقت کا اندراج نیچ ٹائیوں (seconds) کو نتا آ سے کیا گیاہے ۔ مدم نفس کے عرصے میں ہو بھیوٹے چیوٹے تمومات وہ ہیں وہ قلب کی ضربات کی وج سے ہیں۔

نتبادل عرصے ہوتے ہیں۔ بیش نفسی عرصے تنعنی ضمامتو (respiratory volumes) کا ندریجی جڑھا کو اسار طا ہر کرتے ہیں جیسا کشکل مریں تبلایا گیا ہے۔ ایک وریع

(cycle) کی پوری مّدت بیس تا ما تھ سیکنڈ ہوسکتی ہے' اور ہس من ننسات کی تعداد را اُن کے خلف ہونی ہے تنفس کی زما دتی کے عرصہ کے وسط میں نفس کی مشرح نی منٹ بچاس یا ساٹھ تک تیز ہومکتی ہے ۔ مین اِسٹوکس مع یک ندنری (excitability) کے تغیرات کے ساتھ وابنتہ ہوتا ہے اوراس سے عمراً آكسيور كى كمى طابر بنوتى ب- نيكن مكن ب كدوما غي ترائين كو قطريه (calibre) کے تخبر ات اس کاسب مول اور شخاع متعلیل (medulla) کی شریا نول کوانوبتی انتیاب (periodic contraction) نوبتی میرمنفس (periodic apnœa) بیداکر دنتا بعو سَنَعْسَ تَسْمِی تَسْمِطْ بِی اتَّنْعَاصِ میں سونے کی مالت میں موجود ہوتا ہے اور مرتفع اور لمبتدمقامات برببت عام كحور بروائن بومانا بيء كشرا لتغدا وامراصني تي عالتوں میں وہ اکثر مونت سے چند اکھنٹے پہلے داقع ہوتا ہے ۔ ایس کے برمکسس اُن ضعیف العمراشخاص میں جوعضائہ قلب کے انتظاط (myocardial degeneration) اورتثيريا في مرض بي متبلا مول جِين مسئوكس نغس كامهينوں جارى رہنامعلوم ہواہے۔ مِیش منفی عرصہ کا اثریہ ہوتا ہے کہ وہ نون سے ،CO کو دھوکرخارج کردتیا ہے لہذا ی مرکز متبیج بسی ہوتا اور سانس موقو ف ہوجانی ہے۔ و تعذیحے دوران میں ، CO بتدریج مجتمع ہوجاتی ہے اور مرقبیسنرول (alveoli) میں کی انسیجن خرج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے معدجب آکسین کی احنیاج ناگہا نی طور پر محموس ہوتی ہے نو سانس کیورسشہ وع ہوماتی ہے۔ بتی تفس (hyperpnœa) کے دورا ن می مجمعے مو یں اُلیمن برموت زیا دہ ہوماتی ہے۔ لیکن جو ککہ مرکز نیفس مرورت سے ز متہیج ہوما تا ہے لہذا ہ^{CO} وُصلاَ مِارج ہوما تی ہے اور انسیمن کی امتیاج سرومیت موجو د تہیں رہتی۔ اِس طرح میں ہسٹوکسٹنفس کا انصار دو ُعدائگا نہ عا ملول کی موجود گی پر ہوتا ہے' جومرکز منفس کو متباتیج کرتے ہیں۔ یہ عالی پر ہیں ، آئیجن کی امت پاج 'اور ''کریم' دیکر 'کار كارِ بن ذِالْيَ آكَالُينِدْ (وCO)(Pembrey and Allen)-يِعِين المُوكِمُسِّ مُنْفُس كُوا كِي ا بخن کے ماکم کی جو بندگی"("hunting of the governor") سے تشبیه و محاصکتی ہے جواڑ پہلتے (flywheel) کی غیرموجو دگی میں واقع ہوتی ہے تنفس کے ال مُغَرِّرات کے ماتھ دو سرے مطاہر بھی ہوسکتے ہیں۔ عدم منس (apnœa) کے اختیام زِکِیجن

احتیاج کے زاد میں مریض برغنود کی طاری بروجاتی ہے وہ غافل اور ہے بروا ہوجاتا ، ہے اور اس کا جہرو کہود (livid) بوجاتا ہے۔ اس طرح کمن ہے کہ بیش افغنسی عرصے کئے اور اس کا جہرو کہود (livid) بوجاتا ہے۔ اس طرح کمن ہے کہ بیش افغنسی عرصے کئے اور کا میں مرکب کے اور کا میں اور عدم نفس (apnæa) میں بحر سکر اجائیں۔ مرکب کو بیل اس تعرب ہوجا میں اور عدم نفس (apnæa) میں بحر سکر اجائیں۔ نبض اکثر سٹ فرہی متاثر ہوتی ہے کیکن سرایف طیل (sir F. Taylor) میں مائز ہوتی ہے کیکن سرایف طیل (sir F. Taylor) میں کا کو وہ بیش نفس کے اتبدائی اور در میانی زمانوں میں میں سیکنڈ کے لئے بالکل موقف ہوگئی۔

تنفس بنيو (Biot's respiration) من موعام ترين طور بولتهاب سحابا (meningitis) میں دیکھا جا تاہے کئی سیکنڈ (تمیس یازائد سیکنڈ تک) کے وقفے کم دسیشیں نوئبی طور پر واقع ہوتے ہیں لیکن تنفسات کا چرامعا و اسار نہیں ہوتا۔ را تجنی شعاعین (Rôntgen rays) - بیطریقه تحقیق سینه کے مرض کی حقیقت مشناخت کریے 'یا اُس کی وسوت اور مائے و توع کا انعازہ کرہے کیلئے نہا بت منعنت بخش ہے ۔ عجاب ما جز کی وضع اور حرکسنٹ اور ریو گی تجت (pulmonary consolidation) ورنه (tubercle) نویالیدول اورائع انعما ا (liquid effusions) کی موجودگی کی مشتاخت کیر ذہ پر نظر آنے والے سایہ سے ماسکتی ہے' اور اِن کی عکسی تھیو ہریں لیجاسکتی ہیں ۔ مریفن کے امتحان کا بہترمک^ن طریقه عمراً بیب که اسے افقی وضع میں دیکھنے کی بجائے انتصابی وضع میں دیکھا جائے۔ ں (palpation)- اس سے یہ مراوے کرسینہ کے حرکات کے امتحال کے لئے یا امس کی دیواروں کے اُ ن ارتعاشات (vibrations) کے مطالعہ کیلئے جواً وازيا دوسرے سبب سے ببدا رمو جانتے رہي سينه کي سطح پر إنح تعدر كھاجائے لول الأكر (clavicle) كَيْ يَنْ يُكِ لِي زَرِكُتَ عَيْ (infra-scapular) خَطِّ أَوْ زِيرِ بَعْسَلَى -(clavicle) (ax llary خطے برر كما ما تا لے جس سے حركت كى طلق اور اضا في مقداري كسيتعدر صحت کے ماتر معلوم کی ماسکتی میں ۔ آخرالذ کرمقصد کے لئے انتھ سینہ برجیٹیار کھیدیا مِا آئے اور مریض ملباند آواز سے بر تنا ہے۔ بہترین طریقریہ ہے کہ دونوں انتحول

. وقت سینه کی برط نب برتمثاکل (symmetrical) و صنعوں میں رکھا ما ہے ۔ ؛ غنوں کی طہری (dorsal) سطحیر اور رائی (palmar) سطمیں دونوں امتعال کمحاتی م. (Jex-Blake)- عالت صحت بي ديوارسينه مي البيع ارتعاشات مونيم مي ج أُس بركھ ہوئے إلته كوما ف طور يرخوس ہونے بي [ملسى صوتى تحقيف (tactile vocal fremitus) یا ملسی ارتعاش (tactile vocal fremitus) کے لئے ضروری سبے کہ احبال صوت (voca) cords) کا ارتماش طبی مؤ او پھیے۔ اُر کی ایصالی قوت (conductivity) ملبی ہوا در اس کے سنا نقدر ہی شیعی انہو بات (bronchial tubes)مغتوح مول اورستش كي مافت الفنجي مويه ارتعاش كي مقدار . نند پرت اشخاص میں مختلف **ہوتی ہے . یا بغ** مرکو**وں میں جن کی اواز گہری اور کُخِ** والی مورسب سے زیادہ ارتعاش یا یا جا تا ہے۔عور توں اور بچوں میں یہ ارتعاش . فلیل زین باغ موجود ہوتا ہے۔ ارتعاش مرمِن کی مالت میں ہرایسی جیزے کم یا نا بود ہو ما" ناہیے ہوشبی اُ نبو بات میں رکا وٹ پیدا کردے یا بھیپھوٹروں کو پیچیکا کرا کی اسفنی یا فت کو مفوس بنا و کے مثلاً بلیودائی کیف کے اندر مام (liquid) یا بواکی مو ہو دگی (استرواح الصدر :pneumothorax)- جب ششش کی یافت کے بیجگیا (consolidation) کے ساتھ شبی اُ نیو یات کی مفتوح حالت (patency) موتواریمان زیاوہ ہوجاتا ہے۔ ذات الرید (pneumonia) میں جب جیموٹے اُنبوبات افراز سے بھرے ہوئے ہوں توار تعاش کم یاغ رموجود ہوتا ہے کیکن اگرانبو بات کھانسنے سے مات ہوگئے ہوں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔

سے بینی (palpation) سے بلیکو رائی فرک (pleural friction) کے اتعاشا شعبی مشکی کے ارتعاشات (خرخرات :rhonchi) اور کہفوں یں بیدا ہوسنے والی بعض آوا زوں کے ارتعاشات بھی سنشاخت کے جاسکتے ہیں۔ تتناظ آوا زوں کا

تذکرہ اِسٹاع (auscultation) کے بیان میں درج کیاگیا ہے۔ قرع (percussion) قرع بیعنہ عمیکنے یا عوص سے مرکسی بھی تھے سے آواز بید آکیا سکتی ہے۔ شکاران سے ایک بالکل احتم آواز (absolutely) موتی ہے جس میں مرف طسال میں میں مرف

رومفات موتے ہیں سینے بلنبای (loudness) اور ملک سے (duration)-جب میں یا شکہ کو (جربموا دار کیفے ہیں) ٹھو کا جا آسیے ، تو اُن کی آ واز ایک مدیک توایک شور (noise) ہوتی ہے اور ایک مدیک ایکب موسیقی سرتی (musical tone)- كسى ما خت ميں ايسي موسيقي بر تي جس جد تك موجو و مواسي مدیک اس ساخت کو مکک د اس (resonant) کیتے ہیں کمک (resonance) كالخعار امور ذمل بربوتاب :- (١) ايك كبف جس بن بوالمتعش بوسك (١) د بوارس خوکا فی طور مر لیمکدار ہوں' اورا یسا صیح تنا وُ (tension) رکھتی ہوں لا ہو اکے ساتھ ہم ہم ہنگ ہوکر مرتعش ہو تکبیں نیز آواز کو با ہرکی طرف ایصال کرنے كى صلاحيت وكمنى مول و ديواركاتناك ككك يرجو الرّر كفتا ب أسه مواسس مُعلائ ، موٹ گال کو اُنگل کے اخن سے تعب متباکراورگال کے عصالات کے ا نتباعن کو برل مرل کر آسانی نبلا یا ماسکتا ہے۔ سرتی (tone) ارتعاشات کے ایک ہا تا عدہ مکسلہ سے بیدا ہوتی ہے۔ اس کا اس تفاع (pitch) ارتعاثنات کی في "انيه تعداد ير شخصر موتا جه - اسس كي صفت (quality) كا انخصار لبند نغات (harmonics) یا اونجی سرتیوں (overtones) کی اُس تعداد بر برو اے جو نبادی شر (fundamental note) سکے ساتھ موجو و بھول رشور محض (mere noise) کی طرع مُسرتی (tone) میں میں میں میں میں میں میں المان (duration) اور قدت (duration) موجود ہوتی ہدیں اگر قرع (percussion) کی طاقت میا وی ہؤ تو محض شور کے متعا بلہ میں مرتی کی بندی اوراس کی قدت زیاده جوتی ب

قرع کی سہدنے اور ترسی اور موسی آوازوں (tympanitic) کو طبلی (tympanitic) کہتے ہیں۔ ایسی آوازیں شکم سے اور ایک استرواح ہمائہ والے سینہ سے ماصل ہوتی ہیں۔ ان حالتوں میں ارتفاع (pitch) اونی ہوتا ہے کہ والے سینہ سے ماصل ہوتی ہیں۔ ان حالتوں میں ارتفاع (trachea) سے بھی ایک طبلی آواز میں کہ وی ہے کہ میں ایک طبلی آواز میں ہوتی ہے کہ میں میں اس کا ارتفاع نسبتہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ طبعی سینہ کا قرع کرنے سے مشکل ہوتی ہے جسس میں موسیقیت کا عنصر برنبت اس کے جو طبلیت (normal lung resonance) میں ہوتا ہے موسیقیت کا عنصر برنبت اس کے جو طبلیت (tympany) میں ہوتا ہے

بلیش کمک ورمیان بین گمک کی زیادتی اس ورمیان این اس ورمیان است کے درمیان ہو کہ ہے۔ خفت کمک فلام کرتی ہے ہو الله مرکزی الله مرکز

اور جا مدمعلوم بهوتی ہے۔

انتخاص کی سبت عصلی نشوہ نما والے انتخاص میں اورسینہ کے الکے حصے کی سبت سینہ کی بیثت سے نسبتہ زیادہ اصم مراصل موتا ہے۔

براست قرع کرکے کی جاتی ہے۔ بالواسطہ قوع (immediate percussion) کی شق ترقوی الہو براست قرع کرکے کی جاتی ہے۔ بالواسطہ قوع (mediate percussion) بغتی بیت المیں اسلام ساتی مفصل بغتی بیت الاضلاع فضاء کے طول ہیں رکھ کر اُس کے بعدی بین السلام ساتی مفصل بین الاضلاع فضاء کے طول ہیں رکھ کر اُس کے بعدی بین السلام ساتی مفصل (distal interphalangeal joint) کی طری سطح پر د ائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کی توک سے مطوع جاتی ایستہ کی دو توں جا نبوں کے تعناظ نقطوں کا ایم مفال کرنے بیم مفالہ کرنا بھی ہے وری اور اہم ہے ۔ انگلیوں کو اس طریقہ براشعال کرنے سے مدرا سے سے مدرا سے سے مراسل ہوتا ہے وہاں سینہ بررکھی ہوئی اندازہ ہوسکتا ہے۔ جہاں ایک مگلی سرودی اور اس موسکتا ہے۔ جہاں ایک مگلی سرودی اور اسم ہوتودیوارسینہ براکھی ہوئی انگلی کی دساطت کے بیک (resilience) کا احاسم موس ہوتا ہے ۔ جب او از اسم ہوتودیوارسینہ براکی (unyielding)

یہاں قرعی اور دوں کی دوسموں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے !۔

(۱) صوت طرف شکستر (cracked pot sound) ہو کہی ہے گئے ہیں اس کہفہ یہ مصنائی دیتی ہے جو ایک شغبت (bronchus) سے کمنی ہو (ما (خطرہ موصفہ 168)۔

(metallic علی می کمک (amphoric resonance) یا فلزی جھند کیار ring) دیتی ہے اور حر دوخت ایک بواسے بھرے ہوئے بڑے کہفہ برقرع کرنے سے سائی دیتی ہے اور حر دینے اس ایک بواسے بھرے ہوئے بڑے کہفہ برقرع کرنے سے سائی دیتی ہے اور حر دینے اس ایک اور اس سے بہلے دین قرار (Auenbrugger) کو رہ سے بہلے دین قرار (افرار سے بہلے دین قرار کی تبدیلیوں کے ساتھ یا تی جاتی ہیں ۔

کیں جو قرع کی اور از کی تبدیلیوں کے ساتھ یا تی جاتی ہیں ۔

استعاع (auscultation)- یہ احشاء (viscera) باجہم کے دورہے استعام کے دورہے استعام کے دورہے مصول کا مطالعہ ہے وارد ول کوسٹن کر کیا جا تہہ ۔ یہ ملک مطالعہ ہے وارد ول کوسٹن کر کیا جا تہہ ہے الدر پیدا شدہ استعام کے استعام کے استعام کے استعام کے استعام کے استان کے استعام کے استان کے استعام کے دورہے کے استعام کے دورہے کے استعام کے دورہے کے دو

مون آیک تولید یاروه ال کو حائل رکو کرمریض کے سینہ سے خود کا ن کولگا دیا جاہو۔

یا بالواسطی (mediate) جب کہ ایک موسل صوت الا sound conducting) نا بالواسطی (instrument) کر یون کے سینہ اور سامع کے کا ن کے در میان دبط پیدا کرتا ہے۔

زیادہ عام طور پر جو ہ لات استمال میں لا نے جاتے ہیں وہ یہ ہیں :۔ (۱) ووگوشی مسلماع الصدار جو تقریباً و انج لمبا ہوتا ہے 'اور (۲) سیدما چوبی اسٹنزی مسلماع الصدار جو تقریباً و انج لمبا ہوتا ہے 'اور (۲) صوبی تی کری وں باین مسلماع الصدار جو تقریباً و انج لمبا ہوتا ہے 'اور (۲) صوبی تی ہوئی ہے ۔

مریفن کی ہروضع میں استعمال کے جاسکتے ہیں ۔ استان عاور اس کے لمبی فوائد مریفن کی ہروضع میں استعمال کے جاسکتے ہیں ۔ استان عاور اس کے لمبی فوائد مریفن کی ہروضع میں استعمال کے جاسکتے ہیں ۔ استان عاور اس کے لمبی فوائد مریفن کی ہروضع میں استعمال کے جاسکتے ہیں ۔ اس نے اپنے شاہدات کو مدر سے پہلے لا بینک (Laennee) کے مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کے اپنے شاہدات کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کا دوران کیا کہ کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کا دوران کی کو مدرج ذمل نام سے موسوم کیا ۔ اس کا دوران کی کی کو دوران کے دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کو د

l'Auscultation Médiate ou Traité du Diagnostic des Maladies

des Poumons et du Coeur fondé principalement sur ce nouveau "moyen d'exploration," اور یہ بیرسس من طبع بوئیں ۔ بالوا سطراستاع کے

انگشاف کواس نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے(8):

" ملاا الله من مجسے ایک نوج آن مورت نے مشورہ جائی۔ مریعنہ میں قلب کے مرض کے عام طامات نظر آتے ہے ۔ . . . مریعنہ کی عمر اور صنف کی وجہ سے محصواس کا موقع نہیں متعاکہ میں مندر جبالاطریقہ سے (مینی سینہ پر براہ داست کان لگاکر) اس کا استحاکہ میں مندر جبالاطریقہ سے جھے ایک شہور سمنی ظہر (acoustic phenomenon) یا وہ یا: یعنے یہ کہ اگر ہم ایک ہج بی شہتیر کے ایک مرح کی اگر ہم ایک ہج بی شہتیر کے ایک مرح کی ایک مرح کی ایک البین سے کھر ہے کی اگر ہم ایک ایک البین سے کھر ہے کی اگر میم ایک ہو بی شہتیر کے ایک مرح کی کی ایک مشمالیا اور آسے لیب کر فرب سخت بنالیا 'اور اسس کا ایک برا مریضہ کے ایک مرح کی کا مذکو ایک میں مریضہ کی فر بات قلب کو بیٹ شخص بھی جو اور فرش مجی جب کہ میں ہے یہ دیکھا کہ میں مریضہ کی فر بات قلب کو شخص بھی جو اور فرش مجی جب کہ میں ہے یہ دیکھا کہ میں مریضہ کی فر بات قلب کو شخص بھی اور اور فرش مجی جب کہ میں ہے یہ دیکھا کہ میں مریضہ کی فر بات قلب کو

اس قدرما ف اور وامنع طور برشن مکماً ہول کہ میں نے بہلے کہمی ابناکان براور ا لگا نے برہمی کس مفائی اور وضاحت کے ماتھ ہزینا تھا "

ِ اَگُرِ تَنْدُرُ مِنْ تَصْشُ كَا اِسْتَمَاعُ كِياماتُ تُوہِم ہِرْمَعْس كُيُما تَهِ ہِرِ مِكْهِ ايك أوازسين كي مير بين صورمت تنفس (normal breath sound) بإنحويقلى حریر (vesicular murmur) کہتے ہیں ۔ اس کی نقل یوں اُساری مانکتی ہے كه بنونول كو برمن حرف و بليو ("German "w") يا الكريزي محبول وي (English) ("v") 80ft كا تلفظ ا داكرية كى وضع من ركها حائے اور تلك سے بيونك مارى طئے-اس واز كاار تفاع ا دفي (low pitch) بموّا ہے اور اس میں . نا . و ارتعاشات (vibrations) موتر میں (Müller)- حواصلی خریز شہیتی (inspiration) کے ووران مين سنائي وتراجيم ليكن زفيري مل (expiratory act) يا تو إلكل فاموشی کے ساتھ ہوتا ہے' یا ایک مأثل آواز کے ساتھ ہوتا ہے' جرنسبتہ زیادہ زم اور مختقر (softer & shorter) ہوتی ہے' اور زفیر کے اوائل کک محدور موتی ہے۔ نغس کی آوازوں کی پیدائش کی **توضیح میں مغیر 21**8 پر بیان کیا گیا ہ**ی** لديراً وازين اس وقت جب كربوا ديك نك سوراخ مسيحسى نسبتُه جرارى فعنابي جانی ہے ' ایک منجد حار (inspiration) بن جائے کی وجہ سے بیدا ہوجاتی ہیں۔ د ویان این (inspiration) می تنفس کی آواد (۱) مزمار (glottis) کے مقامر بیدا ہوتی ہواور (۲) محیط کے متعام براس و فت پیدا ہوتی ہے جب کہ موا تنفی عیباً (respiratory bronchioles) تمن سينكل كؤا ورجوفيزى قن تون اورا واقالول (atria) سی سے بوتی ہوئی ہوئی ہوائی ساج ل (air-sacs) کے اندر جاتی سے (ملاحظه بوتصويره) مجب آوازكسي البيه منبع سيفكلتي بوجوكهكيال واسانل پوتو وه عمراً مارول طرف منتِشر بهو جاتی ہے اور اسٹس کی شدّت فا **ملہ ک**ے مربع کے تناسب کمٹ جاتی ہے۔ لیکن جب آواد مزار میں پیدا ہوتی سے جوکہ ایک بلی میں واقع ہے ' تو ایس کا انتشار رک جاتا ہے اور وہ الی کی دیواں کے اندا سے مسل مکوس ہوتی ہوئی، کی کے رامستہ سے نیچے کو ایصال بذہر ہو جاتی ہے، جیاک ایک بولنے کی کلی (speaking-tube) میں ہو تا ہے ۔ مارہم نیچے جاکرانسبتہ

سے جوکہ ممیط کی طرف

ہوائی تاجواں وغرہ

مل برز موتی سیم

تغويت عاصل موني تبحة

بولنے کی ٹلی کا سی صول

استماع من مساع الصدّ

کے متعمال کی تھی توہیج

رماً سبيع . دوران

(expiration)

مي آوازا ورممي زياوه

كمزور زوتى من كيوكم

و **و خالصاً مِ**ز ما له حكي

عام فاعدہ یہ نمی ہے کہ

اً وازیس بواک روکی

مالف منت ميس آساني

سے ایسال پریوں

جیموٹی تالیوں سے کینفدر انتظار گردو سیٹس کیشش میں واقع ہوٹا ہے ۔ اس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزماری آواز جب سینہ کے یا ہرسنائی و تی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے ' پر ہموتا ہے کہ مزماری اور جب سینہ کے یا ہرسنائی و تی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے '

المان المان

تصویر ۹ برسش کی ساخست ، بجوالط مطالط (45)۔ تغنی تعیات موفیزی تناتیں او تافات اورامخوار ل پر موائی تاجے ان سب کی دیوار دل میں جوفیزوں کا اسر موتا ہے جس کی داہ سے گیموں کا تبادلہ موتا ہے۔

ہوتیں کومِں آسانی کے ساتھ وہ اس کے سیاتھ سیاتھ ایصال پذیر ہوتی ہیں سینہ کے بیض معتوں ہیں' جہاں بڑے بڑے شعبات اور دیوارسینہ کے درمیان استنبی اِفت کی تہ جن اِن دہنر نہیں ہوتی' کو بھلی نو رکسی قدر در دشت ترا وازول (harsher sounds) سے

196

براجاً ما ہے، جرز فیر کے بیٹتر مصفے میں ماری رہتی ہیں اور شعبی تحویصلی تنف (broncho-vescicular breathing) كبلاتي من - يد حصت يد مين: عظم التص (sternum) كا ما لا في سرا كيهل في المي أو يون المال و عظم النفس سع اتصال مالسل كرتى بين اورئيت يرخط وسعلى مي أيك ألماسي شكل كي فطفا رُعِس بير مساتوا ل منعتى (cervical) اور بهلا فرری شو که (dorsal spine) شامل بیس - دوسری عبد اموقت يك جب ككر كمشش مندُ رَست ب اور جوائى د استے نفوذ بدر بن و بعلى خرر يوش موجو در تناہے۔ موبیلی خریر بالمنوں کی نسبت بھوں میں زیادہ بلنداورزیا دہ درشت (harsher) بو ام وصرائي تنفس :puerile breathing) بالغول مي والميا نننس تندرست مشش براس وقت درشت اورما لغه آمیز بیوتا ہے جب که دوسراش ا نیافل انجام نه دے را کم مو (تعویضی تنفس: compensatory breathing) تنفن كي أوازيل عيميت نفس من نفاخ مين اور كسس وقت جب كه ولوارسينه وبرز بوء كم وربوسكتي من _ وقفه د اريا دوم مُسَان تنفس interrupted or (cog-wheel respiration و إلى بوتا تع جا لَ شَعْس كَ غِرِ منظم طور رفطنے كى وجرسے، جس کاسب مکن ہے کہ ہو ایکے واضلہ میں میکا نی مزاحمت ہو^ا ما معصوبت (nervousness) کی وجہ سے عضلی فعل کی بتفاعد گی مو ، شبیقی نور معنکے کے ساتھ (jerky) ما تموى بوتاب - إس معم كاننفس زياد و تشخيمي ابميت نبس ركفتا -محویصل حرمر کی کمی مواکه داخله میں کمی یا مغس کی آوازوں کی غېرموجو د گئ اس و قت يا يې تباتی ہے بب که بوائي جو فيزے مطموس (obliterated) موجاتين يا جب أن سع ارتباط ريكينه والانتعبر (bronchus) ميدود بالمطمول بو یاجب ہوائی جوفیزے سطح سینے دور مہٹ مائیں جیساکہ عام طور برلمیکورا فی نفسا (pleural effusion) کی مالت میں ہو اے ۔ آخر الذکرمالت میں فضل کی آواز لی غیرموج دگی کا انخصار اِسُ امول پر ہوتا ہے کہ جب آ واز ایک واس ہوا' میں سے گزرتی ہوئی کسی دو سرے و اسط' مشلاً بلئورا ئی انصباب می **مود** سطم پر ہنمتی ہے تو آخرالذ کریں سے اس کی متقلی اتفی طور مربو تی ہیں لینا المركا منتز معدوابس نعكس موما آبء به الارت أس وقت ببت بري تنفيغ

ہمت رکھتی ہے جب کہ مقامل سنئش کے تمنا طریقتطے تر نعسی اوا زیں ملبی یائی حال ہ شَعِبِي تَنْعُس (bronchial breathing) ابک کرہری آواز ہے جو دوران منفس من مزمارم بيلا موتى بيئ ادروبن لبعوم اور سعبى أنبوات كي مكك سے ترمیم یافته بوجاتی ہے۔ ایسانفس قصبته الربه (trachea) پر استاع کرنے سے مَّنَا مَا لَمُكَمَّا ہے۔شہنفی اور زفہ ی آ وا زیں لول میں میا وی نبوتی ہیں۔ وہ ایک ومرے سے صاف طور بر کیا موتی بن اور ایفیت میں درست (harsh) موتی بن-اً كَيْنَقْلُ أَيَّارِ مِنْ كَايِهِ فَلِي يَعِيبُ عَبِينَ اورزْ بِان يُوجِرِمن "ch" كَالْمُفْلَاوا كُفَّة کی دمنع میں رکھا ہائے اور یا مہر کو معیو اُپ ار کرا ندر کو ہوا چوسی جائے بمشتن پرجو شعبي تغس سُنا ئي دييا ہے وہ اعلیٰ ارتفاع كا (high-pitched) اليبيبي: (tubular) يا ا وسط ارتفاع كا (medium-pitched) كيا وفي ارتفاع كا (low-pitched) ومعفى (cavernous) موسكمات يه وازون كى بلندى (loudness) عني راجم ہے۔ اُنیبیتی نفس (tubular breathing) جو الخصوص متکبت ر (hepatised) مَشْنَشْ بِرَسْنَا فِي و تناسِع الكِ خاص بيونك (blowing) يا "كِيْنُ" (whiffing) کی صفت رکھا ہے۔ کہ فکی نفس (cavernous breathing) کھو کھیلی (chollow) نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ اکن مجھیمطرے کے کہفوں برمشنا ماتا ہے کبین یہ ہشہال امر سروال نہیں ہوتا کہ ویاں آیک کہفہ سے شعبی نسن (bronchial breathing) جب سینہ پرمشنا طِ نے بواس کے میمنی ہیں کہ مشش کی یا فت میں ترمیم ہوگئی ہے۔ یہ تر نیم مِنْتر یہ ہے کہ اِنعبی ماخت میں ماخت میں تبدیل ہوجاتی کہے اور یہ تبدیلی ٰ تو ہوا ئی خلبات کے بڑے ہونے آلف ہوجائے سے ہوتی ہے (جیسے کر ذا نتي^ا اربه پايل ريوي**ين) ميا نبعن او قات اگرېوا ئ**يرانت*ے تما مز*مطموسس مَّهُ بِمُوكَةُ مِونَ تُوسِرِو نِي بِحِكَا وُ (لَلِيكُورا في انصاب: pleuritic effusion) كي في سے موتی ہے۔ فروری شرط یہ ہے کہ گر دوبیش کیشش کے تبدر (consolidation) کے ساتھ شعبی انبو بات کا انفیاع (patency) موجر و ہوئی کہ بزیاری اواز کا ابھال سطح کک ہوسکے اور وہ منتشر مذہو نے یائے' نیز یہ کہ معمو تی تفسی خربر کا جو میزی جزو

صرص و (stridor) ایک بلند آواز ہے جو انبینی نفس breathing) ایک بلند آواز ہے جو انبینی نفس breathing) سیکسی فدرمت بر ہوتی ہے۔ یہ آواز و مزار کی شنگی قصبہ کی ملکی برقی ہے۔ یہ آواز و مزار کی شنگی قصبہ کی ملکی بایک شعبہ کی تشکی کی وجہ سے بمدا ہوجاتی ہے۔ یہ بینے کے بار میں سے کسی ایک شعبہ کی تشکی کی وجہ سے بمدا ہوجاتی ہے۔ یہ بینے کے بیشنے کے بیشنے کے بیشنے کے بیشنے کے بیشنے کے بیشنے کے آومی اسے بیشنے حصے برکسنائی دیتی ہے اور بیش اوقات مریض کے نزدیک کے آومی اسے بغیر مسماع العدر کی مدد کے شن کے تری ۔

غیره حمولی اوازس (adventitious sounds)، ممولی نفس کی آوازول یا مت کرهٔ بالاطور برترمیم شده نفسی آوازول کے علاوہ اور آن کے ساتھ سائد کرہ بالاطور برترمیم شده نفسی آوازول کے علاوہ اور آن کے ساتھ سائد کشنائی وین تو مریض کو کری سانس اندرلینی چاہیے، جس سے مکن ہے کہ برسنائی وین قلیس غیب محمولی آوازی شخرخ احت (rhonchi) لغطاحت (râles) اور فس کے آوازیں میں ۔

کی اواریس ہیں۔
خوخرات (rhonchi) کم وبیش موسی آوازیں ہی جوفاط کے
اجتاع سے شعبی انبوبات کے تعدد ایخاطی علی کے دَرم کیا انبوبات کے عضلی رمیٹوں
کے شنبی انتام کے باعث بدا ہو جاتی ہیں۔ یہ وازی شعبی انبوبہ کی جامسے
اور شکی کی مندار کے کواظ سے بہت مختلف ہوتی ہیں اور انجیس مختلف معمولی آوازہ
بیٹا کو گوکر نے (cooing) کرا ہے (groaning) خرا اف لینے کئے عزامے

(grunting) ایمٹی بجائے سے تشیبہ وی جاتی ہے۔ اولے انظامی (grunting) کہتے ہیں ا خوافے دار آوازوں کو س آن خوخر است (sonorous rhonchi) کہتے ہیں ا اور بہ نبیتہ بڑے آئبو بات میں پیدا ہوتے ہیں ۔ نسبتہ اعلیٰ ارتفاع کی۔ pitched) (Sibilant rhonchi) میٹی جیسی آوازوں کو صفاری خرخر است (Sibilant rhonchi) کہتے ہیں اور بہ نسبۂ جموعے آئبو بات ہیں بیدا ہونے ہیں ۔ یہ زفیر یاشہبتی ہیں ا سنائی دے سکتے ہیں اور ان کی جگہ اور لمبندی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے ۔ بندر آن اور انھیں سے اکثر مریف کے نزویک کھڑے رہنے والے اشنی می کوسنائی ویتے ہیں اور انھیں سے اکثر مریف کے نزویک کھڑے رہنے والے اشنی می کوسنائی ویتے ہیں اور انھیں سے در سے والے اشنی می کوسنائی ویتے ہیں اور انھیں سے در سے والے اشنی می کوسنائی ویتے ہیں اور انھیں سے در سے والے اشنی میں کوسنائی ویتے ہیں اور انھیں سے در سے والے اشنی میں کوسنائی ویتے ہیں اور انھیں سے در سے والے اس کی ہوئی ہے۔

لغطات (râles) مخلف مركى يتمني كي المحسلق من کھو کھے و بولنے کی (rattling) آوازی برل۔ یہ بڑے اوسطِ جامت کے اور نسبتًه جو سط شعبی أنبوابت بن يا رتبي كهنون من ولال كه جمع شده مسال ا فرازات کے اندر ہوا کے زورسے داخل ہونے کی وجے اور بلبلوں کے بنے اور ان کے کسی قدر شور کے ماتھ مھیوٹنے سے بیدا ہوجاتی ہیں یعیض او کا ت انھیں نو خرات یا خشک آوازوں (rhonchi or dry sounds) سے تیز کرنے ، کے لئے مسر اوازوں (moist sounds) کے نام سے یاوکرتے ہیں اسکن یہ تفريق امناسب مي كيونكه مكن مي كخود خرفرات (rhonchi) مخاط كي موجود كي کے باعث بیدا ہو گئے ہوں۔ لغطات (râles) مبیلوں کی جیامت کے لحافا سے مُغَلِّف مِوتَّةَ بِينَ جِيَانِجِيوه بإس مِكَ (fine) متوسط (medium) يامركُ (coarse)كبلاتے من لفظات كى تقتيم لختيبى (bubbling) اور مَتَفَقَّع (crackling) لغطات مي مي كي حاني ہے - اخرالذكر ايك تيز صاف جھنكاردار أ ا نغیاری (explosive) نوعیت کے ہوتے ہن جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یُمجَّت ر تششش کے وسط میں واقع ہوتے ہیں جہاں گمک کے لئے مخصوص مالات موجود ہوتے ، میں ۔ اول الذكر بيعنے تحبتی لغطات كی اواز دهيمي (dull) ہونی ہے ان مي جھنکار آ وصاکے کے ساتھ میو طنے کی صفت نہیں ہوتی اور یہ میتران انبواب میں مدا ہوئے ہیں جوطبی الفبنی بافت سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ متفق لنظانت

ہں جو کھانشی کے بعد ہو۔

(crackling râles) کوبعن اوقات اُن کے مفروضه سمی فغذ (crackling râles) کو اس کے مفروضه سمی فغذ (bubbling râles) اور تحبی لغظت (consonating) کو اس کے باتعاں غایر مکتنف (consonating) کہتے ہیں۔ تخری مغطب (gurgling râle) کی اصطلاح بلا اتمیا زنما م نظات کے لئے تکدت کی اصطلاح بلا اتمیا زنما م نظات کے لئے تکدت کی اصطلاح بلا اتمیا زنما م نظات کے لئے انتخال کی گئی ہے کیل بیٹو اُور ایک نیا م نظات کے لئے انتخال کی گئی ہے کیل بیٹو اُور ایک نیا میں بالوں کی درگر یارٹیم کی مرداسی سے انتخال کی گئی ہے کیل بیٹو اُور اور ہوائی درجین اُومائی سراسی سے انتخال کی درجین اُومائی سے اُس کے وات الریہ کے ابتدائی درجین اُومائی شنگ وات الریہ کے ابتدائی درجین اُومائی شنگ وات میں اور ہوائی تا ہوں کے کھلنے کے باحث بن اور ایسے شنگ ہوں بیٹو کی مور ایس کی مور سے جبک کئے ہوں بیٹو کی دور اس میں مائی دیتے ہیں۔ ہوتا ہے جو جو ان اور ہوائی ہیں میں سے با ما دہ عدم استعال کی دجہ سے جبک گئے ہوں بیٹو ہیں۔ ہوتا ہے دور ان زفر میں بی میں مائی دیتے ہیں۔ متوسط جامت کے اور مو لے لغظات دور ان زفر میں بھی منائی دے سے جبک سکتے ہیں۔ متوسط جامت کے اور مو لے لغظات ور ان ان فر میں بھی منائی دے سیکتے ہیں۔ متوسط جامت کے اور مو لے لغظات ور ان زفر میں بھی منائی دے سیکتے ہیں۔ متوسط جامت کے اور مو لئے لغظات اس کہر شہیت کے دور ان میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ متوسط جامت کے اور مو لئے لغظات اس کہر شہیت کے دور ان میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ میں دور ان میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ میں دور ان میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ میں دور ان میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔

فِلْزِی جَمِیکا رواریا است کو اطلاق ان جمیکا رواد او است کا اطلاق ان جمیکار داریا کوناکھن کی اوازوں پر کیا جا آسٹ جو بعض اوقات اس صورت میں سنا کی دیتی ہیں جب کہ ایک مریض جس کے مشتش میں ایک بڑا کہ خد ہو کو لنا کیا کھا نشا ہو۔ یہ عمواً ایک موسیقی لنظہ (musical râle) ہوتی ہے۔

بعل سُعالی امتصاص (post-tussive suction) ایک پُوسنے کی اُواز ہے جو ایک کہفہ (تدرنی یا تمدور شبی اُواز ہے جو ایک کہفہ (تدرنی یا تمدور شبی اُنے کے بعد سُائی در ہے۔ اس کا سب یہ ہوتا ہے کہ الم بعد گہرے شبیق کے سنہ وعیں ہوا ایک مسئلا دار آ واز (hissing sound) کے ساتھ کیا بک کہفہ کے اندر وا بس میسس کی باتی ہے۔

آ بی استرواح الصدند (hydro-pneumothorax) یا دمی استرواع اصد

(pyo-pneumothorax) كي اصابتون مِنْ أسس وقت بها اللبسد يما يا أن مريض كے سينہ برلكا ہوا ہوا گرمريين كوبلا إجائے تو ايك سيھاك كئى آ واز plashing -(Bound سنائي ديكي جوكه فرينوراني من كي موز اور مائع سين كلتي ب (هنولاً) نقراط: Hippocratic succussion:

فِي كَى آ و إز (friction sound) يا ملثورائي دكر (pleuritic rub) یلٹوراکی دو ایسی طمول کے باہم رگڑنے سے پیلا ہوجاتی ہے جرالتہا ۔ کی وجہ سے کی دری ہوگئی موں ۔ یہ اپنی نیا ابت مُمتز شکل میں ک*یک ویشت کر کرانے* (grating) ا حَرِيرَ النے (creaking) کی آواز ہوتی ہے 'جیسی کہ پیرے کے دو کروں کو ایک دو مرے رزورے رگرم نے سے یا آنگلی کی راحی سطم (palmar surface) کو ایک چو بی سطح نرمتلنے سے تکلتی ہے۔ یہ دورا ن پہنی میں ہترین مسنائی دہتی ہے کیکن مر بے کہ زفر کے ساتھ بھی سنی مائے معض فِر کی اُوازیں لفطات سے نہا بہت قریبی مثنا بہت رکھتی ہمں لیکن وہ سینہ کے تھوڑے ج<u>صنے پر محدور ہوتی ہیں</u> ، اور بالنف سے متا تزمنس ہوتیں ۔جب ویوارسینہ پرمساع الصدر کا وہا وُیدل و ما حیاتا ئے توان کی بلندی مختلف موجاتی ہے۔جب وہ قلب کے اوپریکے بلیورامیں ببیار 127 ہوتی ہیں تو ضر بات قلب کے ساتھ تمنا ظر موتی ہیں کیلن اُن کی لبندی (loudness) نغس کی سیئتوں (phases) کے ماتھ ماتھ بدلتی رہتی ہے (ملیئو اِ فی تاموس ی فرك pleuro-pericardial friction.

بولنے کی آوازی (voice sounds)۔ برلنے کی آوازی وطبی میندیں اعالصدی سخاماتی بیراکی میم (blurred) او رغیواضح نوعیت رکھتی بن جس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیزی افت میں اُن کا ایصال غیر منظم طور پر ہوتا ہے۔ اِس عدم وضاحت کی منفت ہی برصو^{تی} مگ (vocal resonance) کی اصطلاح کا اطلاق کیا جا آہے۔ صوتی مگآ کا كمريا مفقود هو نا (diminished or absent vocal resonance) بريول اورعور تول میں جن کی آ وازیں اعلیٰ ارتفاع کی (high pitched) ہوتی ہیں مکن ہے ارصوتی گلک خنیف ما مفتود ہو۔ مرض ہی اکسُس کی غرموجود گی شعب کے تب د ، (obstruction) یا بیال سے سنٹش کے کیکا و (compression) کا نتیجہ ہوتی ہے۔

شعب صوبى (bronchophony): _ يراصطلاح أس وقت استعال كى ما تى ب جب بو لمنے کی آ وا زیں اپنی نوعیت میں واضح' اورساتھ ہی معمول کے نسبت زیادہ ملبند ہوتی میں رجب آ وازیں واضح گر کم ور مول تو بعیل شعبہ صوتی distant) (bronchophony کی اصطلاح استعال کی جاسکتی ہے ۔ شعبصوتی تجدیشتش میں یا ٹی جاتی ہے' مثلاً اس شجر میں جو ذان الرید اور سب آر دیوی میں واقع ہوتا ہے' ا ورمبض اوقات اس وقت یا نی ماتی ہے سب کشش کا پیکا و (compression) ہو۔ جب شعبہ صوتی موجود ہوتی ہے تو سرگوشی کی اوازوں (whisper sounds) کاجی سشس سے ایمال ہوا ہے (صلی کلا می:pectoriloquy)- برصونی (ægophony) أوازكي و مخصوص إنفي يا تخنعُناهك داس (twanging) ترميم ا فنه صورت ہے جومساع الصدر سے سنائی دیتی ہے۔ یہ نام اسس مشابہت برمبنی ب حرکه اس میں اور کمری کے ممیاسنے (bleating) میں یائی جاتی ہے۔ اس کا عام ترین سبب بلا شبہ بلیئوراکے اندرسیال کی موجو د گی ہے۔ یہ مبغن اوقات ذات الرہی کتجر میں عی بریا ہوسکتی ہے۔ برصوتی کی توجید ہونہایت عام طور پرتسلیم کی جاتی ہے یہ ہے که بولی موتی اواز ایک خالص سُرتی (pure tone) نہیں کمکہ ایک مبنیا وی سسر (fundamental note) اور اسس کے اعلیٰ ترا رتفاع کے کمن نیا ت (low notes) کا آمیزہ ہے۔ یہ بخونی معلوم ہے کہ اوسے اسمسر (of higher pitch) ہوا میں سبے ائے میں اتنی اجمی طرح منتقل نہیں ہو اتنے حتنی احمیی طرح کہ نسبتہ اعلیٰ سُر مُتقل ہوتے ہیں۔ کسس بنا پرخیال کیا جاتا ہے کہ مکن ہے کہ بنیا دی نسرت پال ہیں ۔۔۔۔ كذر من نبيل بآيا اورسطح سببندير الخصوص لمبندنتات (harmonics) سي سنة ما تغرين-اس كواس طرح ببترين ملورير و اصنح كيا ماسكماً ہے كه مريض كوا يسے الفاظ كا تلغظ كولئے كو كهاجائ بن مي حروف علت أقراى " (e) اور " أي " (i) موجود بول [مسشلاً " تقري (three) اورٌ نائنيْ نائن ٌ (ninety-nine)] جن كا انحصار اعلىٰ تر لمب دُنغ ست (higher harmonics) بربرتا ہے۔

استماعی قر غ (auscultatory percussion)-اس ملی استماعی قر غ (ع کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص منفت یہ ہے کہ

ال کے ذریعہ سے استرواح الصدر (pneumothorax) کی اصابتوں ہے۔ طبیب سنے (bell souund) یا حریب استیاع (bell souund) یا حروبہ الصدر سے او ف سمجھا گیا ہے ' مسلم الصدر سے استیاع کرا ہے اورساتھ ہی آب مدد کا دمریض کے سینہ پرایک سکرد کھ کرا سے دو سرے سکر سے ما رکر اورساتھ ہی آب مدد کا دمریض کے سینہ پرایک سکرد کھ کرا سے دو سرے سکر سے ما رکر بجاتا ہے ۔ یہ آواز کھو کھلے کہفہ ہیں گیک ماصل کرتی ہوئی ' مسلم الصدری ایک لیست جھکا دوارسیتی شر (musical note) کے طور پر تنقل ہوتی ہے (نیز کا خلی ہو صفحہ 191)۔

النهاب قصبة الربير (TRACHETTIS) اورنوى الثيني

الہماب قصبہ و ہے ہی حالات و احول سے بیدا ہوجا ہے جوالتہا ب مخرہ بیدا (acute catarhal tracheitis) کردینے ہیں۔ حاونازلتی الہماب قصبہ (bronchitus) کے ساتھ ہو تاہے کیکن ان کے بیداکودہ التہاب حغرہ و اور شعبی التہاب (hacking) کے ساتھ ہو تاہے کیکن ان کے بیداکودہ علا ہ سے پوسٹ بیدہ و رکھتے ہیں۔ کہمی کمبی یہ تہنا بھی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ کھانسی بیداکر و تیاہے جواکرہ خٹ (expectoration) شاید بہت زور کی یا دُورے کے طور برُ اور سی قدر نفث (expectoration) کے ساتھ ہوتی ہے۔ انفلو نیزا کے ہناز میں النہ اپنے نصبہ کے ساتھ نامعلوم مبدا رکا تحت النصی وُرد موجو د ہوسکتا ہے۔ حغومین میں النہ اپنے نصبہ کے ساتھ الم مبلی ممثلی (congested) نظر آتی ہے اور بعض اوقات وسے مناطق مبلی کا ورم اور مناطی اجت ساتھ زیادہ تہر قرے رہیں کی فلز آتے ہیں ۔ مساع الصدر سے فصبۃ الربیہ کے اندر فیا طی اختات (dyspnæa) میں کیا جاتا ہے کہ دیے ہی عالم کی ورم اور مناطی اجت سے بی عالم کی است میں کیا جاتا ہے کہ دیے ہی عالم کی اور میں کیا جاتا ہے کہ دیے ہی عالم کی است میں کیا جاتا ہے کہ دیے ہی عالم کی است اور مکشف وہ کیا میں کیا جاتا ہے کہ دیے ہی عالم کی است از ایک التہ ہوسکتا ہے اور شختات اور مکشف میں اور جی اور میں الذہ ب رائی المیاب (exposure) مثلاً استیال (aquill) اور عتی الذہ ب لیسے موج علیم اور یہ اور یہ (expectorants) مثلاً استیال (aquill) اور عتی الذہ ب

(ipecacuanha) عباب بالوبان (benzoin) کے استثناقات (inhalations) اور عظالقص (sternum) کے بالائی حصتے بررائی کا لگاناکا راکد میں ۔

قصبة الريد برد فتهايريا (diphtheria) كاحمله بوتا بو حبره سي بميل آنا ب ـ جانبي كروب (croup) جرخبري و فقير إكسواك اور كيونبس ايك زاندين زاده ترالبتاب تصدر (tracheitis) بي مجمى عاتى نتى -

کیمی سخرہ کے تدرن کے ساتھ تلی ن قصب نہ الرب المناطی با نت میں of the trachea) ہیں واقع ہوجا آ ہے ۔ غشائے مخاطی با سخت المخاطی با نت میں در نہ کے جاؤ کے بعد تقرح (ulceration) بیدا ہوجا آ ہے ۔ یہ قرح کیمیلی دیوار برزیادہ مام ہوتے ہیں اور عوا آ ہم ملی میٹر ناپ کے ہوتے ہیں کیکن مکن ہے کہ یہ قطستریں مام ہوتے ہیں کیکن مکن ہے کہ یہ قطستریں ، المی میٹر سک ہنچ جا ہیں ۔قصبی تدرت (tracheal tubercle) کے باعث ہو علامات ہوتے ہیں وہ قری آ ان علامتوں سے پوست یہ ہوجاتے ہیں جو کہ حنچ و یاسشش کے ہمن مان مرض کا نتیج ہوتے ہیں ۔

لے و یل می قصبی تستر و (tracheal obstruction) کے عنوان کے تحست طافط فرائیں -

قصبةالريبركي نوبالبدين

(NEW GROWTHS IN THE TRACKEA)

قصبی تسدد

(TRACHEAL OBSTRUCTION)

اس كه اسباب كى گروه بندى مين عنوالول كے تحت كى جاسكتى ہے : ـ

(۱) باہرے دبا و (۲) تغیرات جو خود قصبہ کی دیواروں میں ہو حب ایس (تغیری (آفیقی (foreign bodies) کی موفوق قصبہ کا افران (من کے اند اجمام غرببہ (mediastinal new growths) کی موفوق عام ترین اسباب و اسلی نوالدیں (mediastinal new growths) اور الحی ایک عام ترین اسباب و اسلی نوالدیں (mediastinal new growths) اور الحی ایک عام ترین اسباب و اسلی نوالدیں اور گرون کے سلمات خبیتہ ہیں۔ مُری کا سرفان کی عمد کو د باسک ہے کیکن یہ طان کی اور گرون کے سلمات خبیتہ ہیں۔ مُری کا سرفان کی قصبہ کو د باسک ہے کیکن یہ طابہ کا اور سمی ہو با ہے۔ کہ ان دو توں انبو بات کے در میان انتقاب (caseation) واقع ہو جا ہے۔ کور میں شعبی غدد کا محبی سے قصبۃ الربید دب جا تا ہے اور اگر کھور قصبہ کی اور اگر کھور قصبہ کی دو میرے طریقے [مؤکر کی ہوسید کی دو میرے طریقے (میری کی دو میرے طریقے و میری کی دو میرے طریقے (شعبہ کی دو میرے طریقے و میں کی دو میرے طریقے (شعبہ کی دو میری کی دو میری کھی کھی تصبی دیا ہو ایک دو بیر ہو جاتے ہیں۔ مطافی خبی ہو جاتے ہیں۔ دو میری دو میں دو میری دو اور کا دو بیر برطیع کی دو میری دو میری دو ایک دو بیر برطیع کی دو میری دو میں۔ موانی میں میں اسب آ دیک دو میں برطیع کی دو میں برطیع کو میں۔ دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں بر برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں بر برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کا خاص میں برطیع کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کی دو میں برطیع کی دو میں۔ اس کی دو میں برطیع کی دو میں کی دو میں برطیع کی دو میں کی کی دو کی کی کی دو میں کی کی دو میں کی کی دو میں کی کی دو میں کی کی دو

کیا ماجکاہے۔ اجساھ پنے دیسے تصنہ الربہ کے اندرشا و ونا درہی مجوس رہتے ہیں' لیکن زیادہ عام طور بروہ ایک یا دوس سنعیہ کے اندرگر جانے ہیں' گویکن ہے کہ دونفسی رووں سے تصبہ میں او پر نیجے حرکت کرتے ہموں۔

علا مات _ اہم ترین علامات بہر (dyspnoea) اور صرصری تنفسس علامات بہر (stridulous breathing) اور صرصری تنفسس بیت کے ساتھ اکثر کھائسی ہوتی ہے اور بیلے جماک دار مخاط کا نفث نکلنا ہے ۔ آواز غیر متاثر دہشی ہے کا کہ در ہوتی ہے کیونکہ تسد د زفیری ہوا (expired air) کی دُوکو کمز در کر دیتا ہے یہ سینہ گلک دار (vesicular murmur) کی ورہوتا ہے اس والے کیکن تو یصلی خریر (vesicular murmur) کی در ہوتا ہے یا صرح و (Stridor) کے شور کی وجہ سے مسئائی بنیں دیتا تصبی تی کے ساتھ دوسری یا صرح و (Stridor) کے شور کی وجہ سے مسئائی بنیں دیتا یہ تھی کے ساتھ دوسری

علا ات اسس مذر کی وج سے ہوتی ہیں ہوخیق پیداکرتا ہے۔ به علامنیں بعض اوقات اور کی اُسے میں است بنائی مانت بن الم اُور کمی اَ تورسایا عمینی المقام واسطی سلمہ (mediastinal tumour) کی حالت بن المراق یا لکل فائب ہوتی ہیں ۔

جب تعبی قین یا تصبی انضغا دایک خاص صرکک بینی ما آیئ تو مریف بر شدید بهراورسا تو بی زراق (cyanosis) که ناکهانی حلے بهو مائے کا ان بوتا ہے ان بین سے جند دوروں سے تو مکن ہے کہ وہ شغا باب بموجا نے کہی تیسرے یا جو تھتے یا بعد کے کسی دورے میں وہ غالباً بلاک بوما رئے کا ۔

نص ۔ پیجسب ذمل امور کے درمیان کرنی بڑتی ہے ؛۔ (۱) تب ددِ نعبنة الريدا ورتبددٍ منجره كے درميان - (٢) تصبی تبدّد كے مملف الباب كے درسا ـ منجرہ میں' منجری مرض کی غیرموجو دیگی کو ہی البور ظاہر کردے گی۔ تصبی نضیق کی موجود گی کا قصبہ کو دیائے والے سلعہا الورساکی موج دگی صحرہ بین ہے' یا آگراس سے ا کامی روز تو شعر بین (bronchoscope) سے بھی بتلائی جاسسکتی ہے۔ اگر مکن ہوتو امں امر کا تعین منذ کرہ ہالا دُوروں کے وقوع ہے بہلے ہی کر لینا جا ہے کیونکہ مکن ہے کہ وَدروں کی عالمت میں اِن آلا شکا استعال سکل ہو اور مزید برآ ریمکن ہے کہ دورے حنج ی سننج (laryngeal spasm) کا غلط ایماکر دیں جس کا نیتمہیہ یہ ہو کہ عاطانہ ا ورخیر ضروری قصب شکا فی کر دی جائے بہنے ی اور قصبی تسدّ دکے اثرات کے درمیان بعض انتملافات بوتے بیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جسے گر آرٹ (Gerhardt) نے دیکھاہے کہ حنبری تندو مبئ حنجرہ ' تنفسی مرکات کے دوران میں گردن میں ادیراور نیچ کی طرف بڑی دور تک حرکت کر آسے درا مخالیک تصبی نسدویں و محض خبیف سی حرکت کرتا ہے۔ منوی تسد دیس سر پیکھیے کو گرجا آئے کیکی قصبی تسد دیس سراکز ساسے کو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر حنوی تسدید کی وجہ عضلان مبعدہ کالل (abductor paralysia) ہو تو صرم (stridor) زیادہ ترتبہ بقی (inspiratory) ہوتا ہے' کر قصبی ندوس کھے صرم وعمواً زفير (expiration) كے ساتھ بوتا ہے - تا ہم مغرى تسدد كى بف اصابتوں مي صرفره بردوننفس انعال كيسانغرواتع بوتاب قصبكا التعاع (au scultation) يَتِيناً مَنا لَطَهُ وَهُ مِوْ مَاسِيعٌ كِيونكُهُ مُوامِنينَ (stenosis) تَصبته الريدك اندر مؤلمندترين

(loudest) مرصروح فرویری سنائی دینا ہے۔ زیز بحث کمت علی ہمیت رکمتا ہے کہ کہ تو کہ تعلیم اللہ موجائے کے کہ کہ توی تسدد کا ازالہ موجائے کے کہ کہ تعلیم سنگافی (tracheotomy) سے مکن ہے کہ حنی تسدد کا ازالہ موجائے کہ اس سے تصبی تسدد کا ازالہ ہونا تنا ذہبے ۔ اور جب اس نوعیت کاعملیم یصن کو کہ اُل کا فائدہ نہیں ہنچا مکنا تو سنتی یہ یہ کہ اُسے اس سے معاف ہی رکھا جائے ۔ لیکن مکن فائدہ نہیں ہنچا مکنا تو مسئوں یہ ہے کہ اُسے اس سے معاف ہی رکھا جائے ۔ لیکن مکن میں اور دورا اِلواط ہے یہ دونوں تسدات بوجائیں سینے ایک تو بلاواسط قصبتہ الریہ پر دبا و بڑے سے اور دورا اِلواط بازگر دمنجی اعصاب (recurrent laryngeal nerves) پر دبا و بڑے سے سے مطال یہ اور جائے ہے۔

قطع نظراس المداد كے جو تخرہ بين يا شعب بين ہے حاصل ہوتى ہے قصبى ترا الله كي سبب كى سفنا خت كا انحصار و برطا الله برجمى ہوتا ہے جو كدما تحد يا في جاتى بيل (collateral symptoms) - انصفا طاكاكوئى فيم غالباً دو مرب اعضاء و احتاركو بمي اوف كردے كا اور اس طح عساليل مركردن يا بازوكى وريدوں كاتسد و مناظ اعصاب برد يا واف المعيت با عصاب برد يا واف المعيت با سينہ كے بالائى صحيح برايك طوف المعيت بوائي ويا يا ور كا اس كے برعس جيساكہ بہلے بيان كيا كيا ہے اس تعنيق كو بوائت كے باعث ہوا سے علامات سے مبرا ہونا جا ہے لين جب اور طح كا اوب سے وہ تصب كو د باقل ہونا جا ہے ۔ اس كے برعس بوائي اوب المحت خلام برنس ہوتى كہ جس سے وہ تصب كو د باقل ہونا جا ہے ۔ اس كو رسالا ور دروں صدرى علامت خلام برنس ہوتى كر جس سے وہ سے نا فرائي المحت كيا جا سے ۔ اور المحت كيا جا سے درميان تفريق كرك المحت كيا جا مكے ۔ اور المحت كيا جا مكے ۔ اور المحت ميان مادور تو سي را بحق نا والمحت خلام المحت خلام ال

انذار - یر نهایت ناموافق بوتایت کیونکه ان سسباب پرج که نسبته عام کیا معالیه کاچندان انزلیس بوتا - لیکن مکن ہے کہ قصبہ کو دبائے والے بیوڑوں کی شاذ اما بتیں بیوڑے کے بیوٹ جاسے پرشغایا ب بوجا بیں ۔

علاج ـ واعمات (indications) یه بین : _ (۱) اگر مکن بوتوسب مرض کا دور کرنا ـ (۲) جهال تسدد بالائی صفے میں بوقصبہ کو مقام تسدّ و سے نیکے

کھول، بنااور رہیں علامات اور ٹالوی نستائج کاا زالہ کرنایا یک مرضی غلرہ ورقسیہ (thyroid) ما بيش برورده تيموميد (hypertrophied thymus) كونكال كر خارج كرد بناجابية اوركرون كے بڑھے ہوئے غدد یا البدول كوبھى اسى طرح بھورے حِمَانَ قَا بَلِ رِمَا فَي بُونُ حَيِ الأِيرِكَانِ كَعُولِ دينة جَاهِئينِ ـ ليكن البيع مو ــقع نا درالو توع ہیں۔ اگرا نورسا کی شخیص ہوگئی ہوتو آپ مالت کا مناسب علاع کل من لاناجائے اور بین نصیق (stricture) کے لئے یارہ اور اوال سیم آیو ڈائڈ یا سال ورسان (salvarsan) کے ذریعہ سے فعال داخم آ تشک علاج اعلی میں لاتا جائے' بالحضوم جب کہ تعامل وآ زرمن (Wassermann) نثبت طاصل ہوا ہو-{ یوڈ اُلڈ کا استعال ہرائی اصابت میں کیا جاسکتا ہے جس میں تسدّد کے سب کے ملق قطعی تشخیص کرنے کے لئے کا فی معطبات (data)حاصل مذہول جسم غریب (foreign body) كي صورت مِن قصية شكا في (tracheotomy) كا عليه كزا ميا ميم ا در پیر مریض کو اکٹا کریا ہلاکر' یا ایک شعبہ بین (bronchoscope) میں سے نماض قسم کا کلاب استعال کرکے جبیم غربیب کو نکالنے کی کوششیں کرنی چاہئیں۔

کبحث انسباب ۔شعبیالتہاب ایک اولی مرض کے طور پر واقع ہوگیا ہے' اور ایسی صورت میں وہ غالباً اس معمولی ذکام (common cold)') کی ایک ہے جوسغہ 195 پر بیان کیا گیا ہے اور اس کی جر توسیات اور طریقہ سرایت می اسی کے جرتومیات اور طریقه سرایت کے ماثل ہوتے ہیں۔ اس تسم کاشبی الماب کٹر عنجرہ اورا نفی عنشا ئے مفاطی کے ابہتا ب کے ماقہ یا اس کے پہلے ہو اسے 'یا مکن کیے کہ البتہاب آخرالذکر مقایات کے اندر شروع ہو' اور پیر نیچے کوشعابت بسیل مائے۔ درتقیقت زکام کے باب (section) کا مطالع شعبی النہاب کے ہمراہ کرنا چاہئے بیعبی التہاب کا ایک دوسراسب بیہ ہے کہ شعبی عشائے محاطی کا تماک

خرائش آ ور بخارات کے ماتھ' یا نشوں ذرّا ت (جیسے ک*ر گرد وغیا ذکر کر)* کی **مال** مولکے ساتھ' إسرةُ مرطوب اور تغير ندير آب و مواول كے ساتھ' يا كا نوں كى يابعض كارخانوں کی ہو اکے ساتھ ہو۔ شعبی البہاب شعبی انبوات کے اندر اجبام غریب کی تنبقی موجودگی سے بھی بیب! ہوسکتاہے۔ ایبا ہو نا مقابلةً ننا ذہبے کیکن اُنیوہائت کے اندرانعیاب شدہ خون مجی اس طریقہ سے عل کرسکتاہے' اور شعبی التہاب جرم شئش کے اندرور ش یا سرطان (carcinoma) کے جا کرسے عمی ہمشہ واقع موجاً اب ۔ شامبی البّها سباً ن نا زلنی مصنوبات (catarrhal organisms) میں سے کسی ایک کے باعث ہوسکتا ہے جو بُماق (sputum) کے اندرموجودر سنے میں سبعیے کہ نبقے ، ریوی (pneumococcus) وَلَمُ لَعَنِيدُ رِكَا عَصِيدُ رِنُوى (pneumobacillus) نبعًا عصبيد (streptococci) خرد تنبقد نا زلتي (M. catarrhalis) نبقاست عنم (staphylococci) خود نبقه محمارزل (M. tetragenus) اوركيمي عمومي عصیهٔ قولونی (bacillus coli communis) - نیز به برست می اسکی سرایت (focal infection) اورخاص كرجوني مض (sinus disease) سے شا نوى طور ربيدا ہوسکتا ہے ۔ بعض سساری امراض مثلاً تب محرقہ (typhoid fever) ' کھسراً وُمُتَّقِریٰ ا نغلو ٔ منزا' اور کالی کھانسی (whooping cough) کے ساتھ شنبی التہا بہمشہ ایا ماتاً ے اور مون برائٹ (Bright's disease) میں یہ اکٹر موجود ہوتا ہے شعبی انتہاب اور دمه (asthma) کا ماہمی تعلق کمباہے یہ بعدمی بیان کیا جائےگا۔

ہوتا ہے شعبی البہاب کامب معت (predisposing cause) ہے یہ وہم گرا کی منبت سرا من شعبی البہاب کا مبت زیادہ عام ہوتا ہے ۔ مزمن شعبی البہاب کا دشعبی البہاب کے درمن البہاب کا درمن ہے کہ مزمن الب ہوسکتا ہے اور یہ بعبی مکن ہے کہ مزمن شعبی البہاب کی موجودگی برحا دشعبی البہاب کا اضافہ ہوجائے ۔

ا مراضیات (pathology) سب سے زیاوہ ہاؤٹ ہونے والاحت عضائے خاطی ہے کین مض کی شدیدیا طول ا ما بتوں میں سخت المخاطی المسبقہ عضائے خاطی ہے کین مض کی شدیدیا طول ا ما بتوں میں سخت المخاطی المسبقہ (submucosa) اور شاؤ شالوں ہیں شبی اُ نبو بات کی کر یا ن اور شش کے وہ صحیح ہم ہم ہم ہم ہم وہ میں اور قدم میں زیادتی ہموجاتی ہے اور عقور سے خاطی کی عروقیت (vascularity) اور ورم میں زیادتی ہموجاتی ہے اور الب صاف سیال ہوتا ہے جس می خاط سلم سے برکڑ ت ا فراز کلتا ہے۔ یہ افراز ابب صاف سیال ہوتا ہے جس می خاط (mucus) موجو و ہوتے ہیں ۔ آخری درجوں میں یہ افراز سید خلیوں کی بوئے ہموجو و ہوتے ہیں ۔ آخری درجوں میں یہ افراز سید خلیوں کی رصی میں ہوئی ہمیداو کی موجو و ہوتے ہیں ۔ آخری درجوں میں یہ افراز سید خلیوں کی رصی خلیات یائے جا میں جوکہ انحفاظی حالت میں ہوگ کا میں میں خلیات بیں ہوگ المی خلیا ت میں ہوگ المی خلیا میں موجو و ہو۔ اسے خلیات یائے جا میں جوکہ انحفاظی حالت میں ہوگ کا اسے خلیا ت میں میں شروع و ہو۔

والمارية والمارية

شعبی التهاب کانیتی یه مو آپ که خودسشش کی ساخت میں اہم تغیرات واقع ہوجاتے ہیں۔ یعنی التهاب کانیتی یہ مو آپ کہ خودسشش کی ساخت میں اہم تغیرات واقع ہوجاتے ہیں۔ یعنے ما دشعری شعبی التهاب سے گفت کی هدب و (broncho-pneumonia) بها ہوسکا (vesicular emphysema) به مرسکو بصلی نف آخ (chronic interstitial pneumonia) ہوجا آپ کے بعد محو بصلی نف آخ (chronic interstitial pneumonia) ہوجا آپ ۔ آخرالذکر میزوں کا تذکرہ گذار آگا کیا جائے گا۔

کنتکی هبوط (lobular collapse) انفرادی گفتگوں میں کہس وقت ہوتا ہے کہ جب اُن ک پہنچا نے والے شعبی اُنہوبات مخاط سے مدو وہو ماتے ہیں او اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اُنہو بہ مدو و ہو ما تا ہے تو اکس کے اندر کی محبوس موا ایک غیر متح کہ حالت میں ریوی شعر یا ت کے ساتھ متماس رہنے سے خبذب ہو جاتی ہے ' اُسی طبح جس طرح کہ وہ ہوا ہو کہ تحت الجاری خلوی یا فت کے اندر داخل ہو گئی ہو۔ اُسی طبح جس طرح کہ وہ ہوا ہو کہ تحت الجاری خلوی یا فت کے اندر داخل ہو گئی ہو۔ مشریا فی خون کے امتحان سے مال سٹ دہ تجربی شہادت (1) موجودہ کہ

شعبی اہماب کی شدیداصا بنول میں ہوئم (dyspnœa) یا یا جا سا ہے اس کی وجہ (CO) کا احتباس کی وجہ (dyspnœa) اور آکسیمن کی قلت ہیں اور یہ احتباس اور قلت خالباً شعبی شیخ کے ماعث رونما ہوتے ہیں۔

طبیعی ا مارات معا ننه کرے بیننس نیزنطرا آب دسید مثال (symmetrical) اورعام طور بریتوسط ورجہ کے بیشس تمدد کی طالت میں ہوتا ہے۔ تنفس کے میں عضلات (accessory muscles) قوی عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اورزفیر (expiration) طویل ہوتا ہے۔ معض افات دورانِ تبیق (inspiration)

مي بين الاصلاع فضائي اندركويوس لى جاتى بي . قرع (percussion) كرندير عمواً ایک طبعی کمک دارا واز کلتی ہے لیکن ہوا تی حوصلوں کے عارضی بیشس تمدد کے باعث کمبی کیجی خیف سی بیش گیک (hyperresonance) یا ٹی ماتی ہے مکن ہے کہ جمع شدہ افرازے یا ہموط (collapse) کے باعث ممک میں کمی ہوجائے ۔ا منتل (auscultation) طا ہر کر تا ہے کہ تہتیں اور زامین و نوں کے ساتھ صفاری خرخوات (sibilant rhonchi) باس مان خو خوات (sonorous ronchi) موجود موت میں (جس کا استعمار ما وُف أ بوات كى جامت ير موتاب) يامخلف أتسام كے لغطات (râles) موج و بهوتے من يا فرخرات (rhonchi) اور انطات (râles) دونوں بیک وقت موجود ہوتے ہیں ۔ زیا دہ موسفے خرفراً (coarser rhonchi) اکثر سینہ پر رکھے ہوئے! تھ سے محسوس ہو ماتے رہیں' بلکہ مکن ہے کہ خود مریف کؤیا اُس کے پاس کھڑے ہوئے اشخاص کو بھی سنائی ویں ۔ زیا دہ ٹرے بینی موسیع لغطات (coarser râles) ز فیرا ورشهیق دو بول کے ساتھ 'اور نہابیت باریک تغطآ (finest rales) مرف تبسق كرما تدسسنان ويتربس -يداموات تمام اصابول میں یا مرض کے تمام ورجو آ میں مکسال طور پرنہیں موجود ہوتے۔ بہت سی اصابتوں میں تنها خرخرات (rhanchi) موجرد ہوتے ہیں یمشدیداصا بنوں میں یہ اصواست مختلف طور برمملوط ہو کرسالے سینہ پرسنائی دیتے ہیں؟ یا در مکن ہے کہ توبیلی خریر (vesicular murmur) كوبالكل وإ ديس شعبى معنله كي شيخ كي صورت بين زفبر (expiration) ما ال طور برطويل بوما ما ي ـ

حادث عبى البهاب كے علامات - ابتداءً قدر ك كمندى (malaise) اور كسيند ميں نگى كا احماس ہوتا ہے اور كھانسى واقع ہوتى ہے ليكن بكت اور كھانسى واقع ہوتى ہے ليكن بكت الموسيند ميں نگى كا احماس ہوتا ہے اور كھانسى واقع ہوتى ہے ليكن بكت الموسا بتوال ميں قدر يت بوكر ہے اور بيارى كھانسى تك محد د د ہوتى ہے - سند بد اصابتوں ميں قدر يت بوكر تي مين اور قارورہ قليل المقدار ہوما تا ہے - كھانسى استدار موما تا ہو - كھانسى استدار موما تا ہے - كھانسى استدار موما تا ہے - كھانسى استدار موما تا ہے - كھانسى استدار موما تا ہو - كھانسى استدار موما تا ہے - كھانسى استدار موما تا ہو - كھانسى تا ہو - كھانسى

جبری زفیر (forced expiration) کے مصلات میں بھی در دیوتا ہے جس کی وجہوہ ا (strain) ہے جوآن بر بڑ آ ہے ۔ اس وقت نعنت محض قلیل المقدار ہی ہوتا ہے اور بنلی جماک وار مخاط پر ضبل ہوتا ہے میں کے ساتھ مکن ہے کہمی خون کی دھاری موحود هو په چندروزیکه مېد کهانسي نسسته زيا د ، آمان اورزياد ه ميملي **بوماتي ېځ** ا ورنغث (expectoration) مق*دار من* زیاده وافز٬ زیاده غیرش*غاف٬ اور زر* و اور سنر ہوجا ناہے جس کی وجہ یہ ہے کہ س میں خون کے سیبیہ تطبیوں کی بڑھتی ہوئی مقدار و كا اضافه ہوتا ماتا ہے ۔لنسینہ نضیف ترا صابتوں میں نفث' دوران نو اب میں جمع موما نے کی وجہ سے مسم کے وقت عمواً زیا دہ تکلیا ہے اور شہروں میں یہ بُ اَق (sputum) اکثر اوقات کرہ ہوائی سے افذ کروہ رنگ کے ماعث سیاہ ہوتا ہے۔ مر (dyspnæa) اکثر زیاده بوتا ہے اور مریض کو بہتریں سیدھا بیٹھنا پڑتا ہے (ا نتصاتی نفنس: orthopnea) اورتمام منسي عضلات کو حرکت ميں لانا پر تاہيں -کھے عرصہ بے بعد مخاطرا میزریم (muco-pus) کا افراز کم بوجا آہے' کھانسی نسستہ کم مرتبة من لکتی ہے اور بتدریج علامات رفع ہوجاتے ہیں ایجب اس کل میک جسے اوپر شعری شعبی التهاب (capillary bronchitis) کے نام سے بیان کیا گیا ہے صغیرترین شعبیاً نبوبات ریمی افرازہے کیر ہو جا میں تو حالت نہا بٹ خطر آک ہوتی ہے الخصوص بالكل تيوك بچول بي منديد بُهرُ عبريه اورا طراف كاسخت زراق (cyanosia) يأكبود (lividity)، اور سریع خستنگی (exhaustion) واقع ہوتی ہے ۔ کھانسی ابتدار ا اً تى ہے' اور اُس كے مئا تھ لزج مجكد ار مما طأيا مما طاآ ميز بيپ' يا بيپ' نعنت مِس إفرا خارج مرتی ہے۔ م مدور عرب سی مریض کبووا ور عنو وہ (drowsy) موماً م ب -اس کی نبض زیا ده کرز در اور زیا ده سریع معوماتی ہے تیہ بقی مساعی سنبیّه کم کارگر موتی ہیں اور بین الاضلاع فضائیں زیا وہ اندرجوسی ہوئی ہوتی ہیں ۔ نفث بتدرایج کم موما آ ہے، اور موت سے پہلے د ماغی د ورا اِن خون کا اختلال قوم (coma) سے طاہر ہواتا ہے جس کے ساتھ اکٹر خفیف ندیان تھی ہو اے۔

مزمن شعبی البهاب کے علامات یہ س کے خاص صفات و مہل حادثہ کے مغات سے مخلف نہیں ۔ نیکن اس میں تب اور وہ بنٹی انتلال نہیں ہو تاجو حاد ملوث

واقع بوتام، اورطولی بدت که جاری رہے کے بدشقل قسم کے نافی تنائج بدا ہوجاتے ہیں۔ فورضش میں نفاخ (emphysema) اور اِشاع انبوا اُسے (کَمَلُ د الشعب فروضش میں نفاخ (جوبا آئے جن کا بیان بعد بین ویا جائے کا لیکن مرئن شبی انتهاب کے اثرات صش سے بھی آگے کہ موس ہونے دیں۔ خانج نفاخ (بی کا بیان لاخط ہو) روی دوران خون میں مزاحم ہونا ہے اوروایا نفاخ (بی کا بیان لاخط ہو) روی دوران خون میں مزاحم ہونا ہے اوروایا نفاخ (بی کا مرائے کے دایا ن قلب بالآخر تنسع ہوجائے ، اور ایسا ہوئے برعام وریدی تظام مت اثر بوجانا ہے جس کانتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اطراف زیرین کا تہتے اسلالے جا استفالے سکی استفالے سکی اور ایسا ہوئے برعال استفالے سکی استفالے کی استفالے سکی اور ایسا ہوئے برعال استفالے کی استفالے کی استفالے کی استفالے کی اور ایسا ہوئے اور اس موال کے بی استفالے کی استفال نواز (tricuspid regurgitation) یہ در میں المیت المین المیاب مریض کی قرت پر ایک خطراک اثر والی ہے ۔ نمید میں خال نفی موران اوران قلب کے ۔ نمید میں خال نفی و ت پر ایک خطراک اثر والی ہے کہ امرائی نفی وائی استفال نفی وائی استفال نفی وائی بہت ہوجائے ۔ بعض اصا توں میں یہ بھی مکن ہے کہ اس آخری درجیں ایک عادتی تمی میں استفی الہتاب کے ۔ عام مام طور برجب ویل بیان کئے جاتے ہیں : ۔ میں مام طور برجب ویل بیان کئے جاتے ہیں : ۔ میں مام طور برجب ویل بیان کئے جاتے ہیں : ۔ میں مام طور برجب ویل بیان کئے جاتے ہیں : ۔ میں مام طور برجب ویل بیان کئے جاتے ہیں : ۔

ا اما بول کی سب المرائی معدا و سعال شتائی (winter cough)
کوعنوان کے تحت آتی ہے کو متذکرہ الاطریقہ بروائع ہوتی ہے ۔ یہ کھانسی تغیر نیریر
ہوتی ہے اور مبض اوقات یہ ووروں کی صورت میں آتی ہے اور رات کے وقت زیاہ سکیف دہ ہوتی ہے جو بوقت استراحت سکیف دہ ہوتی ہے جو بوقت استراحت بعی الزشد ید کھانسی ہوتی ہے جو بوقت استراحت بعی طرف افرازات کو نکا لئے کے لئے کافی ہوتی ہے ۔ نفث مرض کی شدت یا وصعت کے وقت اس میں اور وہا کہ وار ہوتا ہے اور مبح کے وقت اس میں اور وہا کہ وار ہوتا ہے اور مبح کے وقت اس میں میں ہوا بہت کہ ہوتی ہے ۔ یا مکن ہے کہ وہ انسان اور کی ملی رسی کہ وقت اس میں ہوا بہت کہ ہوتی ہے ۔ یا مکن ہے کہ وہ انسان ہوا ہم مخلوط (aputa) می آخاف کے اند ا ہم مخلوط اش سبز یہیں ہو۔ اس صورت میں بُنا قات (aputa) عمو آخاف کے اند ا ہم مخلوط بوجائے بین اور وہ سکہ نما کی کیفیت (nummular character) جو سبل دیوی میں بوجائے بین اور وہ سکہ نما کیفیت (nummular character) جو سبل دیوی میں

عام ہوتی ہے نہیں ظا ہر کرتے ۔خرد بین ۔ کبر نیچ کثیر انتدا در بی خلبوں کے ملاوہ مسر کمی سنطیے جن میں چر نی ہوتی ہے ' اورغیر مرض زا خر ،عضو پے و کھا کی دیتے، ہیں ۔ کبھی کہلی نفٹ کے اندرنوں موجو د ہوتا ہے جوعمو ہا وسار بوں کی سورت میں ہوتا ہے کیکن مٹ فہ مالتوں میں تودوں کے طور پڑیا گئی فری مقدار میں ہوتا ہے ۔

م يخشك شعبى التهاب (dry bronehitis) إخشك نا زلت (dry catarrh) إخشك نا زلت (dry catarrh) مرمن عبى التهاب كى ايك قسم هئي جن بن افراز نها بيت كم مؤاج كمانسى متوازئ سندا ورطول بوتى هئي جس كانتيجه يه بوزا ب كه چركاشد برامستال واقع بوجا آب يد ليكن ثباق يا تو إلكانهس بوتاكيا مرف لوجداد (tough) خاطكايل مقدار بيدا بوتى هي سين بي بهت خرست (soreness) ورنسته جمور في انبوات مقدار بيدا بوتى هي بست نهر (dyspnoa) بوتا ب -

133

م. كند مله ما منتن شعبي التها حيد putrid or foetid (bronchitis ۽ اس کی مميز خصوصبت بها يت بد بودار بُساق ہے جربیتیزان اصابر میں ہوتا ہے من میں انہوبات نتیج ہوجاتے ہیں۔ بُہات و افر مقدار میں اور کسی فدریلا ہو ًا ہے' اور کیا تی وان کے اندراکٹر تین تُہوں میں تعدا ہوجاً ہے' جن ہیں سنے سب سے اوپروالی تہ جماگ دار اور نحاطی ہوئی ہے اور میانی تہ اکتیلی عملی نحاطی سیال ہونی ہے اورسب سے نیچے ہیں۔ کی دبنرتہ ہوتی ہے جس میں وہ اجمام موجود ہموتے بن عو وطرش ما تراو نے کے صلمات (Dittrich's or Traube's plugs) کے نام سے موسوم ہیں۔ اِن کارنگ سیبدی ائل را دی اِمیلارا وی اُن ل زرد ہونا پُرُ ا ورجامات میں یہ آجرے کے والے سے لے کرمیسم کے بیج کے برابر مک مخلف رموہنے میں ۔ خرد بین کے نیچے ان کی ترکیب میں رہی جیات کئر آلے (detritus)، حب اُنکم یا میٹک (palmitic) اور اسٹیرک (stearic) ترشوں کے باریک سوزن نما بنڈِل اور تنجیف شعریہ (leptothrix) کے بلدار وحاکے ثنائل ہوتے ہیں۔ اس بُباق کے کیمائی افيه أييميك (acetic) بيولما نُرك (butyric) اوروكيريا كك (valerianic) تُرْتُ لِيُوسِين (leucin) فائروسين (tyrosin) مسلفيُور يثب إلار وجن. (sulphuretted hydrogen) أورستها أرا مأن (methylamine) گندیده شعبی البتهاب بین اور*رُشش کے گنگرین میں ا* متیاز کرنا چلہئے ۔ بہت ید مُودار بُبِاقُ أَسَ وُ بَلْهِ (empyema) سے عبی نکل سکتا ہے جرکشتر کے اندر میوٹ جائے اور بی کسی یہ ایک پرامنے تدر نی کیف (tuberculous cavity) سے بھی کنیا ہے۔ ه - مَكُورِيني (plastic) فَا مُدِرِيني (fibrinous) إِلَروِي (plastic) شعبی التھا ہے۔ اس مِٹ وعارضہ کی ممتز خصوصیت یہ ہے کہ اس مِں نفٹ کے اِندرشمی اُ نبومات کے سالک (casts) فارح ہوتے ہیں ۔ بُاق عمواً گول تو دہ کی شکل بین اور مخاط یا خون سے ڈرمعکا ہوا ہو ماہیے اور جب اُسے یا بی میں رگڑا جائے تو ہمیں شعبی انبوبی نظام کے ایک سے کا کم و بیش کمل شاخدارسیکہ (cast) نظراتا ہے۔ یسبیک عمولاً ایک قال کے بر (goose-quill)سے زیادہ دبزنہیں ہوتا اور طول یا ا سے کیکر اوا کی مک متغیر ہمو تاہے اور مرف ٹا ذہمی تم یا ۵ یا بلکہ ، ایج کک بہنچیا سہے ۔

اس کارنگ را دی یا سیبدی ائل زر دربوتا ہے' اور یہ ہم مرکز وُرُون (laminæ) میسکر مِوْنَا ہے جوعمولاً انبوبہ کے درونہ (lumen) کوٹرنیس کراتے، یہی دجہ ہے کہ یہ سبالگ سوائے اُن کے بوصغیر ترین اُنبوا شہد نظے ہوں مھوس بنیں ہوتے ۔ خرد بین کے یجے انس سبکہ کی ساخت ریٹک دارنظر ہتی ہے جس س کثر انتداو سیبد جب ہا ہے ، نتفات بعید (اسٹریٹوکا کا بی) نتفات عنیہ ساٹا یڈن کی قلمیں گرومنسن کے مُرغوم لے (Cruschmann's spirals) اورشار کو لیڈن کی فسلیں Charcot-Leyden (crystals مرفون موتى بس (المخط موصفيه 141) ـ مريض كوكهانسي كيسخت مع ہوتے ہیں جن سے اس کا دم مگٹے لگآہے اسا تھ ہی سسینہ یں کم وہش در د اور د بائو (oppression) محموسس ہوتا ہے اوران حلوں کے ساتھ ابتدار میاق نہیں نکلیا ، اورار کھی کلتا ہے تووہ تا بدقدرے فاط ہوتا ہے۔ کچے عرصہ کے بعد (جرمرف بندہی گفتے کا بارو اتین دن کا ہوتا ہے) ایک شعبی سبیکہ خارج ہوتا ہے۔ اس سے عمو ما فی الفور ارام محسوس ہو اے اور کھانسی کم اغائب ہوجاتی ہے ۔ لیکن وہ عمواً جست ری لحنٹوں بیں چیرعود کر ہی ہے اور بعض او فات ایک اوھ روڑ کے وقف ل سے سالک (casts) کئی دن کک نفت سے خارج ہونے رہتے ہیں اور چرمریض تبدیج بالکل جیما ہوجا ہے۔ معض اُصابنول میں نفث الدم (hæmoptysis) واقع ہوتا ہے' اور پیممر اُ سیکہ خارج مونے کے بعد رمو اے طبیعی المرات ابک شعبہ کے تعد دیے ہوتے ہیں اور اس کے مانچوہی جیسے جیسے مبالک اکھر تے جاتے ہیں لفطان (râles) نائی ویتے بس - نکو نی تنعبی التهاب (plastic bronchitis) شاؤری مهلک بوزای ورجب ہوتا ہے توبیحیب دگیوں کے سب سے ۔ لیکن وہ غیر مشظم وففوں کے ساتھ کئی سال کے عرصهٰ کک متواتر ہوتار نینا ہے۔

(clubbed finger) المراس المراس و مرض كثر مت خليات مدخ المجاب المراس الم

بوجانا ہے اور ایک اصابت میں شریا ہی خون ' بجائے طبعی ۵ ہ فیصد کی بیمن کے تم ہی فیصلا آکیرسے پرٹرڈ پایک یہ اسم ہو گہ ہیمو گلو بین اور سرخ خلیوں میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا تھا دید آآکسی کی جیمی مقدار جونوں کے فریعہ سے منتقل ہوئی تقریبا طبعی درجہ کی تھی۔ ٹریافوں میں ۵۰۵ کا دیا و بھی ریا وہ تھا اور مریض کی سانس سایت بیمولی ہوئی تھی (۳)۔ عول کی نبت مروزیا وہ عام لمو بیرا وف ہرتے ہیں اور تعالی و آرمن (Wassermann) کی نبت مروزیا وہ عام لمو بیرا وف ہوتے ہیں اور تعالی و آرمن برور دہ اور تمتع ہوتا ہے ' کی نبت مروزیا وہ عام لمو بیرا وف مو ایس بہت بیش پرور دہ اور تمتع ہوتا ہے ' میں کا مظام و ہرتی طبی ترکسیم (electrocardiogram) سے ہوتا ہے ۔ ریوی نشرایان کا اتباع اور آ تھی وا اور جیسی میں احتقال (engorgement) بیا جا آ ہے 'جور ہوی

دموی داوی زیادتی کی د تبلّ ہے۔

المناف ا

اب اسس کی تعبین باقی رہ جاتی ہے کہ آیا جاد سعی الہماب ایک اولی است سے یا ابیے عواض کا جیسے کہ کالی کھنے کہ (whooping cough) کھی اُر تنب محرفہ

1.34

یا دورری سی نوعی ب کا تا نوی نیتجہ ہے۔ بچوں میں حادُوخی ندّن (acute miliary) (tuberculosis) کا خیال کیا جا ایجی صروری ہے۔

اندار دروز سے لے کر مین مفتول یا زائد تک ہوتی ہے۔ رہی (purulent) یا شعبی التھا ہے۔ رہی (purulent) یا شعبی التھاب کی جملک اصابتوں ہیں یہ تدت ہوتا ۱۹ روز ہوتی ہے۔ مذمن شعبی التھاب کی جملک اصابتوں ہیں یہ تدت ہوتا ۱۹ روز ہوتی ہے۔ مذمن شعبی التھاب (chronic bronchitis) و اگر جبہ یہ اکثر زیدہ رہتے ہیں۔ و زیا ہے کا اہم بہت سے لوگ اس کی موجود گی ہیں بھی بٹری عربی کر زیدہ رہتے ہیں۔ یہ موجود گی ہیں بھی بٹری عربی اور اب کر ماہیں اور اس کے مریض دور اب کر ماہیں اکثر عملی التجاب اور اس کے مریض دور اب کر ماہیں اور مرما ہیں بھر بھالہ ہوجاتے ہیں۔ لیکن اس کی حالت بعد میں نور میں اور مرما ہیں یا شہروں کے سرد کہروں میں یا دور مرم مقامات پر ترقی یا شال بشرقی ہوا ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اار میض گھرکی نفر میں اور ایسے میں اور وائی مقار اور ثانوی استانے دیں وائی ہوں گے۔ اثرات اور اور کی مقار اور ثانوی استانے دیں ایسے نفاع شمام انوبات اور وائی قلب

تخریز - اس کا انحصاداس امر پر ہوتا ہے کرر است کے منبول سے اور
انفرادی اصابتوں میں سرائٹ کی استعداد پیداکرنے والے اساب سے بچاؤکیا جائے۔
اثر بذیراننخاص کو نازلت (catarth) کے دو سرے مریفنوں سے احتراز کرنا چاہئے۔
اگر تماس کے بغیر چارہ نہ ہو تو انفلوئٹزا کے تحت میں بیان کئے ہوئے جالی کے بعرو لوئٹس (coryza) کی روک تمام
یہرو لوئٹس (gauze masks) بہنے جاسکتے ہیں ۔ زکام (coryza) کی روک تمام
کے تحت میں بیان کی ہوئی مختلف تدبیریں اطاحظہ بوصفی (196) مناسب صابتوں میں استعمال کی جاسکتی ہیں ۔ ندخورہ جدریات (stock vaccines) یا خود زاد میرانیات (stock vaccines) کی خود زاد میرانیات (autogenous-vaccines) کے خوالد کر کہا تھا

(sputum) سے تیار کی طامکتی میں کیکن کاشتیں ناکتے بھی لی جامکتی میں جہا ل و و عصویہ جومزش کا خاص سب ہے۔ اکثر خالف کا ست میں خال کیا جاسکتا ہے انگلتا کے موسم میراکی آب و ہواجس میں سر دی اور بطوبت ہوتی ہے 'تشغبی النِّماب کا ہما بت عام سبب معلد (predisposing cause) ہے لیکن مکن ہے کہ اسمان کے جنوبی مقامات جیسے کہ لوزن متھ (Bournemouth) والیت شنر (Ventnor) ارکوے (Torquay) یا بینزنس (Penzance) کی بودوباش ساز کارنستانج بیدا کردے ۔ نیزساز گارآب مروائیں برون انگلتان میں بھی ہیں اور مت نٹون (Mentone) سان ریمه (San Remo) کمنیس (Cannes) آرکے سفان (Arcachon) خزار کیا نری (Canary Islands) ٹیرا (Madeira) اور اُلِی (Nile) (اسوان . Assouan) السيد مقامات بن جها م بضرب ساريا دومات ين-علاج ۔ متوسط شدت کی اصا نبول میں مریض کواکٹ گرم کمرے ہیں بيتر برلثا دينا ماسئے به نبتهٔ کم تندیلصابتون بی اگرچه مریض کوانشخه کی احازت دى جاتى ہے "سانيم أست كلشف (exposure) سے محفوظ اور حتى الامكان و ورجها ۸۶ درجہ فارن ہائے کی ہموار تعشی میں رکھنا جا ہئے۔ مرس شعبی التہاب میں مکن ہے كدابك ما زكاراب و بوامين تقل كرف كي موال يرغوركرنا بير، (ملاحظه بو تحريز) اگرسینه میں زیاد و تنسکی موتو اینٹی فلاجسٹین (antiphlogistine) و این کی پٹی (mustard leaf) كم ياالسي كي يونش (linseed meal poultice) سيخس بر ا بی تعطر کی مہوئی ہو جوا بی خراش (counter-irritation) بیدا کرنی چاہئے بھول میں جوابی خرات آوراوویہ (counter-irritants) کواحتیا طرکے ساتھ استعمال كُنَا مِا سِينَ كُراكِ بَنِي يُولِيش جِ ما ريمينة كو كميرك (جاكث يوليس إلى jacket :poultice) نہایت کار کر بوتی ہے . غذا بلکی اور مغذی رمونی جاسے ۔

مِوا بَيْ رَاسَوْل كَا تَددُ و رُوكَ كَ لِنَ ثَمِن صَدَّر كَى مِيكَانَبْتِ بِ motor مِوا بَيْ رَاسَوْل كَا تَددُ و رُوكَ كَ لِنَ ثَمِن صَدْر كَى مِيكَانَبْت بِي سَعْن بَتْ مِرْبُ شَعْبات كَ لِحُ الْجَالِ (ciliæ) كَيْ حَرَّمْت وَسَر (propulsive movement) اور كم النبي كى اخراجى ميكانيت معنى اخراجى ميكانيت وو ويد و ويد (mechanism) ورنبتُهُ جِموع شخبات كے لئے عضلی حرکت و و ديد

۲۰.

(muscular peristalsis) - ليكن شعبتول مي افراز كاعده بياوي مساوى ا ہمیت رکھتا ہے' اوروہ ایک مرتبن (lubricant) اور خرامشن آ وراشا ہے مرقق کے طور بر ہر دوصینیت ہے گل کر تا ہے ۔ بٹر وع میں جب کھ کھانسی خشک ہؤ مكن ت (sedatives) مُثَلًا مرك صبغية كافرر (tinct. camph. co.) كي ضرورت بے اور اس کے بعد منفثات (expectoranta) کی ۔ امونسیٹم کاربونیٹ (ammonium carbonate) (ه كرين مريو تق كفنش نبب زلوق الذمب (vinum ipecacuanhæ) رها، اقطرت الوصيغية الله (vinum ipecacuanhæ) (٥ ا قطرے) معدی غضائے محاطی میں خرائشس مداکرتے ' اور عصب مائی۔ (vagus) کے معکوس عل کے ذریعہ ضعبی افراز کو بڑھا ویتے ہیں ۔اگران ا دویہ کو قع (emesis) لاینے کی صرتک دیاجا ئے توشعبی افراز اور بھی زیادہ ہوجا تاہیں۔ منائح بحول کے علاج میں اسی اسلوب عل سے فائدہ اٹھا باجا یا ہے تعظیم شدہ شعبي أفراز كوفائ كرف كم لية ابك درام نبيذ عق الذبب (vinum ipecae) دیاجاتا ہے اور مزورت ہوتو بندرہ منٹ کے بعداسے مردد احاتا ہے۔ مزمن شعبى النهاب مي إنتيل (aquill) خاص منعت ركه ما بي كيو مكر قلب يراكس كااثر طیحیٹانس (digitalis) کے مثل ہوتا ہے۔ منقثات (expectoranta) کی آیک ووسری جاعت شعبی غدد کی راہ سے خارج موکراً ن کے افراز کو تخریک بہنجاتی ہے۔ اس جاعت كا ايم ترين ركن ه كرين كي خوراكون من إيم آلودائد به potaccium (iodide ب. ير مرت عي التهاب من خاص طورير نفع بخلش م جمال نفث كرت بو بلان برو (balsam of Peru) راس كه ۲۰ قطر ال ورامتهدي مَعُلَقَ كُرك) اور لمِمّان طولو (balsam of Tolu) ويناجا جِعَهُ ؟ يا أمونيمُ كاوالله (ammonium chloride) (ه تا ۲۰ گرین) - مهال ساق داودار (fætid) بو یری بین (terebene) (و تا واقطری) و بنایا سنے ۔ سعال سنتائی winter) (cough) کے لئے اس کے و قطر نیکرٹرکاکرون میں کئی بارلینا مفیدے۔ نوعم بجون میں جرطاقت نغث ممض برائ امري ركيتي من شعب ري شعب البتاب capillary) (bronchitis مي معض او قات افراز اس قدر كثرت كرماته بوتا ب كراس

د بات ثرُ ہوکر دُم کھٹنے کا خطرہ ہوجا ماہے ۔ افرا زی غدد کومشلول کرینے اور اُنہوما كردين كم التُ صبغية لفاح (tine belladonnæ) سرّا ه قطرول كي حواكو مِن یا ایروین (atropine) بمقدار اله گرسن که اِشرابات دے جاتے ہیں۔ یهی علاج بالغوث مس بھی مغید ہوسکتاہے ۔ جب کھانسی زما دہ خرامشس آور ہو تومکنا (sedatives) انتعال کے ماسکتے من مثلاً مارف (morphia) علیل مقدارو ل مِي (١٤ كُرين ما ١٤ كُرين) مركب مبغيّه كا فور (١٥ درام) رميرونن (١٠ المرين) ىن فاسغىيث (codeine phosphate) (كَرَّانَ) بالوَلْمَاسِيمُ با امُونِيمُ مِرو ما تُدُ بن کرکزی (lividity) زیاره موجو د موتوان چیزون کوبیت احتیاط ً یا جا ہے کیونکہ اِن حالاِت میں مکن ہے تیننشی اور ملبی مرکز وں کو خطرناک طور پر کر دس ۔ اِکٹر روسا مُنک ترشہ (hydrocyanic acid) بھی سکن ہے۔ یہ ترشہ شربت کرزیری (syrup of Virginian prune) کے اندرموج دہوتا ہے جوعام طور پرتجویز کیا جانا ہے۔ یہ غالباً معدے میں عصب تا ٹیہ کے اختیابات کومٹ لول ركے على كرتا ہے (جوع ق الذہرب كے برعس ہے) اور معدى انتى stomach (cough میںمفید ہے۔ ان اصابتوں میں کہ جن میں شعبی اُ نبوبات کا زیا وہ شنج ہو تاہجہ صغية حوزياً لل (tinct. stramonii) إصبغية تبغ صحرائي التيمري (tinct. lobeliæ) (eth.) ایتمرده ا بند) یا صبغهٔ کتب بندی eth.) (. Ind. (۱۱ بوند) سے فائدہ ہوسکتا ہے۔ نیز قلیل متداروں س کلور ل (chloral) (ھا ، گرین) کی سفارشس مبی کی گئی ہے۔ مکن ہے اب میں سے بعض طریقہائے علاج ایک دوسرے سے متخالف معلوم ہوں۔ فی الحقیقت ان کو مجموعی طور بروینے سے عدد (linetus scille co.)(B. P. C.) (ا ڈرام خوراک) کی صورت میں جس میں سکتن مرکب صبغیہ کا فور اور منفقات سلنجبان قبل (oxymel scillæ) اور تربت طولو (syrup. tolutanus) کی میاوی مقداری موجود ہوتی میں ۔ اِسی طرح بوز اس (stramonium) یا تیغ صحسرائی (lobelia) عام طور بر لو السيم ميوو أند ك ساته برين خريز ك جاتے بي اوراليك روا كمارفيني مين (B. P. C.) (elixir diamorphini et terpini) (ا دُرام) مِن شريمين إ كَدُريث

(terpin hydrate) بهروش (heroin) اور تربیت کرنه بتری (terpin hydrate) موجود بوتے بین بینے ایک منفِت اورد وسیکن ۔

Virginian prune)

تمام شدیدا سانتون مین تراق (cyanosis) آیا متور (dyspnœa) موجود ہوا کے استشاسی (oxygen inhalations) سے فیمتی مدد بہنچ سکتی ہے (الم خطر بوصفي 156) - كرب كي بواكو بهاي سے (جوا كن بحر منا : bronchitis) kettle " سے تکلتی ہو) مرغوب رکھنے سے کیا دوا آلود (medicated) استفاقات مَلُا لُوبان کے بخارات (vapour benzoini) سے [مرکب صبغیر موو ایک ڈرام کرم یا نی ایک یا نستُ ہموا کیہ خاص شامہ (inhaler) سے یا ایک معمولی ابریق (jug) سے استنشان کیاجائے افائدہ بہنچ سکتا ہے۔جب سکاق کمٹرت ہوبا بدبودار ہو توزیل کے (دويهمفيدين: ويبراولياً في أبائمس (vapour olei abietis) (B. P. C.) (vapour olei abietis) (ايك ورام نصف يا نن ين يستنشأ قات مثلاً ويركربيال و (vapour cresol. co.) (.B. P. C.) بحبکه اسس سال کی ایک تموٹری مقدار کو ایک وصات کے برتن بس ڈ ال کر حرارت سے اس کی بخیر کردی جاتی ہے ۔ ویرآ ایوٹوی ایتھرسس vapour iodi) (atheris) ایک فمی انفی آل استفس (oro-nasal respirator) کے ذریعیہ سے۔ ویم ائمونيا كي كلورائيزي (B. P. C.) (vapour ammoni chloridi) إگرشعبي البتهاب سی بنیئی مرض سے نسوب کیا جاسکے تو بلاسٹ برساتھ ہی اس کا بھی علاج کرنا جا ہے، مثلاً نقرس (gout) کا علاج فلو یا ت (alkalies) اور سور نجان (colchicum) و کریست اصاً تبوں کے لئے مغویات (tonics) میسے کہ کومین اور کا طرمجھلی کے تبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ و کیفنامیمی مناسب ہے کہ اُمعا کا فعل ازادیہ ہور اہمے۔ اور زیادہ عربسہ کی اصابتوں میں جہاں قلب کی وأبیس جانب تسع (dilated) ہو گئی ہو مختلف إ فرا زات کا آ زاوانہ بہا وُجاری رکمناجاہئے' اور قلب کے نعساں کو ڈجیے شالس (digitalis) سے اسی طرح دو بہنوانی جا سے اس طرح کمصر اعی ش valvular) (disease کی تمناظراصا تبول نین بہنجائی جاتی ہے۔جب عالب عضویة خرد عضویه نازلت (M. Catarrhalis) يَوْرِيدُنْ يَدُرُكُمُا عَصَيْدِ (Friedlander's bacillus) بِهُ یا جب ماسکی سرابت (foral infection) اولی سبب بوئ تومدرینات (vaccines)

مفيد ہوتے میں.

مؤرر الشحب

(Bronchiectasis)

بحث اسباب - تمد دالشعب یا شعبات کا اتناع میسیمروں کے متعد دامراض کے تعلق میں واقع ہوسکتاہے ۔ اکثر اس کے ہمراہ گردویریش کی ششی بافت کی سی قدرلیفیت (hbroid lung) یا نقاخ (emphysema) میں دارات کی سی قدرلیفیت (لیفی شش : fibroid lung) یا نقاخ (emphysema) میں دارات ہر

می پایاجا اسے۔
مکن ہاکسی بڑے شبی اُ بورہ کابتدریج ترقی کردہ اور کمل تسدّ و اس سے نکلنے
والے نسبنہ جیو نے شعبات کا اتباع واقع کر دے۔ اس طرع سے مکن ہے کہ اور سے
بوکسی شعبہ کو دہاتے ہوں ' مرفا ان جو اُسے دہائے یا س کے اندر بڑھ جائے ' اکشکی
منبق (syphilitic stenosis) باایک مغروز جسم غریب مدد الشعب کے اسب
ہوجا میں ۔ نیکن تمدد الشعب کا عام ترین مبب ایک اولی التہا بی عالمت ہے جیسے
کرشی البتہا ب عرصہ در از کی ماری رہا ہواشعبی ذات الریم بالخصوس بچوں میں
کرشی البتہا ب عرصہ در از کی ماری رہا ہواشعبی ذات الریم بالخصوس بچوں میں
ویسلات (empyemas) کا مشتش پر بیرونی وہا و تمدد الشعب بعدا کر دے کہ
جس کے ساتھ سختش کی لیفیت (fibrosis) بھی پائی جاتی ہے۔ دویری انحفاط کا ذکر کرنا بی
مدد الشعب کی عالمت بدا کشی ہوتی ہے ۔ یہا استسش کے دویری انحفاط کا ذکر کرنا بی

ا فراضیات ۔ جن کہ تقدد کی مورت بی جب اس کے آگے کے انہوات منمقد د ہموجاتے ہیں توانس کی وجریہ ہوتی ہے کہ شہنتی سر کا ت زنیری حرکات کی سبت زیادہ موٹر بموتے ہیں جس سے ہوا اندر کی سس لی جاتی ہے اور پھر کا مل طور پر اہر نہیں تکلتی ۔ مزمن ضبی التہاب میں انہوات کے اندر کا افراز تسدد پیلا کرتا ہے اور

ساتھ ہی انبوات کی دیواری الہماب کی وجہ سے ترم ہوجاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا ہی الکہ وہ آسانی شعب ہوجا ہی اللہ اللہ کہ وہ آسانی شعب کی بیدائش کا ایک دو ساطریقہ وریا فت ہوا ہے۔ حاد شبی الہماب اور گردشعبی عروق کمفائیہ کا الہماب (peripronchial ly mphangitis) شبی و یواد کا کا کل آنا ف واقع کرتیا ہو گرکہ ہو جا کہ فیران کا کا کل آنا ف واقع کرتیا ہو گئی ہو جا کے ایک صاف کما ہوا ہی المعالی کہ فیران ہو کہ کا طور انبوب کا کہ فیران ہو ہو کا طول کہ کھ ہو جانے کی صورت بن اکستوانی اور انبوب کا صوف ایک جانب کف ہو جانے کی صورت بن اکستوانی اور انبوب کا مرف ایک جانب کف ہو جانے کی صورت بن اکستوانی اور انبوب کا اندان کی سے دروال کا اندان ہو ہو گئی گئی ہو گئی

تمددانشب اکثر ایکشش کک محدود ہوتا ہے ' الخصوص آس وقعت جبکہ وہ شعبی تسد و مسلم کی دجہ سے ہو۔ جبکہ وہ شعبی تسدّ و جمہ عزیب ' یا حا د ذات الر یہ یا ذات المجنب کی دجہ سے ہو۔ اگر دونوں مجمعے شے اُوک ہول تو خرات (lesions) دسم ہنیں ہوتے ' یا ایک

ر درون بینچرے، وف ہوں و فران (۱۵۱۵) ویم ہیں ہوت یا ایاب بینچیز ادوسرے کی نسبت بہت زیادہ ما دف موتا ہے ۔ مال دوسرے کی نسبت بہت زیادہ ما دف



ب. تمدوالشعب كلفها (أنحشت وسانه كل) فهم كار (شعاع تُكَاشَيْن سرْلندْ سالاك في لايُدِي) المال مع الله المال المال

إلمالت بماكروبية بس-

مریش کا لاغر مونا صروری نہیں ' وہ عموماً بخار سے مقرا ہو اسے ' اور مکن یہ اُر است بہر' کھا نسی' اور نفٹ کے علاوہ اور کوئی ہینے مکلیف دہ نہو یکین مکن ہے کر زرائی (cyar osis) اور انگلیوں کی گرزشکی (clubbing of the fingers) موجج مہو۔ جب رہری دو الن حون میں زیادہ مرائمت ہوئی ہے ' تو رائیس قلب کا منصل

(failure) کیا و اُن کا اُن کا اُن کار اورالیکومن بولیت پیداکردے گا۔ مُناق (sputum) یا توری اور نے ہوائی دی مفاطی ری اور م

کھالئی کی تحریک بیدائے بعیرتیع اموبات میں جمع ہوتا دستاہے۔ بھر! تواس کی مفاری کو اس کی مفاری کی مفاری کی مفاری کا مفاری کے مفاری کی مفاری کی مفاری کے مفاری کے مفاری کے مفاری کے مفاری کے مفاری کی مفاری کے مفاری کی مفاری کے مفاری کے مفاری کی مفاری کے مفاری کی مفاری کے مفاری کی مفاری کی مفاری کے مفاری کی مفاری کی مفاری کے مفاری کی مفاری کی مفاری کی مفاری کی مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کہنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کی کھنے کے مفاری کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کی کھنے کے مفاری کے مفاری کی کھنے کے مفاری کے مفاری کی کھنے کے مفاری کی کھنے کے مفاری کے مفاری کے مفاری کے مفاری کے مفاری کے مفاری کی کھنے کے مفاری کو کئی کے مفاری کے کہ کے مفاری کے کہ کے مفاری کے مفاری کے مفاری کے کہ کے مفاری کے کہ کے مفاری کے مفاری کے کہ

مبب سے افراز ایک ہم بلونستہ مندریت ترانبوبہ کے اندر بکرملاط انہا جس


کھانسی کی تحریک ہوتی التے ، اور خاطی رہی افرازکے جند اُونس سب ایک وم نفث سے عاج ہوجاتے ہیں معض صابتوں بن نفث الدّم (hæmoptysis) بار!راور

ہے جائی ہوجائے، میں مبعض تعاموں بل علت الدم (mæmoptysis) ہار جوہ سی سط طور برکٹر ت، کے ماتھ ہونا ہے ۔

ختشک ته دالشعت ب یه ایک عامقهم یه بوکرلب آیو دال (lipiodol) که انتراب که بعد لاشعاعی امتحان کرنے سے دریافت، بوتی ہے ۔ شعبی امتحان کرنے سے دریافت، بوتی ہے ۔ شعبی نیسی اور کالی کھائنی کے بعد ہوا تھا 'سا بقہ سرگذشت ہیں یا یا با است علامات کھائنی اور اسکے ساتھ فراسا ہے بوئساق اور نفث الدم ہوتے ہیں۔ قاعدی کی کی کر قرنفنی آوازی اور لفظ ن موجو دہوتے ہیں۔ یا ممرم گرزشکی بالل نہیں مائی جاتی خطرات وافر نفث الدم یا تر تمدالشعب کی نمویا یی بس (11)۔ در

نہیں پائی جاتی بنظرات وافر نفٹ الدم یا تر تمذالتخب کی نویا بی بیں (11)۔ طبیع الم رات ۔ یہ اتباعات کی نوعیت وجامت 'مشنش کے اندرانکی توریخ او بیچ مرحاتی بونوائیش کے تبحد (consolidation) یالیفیت (fibrosis) کی 137 مقدار کے کیا طبیع مختلف ہوتے ہیں۔ مبصل اصابتوں میں ایک قاعدہ کے بیٹے سے

حصد میں کارسید کی ایک پوری جانب میں موٹے (coarse) بچر جرانے والے (creaking)" اور شخنے والیے (crackling) لفظات (râles) مائے جاتے ہن جوتنفی ور مرکو یوست مدہ ر ونتے ہی نیکن کونی اہمیت (dulness) یا کوئی نمایاں تحدید حرکت نہیں ہوتی۔ وری اصابتوں من اس کے ملاوہ کمک کی کمیٰ (impairment) کا ایک ایسار قب منوا ے نہاں تعتی تفس یا قدری نفس (amphoric breathing)' ہور اس کے ساتھ صبِعُوتَی (bronchophony) اورصدر کلامی (pectoriloquy) شاتی ویتے ہیں' اوراک ایسے کہفے کے حوکثیف شدہ ما فت نے تھٹومؤدوسے شاذ ترعلامات موجود ہونے میں (سفی 127) ۔ جب کہندافراز سے لبریز ہوتا ہے ' تو گمک کی کمی (impairment) اور تمصير موے اصوات مفس موجود موتے میں مبکن لغطات (râles) اورشعتی نفس صرف کھانسے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ انتہا فی اصابتوں میں پیالت مزمن وات الربے سے مشابہ ہوتی ہے ۔ سینہ کی ما دکشدگی (retraction) وِ اقع بهوجاتی ہے ' قلب الفقی رخ میں مُرسیٰ شش کی طرف کھنچے آتا ہے' اور مق الل کا تعویضی طور بر نفاخی (compensatorily emphysematous) موجا اہے-ھے ، پیچنف (cavitation) کی تشخیص اور وسعت' لب 'پڈال (hpiodol) کے اتراب کے بعد لا شعاع سے متعین کی جاسکتی ہے . برافتادہ طبد وغواکو' ایک فی صدی نوووکین (novocaine) مسلقی در قی خصب کی (merabrane کے مشرب کرکے عدیم کوس کر لیا ما تا ہے۔ مریف کوسد معامیم موار که کره فی صدی توکین (cocaine) الزر) ال این التی کاریا رقصته الربیک اندرمشرب کی جاتی ہے۔ مین منٹ کے بعد ایک فاص خمیدہ منزل اورنت نو لمجہ trocar and) (cannula) ال حطی میں سے ہو کر قصنہ الربیہ کے اندر داخل کیا جاتا ہے ۔ اس امرائیس ا لے کے لئے کہ یہ مقام صبی ہے فنولیے کی راہ سے ہواکھینچی جاسکتی ہے۔ لیانڈال کوجیے ٧٠ در جه فارن لم يُتْ تَكُ رُّم مر ليا كما هؤ (معوّا ٢٠ كمفّ سني ميثرا كم الغ كے لئے اور ۳۰ معب سٹی مٹیر بچیہ کے لئے) گرم کی ہوئی عقیم بجیکاری کے اندر کھینچے قنولی کی راہے مشرب كروبا ما الله على الارتيم مريض مطتبه ملوراك ما السري - شعب ع كاشت (radiogram) انتصابی وضع میں لی جاتی ہے (الاخطہ ہول صحفہ ا اور ۲ الف



الله طبعی بین بیاندان مرنی کی بعد- رشعاع تگانت واکر ایف بی جیاندار اور سراج وی سباکس والور بایک چست میتال نے ای ب



ب شعبه كاسرطان - اس كامفا بيصحفه ه صفحه 159 سي كرو (شعاع مُكَاشَت مسرلن سي لاك في لي ب) المعال معد 159 ما المعال معد 159

جوطبی مانت ظاہر کرتی ہیں)۔ اگر لیامڈال کھانسی کے ذریعہ کل کراویہ اجائے توکسے کلن نہیں چاہئے ۔ بالغ میں لیا کٹال کو ایک بجیکاری اور تما طیر کے ذریعہ براہ راست اوپر سے ڈالا جاسکنا ہے ۔ شعبہ بینی جیسی کہ شش کے خراج کے بعنوان کے تحت بیان حنبہ ویں ڈالا چاسکنا ہے ۔ شعبہ بینی جیسی کہ شش کے خراج کے بعنوان کے تحت بیان کی کئی ہے تشخیص میں نہایت مفید تا ہت ہوتی ہے ۔

مزمن لی رای (chronic pluthisis) سے تفریقی تشخیص کا انحصار ا ساق کے اندر ان عصب کی می موجود کی بُرکہی میش دور ایت مثلاً واست الربه کی سرگذشت براور کی شاہ است الربه کی سرگذشت براور کی شاہ (cavitation) کی جانے وقوع پر ہوتا ہے جو نہا بیت شا فر طور ہر راسی ہونی ہے۔ ایک قاعد بی تمدد الشعب کوالیے کہ بسیلہ (empyeina) میں کرنا شکل ہونا ہے کہ جس کا مواوشعبات کے اندر خارج ہور اہو۔ حکن ہے کہ سرگز شرت مفن سے مدو ملے اور نفت الدم سے تمدد الشعب کی تائید ہوتی ہے۔ استقصاء (exploration) سے دونول صور توں ہیں بسیب ل کئتی ہے۔

بہت بڑا افا قد واقع ہوتا ہے گاہم چو کھ آنوا ت میں ساختی تغیرو اقع ہو تکا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے المدام یوفی کو بعدیں استدا وات واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ شعبات کے دفع عفونت (antisepsis) کے لئے روغن نار بین کے ہا قطرے مک دن بی بین بار برا ہ و بن و سامتے ہیں۔ وافعات عفونت (antiseptics) (ملاخط ہو البتاب شعبات و بن و سن مسلخ ہیں۔ وافعات عفونت (crensote) کے بحار فالمستنتاق می شامل ہے ہوا کہ بند کوشک (closed chamber) کے اندر روزانہ یندرہ سے سامتھ منٹ مک عل میں لانا جا ہے (Chaplin) کے اندر روزانہ یندرہ سے سامتھ منٹ مک عل میں لانا جا ہے کہ (Chaplin) ک

کی جرای طریفهائے علاج آزمائے گئے ہیں بن مندرج فی بل شافی نیا ایک انفرادی بڑے کہنے کی بتراحی سلیت (surgical drainage) کے جو بڑا فت اوں استیصال جزئی کے کہناتی لیلیوں کے استیصال جزئی کے کہناتی استیروں کے استیصال جزئی کے کہناتی ہے یعمین طبی کا قلع (resection) کے ساتھ یا بدون استیصال جزئی کے کہناتی ہے یعمین طبی کا قلع (artificial pneumothorax) میں کے بعد ایک منولی کے فرد بعد سینہ میں روعن زینون (artificial pneumothorax) میں کے بعد ایک منولی کے فرد بعد سینہ میں روعن زینون (olive oil) بھردیا جاسکتا ہے جس میں ہ فی صدی گامیسنال (excision) شامل ہو۔ یہ جر مجمینے تک بلاخد برہوئے رہیکا نینا کے بعد مکر دبھرنے کی خرور ن ہوتی ہے ۔ مرضی گئتہ کا استیصال (occlusion) اور شعبہ کا انداد (occlusion) اس طرف جو کہ کا شعبی تمدہ کی صفحہ کے اور واقع ہوں مارکہ ببوط (collapse) واقع ہوں کے صفحہ کے اور واقع ہوں مارکہ ببوط (collapse) واقع ہوں کے ۔

(ASTHMA) ومم (HAY FEVER)

حملت القش ایک نهایت شدید نا زلت بے جو بالحصوص انفی غشائے نماطی کو کین اکثر شعبی غشائے نماطی کو بمبی متأثر کرتی ہے اور شعبی نظت م عضلی bronchial) (musculature کے انقباضات بیدا کر دتی ہے۔ دھد (asthma) اپنے وسع تربن

والت حماسيت (allergic state) عمة القش اور وَمر اكثر ايك بي شامل مين به وردى .

قدر كرم في كرفخلف مظاهر بين بس من مند به ويل بحى شامل مين به وردى .

والمان الانف (paroxysmal rhinorrhoea) وعائى عصابى او يما (paroxysmal rhinorrhoea) - سترى البتاب الانف (angeio-neurotic oedema) ويمائى عصابى الموسان ويمائل والمعتملي (vasomotor rhinitis) وردى استراك مضعلى (prurica) ورحكاك (prurica) - سترى (eczema) المربي بما والمناس فارش والمناس (migraine) ورحكاك (prurica) كي بعض مدى معائى اختلالات منتفيقة (migraine) اور صرح ارضاب كي بين المعن فاري بين كوماسيت بها بوما والمن بين الميك فاحت حسا سيت (allergic state) كور برجاعت بند المناس بين الميك فاحت بند المناس بين بين الميك فاحت من الميك فاحت بين الميك فاحت بين الميك في مناسيت بين الميك والمن بين الميك في مناسيت بين الميك المين بين الميك في مناسيت بين الميك المين و و كورك المراكز بين الميك في مناسيت بين الميك المين و و كورك المراكز بين بين الميك المناس بناديا كيا بورو بين في مين الميك و معل كوال كورك المين بناديا كيا بورو بين في بين و و و كورك المراكز بين بين المين المين بين الميك المين و و كورك المراكز بين بين المين الم

در اسل کی رسی نوعیت کی بینے استهال افی (anaphylactic) سمجھی طاتی ہیں (الاخط موص غير 15 كرجهال يرانستر كملة (Praunitz-Küstner) كا تعاص على بيان نباكيات إليكن خالص اورسا وه استهداف (anaphylaxis) كيمتعلق بدايك ساف یات سے کہ بستبدا فی صدمہ (anaphylactic shock) یہ داکر منے کے لئے انیکی فن (antigen) کا ایک صال گرا نبیدانی اِ شراب مینیندههٔ ورنی بیونا ہے ٔ در انحالیکہ فطری طوربرو افتع بهومنة والبيرحساميتي امرانس ميں البيمي ابتدا بي حيا ركى (sensitization) کی شہاوت ہمیں یا بی مانی ۔ لیکن مکن ہے کہ خامیدت (allergy) میں ابنٹی جن (حبکی بالکل مغوری مقدارین مروری ہوتی ہیں) ایک خراشید ہ عنشا سے نجاطی کی را ہ سے د اخل ہوگیا ہو یشکا کئن ہے کہ مع*دی معوی ایتھاب (*gastro-enteritis) کے دور آ مِنْ فِيرِ مِنْ مَنْد ويرونين مَنْلاً انتركايرونين معوى خطر سے جذب موجاتا جواوراس طرح اس کشنے کی بیش ساسیت کی ایک متقل جالت (hyper-sensitiveness) بیدا کر دیتا ہو۔ نیز بریقین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ ایسی صابتو سیں معدی ہضم اور نتیجة ً بر ومین یا شدگی (proteolysis) بهی ناقص بوتی ہے جس کا متبعہ یہ ہوتا ہوکی پرڈیوز آپ (proteoses) نيذائي خط سے براه راست بهضم بوطنے بن اور اوقت مگراُن برال طح على نس كرسكتا جيهاكه أسد كرنا جاسية (يرونين النش: protopexic فعل كأشل) وہ عام دورا نِن نون کے اندر واخل ہو گرانستہدا ن بیدا کردیتے ہیں (46) ۔ املی شس اورُاس ابتدائی صربه (trauma) کے علاوہ میں کی راہ سے پرومین حبم کے اندر داخل ہو اہے سالیت میں دوسرے عاملات بھی موجود ہوتے ہیں ا ز عصبی عالمات اور روشنی کی حیاس گری بلکه او ویه هجی لاً سشسهال کی پیدائش میں حصہ لیتے میں مثلًا ومہ کے ہم فی صدی مریض ایسپرین (aspirin) کے لئے انہمائی صامیت ظا مركرتے بن اور اس كى إكل حفيف مقداروں سے تفرياً بلاكت كو بنيج كے أيل امدان اوگول میں ایسیرین کی خوداک کے بعد خون کے اندرسیبلی سِلِک آیس (salicylic acid) معمول ك نسبت بيت زياده عد مك عمر با ياكبات (13) -مزيد برا ن سمی خوورو ما رضات (toxic idiopathies) کا ایک توی مورد تی رجمان جمی ہوتا ہے، اگر حیہ مارف ماندان کے ارائین فتلف کے سالیتی مرض طاہر

كريكة بن ١٠ منتبقنة أن من يت ايك سے زائد بن بتلا بو كتے بن -

استهدا ف کے باب میں تبلا باکیا نھاکہ استہدا فی سیمہ میں (anaphylactic (antibody حسمانی یا فتوں کے اندر آبنتی جن اور ضدائی عربی اندر اسلامی کے باہری تعسامل (interaction) سے بیدا ہوجاتا ہے اور پر کہ اسس یا ہمی تعامل سے بروٹینی سالمات کی شکسنٹ و ریخیت و اُفتع ہوماتی ہے۔ یہ نہا بن دیجیب ہے لہ *سامسینی امراین* (allergic diseases) مين بعض ما تي ليما ئي تخبرات (allergic diseases) ور ما فت ہوئے ہم جوال نظر یہ کے موتد میں کہ حیاستنی تلامیں بھی خون کے اندر ير وهموز كى زيادتى يا ئى جاتى ہے اور اس كے تنجه كے طور براستهدا في صدر ہونا ہے اور يد بروسيني تعرق (protein catabolism) كي زيا دن يبدأ كروتا ب (14)يال حلاکے دوران می کیدی قات (liver dificiency) اس سے طاہر بہوتی ہے کہ ثون ایک مثبت بالواسطه وا ن ن رگانسامل positive indirect van den (Bergh reaction خون میں و تیاہے اور دموی شکر (blood sugar) بیت لیول بر ہوتی ہے (45) اور ساتھ ہی ایک مٹونشکن حرجز (hæmoclasic crisis) ہوگا ے و نون کے دماؤ کی تخفیف قلت خلیات اپنین (leucopenia) عصر تجمید کی تبدلی اور روستنی کے لئے مصل کے ا نعطافی نمایندے (refractive index) کی تبدلی برختنل ہوتا ہے یہ س کانبتجہ یہ ہوتا ہے کہ خون میں اَ مینو اَیسٹر بورک اَیٹداور رَبُّح تَنبِنِ (creatinine) کے اجزار زیاوہ ہو جاتے ہیں' اور قار ورے میں انجمام کانیادہ اخراج ہوتا ہے ۔ گردوں سے کم یا بی خارج ہونا ہے اور قار ورہ بیٹند ترشی بوجا آہے کوراند کا احتال (retention) ہوجا آے کیوراند کا احتال کا جیے ت بی کلورائٹر کم جوجا تا ہے۔ لیکن سب سے زیا دہ اہم یہ ہے کہ قارورہ یں ابک کیرو مبئوز" ظاہر ہو البح (الماخط موصفحہ فلے کا کی جوم یض بیر آ زمانے ہے (كما حظَّ بواً كَ كامضمون) أبك نوعي مصبدى تعامل" ("skin reaction") بيما كرف ہے۔ ایسے ربوی مربضوں میں کہ جن کی حلکہ غذا یا شمو مات (inhalenta) بے اخ پروٹمینوں کے لئے سامس ہے' . و فی صدی میں نتبت نت انج یائے جاتے ہی لیکن ہاتی ربوی مریعنول میں صرف ۱۵ فی صدی میں صحت مندا ومی شاؤ ونا ور ہی ایپنے پروٹیؤز

کے لئے تعامل طاہر کرتے ہیں گوکہ ۴ فی صدی آ دمی ربوی ہر و ٹیوز کے لئے تعامل طاہر کرتے ہیں جوکہ واضح طور بڑی ہی (47) یحلہ کے بعد نیون طبتی ہوجا کہ ہے۔ لین ساتھ ہی ایک نمایاں اورار (diuresis) ہوتا ہے کہ صدر اوره فی الحقیقة قلوی ہوجا تا ہے ۔ راقر الحروف کی رائے ہے کہ استہدافی صدر (shock) ہیسیدا ہوجا لئے کر سبب سے جا ہر وثینی تفرق واقع ہوتا ہے 'وہ آمینو آبیڈ کے بہت سے نموجا لئے کر سبب سے جا ہر وثینی تفرق واقع ہوتا ہے 'وہ آمینو آبیڈ کے بہت سے نموجا لئے کا مالمات آزاد کر وتیا ہے 'اوریہ بافتوالی ولوجی اور میالی میں رجو سالمات آزاد کر وتیا ہے 'اوریہ بافتوالی ولوجی اور میا ہے نہ کہ ان کی مسامت بر) نباوہ کو دیتے ہیں (جو سالمات کی تعدا و بر سمنے میں اوریو وقی عسبائی ذیما ہو تا ہے ۔ یہ ٹری (urticaria) اور عوقی عسبائی ذیما کی خورت ہوگی (اور COOH گروہو کی تعدیل کے لئے میں بہت نمایاں ہوجا کی تعدیل کے لئے نا لبا اللہ کا احتباس ہوجا کی تعدیل کے لئے خورہ کا کہ خصہ وے ویں گے۔ میں ایک خصہ وے ویں گے۔ میں ہوجا کے گا بلکہ حصہ وے ویں گے۔

حریت القش بنی بون اور جولائی کے مہینوں میں کثرت کے ماتھ واقع بوتا ہے ، جس کی وج بہت کہ نا تھ واقع ہوتا ہے ، جس کی وج بہت کہ خشک کھانس کا زیرہ (pollen) بوہس کا سمی عامل ہوتا ہے ، جس کی وج بہت کہ خشک نے دیرہ کے فریعہ حاس اوروس سال کے کئی قت بین بی مصنوی طور پر بیدا کے جاسکتے ہیں ۔ یہ وریافت ہوا ہے کہ ممتہ القش کے مریف مختلف یو ووں کے زیروں سے مختلف ورجول یہ الل اللہ مرکزتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں کھانس ہی کا زیرہ اہم عالی ہے ۔ گرامی یہ بلزواط ہوتا ہے اور ہوا کے ذریعہ سے کہ می فاصلوں کا منتقل ہوسکتا ہے ۔ امریکہ میں بیض کہ ان میٹی (Compasite) کا زیرہ بھی وجشکا بت ہوسکتا ہے ۔ امریکہ میں بیض کہ ان میٹی فرید سے کہ فوریر کہ ان میٹی اسے اگرمیف اسے استخریب کے ذریعہ انعی اور اسمال بیدا کر دتیا ہے ۔ اگرمیف اسے کے زیروں کے ذریعہ انعی اور اسمالی بیدا کر دتیا ہے ۔ اگرمیف اسے کے زیروں کے دریوہ می و دریا ہے ۔ اگرمیف اسے کے زیروں کے دریوہ میں وریف می اور اسمالی بیدا کر دتیا ہے ۔ اگرمیف اسے کے زیر کر ان کے دریوہ میں وریف می اور اسمالی بیدا کر دتیا ہے ۔ اگرمیف اسے کے زیروں کے دریوہ میں وریف می اور اسمالی بیدا کر دتیا ہے ۔ اگرمیف اسے کے زیروں کے دریوہ کی دریوہ کی دریوں کے دریوہ کی دریوہ کی دریوں کے دریوہ کی دریوں کی دریوہ کی دریوں کی دریوہ کی دریوہ کی دریوں کی دریوہ کی

کَ صلے (toxic idiopathy)۔ سمی خو و روعارضہ (toxic idiopathy) کی ایک دور برق سم حیوانی دے ہیں۔ ان ہیں مرایض ایک گھوڑے کے سبوسہ (dandruff) کی حماسیت رکھتا ہے' اور اگر گھوڑے قرب وجوار میں ہوں تو اسے دَمہ کا حمام موجاً اگر یا کلکہ اگرہ مائیوں کی صحبت میں ہوتو بھی اُسے حملہ ہوجا آ ہے۔ ایسے اور ہی گھوٹے کے بعد معدی معونی کلے ہونا بیان کے گئے میں معرفی کے بعد معدی معونی کلے ہونا بیان کے گئے میں۔ " کی ورمد (sausages) کھائے کے بعد معدی معونی کلے ہونا بیان کے گئے ہیں۔ " کی ورمد (cat asthma) مشہور جزہے۔ اور بھٹروں کا بین مورول کی متاسبت بھی ہوتی ہے ' جنانچہ ایک محمولی فرائز میں مال ہی میں دریا فت ہوا تھم برسوسے سے دَمد کا حملہ شروع ہوئے کہا تھو اور وں کو بہت کھلایا جا ایک موجوبا نوروں کو بہت کھلایا جا ایک ورمد سے دومرسے ماکرے کا ایک بوٹر ذر لعہ ہے۔

ا یک وہ مراستی نو دروعارضہ (toxic idiopathy) غذ الی استنسا دکی حاسیت ہے اورمکن ہے کہ ایک خاص نوعی غذا ئی شئے کھامے سے وک یا معدی معوی احتلالات پیدا بوجائیں ۔ دُمہ کے مریضوں کا امتحان مختلف غزاوں کے پروٹمینوں کی تطعیم سے کیا جاسکتا ہے۔ اُ ناجوں (cereals) میسے کہ گیہوں' کمٹی' مِا نول ان بواای و مراه (oats) سے متبت جلدی تعاملات ماصل ہو نے ہیں۔ ان ع أَنو كيبين (casein) مجينكا بمجعلي (lobster) كنتورامجيلي (oyster) اورمختلف ری معلی مختلف قسم کے گوشت کیاک (spinach) اِسٹر ابری سیب اور دوس نا الته وركيل ال سب مع لفاها بتون مي مثبت تعاطات بيدا بو تعايير. حماسیتی مربعنوں میں ' حباری تعاملات'' کے امتحان کے دُو طریقے ہیں :۔۔ (۱) تشریه ط (scarification) کے ذریعہ۔ میش یا زوکی مبیلہ کوصاف کرنے تھے بعد اس ير NaOH ك N/10 يا N/20 معلول كالك قطرة ركعد باطاماً سيك اوراك چھوسے ماتو کی نوک پر ہر طمن کی مقوری مقدار بصورت سفوف لگاکر ہمس سال ہر مل كردى جاتى اور عيراس المريز و مي سے ايك مطحى جُركا (cut) إلى ايخ لماويا حيا يا ہے۔ بیں سے تیس منٹ میں ایک شبت نتیج ظاہر ہو آے ہوایک مشری وَدورے (urticarial wheal) كى صورت مين موتاب، حوقطريس نصف سنيني ميشر اورايك منطقةُ احمار سر بكوا بوتا بيو ما سي مسيمي كم واضع نتسائج كا اندراج بوياب، کیونکر ورتبیبی عامل کا پتہ دے سکتے ہیں عیاری لشان (control) بلا تب بالکام تعی موناچا ہے۔ (۲) وروں جاری انتراب (intracutaneous injection) کے

ذربیه طلو مجلول کی ۵ . د . سی مقدارایک نهایت باریک موئی سے مجر جلد سے تقریباً متوازی کیل رکھی جاتی ہے ۔ ما نع کا ایک تیوٹا مبنی کمائی متوازی کیل رکھی جاتی ہے ۔ ما نع کا ایک تیوٹا مبنی کمائی د بین جب ہیں اور طبعی مالیح کے ذر بعد ایک عیاری اِشراب علی میں لا أیا ہے ۔ مینی بازو کا اگل حصد بنہ زین مقام انتخاب ہے ۔ ایک النہا بی الیزو مثبت تعامل طام کری ہے ۔ ایک النہا بی الیزو مثبت تعامل طام دمر کے مریضوں کے ایک نماسب میں جو مختلف ملکوں میں ختلف ہے ایک اور اس کا در میں ختلف ہے ایک نماسب میں جو مختلف ملکوں میں ختلف ہے ایک زرید سے مثبت تعامل این ماصل ہوئے ہیں ۔ در یوں (pollens) کے ذریعہ سے مثبت تعاملات حاصل ہوئے ہیں ۔

زمز بی شخ دَر کے مربینوں کی بہت غالب نعدادین نامعلوم ہوتی ہے۔
یہ نمول الہوا (ar-borne) معلوم ہوتی ہے، اوربیض تالول میں بیعبینوندی (mould)
ہوسکتی ہے۔ یہ اکٹ برر کے رہین کے مکان کے رو غبار میں موجو د ہوتی ہے۔ یہ اکٹ برر کے رہین کے مکان کے رو غبار میں موجو د ہوتی ہے۔ یہ الکٹ (Zeeland) میں بیب دو رہی نہات ہیں جن میں آباوی کا ایک فی صدی حصہ دَمہ میں متبلاہے کا ورجب یہ لوگ وربات ہیں آبادی کا ایک فی صدی حصہ دُمہ میں متبلاہے کا ورجب یہ لوگ اسی طرح بیشتر دَمہ کے مربین کو ایک کو بہت ای خطول جیسے کہ الیس (Alps) میں وَمر کے حصہ کی طرف سفر کرتے ہیں کو ایس وربات ہوئی تنی جائی رہتی ہے اورجب وہ محمول جیسے کہ الیس اور ایس آتے ہیں تو ابتدا اُن اُن کے عظم میں ہوتی اُن کی وہ اُمنیت ہوائیس اُن جو ہوں ہوتے ہیں۔ الیس میں حملوں سے ما مونیت اس وجہ سے موتی ہے کہ وہاں وہ زم ہر موجو د نہیں ہوتا 'اور اگرم یفن کو گر دوغبار و غیرہ وہاں نام طور پر لاکر استنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا سستے ہیں۔ نام طور پر لاکر اُستنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا سستے ہیں۔ نام طور پر لاکر اُستنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا سستے ہیں۔ نام طور پر لاکر اُستنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا سستے ہیں۔ نام طور پر لاکر اُستنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا سستے ہیں۔ نام طور پر لاکر اُستنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا سستے ہیں۔ نام طور پر لاکر اُستنشاق کرا یا جا گے تو علے مصنوعی طور پر پیدائی جا

متعدوعا ملات ہیں جوکہ ومہ کی استعداد رکھنے والے افراد میں فی الحقیقة ایک حلہ پیدا کرسکتے ہیں مثلاً انفی غشائے محاطی کی خراشس قبض رحی شکانیس نغذا سے معدہ کا متدد 'تمباکو نوشی کی زیادتی اور وہ سو مصلم حواکٹر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔' لبنی غذائیں' موشویہ (hair wash) میں کاسیسہ' صبغہ (paint) کی ٹو' اور الخصوص مختلف نسنی حالتیں۔ حلے ہس وجہ سے جی ہوسکتے ہیں کہ مریف ان کی امیدر کھٹا ہے۔ شکا گلاب کے چیولوں کی حاسیت رکھنے والے مریض میں حلا ایک مصنوعی کلاب کے و نکینے سے ہو کیا جسے اسس نے صلی سمجھ لیا' اس کے برعکس شدید ہیجان سے حمل بالکل اگر مگرا ہے ۔ حملوں کے ہوئے کا امکان اُس وقت زیا وہ ہو تاسینے جب کہ مریض تھوں کے دوروں کا ایک نہتاں۔

تبعکے ہوئے مول مینی دن کے اختیام پر ۔ دمید سے اری اور محکوس (asthma-infective & reflex)- دمدکی

ارما بنوار کایه گروه 'جس می سال ملک کے رابوی مربینوں کی غالب تعدا و شامل سے ' اویر بها ان کئے ہوئے گروہ ہے بالکل مختلف معلوم ہوتا ہے گو کدو ونول میں کسیقد زغال مونجود تيد يد و مداكثر من بلوغ ياسن إس (climacteric) مين شروع بوتات-مكن ہے كە فورى ئېشىن رو (precursor) طاد شعبى النهاب يا زايت الربير (pneunionia) ہو' جیباً کہ کالی کھالنی (whooping-cough) یا کھسرامیں ہوتا ہے' یا مکن ہے یہ دمہ سبم کے دو سرے حصول میں کی سرا بیت کے باعث واقع ہو۔ یہ ہمہ ا) ان بهتا کی حاسبت کے باعث ہے، جو بھیمٹروں یا دوسرے متعا ماست ہیں مرایت کے حقیقی مقام مرجیم کے اندر داخل روجا نئے بن کیا (۲) محصَن معکوں خرات (reflex irritation) کے اعث ہے۔ (۱) بالغول میں اس امرکی شہادت سے کہ فریڈ لینڈر (Friedlander) گروہ کے گریم نفی (Gram-negative) عصیاست کا شت ہونے بربہ سمان (histamine) کی قسم کے مادے بیدا کرتے ہیں اور یہ انے سَامی طور پرشعبات میں میدا بهو کر علوں کا باعث ابونے میں (48)-اسکی سرایت بر نیج بحث تی گئے ہے۔ (۲) معکوس ومر آک سے پیدا ہوسکتا ہے کی برووی (Brodie) اور وکسن (Dixon) کی تحقیقات سے سمجھ لبنا اِلکل اسان ہے جس متعین طوریزنا بت کردیا ہے کہ انفی غشائے مخاطی کی نہیں ہے ایک معکول شعبی تمنی گی بِيداً كُرِينَي هِي مِن التحقيقة بعض أوفات أنفي سعدانون (nasal polypi) كم اشتیمال اور ناک پر دورسرے اعمال جراحیہ کے بعد دَمہ واُتع ہوگیاہے۔ اس گروہ میں ماسمی سرایتِ (focal infection) کا مقتیام مغیارُہ فکی (maxillary antrum) مِن بُوسَكُمَا ہے ۔ سِطِح التّما بِصفاتي (maxillary antrum)

انغی سعدانے (nasal polypi) ، فاصلی انخراف (septal deviation) مسيو د (xidges) ا مهمه (spurs) ورمنتول بريول كي بش روردگي (purs) ا ورمنتول بريول كي بش روردگي (the turbinates موسكني عيد) اور برسب مواني راستديس مزاحمت ببيدا كرت اورسرابت كے وقوع ميں مؤتد ہونے ہيں ۔ لوزتين اور غدودہ ان اصابتوں کی مختور ی نعدا دیں ضروری حصد لیتے ہیں ۔ یقیناً معمولی میرگذشتِ یہ ہوتی ہے کہ ان برکم از کمرانک مارجراحی عمل بلاشفار ہو جیکا ہے۔ بایں ہمرمکن ہے کہ ووسر ۔ را تتون کی جستوکے بیڈیل جراحی کی مزورت ہو۔ دانت اور ا معا، دوسرے مکن ورا مع مرایت ہیں ۔اں کے بعد مکن ہے کہ معض مریض ایسے رہ جانبیں جن ہیں دمہ کا وقوع سَرِيس زَكَامٌ (colds in the head) كَدِساعَة شروع مِو إلى كَدِيم إه ما في حاكم اورجن میں سوائے اسس کے کہ اُن کی اُنفی غضائے مفاطی کی قوت موافعت نبطا نہر کم ہُوگئی ہے اور ددمہ اکوئی سبب نہیں تبال_ا کا ماسکتا ۔ اُن کی مالٹ اکثریہ ماکے نہ خراب تربونی ہے ملکہ زیادہ اوا خرخزاں اور اوائل فصل بسپ ایس بہجب کہ مو سب سے زیا وہ متلون (capricious) ہونا ہے ' اور ائسس کے تغیرات ٹا کیا نی اور اختشلال آفر بی ہونتے ہیں ۔ساری اورمعکویں وُمہ کی جو اصابتیں ہیں ملک ہیں انی جانی ہیں' وہ استی گروہ کی بعض اصابتوں کے خلاف بروٹینوں کے سائند استخسان كي ترغمواً تعالن بين ظاهر كرتم -

وَمِد اولاً جما کو احتی البتهاب و در شعبی البتاب سے من طرح سے تعلق رکھا ہے ۔ در شعبی البتاب سے میں طرح سے تعلق رکھا ہے ۔ دو بی جب کوئی مریض شعبی البتاب کے متوالی حموں میں مبلا ہوتا ہے تو کمن ہے کہ در مد بندر بج منود ار ہوجائے ' ایسی صورت میں در مدص اُسی وقت واقع ہوتا ہے تو کمن ہمب کہ شعبی البتاب اپنے فراب ترین ورج برا گیا ہوا ورجب شعبی البتاب بنر ہوجائے و در بی مصاف ہو جا اس می مسلمان ہو جا البتاب بنر ہوجائے و در بی مصاف ہو جا اس می مشہبور ہے اور یہ صابیتی ہرگز نہیں ۔ یہ اس وج سے و در میں مان ہو جا اس می مشہبور ہے اور یہ صابیتی ہرگز نہیں ۔ یہ اس وج سے بیدا ہوجاتی ہے کہ شعبی البتاب عثابے خاطی کی عصبی منہا کوں میں خراش بداکر کے ' بیدا ہوجاتی ہو کہ سے مضلات کا ایک متعالی انقاض پیلاکر و تیا ہے ۔ در سل راوی کے ساتھ می مجالے۔ عضلات کا ایک متعالی انقاض پیلاکر و تیا ہے ۔ در سل راوی کے ساتھ می مجالے۔

ر بَيْمِ مَيْنِقَى حَالِينَى وَمد كَهِ مِتُوا ترجع ثا نوى مزمن تعبى البَهَاب پيدا كرسكتي بين عبيها . و بجسف علادت بين بهان كميا كياسي -

معمر اشخاص میں سانس کو لنے کے سلے۔ یہ حالت صغیر 255 پر بیان کی ٹنی ہے اور بعض اوقات قلبی دمہ (cardiac asthma) کے نام سے مورم کی جاتی ہے ' یااگر گردے اوف ہو گئے ہو ک جیسے کصلا بت شہ یا تی و الے مجے لا لا (arterios clerotic kidney) میں نو کلوی دمہ (renal asthma) کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ بشم بولی (uræmia) میں سانس بھو لنے کی حالت کو بعض اوقات تسمیدی بولی دمہ (uræmic asthma) کئے ہیں۔

علامات و سحمت القشى من ما والبهاب الانف (conjunctivitis) كو ما تفاعت الدالنهاب المتمرة (conjunctivitis) كو ما تفاعت عن الحراد (conjunctivitis) اور تعييكس بائي جاتي بن اور نبلي جلدوالح انتفاص من احمراد (lachrymation) اور تعييكس بائي جاتي بن اور نبلي جلدوالح انتفاص من وحدا و ربني والمدال (ery thema) اور ثري محد شد بد خارس كو با باجا ما جو ساته بن و محد المسنى في المناف (mental depression) بر حرال المناف (paroxysmal rhinorrhæa) جس من من من وفعة المائد والمناف (paroxysmal rhinorrhæa) جس من من من من من من المناف والمناف (المناف المراج بوتا من من المناف المناف المراج بوتا من من المناف المراج بوتا من من المناف المراج بوتا من من المناف ا

کَرَمه و بعض اوقات تدبیعی علاات ہوتی ہیں ۔ جیسے کہ بے آرامی والم است ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بے آرامی والم المحکیم احساس مغزو کی جسیلی اورزکام الحجیم احساس مغزو کی جسیلی اورزکام الحجیم رنگ کاصاف پشیاب زیادہ آیا۔ لیکن اکٹر اوقات حملہ الکہانی طور پر اور علی الصباح دواؤ عار بھی کے در میان نثر و ع ہوتا ہے اگر جیمکن ہے کہ مریض سونے کوجاتے وقت نظام الکتا جیاہو۔ مریض ہمر (dyspnæa) کے احماس کے ساتھ حاک المحقاب حبکی وجہ سے استی برا تھ کر کھڑ کی کھول دیا ہے دائے الکتا ہے استی دقت ہوجاتی ہے کہ اُستینس میں عضلات (accessory muscles) سے یہ ولینی پٹرتی ہے ۔ مریض ہے کہ اُستینس کے تمام میں عضلات (accessory muscles) سے یہ ولینی پٹرتی ہے ۔ مریض ہے کا تحول سے ایک تمام میں عضلات (mantlepicce) سے یہ ولینی ٹرتی ہے ۔ مریض ہے کا تحول سے اپنے بستر کے بازوں کو کر سی کے ازوں کو کھڑا تشان (mantlepicce)

ومیا نیز که کنا رے کو کمڑ لیتاہے تاکہ بالائی جواج سے سینہ کوگذریے والے عفیلات لوایک معنبوط سهارا حاصل جو حائے ۔ اتبداع سینه حالت شہیق (inspiration) میں تَقنِهِ بَهَا مثبت ہوجا مَاہیجَا ور نہا بیت خنیف حرکت یا ئی جاتی ہے' اور ہستماع کرفے ہر عملًا كوني اصوات منفس بنين مشنائي ديتے۔ بعدا زال جب كدحر كان كبيتعدرز مادہ أ آ زا دا نه منزوع هو <u>نه مکن</u>ه بین کوچوچنرسب سے زبا دہ نطرا تی سبے وہ زفسیس (expiration) کی غیر معمولی طوالت ہو تی ہے 'جس کے ساتھ زور سے سامیں سامیں لی اورز (loud wheezing) مروتی ہے، جو فاصلہ سے سمنائی دنتی ہے، لیکن بٹرج تنفس سنست ہوتی ہے ۔سینہ کسی فدر بیٹس گمکی (over-resonant) ہوتا ہے۔ شہیقی خرر (inspiratory murmur) بشکل نائی و تیاہے کیا اس کے ساتھ ایک متنقدر صفیری (sibilant) خرخره (rhonchus) موتاہے ایکن رفر کے ساتھ وہِ بلندا واز خرخرہ سنائی و نیا ہے میں کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ کمیں کے ساتھ مریس ای تکلیف بہت نہ یا وہ میونی ہے۔ ایکس کا جہویا زرق ہوجا تاہے '' تنکویں کلی ٹرنی اِس ملتحات مبتل (suffused) بإسُرخ ہوجائے ہیں اور مربض کی ماری توجیسینہ سے ہوا کو خارجے کرنے کی کوئشش میں جذرب ہو جاتی ہے۔ عمو اُنٹ نہیں ہوتی کیم عرصہ کے بعیدُ اورمکن ہے کہ ہر دویا تین ہے کھنٹے ہو' مریض کھا ننا شروع کر ہا ہے اور کستفار تیلی شفاف نفاط کا نعث کر ماہے جس کے ساتھ مقوز انون مجی ملا ہوا موسکتا ہے۔ پیر مفس بنبتهٔ اسانی بوجاتی سے زران کم ہوجاتا ہے بندر بے ساری تحلیف جاتی رہنی ہے اور مریض کو بیندا جاتی ہے۔

بُمان (sputum) کے اندراکٹر استوانی یا بگر بی سرطہ کے علاوہ کوہ اجہام موجو دربوتے ہیں جو مؤلہ جات کر شان (Curchmann's spirals) کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں۔ یہ زروی مائل سنر یار ماوی در ات ہیں جو نما لاکے دھاکو سے بنتے ہیں خرو بین کے بنچ یہ بیچے کھائے ہوئے باریک یا سولٹے دستنے نظر آئے بین جن تحرما تھ ایوسین لیب نسید ظلبات کمے ہوتے ہیں اور بیچ یں ہمشہ ایک ننفاف راشہ بنوا ہے۔ غالبا یہ باریک نرشنبی انبوبات یں بنتے ہیں۔ دومت می نلمیں صبی پائی جاتی ہم کے بیعے کمعب قلمیں جو کیاسیم کار بونیٹ سے بنی ہوئی ہوئی ہی ہیں۔ (17) اور لمبوتری ششطی (hexahedral) قلمیں من کو تنار کو لیٹ ن کی قلیں اور (17) اور لمبوتری ششطی (Charcot-Leyden crystals) کہتے میں موتریک نے اوس سے متی ہیں اور بعض اوقات مرغولہ جات میں یائی ماتی ہیں۔ خون کے ایوسین بیند سیبید خلیات اللہ میں مدمول تر میں اور میں

وروره المراس المعنور المعنور

تشخیص ۔ حربہ القش کی شخیص میں یہ یادر کھنے سے مدو ملے گی کہ یہ ہم گرا کھ اول نصف میں ہو اسے ۔ کہ حمہ کی صورت میں اگر سرگذشت مرض نفس کی نوینت اور اس کے حملہ کے آغاز کا بغور مطالعہ کیا جائے تو تشخیص آسان ہوتی ہو مرض فالب صدری افر رساا ور حنجری نستد و (laryngeal obstruction) میں بہر کے آگیانی حلے و مدسے قریبی مشا بہت رکھ سکتے بہیں۔ بسٹیریا نی حلے بجی اس سے مشایہ ہوسکتے ہیں۔ اس امری وریا فت کے لئے کہ آیا مریض کسی خاص خارجی بروتین مثابہ ہوسکتے ہیں۔ اس امری وریا فت کے لئے کہ آیا مریض کسی خاص خارجی بروتین کی حماسیت رکھتا ہے ' جلدی تعاملات (skin reactions) وسیع طور برستعیل میں۔ کی حماسیت رکھتا ہے ' جلدی تعاملات (skin reactions) وسیع طور برستعیل میں۔ ضدسمی صل (antitoxic serum) کا اشروب کرنے سے پہلے ایسا امتحال گھوٹے کے ضدسمی صل (antitoxic serum) کا اشروب کرنے سے پہلے ایسا امتحال گھوٹے کے

مصل کے لئے کرلینا بیابئے کیو کہ اس اشراب سے بہت سے ربوی مریض ہلاک ہوگئے ہیں۔ وَمرعصنویِ مرض کانتیجہ بھی ہوسکتا ہے اور لیمشعبینی (bronchoscopy) کے فد بعدور بافت ہوسکتا ہے ۔

متی میزیمت القش اور دَمه دو نول بین خاص مقصد علاج حلوں کی وک تھام ہے جمتہ القش میں گھانس کے زانہ (hay-time) میں افتلاع میں رہنے سے محترز رہنا جائے۔ اگر مریض اہر جائے تو آ بھول یا ناک بر ایک نقاب (veil) محترز رہنا جائے۔ اگر مریض اہر جائے تو آ بھول یا ناک بر ایک نقاب استفال سے بین لیے ۔ سیستے بین کے داخلی استفال سے خمتہ القش کے لئے مما بیت کم بوجاتی ہے ۔ ناک کی غطام نقولہ (turbinals) برکے معض مقامات کو کو کین لگا ہے کے معکہ کمو او برقی (electric cautery) سے آہنہ سیستے چھوکہ متبہ کی باجا آ ہے۔

کدر نین جلاح (vaccine therapy) کے اس کر بہت کے کو کام کیا گیا ہو (18) ۔ مریش جس زیرہ کی حاسیت رکھتا ہے اس زیرے کے مرقق خلاصہ جاست کے تحت الحیادی اٹر اب سے بہت سی اصابوں میں علامات میں تخفیف اورحاسیت کے تحت الحیادی اٹر اب سے بہت سی اصابوں میں علامات میں تخفیف اورحاسیت کے طور پرایا گائی کی جاسکتی ہے۔ وس لاکھ میں ایک حقہ الادال کا ٹیوں کے طور پرایا گیا اور کا ہوا ہوا گائی کہ مور پرایا گائی کہ کو ارتباغ الکہ میں کے طور پرایا گیا اور کا ہوا ہوا گائی کے طور پرایا گیا اور کا ہوا ہوا گائی کہ کو انتراب کمی خار کو انتراب کمی خار کا انتراب کمی خار کا انتراب کمی خار کا کہ کہ اور ایک کی مقدار کا مرتبہ سے ہے جا ہو تھے دن اثر اب کمی جا تھے کہ ہوئی کا قت کے خلولات کی کی اور ایک کی مقدار کا مرتبہ سے عالی انتراب کمی خار کی وہ طاقت دریا فت کرتا ہے کہ خبر سے عمید تی تعسائل اور ایک طریقہ استحال سے حقید کی تعسائل اور ایک طریقہ استحال سے حقید والا محلول کا تحت ہے جو مناسب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بزار میں دیک محتد والا محلول اتمال طاقت ہے جو مناسب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بزار میں دیک محتد والا محلول اتمال طاقت ہے جو مناسب ہے۔

وَمُدِ كُمُ مَعَلَى أَبِمُ تَرِينِ امريه بِهِ كُرِحَى الامكان كالل ترين طالتِ محت يك رہنا چاہئے۔ بالخصوص كام كى زيا وتى سے پر بہنر كرنا چاہئے۔ باقاعد كى كے سساتھ ورزسش (exercise) کرنی چاہئے اور تعطیلیں کافی لینی چاہئیں یعفی اشخاص ایسے
ہیں کہ جولندن اور بڑے شہروں ہیں دوروں سے مصنون رہتے ہیں کیرنگرو ، نبلاغ
ہیں رہنے کی کوشش کر میں تو انھیں نی الغور دَورہ ہوجا تا ہے ۔ اس کے برعکس
ہوں رہنے اشخاص ایسے ہوتے ہیں صرف اضلاع میں رہ سکتے ہیں اوراگر شہروں میں
دہیں تو انھیں و مرکے دُورے ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کی ہوا بعضوں ہیں
دورے یہدا کر دیتی ہے اور دو مرول کو اجھا کر دیتی ہے ۔ کسی مریض کے تعلق
یہ دا تعات شخص تجربہ کرنے سے معلوم ہوسکتے ہیں ۔ عمو تا مریض او نجی زمین پر بہنر
یہ دا تھا ت شخص تجربہ کرنے سے معلوم ہوسکتے ہیں ۔ عمو تا مریض او نجی زمین پر بہنر

اس کے بعد جرامور فور طلب ہیں وہ یہ بس کوکس طرح غذا ہیں اعتدال اور اختیا طاعل میں لا ٹی حائے ۔ غذ ارملکی اور بہ آ ما نی مضمر ہو ہے والی ہونی جا ہے۔ سُب كا كَلَمَا أَ بِعَارَى مَه بِونَا بِالسِئْمِ . اور و مَتاً فو مُتاً خاص فالس عَدَاوُل مُللًّا بِنَر و مَعا معالیول مورک گوشت بیر کوغذا سے فارج کرکے و ایکنا چاہئے کہ ان بی سے کوئی شئے نقصان رس ان تو بہیں ہے سینگی ہوئی ٹوبل روٹی (toasted bread) اورنه ب سينك بهوك بكث كلاف كلاف على النبي - نشاسته منر (farinaceous) غذاؤل لویانی میں اُیا لنا جاہئے نہ کہ دود صریب ۔ رود ھ کی دوسری غذاؤں مثلاً مینجر کی غذا سے پر ہیز کرنا جائے۔ حکر کے معل میں مدد دسینے کے لئے کیمو پاسٹنتر و کے ساتھ النس و كير فروز (dextrose) و ن مي تين بارتجونير كرنا جاسي . عب مريض 'ریہ ہو توایک قلبل لیحارہ غذا (low calorie biet) کی ضرور ت ہے۔ اگر میلوم ہوجائے کہ مریض کئی فاص پروٹین کی خامیت رکھتا ہے تو اس شئے سے پرہیزا کڑنا لازم ہے کیا اگرا بیاکر نامنٹ کل ہؤتو اُس خاص پر وٹین سے مِیامیت رَائی (desensitization) عمل من لاني جائے۔ يرون سے تعامل ظام ركرنے والے مریفنوں کے لئے ایک بیل کی روئی کا تکیہ (capoc pillow) تجویز کیا جاتا ہے۔ غیر نوعی پروٹینی ملاج (non-specific protein therapy) کے زر ہیں سے اتبیے نستانج حاصل ہوئے ہیں۔ ایک لاکھ میں ایک طاقت و الی ٹآخ کی ٹی۔ ڈی ۔ ایس ٹیو سِرکیولین (Koch's T. D. A. tuberculin) کے ایک سی سی کے سفتہ واری

تحت الجارى انتراب استعال كئے گئے میں (19)-تبیٹیون (peptone) كے اِنترا ! آرمور کے نمبر ہم بیمبلون (Armour's No. 2 peptone) کی شکل میں ور واعضلی با دروں وریدی راہ سے ہفتہ میں دوبارعل میں لائے جاتے ہیں۔ پہلی خوراک س سی سی۔ ہے' اور بہ تبدریج بقدر ۲ و مسی پسی بڑمعائی جاتی ہے' اورا تم متّ نوراک م یا ۵ ۲۶ سی سی ہے۔ اتم مقدار خوراک وہ ہے جو تعامل بیداکر اتے کرتے نا کام روجائے' اور انٹرا ب کے جارا یا بیجے گھنٹے کے معتدیش کاامتحان کرکے دیکھنا عامیے کہ وہ ملند تو نہیں ہو گئی ہے (20) ۔ تعض او قات ہر کھیا نے سے ٹھیک یون کم صنع نیلے بیپٹون (۵ ء . گرام) براہ وزن لینے سے کامیابی بوتی ہے۔ مریض کے ا بینے یر و گیئو زجو کہ اس کے بیٹال سے تیا ر کئے جاتے ہیں' تغیر ندیرکا میا بی کے م ياً ز مائے گئے ہیں ۔ دِوررے نیا بت مختلف الا فعام طریقے بیان کئے جا سکتے ہیں جو شائد ایک عمومی تعامل بیدا کرکے عل کرنے ہیں جس سے مریض کی عارضی طور برحما سیرت ر با ئی ہوجاتی ہے ۔سومنے کو جانے سے بہلے بیس منٹ کے عرصہ کا گرم آل جس کی نبین ۸ و درجے سے ۱۰۱ورجے فارن ہا 'ٹٹ کک ٹر ہتی ہو ممکن ہے کہ سٹ با محلول کو روک دے ۔ طِدکے آبک رقبہ بر و راء نبغشی روشنی (ultra-violet light) کی ایک " احمراری مغناد" ("erythema dose") کیا لا شعاعول می بخشف اسی طرح سے عمل رسکتا ہے (21) مانٹ ڈورے (Mont Dore) میں آیک گرم مرطوب کرہ ہوائی میں شف استتعال کیا جا آہے۔ مبض او قات فاصل الانف کو مکوا تو برقی سے آہت سے <u>چھڑنے سے سطے زک جاتے ہیں' اور یہاس وقت نہا بت مفید ہوتا ہے جب کہ </u> ناک میں کوئی نشقہ (deformity) یا سیدا نے (polypi) نہوں اور اِنکماشی ضغطہ و می (systolic blood pressure) بلندي كي طرف مأسل بهو (١٢٠ تا ١٧٠ ملي مثير) - ومثل ناک کے سعدا نوں (polypi) کوکسی تعبی مالت ہیں ہنسسییں نکالنا چاہئے (16) ایسے بوابند کوشک تعمر کئے گئے ہیں جن می مریض سؤا بُواور ۱۰۰ فیٹ کی بلندی سے لمینی ہوئی ہوا جو مَزید برا ں تبرید کے ذریبہ مولڈ ز (moulds)سیے اور بھی ماک ر آئے ہوا ترویج کے لئے استعال کی جاتی ہے۔ بہرائے بیش کی گئی ہے کہ جو مکہ مریض چوبیس ممنٹوں کے مبیّز حصے میں ان کرہ ہوائی اووں سے محفوظ رہتا ہے البذاوہ

معول سے مسئون رہتا ہے (22) ۔ لا کر آرسینی کیلس (hquor ersenicalis) فی تورا مقطرے (mm.) میرو کا بٹرز (bromides) اور بائھے میں پوٹما سیم آلیو فر انڈزوزان ہے گرمت مک کی نور آکوں میں میرست حکم اس کا تا غاز روکت کے لئے تہا بہت مصیدا دو بیا ایس پیلومل (calomel) کی تقوزی خوراکول سے ملکے سیمال لا تا بھی مفید ہوتا ہے اور مسیلال (Salol) اور دوسرے معونی دا نمائٹ لیزیہ (intestinal disinfectanty) ہیں۔

جب و مدسرا بیت کے ہمراہ یا ماجائے تو دورہ ہے ممتزا دطریقہائے علاج میسر بین ۔ زکام (coryza) کا علاج بیرا فین اور دلسیسی کے اس آمیزہ سے کرنا چاہئے جو مشر 196 پر بیان کیا گیا ہے ۔ ثباق یا انفی افراز ات سے خو د زاد جگر رسیتا ت مشر 196 پر بیان کیا گیا ہے ۔ ثباق یا انفی افراز ات سے خو د زاد جگر رسیتا ت (autogenous vaccines) میاد کئے جا سکتے 'یا ایک مذورہ کون حلائی استعمال کی جاسکتی ہے ۔ ان کے استمال کا بہنرین طریافقہ دی ون حلائی (intracutaneous) منطق زہرے اور مقیا می تعالی کی مقداد سے مقداد کے منطق زہرے کی طائن و ندارک منطق زہرے کی طائب و تی ہے ۔ عفونی استانی مائٹ (septic foci) کی طائب و ندارک کیا جائے۔

(Morell Mackenzie) علاج بيحمته القش كه كيم مور ل كمنينري

المن اور ناک می کورن کے ہم آ ہو فی صدی محلول کے دِشاش (spray) کی مفارش کر فات میں اور ناک میں کورن اور ایک و تسلیب اور وہ اروغن الروہ اسم کے بعد و وزار نہ ایک و تسلیب اور وہ اروغن الروہ اسم کے بعد و از اسم اللہ اسم کے بار بربا بروائل کرکے پہلے وس مزٹ کے لئے اور از اسم بندر کی برصنے ہوئے عزمول کیلئے تھا کہ نصم کھنٹ یا زائد عرصہ کے لئے اندر مجبور دیا جا اندر مجبور دیا جا اندر مجبور دیا جا اندر مجبور دیا جا کا قت الدر محبور کی کہ دیا کہ اسم کی اسم میں اسم کا قت الدیم کا کا کہ ایک ایک کا میں اسم کی اسم کی اسم کی اسم کی اسم کی اسم کی در میں اسم کا قت الدیم کا کا کہ ایک کی میں ایک کا فی کا کہ ایک کی اسم کی اسم کی اسم کی اسم کی در میں بیش کروڈ کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ

(cautery) کا استهال کرنا پر برخت شفا بخش معلوم بوتا ہے۔ دَمه کا علم روکنے کے لئے آپٹر رینین الائڈر وکلور اُنڈ (۱۰۰۰ میں احصہ) کے

ا آ۲ تطروں کا اِنٹراب نہایت یقینی علاج ہے اگرچہ اُس کے ۱۰ ملکہ ۵ ا می مشرکا مدول عضلی شراب بمی کیاما با ہے۔ ۱۰۰۰ میں ایکرے حسد ایڈرینالبین (adrenaline) کارٹ كربسين في أون انبعث كليرين كه وفي صدى كلور أون اوراً قطر المسلفرس ترسيم (sulphurous acid) کے ملے ہوئے ہول ایک سہولت وہ طریقہ اِنتمالتے مرشہ کو ہاتھ یا بمب کے ذریعہ طلا و حاتا ہے یا ایک استوانہ (cylinder) میں کی آگیجن کو بطور توت مح کہ کے استعمال کیا ما نا ہے۔ ایڈرینین کی تالیفی قلیس (synthetic crystals) (المِي رُام) زبان كے نيج ركه كر عذب كرائى جامكتى بين - كيفين آيودائد (caffeine) (iodide) (له م كرين) يا يا رُوارِدُان (pyramidon) (له م كرين) اورايفيدين (ephodrin) (الم الرون) براه وبان لی جاسکتی ہے ۔ ااکل اُسُرائِٹ (ephodrin) بھی عام طور ریونگھی جانی ہے یا سبغیہ تبغ صحرائی (tr. lobeliæ cth.) صبغیہ جوز آگل (tr. stramon) صينه نفاح (tr. belladonno) كلورل باكثر بيث (tr. belladonno) (nitrites) كانشرائينس (nitrites) يا انشرو كليسرين (nitrogly cerine) كي اتم وَإِ بِا دِ بَيْ نُوراً كَبِي بِرا د دِبن _في عِياسَتَني بِي ۔ ابکِ نَها بیت عام طریقهٔ علاج ی**ه بوکه**ا نائٹر کے محلول (nitre solution) میں سیرشدہ کاغذ کونعث کرکے اور آسے طلاکہ اُس کے بخارات کا استنشاق کیا جا ہے' یا جزراثل (stramonium) کے کتے ہوئے تیوں سے بنائے ہوئے سکر میٹ ہے جائیں 'یاجوز انتل کے دوسرے بچہ: ات ہتمال کئے جائیں۔ استینا ق (inhalation) یعنے دھواں لینا با قاعدہ علائج کرنے کا ایک (bronchitia) ممود إربوط بالبيد -

مریف کوابک آکسیجنی خیمه (oxygen tent) کے اندرآ کیجن (oxygen) کے اندرآ کیجن (oxygen) اور کاربن آئی آگائی گرائی (status asthmaticus) دے کرحالت و (status asthmaticus) کو واقع ہوئے ہے روکا جا جا ہے (49) مصنف نے دروں ریوی دباؤ کو طرحا کر حب
ملے دوک دستے ہیں (ملاحظ ہوریوی ہنج) - اگر بہت شعبی الہما برو تو آگسیجنی خیمہ لاکارین ڈائی آگائی کے نفع بخش نابت ہوتا ہے ۔

برا شعبات كانسدد

جہاں کہ بچکا وکے تفاق ساب کائل ہے ' وبرے شعبات قعبۃ الربہ سے آر۔ بی ما کمت رکھتے ہیں' اور جو تو قعبی تعدد کے عوان کے تحت کہا کیا ہے ' سی آب ہے ہیں اور جو تو قعبی تعدد کے عوان کے تحت کہا کیا ہے ' سی آب ہے ہیں اور بیٹے ہوا ہے ہوت ہو تعدد کا نہتے ہوا ہے نہ وہ رہوی برطان انور سا' اجمام غریبہ یا ایسے شبی غدو کا نہتے ہوا ہے جو خبیت المد کی سے یا تحقیق (caseation) اور تنیخ الیسے شبی غدو کا نہتے ہوا ہوگئے ہموں ۔ نسبۃ کی عام طور برمری کا سسر علمی سلعہ والیسے شبی کو واسکتا ہی ہوگئے ہموں ۔ نسبۃ کی عام طور برمری کا سسر علمی سلعہ ایال اور تنیخ کو واسکتا ہی ہوگئے ہوا ۔ نسبۃ کی عام طور برمری کا سسر علمی سلعہ کے کیا و کا خاص امکان ہے ' کبوکھ یا اس شعبہ نسبۃ بڑا ہوتا ہے' کبوکھ یا اس شعبہ نسبۃ بڑا ہوتا ہے' کبدا یا بیست کے درمیان بالی شعبہ نسبۃ بڑا ہوتا ہے' لبدا احسام غریبہ زیا وہ اکثر اسی کے اندر گرجاتے ہیں ۔ اور چونکہ دونوں شعبات کے درمیان مرکزیں گردی والے اسے کی دائیں شاخ کے اندر چیے جائیں اور اسی یا مقابل شعبہ کے اندر والیس کی دائیں اور اسی یا مقابل شعبہ کے اندر والیس

بہط مائے (Newton Pitt)۔ ایک ڈھیلاجم غربب مجی ایک کو لیکھ۔ رمواع (ball & socket valve) کی طرع عل کرکے ایباری اثر پیداکرد تیاہے۔

اس کا ایک اور اثر تک ل د الشعب (bronchiectasis) ہے جو دو اتنی اس کا ایک اور اثر تک ل د الشعب (pea-nut) ہے جو دو اتنی کے عومہ میں نمو یاب ہوسکتا ہے۔ جب جب غریب ایک پی نٹ (pea-nut) ہوتو بالکل جلد ہی نہایت خطر ناک التہاب بیدا جو جانے کا اندیشہ مؤتا ہے۔ اجام غریب ویل کی دیکر پیجیب دگیاں بیدا کرسکتے ہیں اس بیدا کر اور خاراصا بتوں میں کبھی اسروائے اور کی اور خاراصا بتوں میں کبھی اسروائے اس کا کی بیدا کر سیدا کر سیدا کر سید اس کا میں کبھی استروائے اس کا کہ شدہ اصا بتوں میں کبھی استروائے اللہ (pyo-pneumothorax) اور طوال اللہ قائم شدہ اصا بتوں میں تقیم الصدر (empyema) یا وافر نفت الدم (pso-pneumothorax) ۔ (23) ۔

علامات اوطبیعی امارات - یه تسده که د مباوان کی بیدائش کی سرعت کے لیے طرح حرف نفف ہوتے ہیں ۔ اور چونکہ مقابل انبو بداکٹر غیرا کہ ف ہوتا ہے اور اس طرح صرف نفف نفسی رقبہ میں مداخلت ہوتی ہے ، لہندا وقوع بلاکت سے پیلے شعبہ زیادہ کامل طور پرمیدود جوتا ہے ، اور قصبتہ الریہ آنیا کہی نہیں ہوتا۔

ا تدانهٔ سکون بامشت کی حالت میں نبر (dyspnea) ہی ایم تعاملات
ہوتی ہے اور کمجی کمجی مرحر و (stridor) اور خنیف نفٹ الدّم ہوتے ہیں سیسکن
دونوں بڑے شعبات میں سے کسی ایک کا تسدد اختاق (asphyxia) کے ویسے
ہی دورے بیدا کر سکتا ہے جیسے کہ قصبی تسدد میں واقع ہوتے ہیں یمدالشعب
نمو یا بہ ہوجائے بڑکی نسی بد بودار بیاتی کا نفث اور تموی تعالی نمایاں علاما ہوجائی نمو یک نفو کی خرمود کی اس کی خرمود کی اسک کی خرمود کی اسک کی انتہائی کی انتہائی کی دوری ہے 'جو مقابل جا نب بر بڑھے ہوئے اصوات نعنس کے
اکسٹ کی انتہائی کی دری ہے 'جو مقابل جا نب بر بڑھے ہوئے اصوات نعنس کے
ایسٹ کی انتہائی کی دری ہے 'جو مقابل جا نب بر بڑھے ہوئے اصوات نعنس کے
ایسٹ کی انتہائی کی دری ہے 'جو مقابل جا نب بر بڑھے ہوئے اصوات نعنس کے

الله ايك سيل جوك كهاك اورتيل مكالي كه كام أق ب (سيندرو و كشزى عبدالحق) -

غیرو ضعیت کا شوت موجو د بیوگا عبی کا نتیج به بوسکتا ہے کہ است واح السداد

(pneumothorax) کے ساتھ قربی من بہت ہوجائے۔ ان اصابوں می

الاخر اور دو سری اصابتوں میں انسبتہ بہت بلد ہو اکے جا بہوجائے بیک اور ساتھ ہی اسی ارتعاش گفتا ہوا

اوف قا عدے یہ اصمیت (dulness) ہوتی ہے اور ساتھ ہی اسی ارتعاش گفتا ہوا

ہوتا ہے۔ یہ بڑھ کریہ مالت ہوسکتی ہے کہ اسوات نفس (breath sounds) اور قرعی کی تما مترغائب ہوں اور نسطی اور قرعی کی تما مترغائب ہوں اگر تمددالشعب کے کہفے بڑی حدیک بن جا میں تو مندرجہ بالا طبیعی الوات کے بجائے اکر تمددالشعب کے کہفے بڑی حدیک بن جا میں تو مندرجہ بالا طبیعی الوات کے بجائے ایک یا دوسرے جھو سے رقب بر تعلیلی قرعی مربکہ تی نفس (cavernous breathing) شعب موتی بی سے موتی والی (gurgling) موجو و ہوسکتے ہیں۔

(pector loquy) اور صدر کلامی (pector loquy) موجو و ہوسکتے ہیں۔

ہے بچکا وکی حالت میں افورسائی موجودگی'یا استرو اح الصدر کی حالت میں دیڑھ کی جانب بازکشیدہ (retracted) مشش کی موجود گی ظانبر ہو جائے۔ کی جانب بازکشیدہ محصر جب منیق (stenosis) شش کا کم و بیشس ہو مل

(collapue) بیداکردیتی ہے جیسا کہ اس کو بالانو پیداکر ناہی جائے توطبی امارا اکن علامات سے مشابہ ہوتے ہیں جوایک جزئر مذب سندہ پلیورائی انصباب (pluritic effusion) کے اعث ہوتے ہیں اور ایسی صورت بن آخری فیصلہ

کے لئے ایک استفقائی بچکاری (exploring syringe) کی خرورت ہوسکتی ہے۔

جہاں اجام غریبہ کا سوال ہوتو بلاسٹ بسرگذشت مرض پراحت یا طرک کے ساتھ خور کر ناچاہئے۔ بہت سے اجہام غریبہ لا شعاعوں سے غیر شغاف نظر آئے۔

میں۔ مناسب صابتوں میں شعصہ مین (bronchoscope) استعمال کرناچاہئے۔

بین ۔ مناسب صابتوں میں شعصہ مین نوعیت اور النہ بی تعمال کے درجسہ ہو ہونا ہے۔ ممکن ہے کہ سنتی میں سی حب مغریب کی انہمائی برداشت بیدا ہوجائے میں کہ استحمال کے درجسہ ہو ہونا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی صابتیں مواقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی صابتیں مواقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی صابتیں مواقعہ سے تعداد استحب اور کھی بین (23)۔

میل ہے۔ قصبہ کے تعدد کے علاج سے مث بہتے۔

تنشو كانقاخ

(EMPHYSEMA OF THE LUNGS)

سباب اورامراضات حصہ لینتے ہیں۔ ان میں سے بعض مزمن سعی البتاب (chronic bronchitis) کی ا ئے منل سے ذرابیلے بندمز مار (glottis)کے بیچیے جیسے وں میں دیا وزما وہ موجا ما ہے۔ یہ امردموی رسیس اس مے مداخلت کرتا ہے کد کوی نون کا وا و کم ہوتا ہے۔ اسس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفیتہ رفینہ شش کی افست کا انحطاط واقع ہو جا آ ہجہ رین) کھانسنے کے انتقام راک گہراتہ میں (Inspiration) اماما آ ہے جس سے جو فیزوں کا انتفاخ ہو مالئا ہے' اُ ن کی دیواریں تن ماتی ہ*ن اورعرو قی شعہ ب*یا تنگ بُوطِ تے ہیں' اور اس کامبی ہی نیتی ہوتا ہے کہ دموی رسدیں مداخلت ہوتی ہے۔ (۴) عضلات ہو توت دور آن ثبینی میں بروے کارلاتے ہیں وہ اسس نوت کی پرنسب زیاده ہوتی ہے جو کردوران زفیر (expiration) میں برو*ٹ کار* لائى باتى ہے كيونكمة خوا لذكر فعل زيا وہ ترميبيم شوك كي كيكدار ما زُكْت elastic) ر recoil بی کیوجہ سے ہوتا ہے ۔ اگر شعبات افرا زیسے جزئی طور برمیدو درموک نوباد ہو اس تسدو کے دوران مہت میں ہوا جو فیزوں کے اندر کھنچر آسکتی ہے لیکن دوران ز فیر بیں محیراُن سے با ہرنہیں کل تکتی ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیزے متقلاً منتفعٰ ہومائے ہیں ۔ یہی عامل دَمد کی حالت میں بھی بروے کا رہ آیا ہے ، جہاں ت شعبی عضلات کے انتیاض کے باعث پیلا ہوجا آجے۔ یتبدد ایک مصراع کے طوریمل ارة ہے اینی مواکواندر تواسط و تیاہے لیکن میعریا ہرنہیں جانے دنیا۔ (۴) خبال كياجا بأسب كه شيشه كرول يعنه كانج ميمو شكنه والول (glass-blowers) بھو بک کریاجا بھانے والول اور ان لوگوں میں جومحنت طلب بیٹنوں میں شغول رہتے ہیں' اور جنفیں یا تو ہوا کی ایک دعیبی منصبط رو کی رُسد پہنچا نے کے لئے یا ازووں کے استعال کے لئے ایک سمانے کانقطہ (point d'appui) بسارے كے لئے اپنے سينے ملسل كھلائے ہوئے ركھنے بڑتے ہیں ، جوفیزی د بوارس زیادہ طویل عرصه تک تن کر کھنچ جاتی ہیں ۔ نسکین تا زہ مٹ بدان بنے اس امر کومشنت كرديا ہے (24) - (6) سالها سال كے عرصه ميں مجمع ول كى ليكدار بافت بتدريج

سبده موماتی ہے اور معرات خاص کا خرد شششی نقاخ small-lunged) (emphysema پیداکردیتی ہے۔ (۱) جب شکش کا کوئی حصہ بوج مرض سکر جآیا یا التِها بی ماصلات یا نوماً یہ سے در ریخته (infiltrated) ہو ما تاہے' تووہ دولا شهیق میں چیل نہیں سیکناً۔ ایسی صورت میں قرب وجوار کے جوفیز ول کا بھیب ز اوہ ہوجانا جائے تاکہ خالی ملکہ بر ہوجائے۔ اِسے تعویضی نقاخ (compensatory emphysema) کتتے ہیں ۔ مذکورہ مالا مختلف ذرائع کامتیمہ یہ ہوتا ہے کہ نفاخ میں ہم سلوح فروں کے درمیانی فاصلاً ذیول (atrophied) بوجات، من جدرى فاصل التي اربار أيك انتقاب فائم موجا ماد، عير لورافال تلف موكرد ونوں جوفیزے ایک بن حاتے ہیں۔ اس عمل میں نا صرف لیحکدار با فت بلکہ ر پوی عروق شعرید کا وه پوراجال مجی جو فاسل بین موجود بهوتا ہے 'غائب ہوجا آ ہے۔ اگریعل بھیبھٹروں کے طول وعض ہیں وسیع طور بر کمرر ہو تارہ ہے تو اول نوید ہوتا ہے کہ بنوائی فضائیں بہت بڑی ہوجاتی ہیں اور بہت سسے مقامات رمضتی افت کے بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں جن میں صرف ہوا ہے۔ دو مرسستشن کی وہ لیک جوزفر (expiration) کے لیے ضروری ت کم ہوجاتی ہے۔ سوی وہ عروتی رقبہ جوخون کے تہویہ ف عامات ا ورجهارم بیشتر اصابتول عجیمعڑے بھائے خود بہت بڑے ہوجاتے ہیں۔

کی جیرس کے جاتے رہے کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیرزیا دہ سکل ہوجا ہاہے۔

بھیرسٹروں کی جمامت کی زیادتی کے علاوہ سینہ چرڑائی اور گہرائی میں ٹرا ہوجا آ

بخاورومی سکل اور وضع مستقلاً اختیار کر لیتا ہے جو کا آئی ہی ہوجا تی ہے م کیونکہ مفسوس ہے۔ سینہ کی حرکت بندیری (mohility) بہت کہ ہوجا تی ہے م کیونکہ اسس کی وسعت (range) کا طن ٹیمین اور کا طن زفیر کے درمیان ہوئے کے بجائے مفتی تیمین کے مختلف درجات کے درمیان ہوتی رہتی ہے۔ کمیوں کا باہمی تبادل مفتی تیمین کی خلف درجات کے درمیان ہوتی ہے۔ کمیوں کا باہمی تبادل کے دبائل طور پر ہوتا ہے۔ یہ اس امرسے ظاہر ہوتا ہے کہ شریا نی خون میں میں ایک کے دبائل طور پر ہوتا ہے۔ یہ اس امرسے ظاہر ہوتا ہے کہ شریا نی خون میں میں اور کا طن کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہی

ور حقیقت و CO کی ترشه دمویت (acidæmia) موجود ہوتی ہے ' جوشدید نہر پیدا کردیتی ہے ۔ نثریا نی خون کی آگیجن سے میرمشدگی بھی مکن ہے معمول کی نسبت کر چو(7) یہ عام طور برقلوی محفوظ میں زیادتی جوجاتی ہے جو کہ کا رہن ڈائی آگا کید کر محت اسے کا میں آئی نتہ ہے۔

ایک دومری قسم (خرد ششی نقاخ =small-lunged emphysema) معراشخاص میں ایک شیخوی (senile) د بولی نفیر کے طور بر و اقع موتی سے

جہاں مکن ہے کہ بیجیب گی بیدا کرنے والے (complicating) شعبی کنہا -

اِس مِن سُنَ شِرا نَهِ بِسِ ہُو ما' اور جِعالوں کی مُعداوزیا وہ نہیں ہوتی۔ فاصلات مُد بول ہوجاتے ہیں جس کانتیجہ: ہوتا ہے کہ جو فیزے باہم تحد ہوجاتے ہیں اُوش سکرا ہوا' بے لیک خشک اور جیکے رنگ کا ہوجاتا ہے' اور ممول کے نسبت کم کال استخبی ساخت میش کرتا ہے۔

ر بو سے بہت کر ہات ہے۔ کا سمارا سے کرماصل ہے۔

دورے سے زیادہ قریب تر' اور زیریں لیسلیاں ایک دورے سے زیادہ دُور ہوتی ہیں۔ اور شراسیفی زاویہ نہایت منفری (obtuse) ہوتا ہے۔ اور اس کا از نفاع ' بھٹنی اور مدم القلب ناپ ہوا اسے ۔ بیلیوں کا ار تفاع ' بھٹنی اور مدم القلب (heart's impulse) کے اضافی مقامات کوبدل دیتا ہے۔ بھٹنی اکر پانچوں بلی براور صدم القلب بھٹی فضاد ہیں یا یا جا آہے ۔ سینہ کے جو حصے معمولاً ممکی ہوتے ہیں اُن برگک کی توسیع ہوجاتی ہے ' اور ما یا سنتھ برجاتی ہے ۔ سی طیع جو سے میمولاً ممکی کی توسیع ہوجاتی ہے ۔ سی طیع جو سقے معمولاً ممکی ہوتا ہے ۔ سی طیع برجاتی ہے کی طرف برحتی اور قابی اُن برگگ کی توسیع ہوجاتی ہے ۔ استماع کی طرف برجسی فضا ' یا ساتو ہی لیلی تعک گمکی ہوتا ہے ' اور قابی اُن ہرجاتی ہے ۔ استماع کر فیر بھسی فضا ' یا ساتو ہی لیلی تھک گھٹے ہوئے ہوتے یا بشکل سنائی دیتے ہیں گیلی کمن کی اصوات نفس بہت کچھ گھٹے ہوئے ہوتے یا بشکل سنائی دیتے ہیں گیلی کمن کو جب بمز ماں شعبی سختی ہوتو زفری خریر (expiratory murmur) بہت کمیا کہ جو جاتے ہیں۔

پیمیمیر ول کی کلانی ' دو مرے اعضاد سے متعلق اِمارات کو بھی متا اُثر کردتی ہے۔ چونکہ مشیش کامعمول کی نسبت ایک زیادہ بڑا حصہ قلب اور دیوارسینہ کے در میان واقع ہوتا ہے ' مکن ہے کہ صدم القلب پانچویں فضار میں غیر محسوس ہو' اموات قلب وضیمے (faint) ہوتے ہیں' اور مکن ہے کہ اتعاع (dilatation) با

مِش برور ولی (hypertrophy) پینسیده مومائے۔

خروسشی نفاخ س سینه این فاکے میں زیا وہ مرقر ہوتا ہے لیکن بڑھا ہواہیں ہوتا۔ بھیمیڑے قلب کو ہنیں ڈھا بچے اور قلب بیش پرور دہ تہیں ملکہ غربول ہوتا ہے۔ قرعی مر (percussion note) بیش مگی ہوتا ہے ' اور بہیقی خردر کمزور ہوتا ہے 'لکن ز فیرلمباہیں ہوتا۔

دونون فسموں میں شبی آلبت ایک خرخوات (rhonchi) اکر موجود ہوئے ایس - انبتائی اصا بتول میں افر بیا کی وجہ سے مجیمی و ل کے قاعد س پر انظا (rales) موضع میں اور سساتھ ہی گھٹی ہوئی گلک یا بی جاتی ہے ۔ بیمیب گیاں۔ مزمن عبی التہاب اکثر اوقات موجود ہوتا ہے نواہ اس کے ماتھ تمدد الشعب ہو یا رہو معمرا شخاص میں عمراً عمن یا قلب کا انتظام اس کے ماتھ تمدد الشعب ہو یا رہو معمرا شخاص میں عمراً عمن یا میں جا نب نیز دائمیں جا نب کی بیش پر ورئشس اور اتساع موجود ہوتا ہؤاو رحکن ہے کہ عام اذیما موجود ہوتا ہؤاو رحکن ہے کہ عام اذیما بھی ہو۔ اکثر شدیا نی انتخاط ط(arterial degeneration) موجود ہوتا ہے جسکے ہمراہ سنینے فی شریا نی تصلی گردے (senile arteriosclerotic kidneys) یا کے جاتے ہیں۔ اس صعم کی حالت برصفی 255 برزیا دو نفصیل کے ساتھ عور کیا گیا ہے۔ جاتے ہیں۔ اس صعم کی حالت برصفی 255 برزیا دو نفصیل کے ساتھ عور کیا گیا ہے۔ اور بالخصوص گیا کہ کی متغیر نوعیت پر موتا ہو اور بالخصوص گیا کہ کی متغیر نوعیت اور بہر اور بالخصوص گیا ہر بہوجاتی ہے ۔ خو کوششتی قسم میں گلک کی متغیر نوعیت اور بہر خاص مظا ہر بوت نہیں ۔ رانجنی شعاعیں یہ ظاہر کراتی ہیں کہ تذریب کی حالت کی خاص کی متغیر نوعیت اور ڈا کفرام کا محل د قوع نوب کی اور ایک میں دور بادہ دوروشین دفیہ اور ڈا کفرام کا محل د قوع نوب کی اور ایک میں دوروشین دوروشین دوروشی دوروش

اندار عشیقی صحت یا بی نہیں واقع ہوتی کی طافات میں تخفیف موجاتی ہے۔ زندگی کی مدت کا انحصار تغییر کی وسعت مشیمی المتہاب کے امکان اور عضائه اطب کی حالت پر ہوتا ہے۔ بیٹیر اصابتوں ہیں آخری نتیجہ کئی سال کی مدن کے مبعد

رونما ہوتا ہوتا ہے۔ علاج ۔ اس کا منشاء یہ ہونا جائے کہ مریض کی عام سحت کی اصلاح کیا۔ شعبی التہاب کی بچید کیو کئے تمام خطرا سے احتراز کیا جائے' اور جب یہ واقع ہوجا میں تو اُن میں شخصیف کی جائے ۔ جیٹا نجہ لا زم ہے کہ مریض کو منعذی اور ہضم پذیرعن ذا دی جائے' اسس کے ملبوسات مناسب ہوں' وہ گرم' عدہ ترویج داد کم وں سہے اور مشرفی ہواؤں اور مشبانہ ہوا ہے پر ہیز کرے ۔مقو یات جیسے کہ کا ڈیلور آئیل اور مفن حکم ایری)' لوٹا اسٹر کنیا (strychnia)' اور کو مین (quinine) استعمال کے جاتے ہیں ۔ ضائع مشدہ تو کیکدار یا فت کے نقصان کی تلافی کی کوششیں کی گئی ہیں۔ شلا گر آورٹ (Gerhardt) مشورہ دئیا ہے کہ سینہ کا میکا نی بچکا و علی ب

لاکرز فیر (expiration) میں المدا دہنجائی جائے۔ ایسے ایک دوسر اشخص سینہ کے
زیریں صدیرا ہے یا تھ روز از بانج کی جس شٹ مک رکھ کر انجام دیا ہے۔ ساتھ
موجود رہنے والے شعبی البہا ب کا علاج کرنا جائے ۔ بچکائی موئی ہوا compressed)
(steel کے ذریعہ ملاج ' جیساکہ برآمٹن کے شفاخا نہیں فولا دی کوشک steel
(chamber) میں کیا جا تا ہے ' شہنی میں اندر کی ہوئی آ کسیمن سے ارتکاز
(concentration) کی زیادتی پر شخصہ ہوتا ہے ' اور یہ نفاخ میں مقید یا یا گیا ہے'
خاص کر اس وقت جب کہ البتا ب شبی موجود ہو۔ ایک آ کسیمن کا خیمہ بھی استعال
کیا جا سکتا ہے۔

شنوا كابرئوط

(COLLAPSE OF THE LUNGS)

یہ ڈایا فرام کے شلل کا نتیجرنہیں ہونی کیونکہ یہ ڈایا فرا می عصب کے قلع کے بعد مجی پیدا نِنبی ہوتی ۔

(۱) تسل ۱۵ ال طرح ببدا ہوسکتا ہے: ۔ لوز تبن کی مزمن کلانی اور انعنی ببت زیادہ اکثر بلوم (naso-pharynx) بین غدورہ کی بالبیدگی ہے اور نسبتہ ببت زیادہ اکثر شعبی البناب کے لزج مناطی یا رہی افرازسے بالحقوص بجوں میں اور شبی وات الت کے ایک جزوکے طور بیا اور زیادہ معمرا شخاص میں شعبہ کے اسس تفنیق سے جو فول یہ کے ایک جزوکے طور بیا ان رساست کیا انورساسے کیا بیلے بیان کئے ہوئے دوسرے امباب میں سے کسی سب کی دجہ سے واقع ہو جائے۔

رمین کے اندروہ بیشتر اوقات بلیورائی انصاب کے اعث ہوتا ہے کی کائی سینہ کے اندروہ بیشتر اوقات بلیورائی انصاب کے اعث ہوتا ہے کی کلائی قلب کر دہلی انصاب کو اعث ہوتا ہے کی کلائی قلب کر دہلی انصاب واسطی سلمات اُور لمی کے انورساوُل اور ریر مع کے زاوی انحاء (kypho-scolosis) کی انورساوُل اور ریر معنی انتوا = (kypho-scolosis) کی دراوی از کا ان مسلم سے برصنے والے سلمات کو جسے بی ہوسکا ہیں گری بالائی سطم سے برصنے والے سلمات کو اجاب کی بالائی سلم سے اُل افرامی خراجات کو ایمن ہوسکا اور مبینی سلمات کے دباؤ کے باعث ہوسکا محمل کے کیسید اِست کے دباؤ کے باعث ہوسکا میں سلمات کے دباؤ کے باعث ہوسکا کے دباؤ کے باعث ہوسکا کے دباؤ کی باتھ کی سلمات کے دباؤ کے باعث ہوسکا کے دباؤ کے دباؤ کی باتھ کی دباؤ کی باتھ کو دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کی باتھ کو دباؤ کے دباؤ کی باتھ کی دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کی باتھ کی دباؤ کے دباؤ کی باتھ کی دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کی باتھ کی دباؤ کے دباؤ کے دباؤ کی باتھ کے دباؤ کے دباؤ

(س) ببند کے اور بعض او قات جم کے دو سرے حصول کے زنموں ہیں ایک پورے شوں کے زنموں ہیں ایک پورے شمس کا کلی ہو ط(massive collapse) واقع ہوسکتا ہے۔ اس کی شرط نہیں کہ زنم کہ فائی ہو ط(massive collapse) شرط نہیں کہ زنم کہ فائی ہو اندر چھید کرے اور زنم سے مقابل جا نب کاشش اکوف ہوسکتا ہے۔ اس حالت کے سائھ حکن ہے صدر دمویت (hemothorax) موجو دربو بانہ ہو۔ کلی ہو طاکا حادث کی حالتوں کے ملیہ کی بعدواقع ہونا شاؤ نہیں۔ اب اسس کی وجہ یہ خیال کی جاتی ہے کہ زیادہ تر نبقہ ریو یہ قسم جہام کے درجہ پائے الہما بی حاصلات شعبی انبوبات کو مدو و کر دیتے ہیں (49) - اور اسکا بہتجہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا ہو فیزوں میں سے جذب ہو جاتی ہے اور ہو طرو نما ہوتا ہے۔

مرضى تنثر ميكح - ايب هبوطي مالت يا عدم تمدّ (atelectasis) والأشش

بنفشی پاسیاه ارغوانی رماوی رنگ کا ہوتا ہے' اور تراشنے پروہ لوجار بے ہوا' اور خشک ہوتا ہے یمنفصل حکیتیاں عام سطح سے قدرے نیچے بیٹی ہوئی نظراً تی ایں ۔ تا وقت یک بعدیں ان میں انتہاب رونمانہ ہوگیا بواسے روسے منتفخ کرسے پر یہ عبر بھیلائی عاسکتی ہیں۔

علامات - بيدائشي عدم تمد ر (congenital atelectasis) مي تجيب

کہ ورُاور کہ و بیش کبو و ہو تاہے اور کسس کی مانس تیزار کہ بھلی اور رونا کمہ وری کے اور کا کمہ وری کے ساتھ سینہ کا زیریں حصد اندر کمپنے جاتا ہے اور بین المان کا نیزیں حصد اندر کمپنے جاتا ہے اور بین الاصلاع نضایس اندروب جاتی ہیں۔ امتحان کرنے پرمکن ہے کہ قاعد بین الاصلاع نضایس اندروب جاتی ہیں۔ امتحان کرنے پرمکن کی موردی کمی اور کبھی کھیے گفطات (râles) نظاہر ہوں کہ بین ماصطبیعی المان المان کا بروط شانوی المارت اعموات تعمی کی کردوری (feebleness) ہے۔ شعبی النہا ب کا بروط شانوی اندان کی فروس کی تد و لوگ

اِتنا کا فی وسیع ہوتاہے کہ ہمت اع سے ظاہر ہموجائے اور اکس کی توزیع لخت کی اور منتشر ہوئی ہے۔

جب بمبوط زیا وہ وسیع اور کمیا نیت کے ساتھ ہوتا ہے توطبیع امارات سے آس کے مختلف ور مبات سنت اخت کے ماسکتے ہیں یشش کے عارضی عدم استال سے ہو ابتدائی ذات الجنب کی وجہ سے ہو کیا طوبل ظہری افت و گی استال سے جو ابتدائی ذات الجنب کی وجہ سے ہو کیا طوبل ظہری افت و گی (dorsal decubitus) سے ہو قاعدوں پر ایک نہا یت خفیف درج کا بموط پیدا

ہوسکتا ہے ۔ مشکن کے ماؤف رقبہ پر استماع کرنے سے منوت بنفس بنیا بہت کمزور ہوتی ہے۔ اگر مریض گہری سائن لیتا ہے توزیا وہ بلیٹ حویصلی خسسر پر

(vesicular murmur) اور آسس کے اختتام پر باریک کمت کاست fine) (crepitations) ہوتے ہیں جوان ہوائی و اصلاکے تازہ بھیلنے کیوجہ سے ہوتے ہیں جرمنوزم بوطامی۔

(crepitations ہوتے ہیں جوان ہوائی ہو تصلاکے تازہ بھیلنے کیوجہ سے ہوتے ہیں جو بنوزم ببوطامح۔ شعبی تسد دیکے باعث و اقع ہوئے و اِلے ہبوط کے طبیبی اِمارات ایمی ہای

بو بي مال غيره سي بي كا و بوع كى مالت بن ابتدائ إدات يه بوسكة بن - مهيت بو بي مال غيره سي بي او من كالت بن ابتدائ إدات يه بوسكة بن - مهيت (dulness) ممثل بواكم ارتعاش اوريا توكم موئ يا خيف طور يرشيى اصوات نف

كال بهوط كى حالت من طبيعي المارات حب بل بوت بين . _ كال اسميت absolute)

(dulness) امواتِ بَنفس اولمُسَى ارتعاشَ كَي غير مُوجِود كَي -

اس کی بروط (retraction) کیم او یا مائ اسمیت موجود موتی در الرسینه کی بارکشیدگی (retraction) کیم او یا یا مائ اسمیت موجود موتی در اور الرسینه کی با در السینه کی با در السینه از تعامض فیر موجود بو کسیکن تی یا فته امیا بتول مین مکن ہے کہ بجائے اس کے بلند شبی تعنی اور بڑھا ہوا المسی یا فتہ امیا بتول میں مکن ہے کہ بجائے اس کے بلند شبی تعنی اور بڑھا ہوا ہوا ہوں میں الدر دبی بوتی المسین الدر دبی بوتی موجود ہو تو دبور تو ارسینه بازکشیده بوتی ہوتی ہے کہ طوف کو ماند بی موجود ہوتی ہے کہ دبوار سینه بازکشیده بوتی ہے کہ مکن ہے کہ موجود ہوتی ہے کہ دبوار سینه بازکشیده بوتی ہے کہ مکن ہے کہ مائی الدر کی طرف کی بیا کی طرف کمنی بود ہوتی ہے کہ دبوار سینه کی اندر کی اور فرد رکھ ما تعالی مرک میں یہ قائم رہنا ہے کہ اولی سیب دیوار سینه کی اندر کی اور فرد روموسیت کی میں یہ قائم رہنا ہے گواند کی ایک معد کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کہ بیا کہ میں اور بر سینہ کے بعد کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کہ میں اور بر سینہ کے بعد کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کہ دیوار بر سینہ کے اندر کی وجہ ہے یہ اما بیل کے بعد کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کی بیوط آس ہے دیا اس بیل کے بعد کی بیوط آس سے زیا وہ عام ہے خوا کی بیوط آس سے زیا دہ عام ہی خوا تو بیا تو

علامات يدمين : _ بَهُرُ لَكِن مِب مربعن آرام كى طالت بي جو تويو

نتفیف ہوتا ہے' زراقی' اور نبض اوقات در د۔

عال جے آئی معد کا رہن وائی آگا ٹیڈ کے یا سے کو نور انہیں کے طور پر استعال کیا تی ہے کئی ہم وط کے لئے صبح علاج ہے اور نور المیدہ کا عدم تمد دہیں اس سے عدہ نتائج ماصل ہوتے ہیں گو کہ ساتھ جی صنوعی تنفس کا کوئی نہ کوئی طریقہ بھی ضروری ہوتا ہے (49) ۔ ایکنٹ اور ڈیٹھ نے سفارش کی ہراو کوئی نہ کوئی طریقہ اور پر (expectorant medicines) پڑا سبتم آبو ڈائد کے ہماو دینی جائیس نیز بید کہ حتی الامکان تمام کی بند تنوں (abdominal bandages) کوئی منٹ کے سے کال کو نو میدا کو دینا جا ہے ' اور یہ کہ مریض کو ہر گھنٹہ ہیں یا بخی منٹ کے سے کال کو تو میدا کی ہون کال سیم مریض کو ہر گھنٹہ ہیں یا بخی منٹ کے سے کال شہبتی ماعی طرز کی ہون کالی فریس کی طرز کی ہون کالی سیم تا موجود کی ہون کالی سیم تا موجود کی تون کی ہون کالی سیم تا موجود کی ترفیب و بنی جا ہے ۔ شبی تند دکو شعبہ بینی کے ذر بید وود کیا جا سکتا ہے۔

، اذیمائے ش

(OEDEMA OF THE LUNGS)

پیداگر دیتی ہیں۔ مرضی تشریح ۔ اُو بیاسے او ف شدہ شش مجر دار (bulky) 'اور مبا ہو، ہے 'اور جب اُس میں شکاف دیا جائے تو اس میں سے کسی قدر خون کے رنگ کے جھاگ دارمسل مستال کا ارتشاح بڑی مقداِر میں ہوتا ہے۔

علامات مکن ہے کہ سینہ ابتدار گلی ہو کیکن بعد میں وہ سیجھے فاعدوں کے مقام پر قرعی واز کی کیتقدر تخفیف (impairment) ظامر کر اہے۔ پہاں اموات نفس کمی کے ساتھ (deficient) ہوتے ہیں اور صرف باریا اور اوسط در جرکے وافر کفطات سنائی دیتے ہیں ۔ ماومتم (حاد اعتصاصی اور اوسط در جرکے وافر کفطات سنائی دیتے ہیں ۔ ماومتم (حاد اعتصاصی اُذیما اُخیا اُنتہا کہ اُنتہا کہ کا فط میکا نہ ہوا تا ہے جوکہ کمن ہے ایک محافظ میکا نہ ہو۔ تنفس یا کھٹ کمو ایسٹ دارنفس طاری ہوجا تا ہے جوکہ کمن ہے ایک محافظ میکا نہ ہو۔ تنبی تی کھوٹے ہو بانے ہیں کہو کہ وبائے میں کہو کہ وبائے ہیں کہو کہ وبائے کی کو کہ وبائے کہ وبائے کہ وبائے ہیں کہو کہ وبائے کہو کہ وبائے کو کہو کہ کہو کہ وبیاتی کی کو کو کہ وبائے کہ وبائے کو کھوٹے کو کہ وبائے کہو کہ وبائے کی کو کو کھوٹے کو کہوئے کو کہ کو کہ وبائے کہ کو کہ کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کہ کو کھوٹے کی کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کہ کو کھوٹے کہ کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے کہوٹے کے کہ کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے کہ کو کھوٹے کو کھوٹے کی کو کھوٹے کے کھوٹے کو کھوٹے کے کھوٹے کو کھوٹے کے کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے کھوٹے کو ک

م ہو جائے ہے ا ذبیا کی تکوین کو مد دملتی ہے۔ کس کے نطا ف منتبض شدہ شعیبات كى مراحمت كى خلاف اطالت بذير زفيرات كا وقوع (دبوي س asthmatic breathing) شنول میں وبا وال کو برصا تا ہے ۔ جنا نجہ اس اصول سے علاج میں فائده اعمالياط أسبعه و مُرعلا ان يربين سبع بيني دم كُعيني كا احاسُ كم وميش را قُ يَهُويْ أورسرييه نبضُ اوربيه زَبِك إخون الودهيألُدارة بي بال كي ببت بري تعلا و الكانفث. مِلْمِن ہے کہ بہ حالت ِطِلد ہلاکت بیدا کروے' اِچندگھنٹوں میں مض **بوحائے۔ لیکن** فكن هيه كد حندروز كزرين كأكوئي نغت نه مؤ اور في المحقيقة بعض سريع بهلا ا**صابُوں میں تُر**نفٹ بالکل نہیں ہوتا ۔ ذات الریہ کے آخری اُ ذیما بین تو انٹس ماریے شش پر جواب کر تندر تبت تھا کُنطات (râles) منائی دیتے ہیں۔ جالی حجربی شہادت سے بیمعلوم ہواہے کہ معراشخاص میں عور ات کے وقت سانس جھولنے كَمُصَكِي أِ دوري يُهرِو اقع بلو ماہي (حوالہ الله خطر بو) بعض او قات اس كي موجاد ريوي ا ذما ہوتاہے (49)۔

سے متفرق کرنا چاہئے ، کرمیں میں دروشدت سے ہوتا ہے ۔ اس کور یوی سلویت (pulmonary embolism) سے بی متفرق کرنا بیا ہے ، حس میں نفت بعدمیں

موتاب، ورنفث میں زیارہ فون یا یا جاتا ہے۔ علاج ۔ اگر من ورانی اصل رکھنا ہو تو لیٹش (Plesch) کے تبائے ہوئے الدسے کام لینا جا ہے۔ امول یہ ہے کہ مشتول کے اندر کی طرف ایک ا پیا مبت و اِ وُوْ الا جائے کہ وائیں بطین کی بیش فعالبیت رک حائے ۔ رموا اک موطر شکھے کے ذریعہ ایک حیت بیٹھنے والے تعاب میں بہنیانی ماتی ہے اور یہ ایک مزاحمت میں سے ہوکر بیرونی ہواکی طرف کل جاتی ہے (49) مصنیف بِذِ ا آبِ ایک الیکٹر ولکس (electrolux) منطق استعمال کر تاہیے میں میں نعاب ب حیکا ہوا ایک آبی واب ہا (water manometer) ہوتا ہے تو کہ وہاؤ ظا مركر تا كاورداول في كي بين يا جار اليمي بو اجابيم - أكسجن كينيم سي مي

1

زمایت محیرکن عمده تنایج حامل موئے ہیں۔ نہایت ہی حاد اصل متوں بی فصد (venesection) آزانی جائے ۔

ذات الرب<u>ي</u>

(pneumonia)

تنعى أنوبات كالتهاب كجيرتكس جرم شش كحالتهاب كوذات الريه لیتے ہیں۔ جب یوایک حاد مرض کی شکل میں ہُوتولیہوائی حریملات کے اندالہمائی حاصلات کا ارتشاح (exudation) بیداکر کے تجد (consolidation) بیداکرد تنا ے اور برالتها بی حاصلات دوران شغایا بی بر عمو مآجدب موجاتے رمیں۔ جب يه مرمن شكل من بوتو به زمنكي ما فت كوايك كشيف ليغي با فت ميں برل ديتا ہے' اور یہ تبدلی شکل متنفل ہوتی ہے۔ ما دوات الرید کی دو تمثیلی متب خصاف زىل كے ذريعہ سے ايك دوسرے سے تيز كى جاسكتى ہيں: __لختى ذات الم (lobar pneumonia) سرعمر میں ہوتا ہے کیکن بالغوں میں زیاوہ اکٹر ہوتا ہے ' یشش کے بڑے مصول کوایک ہی وقت میں مانوٹ کرتا ہے، اور ایک نوع کاری مرض کے تمام خصائص رکھتا ہے ' جنا مخبر اسس کی مدت محدود ' شفایا بی سریع' اور بعض ادّ قات میسلاوُ و با تی صورت میں ہوتا ہے۔ شعبی ذات الرہیا (broncho-pneumonia) خاص كرشيرخوارون بيجون ادر بور صول كومتائش كر تاب، مشمش كے منعد و تھيو فے جيو سے رقبوں برحمه اور ہوتا ہے اور اس كا مُمَّ اور طریقهائے آغاز واختنام نسبتهٔ بهت کم متعتین ہونے ہیں۔ تر بته 'خرگوشول (rabbits) میں ایک بڑے شعبہ کے اندر مختلف فیم تعبیت کے (مشمول کا نفخ میں ایک بڑے شعبہ کے اندر مختلف فیم تعبیت کے (مشمول کا روس میں کا کمشتوں کا نفخ (insufflation) کر سے سے ذاکت الربیہ کا مرض بیداکر لیا گیاہے جب تنبیت کم بوتی سے تو نبقات رکو برایسے جوفیزی نظامات (alveolar systems) میں طور جوجاتے یا کمپنج اتے ہیں جو بڑے شعبات کی دیوا روں میں سے براہ رامت

با سر بیلتے ہیں؛ ا در تنبی ذات الریهٔ اور اسس کے ماتھ جوفیزی درو ل طمی خلیول کا تکا تر (proliferation) بدا مویا آب -جب فتیت زیاده بوتویه نبات برسر عت زیا وہ ہو کر سنس کی افت کے اندر سیل ماتے اور لفتکی دات الربع (lobular pneumonia) بيداكر دسيني بي أور اگرتشيت اور زياده موتولختي زات الربه (lobar pneumonia) بیت داکریتے ہیں جس کے ساتھ ایک كَثِيرُ الْاشْتِكَالَ نُواتَى تَعَا لِ (polymorphonuclear reaction) اوربعنس وقات ایک مبلک البتاب عروق لمفائید (lymphangitus) رونما ہوتا ہے۔ ایک متا د حد سے زیا وہ بڑی ہو تو مکن ہے کہ نبقات لیمورا ٹی سطح میں سے آریار گذر کر تعميل جائيس اور ذات الجنب بالانصباب (pleurisy with effusion) اوارتها ما د مور (pericarditis) پیدا کرویں پیشندید ترین تمثیبیت ہو تو ایک سرینع مِهلک عِفونیّة الدموی (septicæmic) حمله واقع بوحا ماہے جب کر مجیسے مست صرف ایک میکتی و ارمصلی ارتشاح اور مُتَعَشِّر (desquamating) جوفیزی خکیات ا ورخمیویے میمویے نز فات کم بلاکسی کثیرالاشکال نواتی تعامل کے ظاہر کرتے تبل اور بہ مناظرہ بیسے ہی ہوتے ہیں جو مدارسٹ میں نہایت مبلک ہِ با وُں میں مثاب^ہ میں آتے ہیں۔ ابتدائی دمیاتین دنوں میں آکٹ مثبت دموی کاشنیں positive) (blood cultures عاصل موتى مي ليكن بعدين نهيس موتيس - اوريه يا يا كيا ہے کہ نبقات سیر برجسے ات کے اندر ہوتے ہیں 'اور مرف مہلک عفونۃ الدم کی حالنوں میں ازاد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ طا ہر ہوتا ہے کہ کسی نوعی بخار مسٹلاً وما غی ننماعی بخا (cerebrospinal fever) یا تب محرقد کی ۱ بتدا سی متبت موی کا شت کا موجود ہونا بیٹما بت نہیں کرتا کہ یہ ور سرا بیّت او لی طور برخون او blood) (born ہے۔ اسس سے عرف بہی مراو ہوسکتی ہے کہ اسس ابتدا ئی زما نہیں جبکہ براشیم ایک فاص مرکز مرض (focus) میں برسرعت تکانٹر کرد ہے ہیں 'خلیات آ کا آواد ہوکر جوئے خون کے اند کل آئے ہیں اور انتقالی مراکز metastatic) (foci) 'سيسي كريم كلا بي مبرّل ("rose-spote") كم متعلق مرفّ يهرب كه بير و و مقامات بمن جبال بيرووراني خليات آكل (circulating phagocytes) گرفتاك

المنعى ركوى) (lobar pneumonia) (المعقى ركوى)

کرویی دات المنے : مرض و و نوس بسوں میں ہوتا ہے ' لیکن و توں منسوں کے در سیان جو فرق ہو ، فہا یت نوع اور معراشخاص کی گرتین ہوتا ہے ۔ نیز پرشیز و اری سے لے کر بڑھا ہے تاکہ زندگی کے تمام زیا نول تیں و کھیا جا تا ہے ' لیکن الفول میں دھیر کو سیک زیا وہ کئیرالوقوع ہو تا ہے ۔ بہ گرا اور فصل نیزاں کی نسبت سرا اور فصل برا رہیں بہت زیا وہ اکثر و کھیا جا تا ہے' جبکہ تیس میں ٹاگہا نی تفیرات موسیق ہوتے دستے ہیں ، جبکہ ہو ایس مشرقی یا شال مشرقی ہوتی ہیں ' یا جب کرمو میں مرطوب! سر د ہو تا ہے ۔ عاوات اور میستے جو کمشف (exposure) کامر قدیدا کرتے تیں ۔ فرات الرب کی استعدا و بدا کر دیتے ہیں ۔ بے اعتدا لی کی عادین (کرت شراب فرات کو بہت فرات اور سے میں اور سی کی استعدا و بدا کر دیتے ہیں ۔ بے اعتدا لی کی عادین کر کرت شراب فرات کو بہت فرات کو بہت فرات کو بہت فرات کو بہت میں ویٹی ہیں کرتا ' ملکہ پہل ک

کنتے ہیں کہ ذات الربہ ایک ہی مرین بیندرہ یا بنیں بار ہواہے ' تا ہم دو مملوں سے زیادہ نہابیت غیر معمولی ہیں۔

کی چارشیں تبتے بیان ہو مکی ہیں (ملاخطہ ہوسفو 66) ۔
مرضی تشت کے ۔ نبقی ریری ذات الر بیمیں اوف شدہ شک کا کچھ عصد متبدل ہو کر اس کی استجی سے ۔ عصد متبدل ہو کر اس کی استجی سے احت ایک عقوس تو وہ بن جانی ہے ۔ ابتدائی ترین یا بہلے درجہ میں جو کہ احتلا یا احتقان کا ہوتا ہے استی سے اس میں بھاری اور سرخی مائل بھو رہے ریگ کا ہوجا تا ہے اُسے دیا ہے اُس میں سے ایک جماگ وار سرخی مالی مقرشے ہوتا ہے 'اور ششن اس سے زیاد ہ آسانی سے تندر ستی میں ٹوٹنا ہے یوق شخریہ آسانی سے تندر ستی میں ٹوٹنا ہے یوق شخریہ اسانی سے تندر ستی میں ٹوٹنا ہے یوق شخریہ

نون سے متمد و ہونے کی وجہ سے تسع اور پیجال (tortuous) ہوتے ہیں' اور

15:

یں نزفات موجو دہوں ۔ دوسرے درجہ میں ہے یا به ہونے کی و مبرسے سرخ تکتیک (red hepatisation) کا درم مش کھیکے سُرخ رنگ کا' تر ایشنے پر ہاریک طور پر ذیّہ اتی: ہانکا ہے ہوا ، بو البياور ما في من ووب جاماً ليكن أنكلي يه وباسع براساني سے ہے۔ جوفیزے پاریک ذراتی توروں میں علیجارہ کئے جا سکتے ہیں' اور اُن کے اندر فائبر مین (fibrin) اور خوان کے کچھ شرخ جسیات اور سید نلایت نظراً تے ہیں۔ در اصل مبوایہ ہے کہ عروق شعریہ میں سے مترشے ہونیوالے سال سے جوفهزی دیو ارمی شفدرمتیدو موگئی بین که در و اسلی خلیات نوٹ کے میں ادر موانی فضاً میں سیال سے بھر بور ہوگئی میں اور سیال عم گیاہے (42)-نیبه اور جربھی سبو سرما دی ملکنگ (grey hepatisation) با ہے اینے ملوسس بن (solidity) کی وجہ سے ممیز بوتا ہے الیکن اسس میں رنگ را وی مائل زرویا ما و**ی ہوناہے' اور انسس من سطح اس کی تنبت کم**رور آتی ہوتی ۔ کہ ختنی ورجُ سرخ میں ہوتی ہے ۔ خررہ بین سے و تجھنے ہر یہ درجہ ہ خرال کر درجہ سے مس انتقال رکھنا ہے کہ ہوائی خلیے اور جوفیزی دبواریں سیدخلیات سے بٹی ہوئی رموتی رہن لیکن فا نبرینی ارتشاح (exudation) اور منے جتیا ہے بهت کی مقدار میں ہونے ہیں۔ رنگ کامتغیر ہونا جوفیز وں میں سبید طلیات کی موجود گی اکی طرف منبوب کیآجا تا ہے۔ ایک جو تھا درجہ تھی جور بھی در دین ش (purulent infiltration) کا موسا ہے' بیان کیا جاتا ہے ۔ نیکن میمض رماوی بانتمائی حالت ہے ۔ اس س عنش نستهٔ زیادہ نرم اورزروی ہُل ، کا ہوجا تا ہے' اور اُسے کھر ہے یا دیائے سے اُس س ایک زرد یال تکلتاً ہے۔ یہ سال ہو آئی خلبات میں بھری ہوئی در ر برشش کے سے بناہے' اور کس میں سپید جبیات متعمی اور ذراتی ہو دباتے ہیں لیکن نَيْتِي خَصُواْ جِي ْ جِوْمَثْيِلِي طَا دِ ذِ ٱلتَّ الريدِ كَا نَيْتُو. مِنْ بَهَا يت مِسْا ذِ بُوْ نَاجِهُ -يبمشكوك بهم كوشفاياب بهوجائ والى اصابتون بس ريى در ريزش كه درحبر كى نوبت أتى ب يابني - يرسيج ب كه نتفايا بي يا الخلال (resolution)

کے ماتھ بعض اوقات ایسے طبیعی الماراست (نہے کہ راجعہ=redux crepitation) بائے ماتے ہیں جو ظا سر کرتے ہیں کہ ار تضاح نرم ہو کرمسیال بن رہا ہے۔لیکن بہت ہے مریض بلا البے کسی مظہر کے اچھے ہو ماتے ہیں ا اوراً ن میں اتنا کم نفث ہوتا ہے کہ اُن کے ارتشاح کے غانس ہوجائے کی تو چمہ صرف یہ ہوسکتی ہے کہ وہ عروق لمفائیہ سے براہ راست عندب مہو گیا ہے۔ صرف چندہی اسا بتوں میں بساق کی مقدار بڑی ہوتی ہے۔ رہے اُصا بَتُوں کی ایک بہرت بڑی تعدا دایسی ہوتی ہے کہ بن میں جرم کے التمال کے ماتحہ ما و و ات الجنب (acute pleurisy) بھی موجو و ہو تا ہے' اور اس دوگو ناخر کو د ات المجنبی د ات الرمیه (pleuro-pneumonia) كهيسكتوريب - نيكن ميه نام عام طور برنهيس استعال كيا عان الله أن انعابتو ل کے لئے کہ بن بن وات الجنب سریر یا تی لحاظ سے ایک نمایاں مظہر مو۔ تعین المقام (localisation) . نبغی رایوی دات الریه تضریباً ہمین جز ئی ہوتاہے' اور رہس کے نسبت زیا دہ اکٹ^ہ قاعدے کو' اور ہا^ئیں شش کی نسبت کسی قدرزیا ده اکثر د ا' بربهشش کوما وُ ف کَرَ تاہیم۔ لا شعاعی امنحیان بالعموم تغيريذ يرجباً من كا أيك فانه نما تسايه ظاهر كِرتاب (صحفه نمبر لأب ج) اور کول کی عورت میں یہ مدت سے تعلیم کیا گیا ہے (33)- گاہے یہ سایہ دیوارصدرکے متوازی تحیط میں ایک بندگی صورت اختیار کر تاہے ۔ ممکن ہے بغر کے طبیعی امارت کے در ریزسٹس موجود ہو۔ سایہ مبض او فات فوق مدل^ق (epituberculosis) کی مشابهت اختیار کرتا ہیئ لیکن نسبتهٔ زیادہ سرعت کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے یعض او قات دو نوں کشش او ف ہوجاتے ہیں ا مگن مرض عمواً ایک شش میں دومرے سے پہلے شروع ہو تاہے۔ علامات اورطبيع المارات - بهدلاكر مجر - إلغ اصابول كي ایک بری تعدا و میں مرض کی تبلی واضح المارت یہ ہے کدایک تشعریرہ (rigor) یا ارزه بوتا ہے (۶۹۳) تمیش ۲-اُ ۳۰۱٬ ایم ۱۰ درجه تک پیراص جاتی ہے' اور نہات اے قرسین مح اندرورج کردہ اردوا عداو طاہر کرتے ہیں کہ فوجی میا بموں کی تحق ذات الریکی



بختی ذات الربیمی قانه نما در بیش اوراس کا ندیجی انحلال (الف) و جولان سیستا الله می داند می داند می داند می کامریض تنحا - (شعاع دب) سا اجولائی سیستا الله که بید داند می کامریض تنحا - (شعاع کاشین مسرله ند سیسک کی بنائی مونی بیس)

المفال صور ۱۱۱

نمایاں ارتفاع مرارت (pyrexia) برتا ہے جس کے ساتھ کسلمندی (malaise) عدم استها استی (۱۳۷) فردارز بان اور بعض استون سیلیون ر تمله (herpes) کا ایک توران(eruption) ہوتا ہے (۔۱۷) جرابک اجھی امازت سمجھی جاتی ہے۔ بحول میں اکثر تشنیات (convulsions) میوجاتے رمی کملیکن قشعریرا ست مِن مِكُنَ سِيمَ كَه علامات البَدارٌ مبهم سے بول اورستا پران كے) بر الششر كى ار فيت ميكولي بوك سائن (shortness of breath) سے ظاہر ہوا ور ہولو من منشد ہدورو (۴۰) موہ جرفہ ات الجنب سے منبو پر ہوسکتا ہے۔اسٹ اتندا ئی زما نہ ہیں مکن ہے کہ استعاع سے کو ئی چیزشنا خت میکن بعض اوقات ایک باریک خت ک سکتکه (crepitation) سنایی و تیا ہے حس کا مقا بله اس آواز ہے کیا گیا ہے جو کا ن کے قریب بالوں کی ایب لٹ کو اٹھی اور انگو سے کے ورمیان ملنے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ کہتکہ بمشہ ایک گہری سانس کے اختیام پڑ لیکن بھن اوقات سارے دورا نِسہیق یں ساتی دم ہے' اور کسس کی 'وَ جب ہر کی حاتی ہے کہ یہ جوفنروں کی د**یواروں کےعلیٰ 'مونے** بیدا ہوتا ہے' جو غیرقدرتی طور پر جِبِ کنی (adhesive) ہوجاتی ہیں۔ اس سے باتدایک غرطیعی مورت حالات کی ایتدا کسس طرح رموتی ہے کہ اس بہ بُرج بَعدیں درجہُ دویم تبعینے تجد کے اِما بات طاہر کرتا ہے' حریصا ہز رکی نما یا عدم موجر و کی واقع موطاتی ہے۔ قرعی اواز (percussion note) اب بھی ار میدل امنمول کی تنبت صرف کسی قدر کم مگی ہوتی ہے ۔ دوسری اصابتوں میں قرع پر ایک طبلی آ واز حاصل ہوتی ہے۔ سکس کے ظہور کا امکا ن آمل وقت ہوتا ہے جب کمہ ذات الرہی عمل انبداءٌ مرکزی ہو' جس کمے نیتی کے طور پرگر و و میشیں کے مشتش کا ارتخا و(relaxation) ہوجا آ۔ یع بعنے وہ ڈیعیلا بڑ جاتا ہے

⁽ بقید طائی منو گذشته) مره ه اصابتول می جو کر مواوی منافی می بنام کدرش (Aldershot) رونها بوئین کتنی فی صدی میں بدیمانات واقع بوئیس (25) -

(جىيە كەسكوۋيا ئى گىگ مىں) ـ

۔۔ے کہ تفریباً تمام امها بتوں پی اُس ہیں وجہ سے ہوئی ہے کہ پیٹور اکے اندرستیال کی ایک تیلی نہ موجود ہونی۔ (26) ۔ طبیعی آبارات کی منویا ہی کے دوران ہیں مریض لاز ما اپنے ابتر پر بزار ہوتا ہے 'کیکن اُسے اکثر انتصابی تنفس (orthopacea) ہوتا ہے۔ اُس کیے گال اور مِیٹانی مُرخ تمتالیے ہوئے (flushed) ہوتے ہیں۔ اُس کی اُ بکیس حکیے لگ ہن اور ظام کر تی ہیں کہ اسس کو تکلیف کا متین اسٹسس ہے۔ اس کی سائنس تبز ہُونی ہے' اور ککن ہے کہ تنفس فی منٹ ، ہم' ۔ ہے' ، یا بلکہ ، ہیںک بڑھ جائے' نبض تیز ہوجاتی ہے لیکن فس کے نماسب سے نہیں۔ حکن سے کہ وہ ١٠١٠ما ۱۶۰ ما نمس سته کمینقدر زیا وه جو - ال طرح نبض وسمنس کی منعبت معمولی مو و ۴۰ إِم وَ اللهِ بِمِلَ كُرْمِ: الْمَانِ الْمُوطِ تِي ہے تمیش عمواً ایک بلندلیول موا ور جبر فام رہنی ہے اور اس میں کم تغیر ہوا ہے۔ اور ملیدخشاک ہوتی ہے اور اسٹ بر رکھے ہوئے کا تھ کو جہمتی موٹی گرمی (pungent, heat) کا احال ط الدّم (blood pressure) عموماً معمول كي تنبيت يتمورُّه المربوّا بحنه کھامنی جو ہمیشہ تو نہیں لیکن علی العموم موجود ہو تی ہے 'زیادہ بار بار نہیں ہوئی' اور و دسخت ' خشک (hard and dry) اور اکثر دردیکے ساتھ ہونی ہے۔ اور بُساق جولزج اورزنگ الوو(rusty) موتا ہے کم تعت ا ہر علی -ہے-ائر میر ایورمیس کا جا وُ بن جاتا ہے۔ اس میں کلورائڈز (chlorides) ہبت ک ہو جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ غیرموجو د ہوں' اور البئیومن کی تقوڑ ی مقدارا کا ا د قات موجود ہوتی ہی ۔عموماً سبب حب یا ت کی کثر ن (leucocytosis) گشرالاشکا نوا تی خلیوں کی زیاوتی کے ہمراہ بائی جاتی ہے' جو َمشد پلاصابتوں میں طول عرصہ تک باقی رہتی ہے۔ مریض کو بذیان ہوجا تا ہے (س) کالخصوص را تت کے وقت کبوری (lividity) یا زراق ایک نمایا ن مظهر موتا ہے۔ ایسی اسابتول میں بیابالکیا ہے کہ آکیجن سے شریانی خون کی سیرٹ کی کم ہوجاتی ہے 'اور وه بجائے د 4 فی صدی کے جو معمولی ہے، مفیصدی موتیٰ ہے (Stadie)-

مریفی کی عام حالت چند روزیک ویسی بی رہتی ہے 'یا ذیادہ کرت کے ساتھ علایات کی شدک میں زیا دتی ہوجاتی ہے۔ نبض ونفس بیز تر ہوجائے ہیں ، نیش بلند قائم رہتی ہے 'زیان زیادہ خشک اور زیادہ مجوری ہوجاتی ہے ' اور رات کا ہذیان زیا دہ قطبی ہوتا ہے۔ یہ مثاہرہ ہوتا ہے کہ طبیبی ایارات محوا روز ہروز منفیر ہوتے جائے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شجدی می بیس ایا ہے' چنا کچہ تکت کہ (crepitation) اور شعبی نفس سینہ پر لمبند سے لمند تر تھیلئے جائے ہیں' بہاں تک کرس (apex) کو ف ہوجائیں۔

(bubbling) نظات پوتے ہیں ہوارتشاح کے دھیلاٹرینے اور اُنہویات میں

آجائے کی وجہ سے ہوتے ہیں کیشنش ہیں یہ تغیر ہونے کے ماتھ ماتھ بساق بھی متغیر ہوجا ہاہے' اُس کی ممیز مجلک (tinge) جاتی رہتی ہے اور وہ زر دیا سبز' مخاطی رہی' اور کم ازج ہوجاتا ہے۔

متمرا ول کا ذات الریه جوکه . مع فی صدی اسا ن**بو**ں کے لیے ذمہ دارہے *ک* خاص كرنوجوان بالغول من بالغروم عوف مبتنه ملامات ببيشس أزاب حوكه بحرن ب ختم ہوتی میں ۔قسم دوم میں علامات زیادہ شدید ہوتی ہیں اور بیا او قاست بحوان ما لکل نہیں ہو تا آلیم موم خصوصیت کے ساتھ معمرا فراد برحمہ آور ہونے کا ا مکان رکھتی ہے۔ قبر جارم ہر عمریس ہوتی ہے ۔ بہلک اصابتوں ہیں موست فٹر رالقلب (farlure of the heart) سے یا اس شکش کے اور ما سے کہ جو اب کک غیراؤف تھا' یا رونوں کے مجموی طور پر ہونے سے واقع ہویی ۔ م علامات زیا ده هوجاتے ہیں: معینے تنفسات تو انزیں بڑھ حاتے ہیں نبض تخ صغیر اور سعیف ہر، جاتی ہے۔ چہرہ کبودیا ازرق ہوجاتا ہے۔ داہیں طبین کے ا تبابع کے طبیعی امارات مشاہرہ میں ہم سکتے ہیں۔ زبان خشک مجبوری اور متعوق (cracked) ہو تی ہے۔بذیان کم وسمشملسل ہو تاہے اور شرابط (muttering) اور تو ما (coma) تبدر بج طار دی جو حاتے ہیں۔ اِست ماع کر خدیر لمِنْد (loud) مولے (coarse) لغطات سینه کی **دو**نوں جا نبوں برمنائی ویے مِں ۔ جوں جوں مریض زیا وہ کمز ور ہوتا جا آہے تیش گرتی جا تی ہے' جارسرو برطاتی اور کیسیندے شرابور ہومائی ہے۔موت عموماً بیاری کی انتها کے زمانہ میں پانچیں اور دمویں دنوں کے درمیان واقع ہوجاتی ہے ۔ لبکن ذائنہ الریہ لبھی مو یا تین دِنوں میں اینامہلک مُمزختم کرد تیا ہے۔

ہیں ہوتا ' بیکن اگر بخار تیسرے ہفتے تک قائم رہے اور اس کے ساتھ قرعی التي اصم بهو' اورشعبي نفس كي آ وازين غائب بالمتغير ہوگئي ہوں تو اس كاشبہ رناحاً ہے ہے ۔ شاؤاصا بتوں میں وات الریہ کے دوران میں ہوا بی خلیات کے ف لینورانی کی طرف متقوق مورات سے است واح الصدر (pneumothorax) بیدا ہوجا اے۔ بابی مانب کے تقیم الصدر کے ساتھ اکثر اوقات التھا م تَآءِ مور (pericarditis) (٢) لِيَامَا بَ النَّهَا بُ اعصابِ تَعَيفُهِ (peripheral neuritis) التهاب كرري (nephritis) ومن التهاب باس بطون (peritonitis) "تقبيح التهاشي التهايا (suppurative meningitis) (۱) اورالتها مضصل (arthritis) (a و ·) شاؤنریقی ربوی سیجیب گیوں میں سے بس مث و اصابتوں ب ایک حقیقی دنوی تقبیح اللهم pyamia) بین ایستان الله ایک متبیع الله ایک متبیع الله به بین البیاب مناسل suppurative بیدا برگیا ب میاسی متبیع البیاب مناسل pyamia) (pustules) اور قا کات (pustules) اورطد کے نیچے کیو ڑے ہوئے میں اور انسیں سے کاڑھی سنری اُ مل بیب ممکنی ہے جس میں نبقات رایو یہ نمالص کا تشت میں موسم و مون بير من من التهاب دفرن قلبه (malignant endocarditis) (۷۷ و .) (خاص کراً ورطی مصراع کا) وات الربیر کے ہمراہ دیجھا گیاہے 'جو اس کے نومی مفنویوں کی وجرسے بیدا ہوجا آ ہے قلیل انتعدا داصا بتوں بی منسایاں مير في ان (Jaundice) (مورا) رمونا من ما يك ملكي برقا في حملك زيا ووعام موتي زية بعض اوقات ووران مون بي معدل مے كاحب دا تساع acute dilatation (of the stomuch واقع بوطاً سرم اورشديد اصابتون بي التهاب نكفيه، (parotitis) بردا ہو سکتا ہے۔ مزمن ذات الربی (parotitis) كَنْكُرِينِ (gangrene) اورخراج سَنْق (gangrene) اورتملَّد

الشعب(bronchiectasis) شاؤعوا قب ہیں۔ تشخیص ۔ مثغریرہ اور تیز بخار کے ابتدائی در مات میں وات الریہ بعض افقات ووسرے حامہ امراض جیسے کہ تپ محرقہ 'قرمزیہ' یا جیجپ سے ناقابل شناخت ہو تا ہے۔اکثر سینہ کے ایک جانب پر کے دردیا تکلیف سے ظاہرہوگا

و ہیں جا د مرض موجود ہے' اور ایک متفام پراصوات منغس کی غیرموجو د کی' ما یا ریگ نظات (fine cropitations) کی موج و گئی جس کے بعد اسمیت شعبی ففس ، اور شعبی صوتیت ہو ٔ بھار ہی کی نوعیت طاہر کرویں گے ۔لیکن یہ درونہایت غلامی هی پیا رُسُنَا ہے۔ اکثر او آتا ت پیسٹکر مک جیلتا 'یا بالحصوں شکریں محموں ہو اسے ' س سے ابتداءً النهاب زائل مدو دید (appendic tis) التهاب ماریطون (peritonitis) یا التهاب مواید (cnolecystitis) کاخیال بوسکتاہے۔ ربوی تاعدول براحتباط کے ساتھ بھا ور کھنا ضروری ہے۔ تا کہ غلطی نہ ہونے باسے یہ دور مری اصابتوں میں طبیعی اِمارات کی نمو اِ بی ہتے، پہلے ایک مختصر سی کھانسٹی گئ جس کے ساتھ زبگ آلود بُاق کا نفٹ ہوتا ہے۔ مُکن ہے کلبسی اارات کے ظہور میں فی لحتیفت اپنج' ماچھ بلکہ دسس دن کی انبیر ہوجائے ' انجیس 'دیت تلائم شركرية كي ندورت بريا درو ديها ديس أن موني بأبهول من إسر بالمراب ا جسے کہ غطر الکتف کے اور ٔ ما بغل کی جیت (top of axilla) میں ۔ امراض طفعید (exanthemata) کے محفقوص وممّهٔ طغیات کی غیر موجو دگی' تنفس کی مرحت ِ جو نتفیں سے غیر تعنا سب ہوتی ہے 'شرخ تمتایا ہوا جرہ (trushed face) اور طینی مِوني الله يحدُ مَخْصُوص وممّنه نوعيت كا بُهانَ اور ورمن كُلّے رُدو بيب بنا كي موجّوني ا ب تشخیص کے لئے مقید کا ہے ہیں۔ امتحان خون سیم مدول کے سی ہے۔ ئیو کر سید خانیات کی کنزت (leucocytosis) سے نب محرفہ ملیریا اورا نفلو ُ ہزا فارج از تبحث موجا آسه - رانمخنی شعامین مجی کار آمر نمی بیبا که بیثیتر بسیان -6-66

جُبِطبِی ا اُرات نمودار ہوجائے ہیں' تو بہتعین کرنا پڑتا ہے کہ آیا ذا ندالر یہ موجو دہت اِ ذات الجعنبی انصباب (pleuritic effusion)'یا،ونوں کارا تھ ساتھ اجتماع ہے۔ اِن دو نول حالتوں کی ایک دو سرے سے تتخب ذا لیجنب (بلبورسی) کے بیان کے کت درج کی گئی ہے۔ شعبی ذات الربیہ سے تشخیص میں بعد میں غور کیا گیا ہے (الماخطہ ہوصغی 158)۔

انترار لئختی ذات الربه کی اوسط شرح اموات تقریباً مرافی سدی ب

وه چوف برون بنها بت کم موتی ہے کین عمر کی زیادتی کے ساتھ بر معتی باتی ہے۔

برا عبدالی کی عاد توں والے استخاص بی اور اُن می جنیں ناکا فی غذالمی ہو کیہ مون

زیادہ قبلک ہوتاہے۔ سریع الوقوع یا مند بدیان فتل پر بین (failing pulse)

کبودی اور زراق کی سب برسکونی کی علامات ہیں۔ فتر سوم کا نبقہ رُلویئہ جس کے ذمہ وار

ملاف ہم کوئی مصل میر نہیں میں سے تشولیت ناک اصابنوں کے لیے ذمہ وار

ہم اور مشرح اموات میں ہے کیونکہ شرح اموات اول الذکر میں ارادہ میں شرح اموات، افیصل فیصدی اور آز خرالذکر میں ۔۔ اول الذکر میں ۔۔ اور میں شرح اموات، افیصدی اور آز خرالذکر میں برادہ ہیں۔ اور است میں ہے۔ اور کی میں شرح اموات، افیصدی ہے۔ اور کی میں شرح اموات، افیصدی اور آز خرالذکر میں ہے۔ اور کی میں شرح اموات، افیصدی ہے۔ اور کی میں شرح اموات، اور کی دور ایک میں شرح اموات، اور کی دور اور کی میں شرح اموات، اور کی دور اور کی میں شرح اموات، اور کی دور اور کی دور کی میں شرح اموات، اور کی دور کی دور کی میں شرح اموات، اور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں شرح اموات، اور کی دور کی کی دور کی


علاجے ۔مریون مجبور آبستر پر طرحا ما ہے اور مبوماً اُسے مرض کی انہت مرم (in the height of the disease) سَيُون يَا خِد (bed-rest) كَيُون عَا خِد (bed-rest) كَيُون عَمْمُ المُحاكي (semi-recumbent) حالت میں مہمارا و ہے کی ضرورت لائن ہونی ہے جب مانی ا رام اور تنولیش سے مبار ہونا علاج کے اہم منا صریب سے ہے۔ غیر مروری طبی ا متمان سے بر ہنرکز ما بائے۔ مریض کو ایک اُزاد انہ ترویج رکھنے والے کرے کے اندر بدا فرا طاگرم ٹا زہ ہوا منا جا ہے ' اسی طرح مس طرح کرکسی دو ہر۔ ساری مرض مب غذا ایسی دبین جایئے نیو ایک حموی مرمن کیلئے موز در مع د ملاحظهٔ رمو صغه 21)- اس میں دودھ قدرتی طور پر ایک اہم عضر بوگا، کیکن ایڈے اورائع (coreals) ووومہ کے بڈنگ (milk-pudding) کی شکل میں کا راک کا اکث طارموا دو دمد (Horlick's malted milk) مجملي يا جوزت كا قيمه وغميسروهمي فذامي ثال كيُ عاسكة بن يه حزورى به كراس معامله بن مريف كي حوامتات کا لما ظاکیا جائے۔ نعوع کم البقر (heef-tea) کیا مکری کے گوٹشت کی شخنی (nutton broth) گریزات نودغذائیں نہیں ہیں تاہم مکن ہے کہ یہ بیندیدہ ہوں۔ ابتدائی در حول میں آنتوں کوصاً ف کر دینا جائے۔ اورالیٹیٹ با باکٹریٹ آف ایمونیم (acetate or citrate of ammonium) کاستمال کرکے طِد کے اً ز ا دا زعل میں مدودنی چاہئے ورمات ہی خوفِ ڈوور (Dover's powder) کی خشیعنہ

ں دینی جامیس ۔ آخرا لذکرو ایت^{الیمن}ی دروم سخفیف بی*دد کرے گ*ا 'کارفیون ت مقداریں (نیخر کے ۳ کا وقطرے) اگر (saline) کے ساتھ اربار ویے عاسُس مِکن ہے کہ مقامی لاَستات (local applications) 'جیسے کہ انتفاظ مینی (antiphlogistin) برف كي متيلي ياكوني يوليس وروس تخنيف كروس -اصابتوں (mild cases) یں بہی کافی ہوسکتا ہے الیکن سند متراصابتون ا ندیان اورترقی پذیرا نبطاح (prostration) کا تدارک بمی ضروری بوگا . او [الذّ تنکے لئے کلوزل (chloral) بکلوزل اما کٹر (chloralamide) اور موٹما سیتم برو ماکٹر (potassium bromide) کا استیمال کیا ماسکتا ہے کیکن جب ہر (spotassium bromide) زه ده بو توکلو زل کو احتیاط کے ساتھ دینا چا سے کیو کمہ وہ تعلب اُوزننس بِطانعن (depressing) انرر کمتاہے۔ اِسی سب کی وج سے آخری ورجوں میں مار فر (morphia) کا استعال کی کے ساتھ کرنا جا ہے۔ بنیوسین کا نگر و برو انگر (hyoscine hydrobromide) (بَالْمُ رَمِّن) كَا يَحْتُ الْجَلِدِي اشْرابِ اكْرْمَغْيِدِ اورنبنة خالى ازخطر بوتابي برصفي بوئ فتل كسيليكي ويجمال اكثر وباجا ماسيئ اورسوا لمرى أدوش ریرٹ کی تھوڑی تھوڑی مقداری تین ماجاراوش تک روزانہ ویجاسکتی ہیں جہاں قلب کھ برط من (right-sided failure) موجود بو وإل فصد (venesection) لتی ہے ۔لیکن المیمین ان سب سچیب مرکبوں کے سے ہنر ان علاج ہے۔ ب اليون بي افراززيا ده بروتوا مونيم كاربونيث (ammonium carbonate) (هما رين برميه الم يوقع محفظ) ويعلم من رمال مي مصنوعي الترواح الم (pleuritic pain کامس لایا گیا ہے' اور وہ وات الیمنی ورو (pleuritic pain) کے دفع کرنے بن کا میاب براہے (27) یعب بحوالن (crinis) خمر بروگیا ہوا ورمیش رور خبعي ريز كى رو تو علاج كانشاء محض يبي بونا ما بيئ كركتين (quinine) اور دوسر مقوات کے اسمال سے مریض کوتقویت سبنی ان مائے یہ امراب سلیم کیا جاتا ہے کہ فیلٹن (Felton) کے مرتکز مند نبقی ر اُوی صل، (anti-pneumococcal serum) کے ذریعہ جات بچے سکتی ہے 'بلکہ مرض دب بھی عِ آسے ۔ موجودہ زمانہ میں کسس کی قبیت گراں اور مقدار محدو وہے کہا گیسے


مریعنوں کک جوسترہ سال سے او پر سول اور جن میں اندار خراب ہوا اکا انتعمال محدور کھنا بجا ہے اور ناکہائی آغاز اور سندید انبطاع کر ور مرجے بیش نغیف میں انجاز ہور کا منت اس کے خاص واحیات میں ۔ نیقاد ہو یہ فی منت اس کے خاص واحیات میں ۔ نیقاد ہو یہ فی منت اس کے خاص واحیات میں ۔ نیقاد ہو یہ فی منت اس کے خاص واحیات میں اور اور میں کے نالف فائدہ مند ہے ۔ نسم اول کا معمل اور قسم اول ودوم کا مختوا مصل حاصل ہو کہ نالف فائدہ من کے مرف کے صوف پہلے یا بچے و فون میں و نیاجا ہے اور الاکر معمل حاصل من کی منت و دوم کی اصا بتوں میں وکئی متنا و بوئی جا ہے اور الاکر میں اور تعمل میں ۔ ۔ ۔ ۲ اکا میال کا لیے سے مرفق کرکے جو کہ حموی تعا طالت روکنے کی عرف سے میازہ تیار کیا جا تھ ہے دروں وریدی طور پرو بجا تی ہیں ۔ اس جا مست کی دومری اور تیم یہ وقتوں سے دیجا تی ہی دومری اور تیم یہ وقتوں سے دیجا تی ہی خور سے واک ہے وقتوں سے دیجا تی ہی اور گا ہے ایک جو تھی یا یا تیجو ہیں متنا و کی بھی ضرور سے ہوتی ہے ۔ اس جو تھی یا یا تیجو ہیں متنا و کی بھی ضرور سے ہوتی ہے ۔ اس جو تھی یا یا تیجو ہیں متنا و کی بھی ضرور سے ہوتی ہے ۔ اس جو تھی یا یا تیجو ہیں متنا و کی بھی ضرور سے ہوتی ہے ۔

آکسیجن کا استعمال ۔ جب کبودی یا زراق ہوتو آسیجن دینی چاہئے۔ مناک کیا دو ملہ نقر میں بیریں دیرانہ قباطلا (naval catheten)۔





الف - اكتين كاخيمه كانى كے موزكا



استعال کرتے ہیں جوکہ زفیر کے دوران میں آکیجن کے بہاؤکوروک ویا اور اسطیح منیاع سے بچاتا ہے محتیقت میں غیرمزوری ہے۔ آکیجن کو تیف کے ذریعہ رسین کا مسرفان اور فیرموٹر طریقہ کھی استعال ذکر نا جا ہے۔

(٢) آگسیعنی خیمی (oxygen tent) فیمه کا امول یه ب کرمون مربادر (مهما و فی صدی) فعنایس رښایس کومس میں سے کاربن فائی آگسا نید کر طوبت اور گرمی دور کردی کمی بهول - کنی ایک خير مات بان كَے كُي بن صحف م الفيں برخيرے كس مي سے رمي اور رلمو بہت کیرف سے بھرتے ہوئے کا وف کے ذریعہ دو کھاتی کا ونجمہ کی چھت کے جاتے ہیں۔ و00 کو دور کرنے کے لیے مضاکو اگر أأبيه كرمس كوايك يج كه ذريعه المستواية كير مركه ما تعويما واطأاة لما ندر كاتمتين كا دبا وُ أيك توت محركه بهم بنعائب (49) - خري اسیجن اورکار بن آئی آگا ئیڈی مقدار فی صدی دریا نت کرانے نے لیے ایک سريري آلموجود بوتاب د وات الربي عريفون يرشرياني وخز arternal) (puncture سے مامل کر دہ تح بی شہا دن موجود ہے کہ نیمہ انفی مثا طیر کی منبت زیادہ موٹرہے ۔ خیر سے کئی زیدگیاں نیج گئی ہیں جواگرا نفی تقاطر کے طلع يرامراركياطاً توتقرباً يقيناً منائع بهوكئي بوتين مصنف نج کے ذراعہ وات الرید کی ۱۷ تشولیشناک اصابتوں میں سے ۲۰ اصابتی بچالی مِں ۔سوال بیدا ہو اے کرآ یا جسیمن کے علاوہ ، co درینا ما ہے یا نہیں ۔ س کے لئے دُورمیں و CO کا کمل انجذابروک، وینا جاہئے تاکہ مریض اس ، CO کوجوکہ اس سے خود بیندائی ہے جزوی طور پر دوبارہ سائنس س نے لیے۔ مصنف ندای را مے میں 00 کو ثاید ذات الریہ کے ابتدائی درجوں ہی دہاہ الم المسر فون سے كر منفس كى كرائى زاوه بوط اے اور ايك حفيف كھا نئى واقع بمواور فما طاكاوه ازج صام الكوا باست مجركه ما بقديان تحدما بتي مرض كا اولی سب ہے۔ اس طریقہ سے امون کو و بایا جاسکنا ہے۔ تاہم من کے آخری

د بوں یں جب کہ قلب تمک جا آ ہے مرف مکسیجن امتعال کرنی چا ہے۔ یہ ایک عجیب امرہے کہ خیر میں ذات المبنی در داکٹر زائل ہوجا آ ہے۔ ویسل لمرک ارکا واست الربید

(Friedlander pneumonia)

اُن اصابتول برمشا بدات کرنے سے جن ی فنی ذات الریافر بدلیندر کے عصبیہ ذا مت الرید کی وج سے ہو اہے معلوم ہو گاہے کہ وہ عمر آایک شدید مرض ہو گاہے کہ وہ عمر کا اندار خراب ہو تاہے۔ ایک مملک اصابت بیش ش مرغ رنگ کی نسبت کریا وہ ایک ہیا کہ اندار خراب ہو تاہے۔ ایک مملک اصابت بیش ش مرغ رنگ کی نسبت کریا وہ ایک ہیا ہی اکل وادی رنگ بیش کرتا ہے اور تراش می سیمی مواط سے وصلی ہوئی ہوتی ہے۔ جو فیزول میں کٹر التحداد شعیت اور گئی میں کرتے ہیں کرتے معمولی تم میں ہوتے ہیں اور میش زیا وہ تغیر فیریر ہوتی ہے۔ فیر فیر فیر فیر کے عصبیہ کے ساتھ کرتے رہو ہے ہی ہوسکتا ہے کا اور اول الذکر لفتکی اور لفتی وراث کی اور اول الذکر لفتکی اور لفتی وراث ہے۔ والے تاہم ہو مول کے ایک اور اول الذکر لفتکی اور لفتی وراث کی دو نول کا میب ہوسکتا ہے۔

شعبى ذات الربيه

(broncho-pneumonia)

(interstitial pneumonia) بأرخنكي (catarrhal) أو المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة (interstitial pneumonia)

محث المسمات - (1) اولى شعبى ذات الربي (primary)

(patchy distribution) سے قطع نظر کیا جائے تو یہ اصاتبیں ا دیر بیان کیا لحتى ذات الريد سے مشابہ موتى بي أوران مي متلازم مي البتاب (bronchitis) نبس موجو د ہوتا۔ ان کے متعلق کیجہ اور کینے کی مُذوِرت نہایں۔ (۲) حتیتی شیعبی ذامت الرميع ميم بعض اقات ثانوي شعبي ذامت اله بيرياحا درخنلي ذامت الماديد كيتة بن بميته حيوثے شعبات كے البّاب سے مثروع موتا ہے اور گدومیش کے بوائی مؤسسلات کے اندرمیل جاتاہے۔ یعمد تا تین سال سے بیج کی جمرو المے بچوں میں واقع ہو ہا ہے ۔ یہ کھیدا آور کا کی کھانسی کی کنٹر الوقوع بجیبد گ کے طور پر ہم تاہیے' اور دوسرے ساری امراض (مینی علی قرمزید اور انفلو کنز او عیرہ) کے معدمغی ہواکر تاہے ۔نعال کیا جا گاہے کہ شہر میں رہنے والے خراب تغذیہ رکھنےوا بے بیجے شعبی ذات الریہ میں متلا ہونیکا زیاد امکان رکھتے ہیں اواز علب **ے کہ کماحتہ بمی انسل کی استعداد پیداکردیتی ہے۔ بالغوں میں شعبی ذات الریہ** فدّات غریب (foreign particles) الخصوص طلّ کے عفونی ما ورس کے بھی وار والمدامستنشاق سے واقع مؤلي (استنشاقي ذات الربه: intialation pneumonia) - يدو فتقر إ كوشعى اليول كى راه سه نيي شيراً (bronchioles) **کیل مانے کا ایک عام بمتبے ہوتا ہے۔ یہ اِکٹر کسی بھی طول اُلمدت لاغری بیدا** رینے والے مض (wasting disease) میں ایک اختیامی واقعہ ہوتا ہے کالحضوں بوژمول میں جوبغتوں یک اصطحاعی حالت میں دسنے پرمجبور ہوئے ہوں ۔جب یہ سشم کے آسفل عمول برحلم آور مو اے تواسے سکودی دات الله hypostatic) (pneumonia کہتے ہیں۔ یہ ان اعل جراحیہ کے بعد ہو سکتا ہے جوعمو می محمیت (general anosthoria) کے تحت کئے گئے ہول اور ان لوگوں میں جو تقریباً غرقا ب ہو گئے ہوں بیموٹ کا ایک کشرالو توع سبب ہوتا ہے۔ مری کا رمطان (carcinoma of the œsophagus) سمنت برحكها وزو كرادردات الربه بيب ار کے مہلک ہوسکتا ہے ۔ لیکن مکن ہے کہ عنونی فرآ این عروق دمویہ کے ذریعیہ ش میں رہنی جائیں اور تقبی الدم (pyamia) اپنے تعیمی ذات الربوی مراکز سکے م*اعث میمزیرو تاہے ۔ اِن بَنِ کے بہت سی اصا* بتوں پرعفو نی ذات الوہیلہ

(septic pneumonia) کی اصطلاح کا اطلاق کیا جا آ ہے۔

شعی و ات الریکی بر تومیات بجید و بین اور بهت سے براتم کلف امترا مات میں بائے گئے ہیں۔ ایک نوعی بخار مثلاً کھرا یا انفلوئنزا کے متعلی بہ کھنا جائے گئے ہیں۔ ایک نوعی برخان مثلاً کھرا یا انفلوئنزا کے متعلی بہ کھنا جائے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کہ بھیری اول برخم تف معنو یے اور برط اور برط اور بوجاتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کی فوج میں وم یاش نبخت سبحیہ (hæmolytic streptococcus) ایک نبایت ارم حال اور سب سے زیا وہ بسلام یا گیا ہیں بیض موقعوں بر نبخہ یو پڑھ جس کہ انفلوئنز اور نبقہ سبحیدہ حسید (streptococcus اور نبقہ سبحیدہ حسید حسید (B. influenze) میں موجود تھے۔ فریڈ لینڈر کا عُصیتہ ور فرقتی یا کی اصابتوں میں محتیم للظ کو معمدید (Klebs-Loffler bacillus) میں بائے جائے ہیں۔

العسبيه (Klebs-Loffler bacillus) مبی این جانته بین -رومن تشرم کے منعی فرات الربی بین تبجد مشش کے طول وعوض میں گر وكور كيشكل مي منتشر و البيخ جو اكثر مُداجُدا جوتي بيعُ ليكن إبهم ل كرنسبته يرت تودي بنادين كارتجان ركمتي بي (التقائي شعبي ذاست الريب : confluent broncho-pneumonia) اینهمد به گرکیس آنکه سے ایک دو سرے سے مدا حداست خاخت بوسکتی بس - تراکھنے پرجا مُرحَّش متعدد جیوسے رہا دی رَارُ مِيْتُمُ نَظْرًا مَاسِيَ جِوْرُفُ مُ وَيِهَا اور سِوط (collapse) كَامْسِيا ومسمنِ لقول سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں میشش رم اوز مند (friable) ہوتا ہے اور تخور نے برائس کی حمیوتی الیول سے پر بیکے ایک قطرے (bead) کا ارتشاع موتا رع ـ اس عل كومعض اوتات تَطَحَلُ الرباي (splenisation of the lung) کہتے ہی خیسر د بین سے و بکھنے پر تمیز و مخصوص ضررات یہ ہوتے ہیں: زخکی التهاب جوشعبی اور جو فیزی دبواروں کو ما وُف کرتاہے ؟ اور گردشعبی الرتماعے ، وثق لمف سير (peribronchial lymphangitis) حين مي سننديد اصابتو سمي وریز خلیے کثر الاشکال (polymorphs) موتے ہیں . شعب اور جوفیزے کا درونہ ارتی افيهدس بربوماً اسع فاص كرفرك ورطمي خليول سع ليكن كجرمت والى اصابول می تقیبی آور اُن کی ہم پہلوجوفیزی ویواروں میں ٹی لینی اِفت کی تکوین موجودموتی

به من سکے ہیں۔ ور سرون کی شعبی ذات الم یہ -interstatial broncho کے نام کا اطلاق اکثر اسی متاسبت کی وجہ سے کیا جا آ ہے شعبات اور طقیعت زوہ موق لمفائیہ (thrombosed lymphatics) میں نبعات سبحیہ بدافر اطہوتے ہیں۔ جب البتاب علی شکل پہنچ جا آ ہے تو ممواً کسی قدر ذات لجنب موجو و ہوتا ہے۔ نبایت حا دا ور مبلک اصا بول میں لیفی افت کی تکوین نہیں ہوتی اور نبقات سبحیہ بوفیزوں برحملہ کرتے ہوئے نظراتے ہیں پیشش کے اندر مجو ڑے اس سکے ہیں۔

علامات اورطبيعي المرات واول الذكركمانسي ببراورا رتفاع موارت (pyrexia) مِينَ اور ورا فرالذكر منتسل مرزات كي وسعت اور مائية توع ك لحاظ سيخلف بوت برا ت اً ربی کوما بقر شعبی البتاب کے باعث بیلے ہی سے کھائسی ہوکرسے نہ پر فرفرات ِ rhonchi) اور لَغطا ست. (râles) موجُود بهول كُوتِجُ فيزول كي ما وُ فيست (implication) مرارت کے ۱۰۱ یا ۱۰۰ درج ک پڑھ ماتے کا کسی کے مختصر (short) نمشک دردر دخیر هو جاغهٔ درکشکا ت (râles) کے زیادہ و افر ہو جائے اورمنغم (consonating) نومیت امتیار کریے سے فا سر موتی ہے۔ لیکن بہت سی صابرول میں ایسے خرفران (rhonchi) نبس موجر و موتے اور طبیعی الحراب ایک یا زائدا سے ر تبول برشتل موتے ہیں جو کم ایمیں وسیح ہوتے ہیں اور ایک یا رونوں مجسیم ورای موجود موتے بین وازناین زیادہ تر بیز جنگنے والے لغلاب sharp) (crackling râles نائی دیتے ہیں ، عن کے ساتھ قرعی آواز بہت کم تغیر ہوتی ہے۔ باطبیعی ادات ایسے رقبول برشتل موتے ہیں جو تو زیع میں بے قاعدہ موتے ہیں، س تھرہی کا فی تعداد میں منبقد لخت کو ل کے اجماع کے ماعث ان براصمیت سنبخس اور شی صوتیت (hronchophony) ہوتی ہے ۔ بول جول مرض ترقی کرتا ہے ایسے رتب برم إلكم في مسكة " اوريميل إصاف بوسكة بي . بُوق (sputum) مخاط يا مفاطی ریم مرضتل ہوتاہے جس کے ساتھ نون کی وساریا ک کمبی ہوتی ہیں اور کمبیاں رَمِي يَكِين نوم رَبِي أَسِيع مواً ثُكِل جاتے مِي . استثناؤاً زادا مذنعن الدم : مِي يَكِين نوم رَبِي أَسِيع مواً ثُكِل جاتے مِي . استثناؤاً زادا مذنعن الدم (hamoptysis) بوسكتاب ـ

مرض کا مَراُس قدرتندین نبس ہوتا جیں قدر کرنتی ربوی و ات الربیر میں۔ مكن ہے كەمض ايك مفته مين تم موجائے الكين اكثر وه مين يا ما رمفتوں المكذا أمد سک قائم رہتا ہے بتیش موماً مُسَفَتَر (remittent) الکہتوتف (intermittent) برتی اور اکرو تطایع (by lyaia) گرتی ہے۔ وہ بہت بتیاعدہ برسکتی ہے ۔ سانس تیز امر منقلب (inverted) موتی ہے ہوشخیس میں اکر نہایت مفید ہوتا ہے۔ ایک سرمع الوقوع شبیق (inspiration) مؤلم است میم نصف سیکند کے سے سانس وک لی جاتی ہے' بیمز فیر (expiration) ایک غرغرا ہٹ (grunt) کے ساتھ واقع موّا کِرُ ا وربيرات كے بعد بلاكسى و تف كے دو إرة بيتى و امّع بوتا ہے - دورا إنتهتى ميں يجودالي مِن الاضلاع فعنسا كير، وَسب حب تي بير- كمانسي ببت موتي بو-مُصَمِّحَ تَمْتُمَا أَعْنَا سِبِي كَا زِياده شديد امِها تبول بين تيبيكا اوركبود موما مُسِبِ-نَبْضَ تَبِيرُ اورصَغيرِ (small) مِوتَى سبِّے - بنر يان اکثرُ موجود من اسبے - المرات اکسٹ م وودان مرمن میں بار بار بدل جاتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرص ایک مصفے م ماف موگیاہے اور دوسرے صول میں تازہ طلے مور ہے ہیں۔ مرض اکثر دونوں محديد طون برحملة ورموالب -شفالي زيا ووتر تدريمي موتى بي فك متي يوى دالي لی طرح کا گہانی ۔ موت سے پہلے تشنیات (convulsions) ہوسکتے میں۔ فنص شبی دانت الریو کمش کے ابتدائی ورجات مِن دوسری ساد معارتی سيجن من تيز بخارا كل مميز خصوصيت مؤخلط لمط جوسكنا هي جعيد كرتب محرقه ي اور چو کله بچوں میں ہرجاد بھاری کی وجہ سے نمالی ں د اغی طلامات بیدا ہوجا ہے تا امكان بوتاب، لبندامكن سب كريس ومرسه التهام معايا كي تتخيس رلي ط التق شعبى التهاب اور صدري علا ات كے ظلب كى وجر مصحكن ہے كفطي كا أرسكاب نہ ہو' مکین مکن ہے کہ چند روز تکسب رائے کو لمتوی کرنا پڑے یہ طوبل المد ت شعبی ذات الریه تل قرن (tuberculosis) کاست به پیدا کرسکتا ہے جسس ی تېزېغاد بېرىكى تىلى بوئ كغلات (rales)كبودئ اوركماتنى نمايال علاات موت مِنَ _ شعرى شعبى التهاب (capillary bronchitis) مِن مُر (capillary bronchitis) مجيزي اور تفكات موجود موقع بي ليكن بالنكات موا قاطدون محد معدود موك

بین بسعی فس نہیں ہوتا۔ مکن ہے کہ رہی نفت بُرْت ہو۔ انتقائی شعبی ذات الربیہ صفیل (confluent broncho-pneumonia) کی ختی ذات الربیہ صفیل شکل موسکتی ہے۔ آخرالذکر حالت میں شفس بیک المرات زیادہ کیاں بھے تعدیمی العد میں مسلمی ہے۔ آخرالذکر حالت میں شفس بی خارات دیادہ میں التباب شعبیا ست میں موجود ہوتا ہے میں کہ دونوں میں میں التباب شعبیا ست واسف کے تغیر نیزائی دونوں میں ہے تغیر نیزائی دونوں میں ہے تغیر نیزائی دونوں میں کے تغیر نیزائی دونوں میں کے تغیر نیزائی دونوں میں ہوئی الربی ہوئی ادر جو کہ کہا الموانین واسم سے مقال نہیں ہوئی المدان الموانین المدانی میں نیزائی دوسر سے مقال نہیں ہوئی المدانی المدانی دونوں کے درجوں کے درجوں ایک دوسر سے مقال نہیں ہوئی المدانی المدانی دونوں کے دیکن خاص المدان یہ کہا کہا ہوئی میں نیزائی دونوں کے دیکن خاص المدان یہ کہا شعبی ذات الربیہ میں مخارزیا دونوں المدانی المدانی کی ہے۔ ایک مثالی شعاع محان نہیں جس منے 156 میں دکھائی گئی ہے۔

اندار - اگر پراسس می فات الریهٔ نبنی ریری تسم کی نعبت بهت زیاد مسکل موتا ہے ۔ اگر پراسس می فات الریهٔ نبنی ریری تسم کی نعبت بهت زیاد بسکل موتا ہے کسی دی مولی اصابی وی مولی اصابی وی بیل الریاس ایکیز (desperate) ہوتی ہیں اکر شفایا بہ بوط تی ہیں کہذانا موافق را سے وینے میں کستعدر احتیاط کی حذورت ہے ۔ براسس میں جوجا مدزرات کے استنتاق کے براسس میں جوجا مدزرات کے استنتاق کے براسس میں جوجا مدزرات کے استنتاق کے


سبب سے ہو اندارزیادہ خطرناک ہو اے۔

علاج ۔ طلح اضیں عام اصولوں پر کرنا چاہئے جو سمولی و ات الریہ کی فائر است الریہ کی فائر است الریہ کی فائر است است اللہ ہے ہیں ۔ کم و خوب تر ویج دار ہونا چاہئے جس میں مریف کو ہوا آزاوا نہ طور پر بہنچتی ہے ۔ کملی ہوا کا طلاح کیا میا بی کے سب تھ آز مایا گیا ہے ۔ اور آزاوا نہ طور پر بہنچتی ہے ۔ کملی ہوا کا طلاح کیا میا بی کوسوں کک سل و نیا چاہئے اور تنفس میں دفت ہو یا کہوری موجود ہو تو آئیجن طویل عرصوں کک سل و نیا چاہئے کو ایک بیمنی خور میں اللا مجوفے میں اللاجونی (tr. belladonna) میں اللاجونے کے لئے کو آنا ایندیو کے بیا کو دیا جاسکتا ہے ۔ میمن اوقات ایرو بین (atropine) کے اشرابات بی بھونے جاتے ہیں ۔ منونا ت (expectoranta) میں جونے بیرس کے لئے عوان ایسندیو

بِن کیونکہ وہ بُسان کو کھا نکر نکا لئے کی قرت نہیں رکھتے۔ شدید اصابتوں کے لئے اکثر مہیات (stimulants) کے قدرے آزادا نہ استعمال کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً تین یا چار برسس کے بچے کے لئے برائم ہی (brandy) کے ۲۰ قطرے ہر کھنٹے ۔ یا لائکر اسٹر کنین اچار بین اور شیر خواروں بی نسبتہ کم مقداریں ۔ مشرب کئے جاسکتے بہن اور شیر خواروں بی نسبتہ کم مقداریں ۔ مشرب کئے جاسکتے بہن اور شیر خواروں بی نسبتہ کم مقداریں ۔

(abscess of the lungs)

تصیه طرے کا میوار القیم الذم کا یا ماو ذات الرید کا نتیجه بومکتاب، بدانهی عوال سے بیدا ہوک تا ہے کہ جشش کا تنگرین واقع کرتے ہیں' (حوالہ الماحظہ ہو) ياقرب وجوار كي تعبُّحُ شلًّا وببله كازير دُّا تغرامي خراج كالميستي من كاشعاع فطربت كريميل ماي سے بيدا بوسكتا ب متجد مشش سے خراج كى تغريقي تشخيص كابوتي ہے تا وقت بکے خراج تمیموٹ کر ہمیہ خاج نہ کردے ۔ بھیراس کے اماسی ا ارا سے (cardinal signs) یہ ہوتے ہیں : _ (۱) ریمی نباق مومکن ہے کہ بدورا (foul) رم کانٹی اوروط کے کے ساتھ نقت (explosive expectoration)۔ رم) بُناق کے اندر کیکداریا فت اور جوفیزی ترتیب (م) قرع کرنے بیرود (circumscribed) اصميت - (٥) لا شاع سے ايك كمعداوراكس مي سال كے ليول كا نظرة ال -جب اس کہفر کا میال ما فید کھانسی ہے یا ہر نکل میکا ہو تو کہفہ کے معمولی امارات موجود مل سکتے ہیں جیسے کہ کہند بڑا موسے کی صورت میں طبلی گمک کہنکی (cavernous) یا قِدری (amphoric) تغنس فلزی مین کار (metallic tinkling) مورصدر کلامی (pectoriloquy) تفتیر الدم کے متعد و جیو سے چھو سے میوڑے کہفول کے طور برنیس ُرشناخت کے ملطقے ۔ فی المتبقت اُن کی موجود گی عمواً گردوپیش کے تجمد میا زات المنبي انصباب كي وجرسے مخفي رہتي ہے (صحف ه) -انداراورعلاج ـ شبه بینی (bronchoscopy) نے اندارمیں ایک انقلاب بداكر دباب . به مشا بده كرك كه بيب كس شعبه سے اربى سے خراج كامقاً



الف اورب بیمیسیمرط کا بیمورانزاجی که خدمی بیپ کا تبال بیول د کھانے کے لئے بیانتھابی اور جانبی وضعوں میں لیگئی ہیں صحفہ 7 اس صفحہ 137 سے تقابلہ کرو۔ (شعاع گاشنین مطران دسے الک خانبی وضعوں میں لیگئی ہیں صحفہ 7 اس مقابلہ کرو۔ (شعاع گاشنین مطران دسے اللہ کے انہوں)

160

ليفي شُن ش

(fibroid lung)

(آللیف شش (fibrosis of the lung) مزمن (chronic pneumonia) خات الربید

بحث اسباب مضض کی بیشکل مقابلة شاؤ ہوتی ہے 'الآ

بج ن بن وجد یہ ہے کہ بالنوں میں رہ می بافت کے مزمن البتا بات فالب تعلاد
میں ندر ن کے ساتھ متلازم ہوتے ، بیں۔ وہ اصابتیں جن میں ایک مزمن البتاب
میں ندر ن سے الگ واقع ہوتا ہے 'اور جنسی لنجی شش (fibroid lung) کا نام دیا گیا۔

مدت سے مون شاؤ مالتوں میں ایک بیش روحاد لختی ذات الرید ایک زیادہ کئی الوق ع بیدا ہوتی ہیں۔ لیکن شعبی ذات الرید ایک زیادہ کئی الوق ع بیش رو ہوتا ہے۔ ووسری مثالوں میں مزمن عبی البیاب (chronic bronchitis)

امرزوت لبحنب (pleurisy) سبب موتع بي

لینی ش ایک ایم گروه وه ب جرمختلف گارسا نول اور کا نول می کام کرنوالے کار گرول میں ہوتا ہے اور جیمے تاتوب الی میا (pneumokoniosis) کوئی کے دیستے اس میں کو ملہ وصات مثلاً کرند (emery) کار بنیز (quartz) دوئی کے دیستے روئوں (fluff) و فی ای گردستے جرب ہوئے کرہ ہوائی کا متوانز استنطاق کیا۔ موثوں المدت منبع خراسش تا بت ہوتا ہے۔ اس امر کے لحاظ سے زمتعلق خراس المدت منبع خراسش تا بت ہوتا ہیں مثلاً شش فحمیت (anthracosis) (بجمس مرض کے نام تغلف ہوتے ہیں مثلاً شش فحمیت رسکے ریزوں سے کو کو لید میں بیان کی جام ہوئے میں اسبستو سبت کر ریزوں سے جوکہ بعد میں بیان کی جام ہے گئی ہی دھری اسبستو سبت (میں بیان کی جام ہے گئی ہی دھری اسبستو سبت (میں بیان کی جام ہے گئی ہی دھری اسبستو سبت ا

آنا ہے۔ آخری درج ل میں مکن ہے کہ سارات سُن متغیر ہوکر لیفی اِفت کا ایک کنیف توہ اِن جائے وہ بین جائے وہ اِن جائے وہ بین جائے ہوا کر اوی رنگ طاہر کرتا ہے (tough) اور قوام میں نوچدار (tough) اور جاقو سے کا کئے پرکر کر اِن (pleurogenous) ہوتا ہے۔ بلیورازاد (pleurogenous) اصابتوں کی فرائے کی کر کر اِن اِن کا طریقہ فالباً مختلف ہوتا ہے 'اور ان اصابتوں میں معش ایک د بزلیفی تہ کے فرریعہ سینہ سے مثبت ہوتا ہے 'اور ان اصابتوں میں معش ایک د بزلیفی تہ کے فرریعہ سینہ سے مثبت ہوتا ہے۔

علامات اورممر۔ یہ مض عمواً مزمن ہوتا ہے اور وہ مریمن مین یہ مشناخت من اما اسن موالسيك مسنون إبرس شكايت كرت رسه اي-مریفول کی مانس محیول جانی ہے اور انھیں کمانسی دنفث (expectoration) ہوتے ہیں جوسٹش کے کمنوں کی وسعت کے نما فلے مختلف ہوتے ہی (ملا خطام تمدوالثعب: bronohiectasıs) مِريضُ أكثرُ وُ لِلْ سِلْاِ مِو مَاسِيَ لَيَكُن مُمَّن ہے كم خوب تغذید یا فت (well nourished) مو اور بیرطال دو کچه عرصد کے ملئے آس کار شب عرقی (night sweating) اور عام بنیٹی اختلال سے مُبرا ہوتا ہے، جو کہ مل رمی میں مشاہرہ میں آتے ہیں۔ نعت الدم اکثر موجود ہو اسے۔ یہ مرن عمومًا يك ما نبى عو ايد يسينه كي تمنا ظرما نب بازكشيده (retracted) شايد ویے ہوئے اور عظم الکتف کا زاویہ با ہر کوہٹا ہوا ہوتا ہے۔ صیدِم القلب من مانب عد طرف سابوا ہوتا ہے اور سینہ کی تندیست ما نب مبل مکی -hyper) (resonant ہوتی ہے۔ ما وُف ما نب مرف خفیف سی کھیلتی اور قرع کرسے پرامتم (dull) ہوتی ہے ۔ جب عیمونی نا سیاں طموس ہوتی ہیں تو مو ا کا و اخلہ کم موتا ہے ورنه مشعبی نفسس شعبه منوتی (bronchophony) میکلامی (pectoriloquy) اور منتم لَمُطَات موتے ہیں ۔ کشسی موتی غیف (tactile vocal fremitus) تغیری موتا ہے۔ او و ف مشش لا شعاموں سے کمی مباشت (opacity) کا ہر کرتا ہے اور بيليال محيرل بن" ("roof tiling") كلا بركر تي رميس (للاحظه بوصغم 168) - اكثر ا نظر کے سرول کی دبازت یا گونی شکلی ("clubbing") (الطرط موسفه 565) نمایات ہوتی ہے ۔ مکن ہے کہ ہالآخر راست ما نبی نشل قلب موجو مرہو ۔

یص ، ۔ اس حالت کوسلِ ربوی (phthisis) مرِمن انصبابی والت مجنب (chronic pleurisy with effusion) اورسینہ کے اندر کی خبیث بالب گی (malignant growth) سے مشتاخت کرنا بڑتا ہے۔ سال ربوی سے نیاخت کرانے والاخاص منظیرٌ سخار کی اور بنیکی انتقلال کی عدم موجود گی ہے۔ یہ مرض اکثر سنتی کے ساتھ یک جانبی اور فاعدی ہوتا ہے' بر ملاف سلِ رہوی کے' جوعمو ماً راسی ہوتی ہے ' اور دو سرے شکش کو ا وُ ف کئے بغیرٹ ا ذہی ایک شکش کے اندر ترقی یا فتہ درجہ کک پہنچتی ہے ۔ علاوہ ازیں بُساق ہیں عصیات بدرن نہیں یائے جاتے۔ دیرسین فرات الجنبی انصباب (pleuritic effusion) مبلے ما تھ سین ازکٹ یدہ ہو کیفی سے قریبی طور پرمث بہت رکھ سکتا ہے اور مکن رہے کہ تشخیص کوصاف کرنے کے لئے سوئی کے در میہ استفاما (exploration) کی مزورت پیش ا کے ۔ دی ون صلی ی سی طابی سلعه (intrathoracic) (carcinoina کی سرگذشت قلیل المدت ہو تی ہے ۔ فکن ہے کہ در واور وسیع تَحْدَّمُونُ اور دِبا وُ يا قلب كي غيروسعيت (displacement) كي علامتيس موجو و بول -لا شعامی امتحان بمیشه عمل میں لانا چاہیے کو اور اسی طرح شعبہ بینی -اندار بالآخرخراب ہوتائے کیکن مکن ہے کہ مرض کا ممر نہا ہت مست موا اور دس یا بندرہ سال کی وسوت رکھتا ہو۔ بچے مبن اوقات شغاباب موجاتے مِن ۔ موت و ائیں تعلب کے فشل (failure) سے کیا تبدیریج طرحتی ہوئی خسستگی (exhaustion) سے جرو افرموا د خارج ہونے کے بعد واقع ہوجاتی ہے ،یا انتقالی (metastatic) فرائج اور خاص کر د ماغی خراج سے واقع موسکتی ہے۔ علاج - مريض كوحتى الامكان ببترين أب وجوابي إورمِحى حالات میں رکھنا ما ہے۔ آسے گرا میں تا زگی تخشس ہوا (bracing air) کین سنسوا میں ایک گرم آب و جوامنی طاہمے ۔ مرز اندمیں سردی تگنے سے بینا میاسے۔ اورمغذی نوراک اورمقویات بیسی کونین ولا د (iron) اور کا و لیور آئیل (روغن مبگر ما ہی استنمال کرنے چاہیں ۔ کھا نسئ نفث اور دو سرے علامات بھیے جمیے کہ وہ بدا ہوتے مائیں ان کا علام اُسی طریف سے کرنا ما ہے میں کی مرایت سل رہی ا

اورشبی التاب اور تمدد التعب (bronchiectasis) کے تحت کی گئی ہے۔

ارد بی باب بردادد مب کولم کی کان کھود سے والے کی زندگی صف منداند موتی ہے کا کہ کہ اس کھود سے والے کی زندگی صف منداند موتی ہے کو کہ ایسا بونا تعجب اگیز ہے کیو کہ مششوں میں کا ربن کی بہت بڑی مقدار کا جاؤیا ایا جائے ہیا ہے کہ وہ خالی انکے کوسیاہ نظر آتے ہیں کا ربن ہدن کے خلاف حفاظت کرتی ہے ۔ سا بھ بعض رقبول مثلاً عنوبی ویل (South Wales) میں دیوی مترانیت کرتی ہے ۔ سا بھ بوکر مزمن دیوی مقب سے موت واقع ہوجاتی ہے ، لیکن مترانیت مرے ہول ششول میں بیتھرکے ان کان کنوں میں جی جوکہ دو سرے اسباب سے مرے ہول ششول میں بیتھرکے

ریزوں کی مقدار طبعی سے بہت زیادہ ہوتی ہے (51)۔

س یوی صیّحوا نبیت (Silicosis). یه ایک دسیع طور پریمیلا مو امنعی ہے جس کے لئے کا رگر کومعا وضہ طلب کرئے کا حق حاصل ہے' اور مبنوبی افریقہ میں توجہ کے ماتھ اس کا مطالعہ کیا گیا ہے اکیونکہ وال یہ رینڈ (Rand) کی سونے کی کا نوں میں بھیلا ہواہے (52)۔ سادہ قسم میں بتھرکے ریزے مشش اور مذری غدوه (root glands) کا گربرگی تلیف بیب داکرتے ہیں۔ اسے لاشعاعی فامی ایک با دونوں ریوی میدا نوں کے با لائی نصغوب کی ایک ممیزیکسا ں عنب سرمتلغیٰ مِتی وارمنظر (mottling) یا یا جا تا ہے جو کہ بعد از ال ممری موجا تا ہے۔ غباضیں (opacities) بالعموم اس سے تیز تراورہ اضح تر بوتی بی کہ متنی مموی مدر ن بی فی مِنُ الرَّمِيثُ بَهِتُ قُرِيبِي مِو تَي ہے ۔ ايک ابتدا ئي منظر جو کو سُٹک بيداکر اب ایک بے برگ درخت کی انندعمومی تشجو (arborisation) ہے جو کہ تشتوں میں نَعْنَى بإِثْمَا يَدِعُووْ قِي دِرَغْتَ كَي كُنِّ نَتْ بْرَمْرْجَا بِيرُكُا نَتِيجِهِ هِوَ اسِهِ - ا تبدأ بي علامات بالكل زمين موتنع ليكن معدمي كمعانسي متوالي و زكام "سانس ميولنا اورمعتدل نغث يا يا ما ما كوكه لاغرى بالكل نبيل بهوتى مكن ب فرات المجنب بهي مو-ساری قسیمی تدرن کا اضافه بوما تا کے کیونکہ استنشاق کے معدمتر کے ریزے آ بیدگی کی وج سے لسونتی سلک ترشه (Bilicic acid) میں تبدیل جو ماتے تیں۔ وماتی سلیکیید (silicates) می با فتوس کی و CO کے ذریعہ سلک ترشدی تب یں موطبقے ہیں۔ آخرالذكركى وجرسے ايك اركى سلى تودہ ظبور ميں آ ، الم حبس ي

تخرکا ایک مرکزی حصد اور اس کے گرواگر دالتها بی تبییں ہوتی ہیں۔ مصیات ددنیہ مرکزی تو اور اس کے گرواگر دالتها بی تبییں ہوتی ہیں ان سے نہد مکتی ہیں مرکزی رقب میں سروت سے لکا ٹر کرتے ہیں اور وہ ووسسر سے بڑھ جاتے ہیں کہ مقائی دفائی تو تیں ان سے عاجز آ جاتی ہیں اور وہ ووسسر سے معمول میں میشیل جاتے ہیں (50)۔ لا شعاعی فلم میں کے غیر شفاف رقبہ جا تہ جا مت اور توزیع میں زیادہ میے قاعدہ ہوجاتے ہیں نافی کے سامے زیادہ نمایا ال موجاتے ہیں اور اصابت ایک بورے طور پر نمویا فتہ غیر مشکوک رہوی تدرین کی ہوجاتی میں اور اصابت ایک بورے طور پر نمویا فتہ غیر مشکوک رہوی تدرین کی ہوجاتی میں خوا کی غرض سے ایک اور میں اور اصابت ایک اور سے بچاک کی غرض سے ایک اور میں اور اسے معمول کی غرض سے ایک اور میں دورے کے موجود کے میں میں کا دورے میں کی خوش سے ایک اور میں دورے کے میں دورے کے دورے کی غرض سے ایک اور میں دورے کے میں دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے دیں میں کے دیں میں کی دورے کے دورے کے دورے کے دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کی دورے کی خوش سے آئی کی دورے کی دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کے دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کی خوش سے آئی کا دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کی خوش سے آئی کی دورے کی خوش سے آئی کی دورے کے دورے کی خوش سے آئی کی دورے کی د

ر یوی اسبستو سیت (asbestosis) ۔ اسبتوس اور ایلو منیم (aluminium) کا ایک سلیکٹ (silicate) ہے ۔ مرض نہا بیت بی مخی طور پر بڑھتا ہے کہ بخانجہ یہ اسے لیک ۱۹ اسلیک کا م کے مبد نویا ب ہوتا ہے ۔ زیر میں لیخے سام طور پر فاؤف ہوتے ہیں اور ایک منتشر طیف اور لجورا کی بڑھی ہوئی دبازت ظاہر کرتے ہیں ۔ ڈاکفرام دبیر اور عفروف کی طرح سخت ہوتا ہے اور ششش کے قامت میں مداخلت کرتا ہے اور لا شماعی ظموں ہیں ہسس کی بالائی سطح ایک نہا ہیت ہی میمز ہے قاعدہ یا گالے جمیا منظر پریشس کرتی ہے ۔ آخر کا رتمد والشعب رو نما ہوجا با محمد ہے ۔ آخر کا رتمد والشعب رو نما ہوجا با محمد ہے ۔ آس امر کے متعلق کچھ شک ہے کہ آیا تدر ن بہدا ہوئے کا کوئی خاص احمال بیا تھیں میز اسبتوسی اجمام (" asbestosis-bodies) بائے جاتے ہیں گئی ہر طرح سے علا مات لینی سطن کے ہوئے ہیں ۔

تختشش كي سنگرين

یه ابک مقابلتهٔ مشا فرهارضه بها کیکن مخلف طالات میں پیدا **وسکر آ**ہے۔ مشسنش کی گسنگرین حا دلختی فراست الریع (acute lobar pneumonia)

، طریعتهٔ اختمام ہے ' الخصوص اُن اصابوں میں جن کا انحصار فرید لینڈر کے ر ہو اور مشا وطور پر بیال روی بی و اتع ہو ماتی ہے۔ اس کے بیدا مینے رِیْدِ طریقے یہ ہمی سیطنش برہم ہیلو مرض مثلاً مری کے سرطانی عنو 'خرا مانٹ' ورمتقیتم کیسیتی دو برون (suppurating hydatid cysts) کے عملہ اور ہونے کے تمتیجہ کے طور پڑجذر مشش (root of the lung) برا نورسا کے دیا وسسے اورسینہ کی چو**نُوں سے ج**ُرَّوْاتِ الریہ یا تقیم الصدر بیداکردیں یشعبریں کھننے ہوئے اصامِ عز بہد کی وجہ سے اور مسع اُنبو مانت کے اتدر رُکے ہوئے اوّ ازات کی موحودگی ، - دبن ٔ حلق ٔ عنجره ٔ مری یا واسط (میڈیا سٹالنم) کے عفونی ا مراض (مثلاً زیان یا منجره کے مرطانی سلعهٔ لوزتین کے اعْدُنت (sloughing) 'ڈفتھ کا مَرِی کم مرطانی سلعہ) ہے بیکلے ہوئے ذرات کے بھیپھڑ ول کیے اندر جلے جاتے سے برمشش کے اندر غذا کے ذرّات اُتفا قایا نئے کی اُنٹ میں کھنچکر خلے جانے بسيم بالمخصوص أن اشخاص ميں حرمخمور (drunk) 'مجنونُ قواز دہ(comatose) ہو اتنال منجرو (laryngeal paralysis) میں متبلا بموں ۔ یا سرایت زوہ یا بی ہے جو فِرْقا بِي كَے دوران میں سائنس كے ساتھ اندر طلا كيا ہو۔ بعض او قائت سنسش كى لتُكُرِّين البِهَابِ أَ ذَ نَ (otitis) قروح الفرائنس(bedsores) ' نفاسي عوامل (puerperal disorders) وغیرو کے بعد تقیم الدم بیدا ہوسے سے ہوجاتی ہے-په گندید گی زاعصنویات (putrefactive organisms) جن میں عصب پُه ویلم (Bacillus Welchii) میں مشامل ہے کی موجود گی سے بیدا ہوتی ہے۔

مرضی تشریح میشش کا او ف صد میلے سبری الل مجورے یا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے ، نرم ہوتا ہے ، بہ آسانی لوٹ جا آ ہے ، بلکر متموہ (diffluent) ہوتا ہے ، اور اسس میں سے اکٹر بد بونکلتی ہے ۔ وہ عمواً متجد ذات الروی افت سے گھرا ہوا ہوتا ہے ، جس میں وہ تبدر بج منتقل ہوجا آ ہے ، یاجس سے وہ ایک خطرفاصل کے فدید کم و بیشس فری طور برجد امعلوم ہوتا ہے ۔ جنانچہ بیرفر ومین اصا بتوں میں معدد و گنگرینی افت مکن بی اما بتوں میں معدد و گنگرینی افت مکن بی دورای کا فوٹ میروٹ کی دورای کی کردورای کی دورای کی کی دورای کی دورای کی دورای کی کردورای کی دورای کی کی دورای کی دورای کی دورای کی دورای کی دورای کی کردورای کی دورای کی دورای

میمی بوئی (ragged) اور پاره پاره (shreddy) ہوتی ہیں۔ اور کبی ایسا کہند ایک پلیوُلائی ایپ (pleural sac) میں وا ہوکر ریمی ترواخ لصلا (pyo-pneumothorax) بیدا کر دیت ہے۔

علا مانت يرشش كى گنگرين جيبى كه وه اكثر ايك تا بوي صرر كے لور پرز ات سے میں سبہلے واقع ہوتی ہے ایک نی نظراً نداز ہوسکتی ہے ۔ اس کے برطس مکن ہے کہ آس کے علامات بجائے خود نیا اِں ہوں' یا اولی صرر کے علامات وُصا مک دیں۔ نفت بین (feetid expectoration) اورسانس کی بدارہا نمایاں ہوتے میں۔ آخر الذّکر نہابت بیز ہوسکتی ہے۔ یہ بڑے فاصلہ مک پنجی ہے اور ایک ہی کمرے میں مریف کے ساتھ دوسرتے تحصوں کارسنا تغیریاً ، مکن گرد تی ہے۔ بُنا تی میلار اُ دی ایمبری اُ کل بمبورا' یا تنفیز سند ونون کی وج سنے سیاہ موتا ہے ۔ اور اسس میں یا تو کنگرینی سنت کی یا فت کی دھجیا ل (Tragments) ﴾ بئ جاتی ب_یں یا خرد بین سے تمثیلی کیکدار رہٹے پہچاہے مباتے ہیں (ملاخطہ ، مو صغر 170) - كميري نفن الدم (hæmoptysis) وافع بوجا ماسي - كمانسي ورو بیلم اور بے قاعدہ اور اکثر متوقف ارتفاع حرارت (intermittent pyrexia) بمی موجو و ہوتے ہیں۔ طبیعی ا مارات تبجة اور كمغه كے ہوتے ہیں جوم فن ششش كی وسعت سے منابب سروتے ہئ ہنی اصمیت (dulness) 'شعبی یا کہنگائنفس' موتی اور اوسط درجہ کے یا موسطے لئطات ۔ نیکن شخیص میں اُن کی تمبت انحصار بڑی حد نک اسبق من بر ہونا جا ہے' بشر طیکہ الیا کوئی موجود ہو-مکن ہے کہ من قشعریرہ اور در دیہلو کے ساتھ شروع ہو' یا نغث الدم کے *ساغایات کے متوالی حلوں اور بد بود ار نعنث کے ساتھ ۔ بشتر اصابتوں س*انکے بعدا نبطاح (prostration) اوراس کے ساتھ نبض نیز اور صغیرا ورز با ن حشیک ہوتی ہے' اور منتوڑے ہیءصہ میں مون واقع ہوجا تی ہے ۔ کیکن بعض اُمثال مبينون يابرسون تك قائم ربتى بين اورأن من سيندت علامات مي ببت تغیرہ تبدل ہوتار متاہے کئیکن ایک مہلک انخام ناگزیر ہوتاہے۔اورخند ا صاً بَون مِن جن مِن كُن كُرين كَي غَالبًا ايك جيوني بَكِتي بي موجود موتى سِفُ

فى لحقيقت شفايا بى واقع موجاتى ب--

علاج - به بربو ارشعی التها ... (fætic bronchitia) یا تدیالشعب (arsenobenzol) کے علاج سے مث بر بوتا ہند ۔ آرمیو بنیزل (bronchiectasis) یا فو وارسینو بینزال (novarsenobenzol) سے کا سیا بیال حال ہوئی ہیں یبغن اوقات مندع غونت شکاف (amiseptic incision) اور زخم سدکی سیلیت اوقات مندع غونت شکاف (drainage) کے جراحی علاج سے ایک آئی بنی کہ غد طلاح پذیر ہوتا ہے ایستم بنی استعال کی جاسکتی ہے ۔ علیه پر اکس وقت غربی رائی وقت عرب تدیمی شخیص امستعال کی جاسکتی ہے ۔ علیه پر اکس وقت غربی رائی در بول ۔

ر بوی ندران

(PULMONARY TUBERCULOSIS)

شش کا تدرن کئی شکلوں بن بواکر تاہے۔ ایک میں عفوکے مارے طول و عض میں وقیق ذرکون (tubercles) کی عام توزیع ہوتی ہے بوطا وطور پر پیدا ہوجاتی ہے اور اسس میں عصبیات درنیہ کسی دوسرے حصے مُسلاً شعبی یا عمقی غدہ سے یا ایک مفصل یا گردے سے 'یا کم عام طور پرخودشش میں کے مزمن مون کے ایک مرکز سے خون کے ور میہ متعل ہوکر مرض پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ حادث کل اکثرایک ایک مرکز سے خون کے ور میہ متعل ہوکر مرض پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ حادث کل اکثرایک ایسے عام دخی تدرن (general miliary tuberculosis) کا حصہ ہوتی ہے وہ میں درنی البتاب سی یا عموماً ایک نمایاں مظہر ہوتا ہے کہ شعش کا من مربریا تا ہے۔

سلتی یوی (phthisis or consumption) بانوں یا اوا خرطفلی کا ایک مزمن مرض ہے میں سیسٹس کے ایک جمیو مے مصفے عمواً راس می جمیوے ورمنے (tubercles) بیدا ہوتھا ورکا ٹرکرتے ہی ورضا تف ورص کی موعوں کے ساتھ شش کے دورمرے حصول میں جیسیل جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ابتد انگر ایک مقابی ہوتا ہے

سل ما نیده (hilum phthisis) ایک شعبی سل ما نیده (phthisis) کی مرس من من من الله مرس من من الله مرس من اله مرس من الله مرس الله مرس من الله مرس الله مرس

ہیں زا دُطفولیت کے اسی مفن کا نیتجہ ہوتے ہیں جواب نا پید ہو یکا ہے ۔ اسی طالت میں بالغوں کی راسی آل میتجہ ہوتے ہیں جواب نا پید ہو یکا ہے ۔ اسی طالت میں بالغوں کی راسی آل جہ اسس امزیں کہ وہ مریض جسے ایک سرایت کر (reinfection) ہوتی ہے 'اگر چہ اسس امزیں کہ وہ مریض جسے ایک بارس طور پر سال نا نچہ ہو یکی ہے 'ازہ سرایت کی خاص طور پر آسیت کی توان ہے ۔ اُسس کی قوت مداف میں رکھتا ہے 'سٹ ہو گر کھنا ہے ۔

تلى نى شعينيات الرباير (tuberculous broncho-pneumonia)

ایک ما د تدرنی علی ب بو بالحضوص بجول یا نویم والغول میں ہوتا ہے اور جس بی ایک ما د تدرنی علی ہے ہو یا کوضوص بجول یا نویم والغول میں ہوتا ہے اور جس بی جسنی تدرقی اسکات (caseous tuberculous foci) محدا خاز بدیر کہ جائے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ بچول میں عمواً کئی مجسیمیٹر وں کے طول وعرض میں جسلے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ بچول میں عمواً اس طرح بیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑا جبنی غدہ متقرع ہوکر ایک بڑے شعبہ میں کھل جا آ اس طرح بیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑا جبنی غدہ متاب کا در دیم کا را بیت رسال ما دہ بذر بعد استنتاق سالے بھیمیٹر کے میں بہوتا۔ میں بیروتا ہے۔ عمواً راسس خاص طور پرا وُفن بنیسیں ہوتا۔

بعاد ذات الربوی سل (acute pneumonic phthisis) جے سل اکش (galloping phthisis) باسل سریع (phthisis florida) کہتے ہیں آیک اور مجی زیا دو حاوی ہے اور میدیس بیان کیا گیا ہے۔

ربی ی دن کے اسساب پر پہلے عام مدن کے ابواب می بحسن

ہو مکی ہے (طاخلہ موصفہ 88)۔ سِل روی کی مرضی کشریج ۔ بھیجیٹوں کے اندرونج (tubercles)

نها يت متيلي طريق سے بنتے اور منو ياب ہوتے ہيں اور ان مي اُن كے مغريتي فلیات کے نظامات (giant-cell systems) اوران کا تجتن موکر وٹرسٹنے کا رِجِحَانِ مِوجِو ہوتا ہے (ملاحظہ ہو سفر 86) ۔معِمولی راسی ضَرَر میں یمل ایک عمومے نَجَهَا ئی شعبہ کی دیوار میں منسر وع ہوتا ہے ۔ تَجَبَّنُ (caseation) واقع مِوّا ہے' اور دَر نی تو د و نوٹ مجھوٹ ما باہے۔ اس موا د کا اخر اج شعبہ کی راہ سے ہوتا کھور ابک وقیق کہفرین جا آہے جو اسٹ شعب سے ملحق ہوتا ہے۔ اِسی درمیان میں یہ عل سٹ کی متصلہ اِ فتوں کے اندر جیل ما آئے ہو کہ کچے تو تجبن اور کھے تعملوی السِّائي ارتشاح (cellular inflammatory exudate) کی وجہ سے متجد ہوجاتی میں۔ یہ تفوس رہے رنگ میں سباہ ہوتے بین اور ان میں چیوسط سید جبنی ورسے مجھول کی مورت میں منتشر ہوتے ہیں اورزیادہ کہنی سکوری (cavity) (formation نظر آئے سے پہلے مرو اُستجد خاصی مقدار میں واقع ہوما آ ہے۔ تجتن اورتعیج کے ایک مخلوط عل سے کہنے بن جاتے ہیں۔متعلد یا ہم پہلو کینے ایک دوسرے میں مل کر الاخرسشش وسیع طور پر کھو کھیلا ہو جا اہیے۔ و بواریں نسعبۃ اتباد کی وروں میں اکر جبنی جا وسے بنی موئی ہو تی ہیں کین برائے کہنوں (vomica) میں یہ بالکل مکنی موتی میں۔ وہ اکثر بندون یاسکوں (trabecula) سے عبور کی ہوئی ہوتی ہیں' جن میں ریوی عوم ق موجو دہوتے ہیں۔ بیعروق اس آ لافی مل کی مرافعت كرتة رمين كيكن شعبات عموا مقاد كيفع برت بهوتة جائته مين اسي ناب کے ساخد متقرح ہومائے ہیں اور ہر کہفد کے اندر ایک بازا کہ شعبات وا بروتے یہ بیا ۔ کہفول (vomice) کے ما فید مبنی ما دی اسٹنٹ کی بافت کا چور کا

(dehris) اور بیب بی - آخرالذ کرشے بُران کہ خوں بی عالب مقداری بوتی ہے۔ اس کی مقدار تغیر پہر ہوتی ہے۔ اور بعض طالات میں آئی کم رموتی ہے کہ عرصہ بائے در انتہ کک کوئی نفث نہیں واقع ہوتا ۔ سس ل یوی کے کہنوں کے اندر واقع کندیدگی (putrefaction) مرف شاذری واقع موتی ہے۔

آن ا معارتوں میں کہ جن میں قوت مدا فعصاد فی اور کی ہوتی ہے کئی ہے کہ مرایت کے کسی آولی ماسکہ سے کہا ق کا استنتاق شعبات کی راہ سے واقع ہو' اور میں بہت سے مبدا عُد اور سالت کا در میں بہت سے مبدا عُد او سکا ست کم و بیشے سے مبدا عُد اور ہو سکنے سے کم و بیشے میں میزواں طور پر بیدا ہوجی اس ۔ مبنی ا ذے کے خال ج ہو سکنے سے کم و بیشے میں ہے کہ میزا فوی اسکہ کے گرد کا کشش در ریختہ ہوجائے یساز اشسی کی قرم بنی اور کی جیلا تین نما ا ذے سے بھر کر یا تعلیم عوس ہوجا ہے اور آخرالذکر

اووسش کے اس جزوکی نمائندگی کرتا ہے جمکا الاف انتاکل طور پر نہیں ہوا ہے اسے بنی کے اس الدیں : caseous lobar pneumonia کے ذات الدیوں مسل : acute pneumonic pithisis) دور پی شالول اس استحان ابدالمات میں بڑے بڑے کہنے اثنا کے مل شکوین میں بات جائے ہے جائے ہیں اور اس کی ولو ارتیاب میں برتی ہونی (ragged) ہوتی ہیں۔ اگر مریض اس سے کم ترقی یا فنہ ورج میں مرسیا ہوتی موسشش کٹر التعداد مقد اکا نہ جنبی اور جیلا تینی رفیع ظا ہر کرے گا بن میں اتبدائی معدی کا میں اس سے کم ترقی یا فنہ ورج میں مرسیا ہوتی موسشش کٹر التعداد مقد اگل نہ جنبی اور جیلا تینی رفیع ظا ہر کرے گا بن میں اتبدائی کہنی کو یا ہم محلوط ہو کر سنتشر و اس الربی عالست کو یا ہم محلوط ہو کر سنتشر و اس الربی عالست (diffuse pneumonic condition) بیداکر دینے کا مقت آئیس طا ہے۔

ليكن اصابتوں كى غالب تعداد بين اسس عمل اللاف كوليورا موقع جسامل نہیں ہوتا۔البّنا بی تغیرًات مخلّف اما بنوں میں فعالیت کے آغیران طا ہرکرتے ہیں۔ مکن سے کہ بہ فیاو (mischief) اینے ممرین ایک یاز اند بار طول عرصول کک موقوف موجائ، يا ملكما ستدائي زمارس يي دب جائه، اوراكة نه برسع -يها ل ليفي يا نت كا منوايك الم عال موتاب - باسوائ نهايت جا واصابتول کے سٹیا فرہی غیرموجو دہموتی ہے' اور مزمن اصابتوں میں مرضی سٹش کی ! تی مائد ا إ فت كا أبك برا برو بناتي ہے - مَتَجَوْسَتْ مِن بين لفتكي فاصلات كے مريس اس کے کثیرالتعداد کبند دوڑتے ہیں ' شعبات تعویق وم یہ اور کوندال کو گھرے ہوئے ہوتے ہیں اورحشائی ملیئور اٹے نیچے ایک کثیف تہ باتے رہیں الیفی ب لُ : fibroid pbthisis) ـ بيركمفي لم فت أكثر لتون موتى اور حابيها بمني تورول ك ساتھ مخلوط ہوتی ہے ۔ وہ اپنے انقباض ہے کہغوں کی تبیامت رئو کر دینے کا ر حمان رکھنی اور اِتلا فی اعال کے مقابلہ میں سیقدر مزاحمت بیش کرتی ہے۔ بعض مواقت اصابتول مي در مه كا ابك ميمولما جاؤ ما لآخر تمّامته بهنج و كرملون كنفي ا کا ایک تو دو بن جا تا ہے' جو فی المحتیقت تندرست سنسش کی اتنی ہی مُقدار کی سبکہ كے بیتاہے كر ديگر لحاظ سے بے مزر ہوتا ہے . حَبنی ا دَے مِن كيك يُم كے لمحات ك جا کہ کی وجہ سے اِن تکریا ہے (cacatrises) کے اندرکلسی فرّات کا لمنا غیر عام اس

اورا میسے ندبہ (eneatrix) کے گروہ عالت بدا ہوسکتی ہے جسے تنظیمی نظائے کہتے ہیں (المحظ موسفو 146) یا ہم یہ ہمیں سمجہ لینا ؟ ہے کہ کیفی یا فت کی تحویل استحصان کلیس ہمیشہ المدالی علی ہی آخری و جرجو است مسلم وار لا شعاعی استحصان کلیس ہمیشہ المدالی علی ہی آخری و جرجو استحصان اللہ مربط ہے کہ مکن ہے اس توعیت کے جانو یا لا خرج سب ہورکی ایکل غائب ہوجا آبا اور تھرمریفن کو دویارہ صحت کلے عاصل ہمربط ہے۔

ذا بت الجند باكل بتدائي دربيس موجود بوسكتاب بمكن ہے كه وہ حشک ہو۔ نیکن ایک ہا ف بوال کے رنگ کا (straw-coloured) مصلے فَا بُرِينِي العِباب تبايت عام ع اوريد إنواس مِضِين بددير بوناب إاس في ال آمد آمد کامیش خیمه مو تاہے۔ ایسا، نصباب خوان کے رنگ کا ہوسکتا ہے۔ ایکے خصائص بعد میں بیان کئے گئے ہیں' اور مکن ہے کہ جب یہ مل اندال بذیر موتو وہ بھی تبدر سج مذب ہو دائے ' مااکے۔ آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشتش کے ماؤ من جھے ہر لیفی بافت کی ایک دبنر تہ کی نگویں ہوجاتی ہے' جو مشمل کوعمہ ہاً و لوا رسینہ سے مصبوطی کے ساتھ ہوڑ دبنی ہے۔ ششر کل بدانضام (adhesion) ایک ایم انزر کمتیا ہے کیونکہ اگرعل اکتہا ہے۔ (process of excavation) سطح کے طرف ایسے نقطہ بر طرحے ہو منصر (adherent) نەرمو تونكن ہے كہ و و كېغه (vomica) متقرّح موكر اينے ما فيد لمپرة لہفے کے اندرخارج کردے اور اِسس کا متحدید ہوکد اول نرایک ما ووات الجنگ (acute pleurisy) بیدارومائ جوعراً ریی تسم کا بونا ہے (تَقْتِيحِ الصدل م بوجائے) اور دوم یا لیورانی تاجیہ کے اندر ہوا وانعل بور ا سترواح الصل ميدا موجائ اور أكرستيال موجود موتواكة بياري استرواح الصدر (hydro-or-pyopneumothorax) بوطائ ـ

آملات ساخت کا ایک دوسرا ایم نتیجه نئرف (meniorrhage) ہے۔ ابتدائی درچوں میں بیصرف اِمثلا (congestion) کا نیتجہ ہوتا ہے۔ آخری درجوں میں عووتی دیوا روں میرور نہ کاراست علمہ ہوجا آ ہے؛ اور اسی، جہ سے مکن ہے کہ وہ متاکل (eroded) ہوجائیں گیا وہ کمزور ہوکر تمع ہوجائیں اور اس طح انورسے بناویں جو کہ مٹریاسیم کے بیج کی جمامت تک پہنچکر اِلآخراہنے سب سے زیا وہ بیشلے مصتر کے مقامے ہر وہ طبیعائیں۔

مكن الم كسال ريوى كے دوران ميں مدن كا حد مم كے دور رے صول رِ مومات مرار (glottia) کی راوسے وَرِندا لود بُ ق (glottia) کی راوسے وَرِندا لود بُ ق (tubercle-laden sputum) کے مسل گذریے سے حجری درنہ(laryngeal tubercle) پیدا ہوجا تا ہے ۔ بہاق کے نُنگلنے اورغذائی قنال کی راہ سے اکس کے تبدیری گذر سے سے لف نعی یا آعور (cæcum) کا دَر بی تقرح اور نامورمبرز (fistula ın ano) بیدا موجا ما ہے۔ ماربطون روه بربخ (epididymis) مزی و صلات (vesiculæ seminales) ، رحم اور اس کے خمیمہ میات کیلیوں اور ریڑھ کی ڈیوں کا تدرن (اور اس سے پیٹر ا مون والعنراماست ، مسيدكه خصري بحورا (psoas abscess)] اوردوسري ہدیوں اور مفاصل کا تدرن رہوی مرض کے ساتھ ساتھ موجو دہو سکتاہے اور ہاتو اسسے بیدا ہوجا تا ہے یا مبض مشالوں میں ایک اولی اسکہ کے طور رول کرتا ہے۔ بعض اوقات عمومی تدرن (general tuberculosis) معدالتها بسحایا (meningitis) اس نظر ركونتم كروتيا ہے ۔ الله كيسن كام ف (Addison's (disease شاذے - چندمال ایک شفاخاندی مهلک اصابتوں کی ، منبصدی تعالی میں میرًو ملحال گرووں اور امعار کا جریشی من (lardaceous disease) یا یاگیا-قلب جيوال بوسايد - ما راصاً بتول بي عدم دمويت ياريوي تبويه (aeration) كي قلت کے با عضائہ قلب شمی انحطا طا طا ہر کرتا ہے۔ مزمن لیفی مض (hypertrophical) میں وایا س کطین مبیش پر ورده (hypertrophical) ہوتا ہے۔

سمی جرفام ہے۔ سرار بوی کی مریر ماتی رو کداو۔ بل ریوی ایک تیزیا ایک ست مر سے ماری روسکتا ہے۔ مندر کر ذیل بیان کا اطلاق بالخصوص ہس اما بت پر بوگا جوچمد اوسے کے کر چندسال تک جاری رہتی ہے۔ من کا آغاز مخلف طورے ہوتا ہے۔ بہت سی اما بتیں کمانی اور خاطی د

یا رہی نغیث سے شروع ہوتی ہیں جس کا کو ٹی سب نہیں تبلا با جاسکتا' یا جوسردی لگنے (chill) المكشف(exposure) سے منبوب كياجا آئے ۔ دوسرى اصابتين نقشالكا (hæmoptysis) ما خون تھو کنے کے ساتھ شروع ہوتی میں مکن ہے کہ مریض نظام س مالت من تعِف اوقات ن ننت کریے کے بعد آلیکن الکل اُسیقدر اکثر جب کہ وہ یہ حال را ہو ٔ یا کوئی ایسا کا مرکز الم ہوجس میں زور لگا نا نہ بڑے یا بار نہ بڑے حکیاتی کا کاری می محوس ہوتی ہے مریض کھا انستاہے اور اُسے یہ و کھیم اور ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ اس ہے جو کچھ تھوکاہے وہ خون ہے۔ اِب ن ہے کہ وہ چند ڈرام یا ایک اُوٹن یا ایک پائنٹ کا نفٹ کرے۔ ممکن ت ارہے اور سینہ کے امتمان سے کچے بھی ظاہر نبولیکن میں کے بعد خون کے تا زہ ضیاع کے بعد یا اس کے بغیر کھا^ن ار موصاتے ہیں در بیا صابت ' دو سری اصابنوں کی طرح ہنو ! ب ہے ۔ تعلیل التعداد اصا تبوں میں صحت میں فرق آجائے کی ہلی ظاہری علام (first apparent departure from health) يه موتى سبير كد اكيب با لا في كخنه میں جاد زات الروی کیفیت منودا رہوجا تی ہے ' جو صرف جزء صاف ہوجا تی ہے کیکن کھانسی اور نفٹ جاری رہتے ہیں' اور اصابت میں سال کے تمام مظاہر ا موجاتے ہیں۔ اور دوسری ا ما تبول ہیں پہلی ٹابل سٹ ناخت بہیاڑی نت العِنب اوران*ڪ ما تھ* انصبائي مان موء ہے ۔ يہ انصباب کہي کھي خون آلود مواہم اورمکن ہے کہ اس سے بطا ہر کلی طور برشغا ہوجائے اور یا بینہہ اس کے بعد مولی رابوی مغیرات بمودار ہوجائیں ۔

منتف اما بتول میں اس مرض کا ممر نہایت متغیر بھی ہوتا ہے۔ وہ مر جن میں ابتدائی ترین علالہ ت ہوتی ہوتا ہے۔ وہ مر جن میں ابتدائی ترین علالہ ت ہوتی ہیں نواہ یہ نفث الدم ہو'یا کھائنی یا لاغو (wasting) 'اگر آب وہوا اور امول صحت کے مناسب حالات ہیں رکھے جائیں تومکن ہے کہ وہ اپنی صحت کلی طور پر از سرنو حال کرلیں۔ اور پیوصہ وراز سے معلوم ہے کہ اُن اشخاص میں جوحا و نمات سے ہلاک ہوئے ہوں'یالیے مرض سے مرب ہوں جن کا مشنش سے تعلق نہ ہو رامین (apices) میں نکه بی (cicatricial) اور لمون حکمتیاں شاید کلسی جاؤکے ساتھ کیائی جاتی ہیں جن کے متعلق مرف یہ سمجھا طاسکتا ہے کہ یہ امیق دُر نول کی با تمیات نہیں۔

لیکن اگر علاج کرا ہے سے پہلے سرایت خوب قابم ہو جی ہے تو تیجواتنا کی بخص نہیں ہوگئا۔ جانجہ موض تین یا جارہ ہون کی مہلک ہوسکا ہے کا گئی بخص نہیں ہوگئا۔ جانک کرمے سے پہلے وہ بارہ یا بندرہ سال کک جاری یا جگن ہے کہ مریض کوبا لا نر بلاک کرمے سے پہلے وہ بارہ یا بندرہ سال کک ماری است وصہ میں اس کی ترقی نہا یت غیرسا وی رہے گئی اکمنٹ روہ ہمینوں یا ایک دوسال کا ساکن رہتا ہے اور پھر یہ سرعت بحراک انصت اور اس کے ساتھ نفٹ الدم یا زیادہ بخار رہو تا ہے۔ ورا نجا لیکہ زیادہ سریع اصابتیں بالحصوص اوف سندہ وشش کی وسعت کی وجہ سے مہلک ہوتی ہیں۔ اصابتیں بالحصوص اوف سندہ وشش کی وسعت کی وجہ سے مہلک ہوتی ہیں۔ نظرناک ہوتی ہیں۔ ان بیجیب دگیوں کی کشت کی وجہ سے زندگی کے لئے خطرناک ہوتی ہیں۔ ان بیجیب دگیوں میں سے بعض خود ششش کے ضررات خطرناک ہوتی ہیں۔ ان بیجیب دگیوں میں سے بعض خود ششش کے فررات موری وہ ہیں ، ووری وہ ہیں۔ اور انہال البتائی (tuberculous meningitis) انقرح امعاد اور انہال البتائی (tuberculous meningitis)۔ اور احتا اور احتا کو ایوریشی مون (lardaceous disease)۔

متقامی علامات ما اب یکیتدرزیا ده تفسیل کے ساتھ بیان کے

جائیگے:۔ کھانسی۔ یہ ایک نہایت عام علامت ہے، اور گوبیٹ نہیں تاہم عموہ اُ اُس وقت تک موجود رہنتی ہے جب تک کہ مرض کسی عدیک فاعلی رہنیا ہے۔ کھانسی یا تو آسانی کے ماتھ ہوتی ہے یا ختک جس کا انحصار بُساق کی مُفلائِ اور اُس کے آسانی کے ماتھ نفٹ سے فارج ہو سکنے برموتا ہے۔ حب کیف وسیع ہوں اور بُساق ہا وُف لختہ کے اسفل حصول ہیں ترنشیں ، وجائے ڈرکھائی طویل طول کھورت ہیں واقع ہوتی ہے جومریض کے لئے ورد اگریے اور نت آس پاسس والوں کے لئے تکلیف وہ ہوتے ہیں اور شاید ایک منٹ سے زیادہ تک جاری رہتے ہیں۔ حغری بیجید گیوں کے ساتھ کمفانسی ایک بھر اِنی مونی (hoarse) یاروکھی (husky) نوعیت ائتلیا ۔ کر لینی ہے۔

افاف المنال الم

نفت الدمس ربی کی بہلی المدر (hæmoptysis) - جب نغت الدمس ربی کی بہلی علامت کے طور برواقع برئو تو خون عمواً شوخ برخ زیگ اور جھاک دار بروتا ہے ۔ وہ تغیر ندیر متعداروں میں نغت سے خارج ہوتا ہے اور عسام طور برمریفن جبند گفتوں یا و نول تک نول کے گلتے (pellets) محتو کما ربتا ہے 'جن کارنگ


ساہ سے سیاہ تر ہوتا جا آہے اور جو بنداری کی کیڑالوقوع ہو کر بھر الکل موقوف
ہوجاتے ہیں۔ آخری درجوں بین جب کدمون توب قایم ہو چکا ہوتا ہے۔
رہی یار پی بساق باکٹر خون کی دھاریاں ہوئی ہیں باوہ خون آلود ہوتا ہے۔
بساق میں جند دھاریاں شبی مخاطی جبلی میں کے جھوسے عوق سے آسکتی ہیں '
بساق میں جند دھاریاں شبی مخاطی جبلی میں کے جھوسے عوق سے آسکتی ہیں '
لاہو آہے ' یا جے ہوئے خون کے گلوں کا اخراج ہے جواکٹر ون کے وقت ہوائے ما تھ ویسے نزفات واقع ہوگئے ہیں جون سے وقت ہوئے اللہ ہوگئے ہیں جون کے ساتھ ویسے نزفات واقع ہوگئے ہیں جن میں خون معمولی افرازسے الگ ہوگر کی آتا ہو اوراگر کوئی بڑی لاگر ایک بھوٹا افواسا کہ بسلے بیان کے گئے ہیں جن میں خون معمولی افرازسے الگ ہوٹر الی جھوٹا افواسا کہ مشقوق ہوجا کے رہومورت کہ زیا دہ اکثر ہواکر تی ہے کو تھوڑے ہی عوصہ مشقوق ہوجا کے رہومورت کہ زیا دہ اکثر ہواکر تی ہے کو تھوڑے ہی موسکتی ہے ۔ نفش الدم ون کے وقت ہو ہے کی نسبت ہر موت واقع ہوسکتی ہے ۔ نفش الدم ون کے وقت ہو ہے کی نسبت بر موت واقع ہوسکتی ہے ۔ نفش الدم ون کے وقت ہو ہے کی نسبت رہ موت واقع ہوسکتی ہے ۔ نفش الدم ون کے وقت ہو ہے کی نسبت ہوتا ہے اور ایسا غالباً سردی کی وج

ظبیع الرات - مریریاتی نقطهٔ نظرسے راسی سب آ Apical کی phthisis)

(phthisis کے بین درجے بیان کئے جاتے ہیں (Turban-Gerhardt کی جاعت بندی) - ذرجہ اول میں ہجا بتدائی اصابتوں کا بوتا ہے ' مون کی باونوں راسوں کے ایک جھو مے رقبہ میں محدود ہوتا ہے - ذرجہ دوری میں محدود ہوتا ہے - ذرجہ دوری میں متحدود ہوتا ہے - ذرجہ دوری میں متحد ہوتا ہے ' اور مون ایک گنتہ کے سارے یا زیادہ ترجعتے کو اوف کر اہمے ورجہ سویر اور بھی زیادہ وسیع مون کا ہوتا ہے ' جس میں وہ تمام اسا تبیں شام ہیں اجن میں کہنی تکوین بہت ہوتی ہے ۔

طبی الدات الخیس ورجوں کے کھاظ سے بہترین بیان کئے جاتے ہیں۔ درجوں کے کھاظ سے بہترین بیان کئے جاتے ہیں۔ درجوں کو ان اور مختلف ہیں۔ درجوں اور مختلف اسا بتوں میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ مکن ہے کہ آنکھ یا ہا تھ کے ذریعاؤف فا برحرکت نید میری (mobility) کی ایک خنیف سی کمی سشنا خت کی مائے۔ برحرکت نید میری (mobility) کی ایک خنیف سی کمی سشنا خت کی مائے۔

م تقعید کے لیے سکون کے ساتھ تنفس(tranquil respiration)کے دوران ور کام تنفس (full respiration) کے دورا نمی اضافی حرکا ت کوغور ہے ر کمینا چاہئے ۔مکن ہے کہ ریکس کا بداختیا طرقرع(percussion) کرنے بیرمقالب ب کے مقابلہ میں سرکی تعنیف سی کمی (slight impairment of note) این عائے ۔ طبعی حالت میں راسی گمک کا ایک دورہ تا دسینی میر (عد النج تا م النج) چوڑا بند ہوتا ہے جوسفانے بر سیلا ہوناہے اختاکنانے کوانگ :Kronig 's ısthmus اب کالت مرض به ننگ بوسکتاب - تر توی بدی کے عین فیج ا ترقوی لِدِي سِرَ إِفْرِقَ لِترْقِي صَغْرِهِ (supra-clavicular fossa) مِن مُركِي كِي (umpaired مِن مُركِي كِي (note مجي لرسكتي ب مريض كو وصلى وضع من بيشا موا موا الماسية - استماع سے اکثر حویصلی خریر (vesicular murmur) کی کمی (diminution) وزباریک یا اوسط ورج کے لفظات (fine or medium râles) یائے جاتے ہیں جر کھا ننے کے بعد پیلے تہتی کے اختتام کے قریب بہترین مسنائی دیتے ہیں ۔ زفری خریر بلنداور لما بوسكا بي جيس كشعبي نفس من اورمكن ب كموتي مك (vocal) (resonance کی زیاوتی اس کے ہمراہ پائی جائے ۔ لیکن یہ یا ورکھنا نہا بیت اہم جر کہدلمبا بلندز فیری نر سرمس کے ساتھ لمند صوتی گلک ہو، سندرست اشخاص کے ب دا مُیں جا نب برغیرعام تہنیں ہوتا' بالخصو*ص عور تو ں میں -* اور بالعب موم ایک ا بَدِدائی اصابت میں اس سے بہلے کہ ہم لمبی امارات پرسے یقین کے ساتھ یہ رسكيں كەراسى ك كى شىما دىت موجو دىلىيى ئىتورىت تقورلىپ وقفول يركمرلامتمانا کی فرور شت ہوتی ہے۔ مرکا کم ہوجا نا (impairment of note) اور لفظاست (râles) نهایت فابل اغتمار دار اسرس سکن مبض اوقاست تعنی ترقری مغصل میں ایسی اوازیں (sounds) پیدا ہوجاتی ہیں جو تیننے و الے لنطات (crackling râles) سے نہایت قریبی مٹ بہت رکمتی ہیں ۔ بیقاعدہ جسکے وا (jerky) يا لِبري (wavy) تنفس (يعني نام بناو وت ببها تنفس -cog-wheel respiration) كوئي تشخيصي البميت نبيس ركهتا -درجه کا دویم (تجد) می طبیعی امارات کئی لحاظت ذات الریاکے



الف يرفى بافتدسل ربوى كى وجدينية ش كادسية تنفط اوردا برران رجمه موجودب،



ب دایال بلیورانی انصباب ، ریشعاع تکاشتین مرالندسے لاک نے لی بین) در ایال بلیورانی انصباب ، ریشعاع تکاشتین مرالندسے لاک نے لی بین)

نہ کی ایک تناظر کمی بھی ہوتی ہے ۔ قرع کرنے برئیراصتم (dull note) ہوتا ہے ا خواه كهف موجود بى كيول مر بمول مر ليكن عب كهفه شرا موتو ايك بيش كمكي -hyper) (resonant ترماصل موتا ہے۔ اگر ایک ٹراکیغه شعبی نالی کے ساتھ آزادانہ ارتباط ركمتن بو اورمريض كامت كملا بوا بوتو قرع كري سه اكثر جيوني هنال بإجيسي ا وإ ذ (cracked pot sound) اصوت ظرف شكسته (bruit de pot felé) نظے کی یوسیکٹ ں کی ہی جمناکار (chak of coms) سے کیتے دشاہ ہوتی ہے ہی کارونو ا تقول کو لائے ہوئے اور کھو کھلار کھ کر مکھٹنے پر اربے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ اس آواز کی پیدانش میں و دعنا صرکار فرنا ہوتے ہیں ۔۔۔ (۱) ایک ہوا سے بھرے ہوئے کیغه کی موجود کی ۔ (۲) قرع کرنے پر ہوا کا تیزی کے ساتھ ایک تنگ فتحہ کی را و سے إ بر تكانا ـ استاع كرية يركلن ي كيم شعبي (bronchial) ، كمفكي (cavernous) اور فَدرى (amphoric) تَنفُسُ مِنْ الله الله الله الله المرك كريستقدر اكتبها ف اوراسك لرونليف (fibrosis) موجود ہے۔ وہ حقيقتَه قدري صرف أليوقت موتا ہے جبكہ كيفه برا بور شعبه صوتى (bronchophony) اورصدر كلامي (pectoriloquy) جي یا۔ 'ء جا ئیس گئے۔ کمفول پر بڑی مبامت کے کر کر اسٹ و اُر لغطات crackling) rales) اور فلزی جیسکار (metallic tinkling) سَائی وبنی ہے۔ استاعی اصوات عميق تبيتق ليسخ يا كهانسنے پر بہترين بخلتے ہيں' جب كەبعض او قاست بُعِدُ سَعِالِي امتصاص (post-tussive suction) کي آوازيمي سنائي ديتي ي-تا ونستیکہ ایک کہفہ کماز کم اخروط کی جیامت کو نہ ہنچ گیا ہو' وہ غالباً تجد کے مقابله مین متنزا مارایت بنیس پیشیس کرنا به ساته بی به عبی بنتالاً و پناجایی که اسوقت جب كه دوران زُند كَي مين كِهفه كَے كُونيُ إلارات موجود نه محق بعدل المهات ا متحان میں ایک کہفدیا پا گیاہے۔

نظامر دوران خون - مزمن آربوی می ملب نبهٔ جواله موماً به بعیاکه اسس کے عض کی لاشاعی بیا نئوں سے ظاہر ہو اہے جو صحب دروں نگار (ortho-dagraph) کے ذریعہ سے لی گئیں۔ خاص طال جواسس کا مبب ہوتا ہے غالباً مزمن کمئی ورزش (chronic under-exercise) ہے۔ یہ ایک عدم استنعالی ذبول (dısuse atrophy) ہے۔

عام علامات - اس تفاع تبیش (pyrexia) - سِل ربی کے ابتدائی ترین ا ہام ہے ابنی رموجو و ہوک کیا ہے' نبیکن بدعمہ ما مشیش میں گئے تدری عل کی ىت كى يى ئىچەردىجەنىيەت ركھتا بىيۇج كانتىچە يە موتاپيۇگەاگرمۇن وقىت أ فِوقتاً غِرفاعلي بهو ما تاہے' تو بخارجی تتنا ظرع صد کے لئے غیر موجو و ہوسکتاہے۔ لیکن وہ اکثر مہمینوں تک مسلسل موجو دہوتا ہے ۔ صبح کی نسبت سٹنا م کوتیش عمواً زیا بلند بروتی ہے ' اور وہ یا تو مُتَفَتَر (remittent) قسم کی ہوتی ہے یا اُمتُو قف (intermittent) قسم کی ریخار کے زیادہ بلندور طول کے ساتھ وہ ہے آرامی ور ندی(discomfort and malaise) موتی ہے جراز تفاع حرارت میں عام ، بجب میش گرتی ہے تو وا فریسینے (profuse sweats) آتنے ہیں بالحصول من کے طریعے ہوئے درجوں میں اور تمھی کیمی پیپینہ آئے سے پہلے خفیف سی مردی مگتی ہے ۔ لیکن ختیقی قتعر پیرو نا درالو قوع ہے اور عام نزین واقعہ پیہے مریقن رات کے اتبدائی حصے میں جہاں تک کہ کمانسی موقع والے، کمرو ہیشس ں کے ساتھ سوجا آ ہے، اور علی الصباح ببیدار ہو کرخود کو تبیینہ سے اُشرا بور یا ہے۔ ابتدائی ورجوں میں بھی کسی قدر مثب عرقی (night sweating) غرفاً

لرغی ی (loss of flesh) اورضیاع قوت و را بن سِل ریوی یس قاعدُ كليه كے طور برواقع ہوتا ہے۔ مكن ہے كہ يہ ايك ابتدا بي ترين علامت ہوُ اور اُکس و قت جب کہ کھانشی محض ایک شعبی نا زلت سمجھی گئی ہو یہ ایک انتباہی نشان ہو۔ ایک مزمن اصابت کے اختتام برلاغری انتہائی درجری موجاتی ہے ۔ مستثنیٰ اصابتوں میں تغذیہ اس وقست بھی خاصہ انچھا تا کم رہتا ہے جب محمد طبیعی اِ مارات یه ظاہر کرتے ،میں کہ ایک بڑا بلکہ صربحاً فاعلی ضررامو جو دہے۔عصنلی طا قت جلد کمزور بٹر ماتی ہے اور مریعنوں کی تو انائی جاتی رہتی ہے اورو مسست بُوكُر طومل محنتَ كے نا قابل ہمو جاتے ہيں 'خواہ يمحنت و ماغي ہو با جہاني ليلين بہت سے مربضوں بیں و ماغی حالت بڑی امید اور اعتما د کی ہوتی ہے' اور امونت می

جب که وه مجبورا وربے دست و با بڑے ہوتے ہیں و ہ اس کا سیج اندازہ نگانے میں قاصر رہتے ہیں کہ وہ کسنفدر بیما رہیں' اور نوخ رکھتے ہیں کہ اگر ایک بار کھانسی سے سی ن ل جائے توشفائے کلی ہوجائے گی۔

عل مرحمو بیت (anæmia) ایک کثیر الوتوع علامت ہے ' ابتدائی اور آخری دونوں در حول میں اور اگر نفث الدم سے تون ضائع موا موتو بد اور بھی مشدید ہوتی ہے ۔

نرسراق (cyanosis)- چېرو کبود بو تا ب الخصوص ان حاد اصابول مين من مين شش كاايك مرار قبه او ف بو اور اس وجه سے ستريا في خون كا تا كه د (oxygenation) اقص بو - ان مزمن اصابتوں مين جن مين فلب كى دائيں جا سب كىيفدر تتسع بوگئي بوئ زياده بين زراق بوتا ہے 'جو بالخصوص وريدى دوران خون كے ليلو، (retardation) كے باعث ہوتا ہے 'جب كہ نطب مي خون دوران خون كے ليلو، (systemic blood) كے باعث موتا ہے 'جب كہ نطب مي خون

علاهما ب سوع هضه بیسے که عدم استہا 'مثلی' اور تے دور ا مرمض بر کسی وقت واقع بوسکتے ہیں۔ آخری ورج س میں مثلی یاغذاستے نفر اس قدر نمایا س بوطا ہے کہ طبیب اور مرضہ کو یہ ایک فاص دقت بوتی ہے کہ مریض کو کوئی بھی چیز کیسے کھلائی جائے۔ آخری درجو س یں اسہال کہ مریض کو کوئی بھی چیز کیسے کھلائی جائے۔ آخری داجو س یں اسہال فی المنظم (diarrhoa) عام بوتا ہے۔ یعض نا زلتی حالت کے باعث بوسکت اے 'یا لفائغی (lardaceous) کے تفرح باجر بشی (lardaceous) مرض کی وجہ سے۔ اجابتیں مختلف ہوتی ہیں ' بعض اوقات زرورنگ کی غیر ہضم سندہ' اور ان میں قدر آ مخاط یا نون ہوتا ہے۔ التھاب ہار بطون (peritonitis) ایک ورٹی قرصہ کا میتے نہا بہت سنا ذہوتا ہے۔ زیادہ اکر وہ بار بطون میں کے دُرٹوں کے ہاعث ہوتا ہے کہ لیکن یہ ایک عام پیپ کی نہیں ہے۔ مستذکر وہ بالاعلاء سے حسل وہ جسم کے دو مرے تھوں

مت ذکر و بالا علاء ت کے عسلا وہ جسم کے دور مرع معول میں وَر منے جم اِنے ہے ہوں علاء ت بین جباکہ رسی تشریح کے باب میں ور منے جم جانے ہے جمی عسلا ہات بیدا ہو سکتے بین جباکہ رسی تشریح کے باب میں بیان کی گیا ہے ۔ اِن میں سب سے زیادہ نا حدیدی تدلی اللہ اللہ اور مناتی ہیں جسے لیا وہ ازیں مختلف عفونی بیجیب گیا ب ہو سکتی ہیں جسے کہ دیا مل (furuncles) و وح الفرائش (bed-sores) و عیرہ آفری ورجول بیل اور فیندنی و می بیل می علقیت (femoral venous thrombosis) ، بو

اعث جواگر کچیے ہو تاہے تو نہا یت اِفراط کے ساتھ } اکثر پانچ سے ہارہ مہنتوں تک میں مبلک ہوجا دیسے ۔

سبل نافیجی (hilum phthisis) یه مرس کی ایک فرمن شکل ہے۔
مریف جوعم فا سبح اور بعض او قات بالغ موتا ہے جہشہ تکان کے احاس کی شکا بت کرتار شاہے ۔ بیش اور فات بالغ موتا ہے جہشہ تکان کے احاس کی شکا بت کرتار شاہ ہے ۔ بیش اکر خیف سی بلند ہوتی ہے بینے بسیح کے وقت شکا بیت کرتار شاہ کے مقام بڑاک یا دوبوں جائے علم الکتف کے فقری کے طون مشش کی جڑکے مقام بڑاک یا دوبوں جائے علم الکتف کے فقری کاروں کے درمیان کھٹا ہوائٹ (Kronig's isthmus) ہوگا ہے اور کمن ہوگئی ہو ۔ لفظات (râles) من کرتا ہو گئی ہو ۔ لفظات (râles) من کرتا ہوں کی مریس کوئی شب یلی نا کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کہ بوگئی ہو ۔ ان بنایت ہی غیر متعین طبیعی المرات کے برمکس لاشاعیں جڑکی بائی جائے ۔ ان بنایت ہی غیر متعین طبیعی المرات کے برمکس لاشاعیں جڑکی بائی جائے ۔ ان بنایت ہی غیر متعین طبیعی المرات کے برمکس لاشاعیں جڑکی المتعامی جوائی المتحدی ہوتی ہے کہ المتحدیث ہوتی ہے کہ بہترہ کی بیرہ کی

ليفي سِل (fibroid phthisis)-بيراس لل (fibroid phthisis)

شائد سارے مارف ششش پرموجود ہوتے ہیں۔ اکر دوسری بانب ماؤف ہوتی ہی تووہ صرف راس پرماؤف ہموتی ہے۔ اکٹر کھانسی یا نغٹ زیا وہ نہیں ہوتے۔ بسینہ بھی نہیں ہوتا' اور تبیش طبعی موتی ہے۔ آخری درجوں میں مکن ہے کہ قلب کے دائمیں جانب کافشل ہو' اور اس کے ساتھ سائس 'بیولا ہوا' استفااورزاق

مِل کی نشخیص به ترقی یافته اصابتوں میں علامات اور طبیبی اِمارات بیل کی نشخیص به ترقی یافته اصابتوں میں علامات اور طبیبی اِمارات تشخیص کوواضح کردیتے ہیں ۔ ابتدائی در حول اور مئون (quiescence) یا اپنیا (arrest) کے زمانوں کے سوائے ' سباق دی عصیان ظاہر کرے گا۔ اُن کی مشنانہ تن کے لئے ماروری ہے کہ ان کی تلوین کرکے ان کو · ہے یا . ہم قطول كى خروبىنى طاقت سە وكميا بائے - آجكل زَيلِ نليس (Ziehl Neelsen) كاطابقية نلوين عام طور بر استعمال كباية بالشهر- ايك شيشهُ محافظ برثباق كي أيك مبيتلي ته كا آلوو(smear) بیمیلا نیاجا آلور) برسند آبسته گرم کریخت کر بیاجا تا ہے ، اور میرات ریحه (slide) کو ایک مهرب سے سیس می انتخاری سے مین بار گذار کاسے مثبت كرلىب فأله م اللحل المن كا من المصول من فكسين (fuchsin) كم ايك حصے کا محلوا ی فینال نے د فی صدی میں بی محلول کے .. احصو سی سامل کرویا عِلَا ہے۔ اِسے رُم کیا عِلا ہے یہاں تک کہ بھا یہ ایسے لکے۔ آب فلم کو نیجے کے طرف رکھتے ہوئے شیٹہ کا فیظ کو اسس آمیزہ بر مین یا چارمنٹ کہ ترایاجاتا ہے' اور بھریا نی سے ومیو کرسلفیۂ رک ایسٹر کے ۲ فی صدی محلول میں ڈیورہا تیا آ ہے' یہاں تک کہ اُس کارنک اُڑجائے۔ بھر اسس کویا نی میں دھو لیا جا آ ہے' ا ورمیتعلین بلرو (methylene blue) کے تقریباً سیرت دہ آ بی محلول کے ذریعیہ اس کی ضند کموین (counter-stain) کرنی جاتی ہے ، پیمراسے ماری سے یا بی سے وصويا ما آئے تحشك كيا با آئے اور اس كا تركت زائلال بالسم (xylol) (balsam میں کر لیاجا آہے - نیز تشخیصی اغراض کے لئے بُناق کا اِٹراب ا کیٹ ئینی لگ میں کیاجا تا ہے' اور حجیہ ہفتوں کے معد ہسں جا بور کا امتعالٰ مُرخیٰ ندرن (miliary tuberculosis) کے لئے کیاما تہے۔



ب - وہی مریض استرواح الصدر کے امالہ کے بعد ۔ دیجھوا بک جھوٹا ساکہ فنہ نوز باتی ہوئشن اور حبداری بلیورا کے درمیان انضام ہے اور فلب بائیں طرف کو شاہوا ہے - (یہ نعاع نے شنین سٹرلنڈ سے لاک نے لی بی) نعاع نے شنین سٹرلنڈ سے لاک نے لی بی)

لیکل ار مافت کے ریزے ہوآخی درجوں پی بہاق کے ساتھ موجود میں خروبین بہاق کے ساتھ موجود میں خروبین بہاق کے ساتھ موجود میں خروبین سے دیکھے جاسکتے ہیں جس کے لئے اُن جیعو ٹی ناہموار کر کموں (nodules) کو جوبیض اوقات یا ٹی جاتی ہیں سوئی ہے کرید کر جیبالا اجائے اُئیا ق کو ہیں منٹ کے لئے لا کرسوڈی (auor sodæ) میں ابال کر تفل (sediment) میں ابال کر تفل (sediment) کا امتحان کرنا جائے۔ نمیکدار بافت ہر اِسٹس اصابت ہیں یا ٹی جا تی ہے کہ جس میں منت ہیں یا ٹی جا تی ہے کہ جس میں منت ہی کا فیا تی ہے کہ جس میں منت ہی کا فیا تی اور اللاف ہو۔

ابتدائی طبیعی امارات ، و تشخیص می سیفدر مغید بوسکتے ہیں ، یہ اب الک راس برگمک کی کمی (impaired resonance) اور ساتھ ہی گئی ہوا ویقلی خریر (vesicular murmur) کی گھٹے ہوئے کو بھیلی خریر کے ست کہ شہبیق فریر کے ست کہ دوران میں لفظات (râles) کی شخیص میں مرافعات (Rontgen rays) سے قبیتی مدوامل ہوتی کی شخیص میں مرافعی شعاعوں (Rontgen rays) سے قبیتی مدوامل ہوتی ہے اور ممن ہے کہ طبیعی الدات بائے جائے سے بیلے تمشیلی مناظر موجود ہوں وسحفہ ہوں) ۔ مکن ہے کہ الف و یہ صفحات 174, 168 ما خطب ہوں) ۔ مکن ہے کہ

ایک ڈاکفرام کی حرکت میں کمی ابتدا ہی سے موجو و مو۔

مختلف تسیر کے جلل ی دی مے (tuberculides) ہجب صبادیہ ماخت ہو جائیں توکسی اندرونی تدرنی ضرر کا پتہ دیتے ہیں (طاحظہ ہو بعد کے

تشخیص متم م تنابیتی نعامل کے فی ربیعی Fixation reaction)

(Bordet جس طرح کر تشخیص آ تشک کے لئے تعامل وَآزرَمن
سے مدوملتی ہے، اسی طرح تدرن کی تشخیص کے لئے بار ڈے گڑکا و Gengou)
سے مدوملتی کے تعامل کے استعال سے بیض کارکنوں کی رائے کے مطابق حال
ہی میں عدو بت انج کا مل ہوئے ہیں۔ زندہ عصیات ورندکا ایک متحلب
ہی میں عدو بت انج کا مل ہوئے ہیں۔ زندہ عصیات ورندکا ایک متحلب
تدرنی مریض کے مصل کے ساتھ ملایا جائے تو یہ متم (complement) کی تثبیت کروتیا ہے کہ خاصی کے دیا تھ ملایا جائے تو یہ متم (sensitised hæmolytic serum) کی تغبیت

کے ذریعہ سرخ خلیوں کی وَم یا شیدگی (hæmolysis) واقع نہیں بوسکتی (30)۔ نفٹ اللّم (hæmoptysis) كوتدرن كى ولالت سمجھ فينے سے بيلے يه ما ف طورير بهجان لينايا جه كذون در صيقت مشش بيسة أب أ كرمه ناک یا دانتوں سے ۔ مریض کے بیانات اکثر غیر شعی عمش یا گمراہ کن ہوتے ہیں ۔ خون بیٹیھٹروں سے کھا نیا ہوا' سرخ اور حماک دار ہونا جاسنے ۔ اکٹر مرس کے نے سے استیا حلق میں گدگدی محوسس ہوتی ہے اور منلی کا وہ احداس نہیں بوتا عرف الدم (hæmatemesis) من زياده عام ب مريدبرا ل اگرخون پھیچھڑو<u>ل</u>ِ سے آیا ہے تو مریف " زاوا نہ نزف واقع ابو نے کے بعد عمواً چو بہس یا الا تأكيس كمفنتون تك بُعاق كے ماتھ الا ہواخون تھوكے كا۔ يمكن سبے كہ پر بیکورا (purpura) بی نون کا نغث فی الحقیقت مشش سے ہوا لیکن ا سبب متلازم علامات برسے بآسانی بہجانا جائے گا۔ بعض ادّ قات نوعمر أَنْخِاص مِن مطرانی ضیق (mitral stenosis) میں نغث الدم ہوتا ہے ۔اگر حیل ہو گا المحلیہ اورکہ بتے گر (cihrrhosis of the liver) اکثرایک ساتھ بائے جاتے ہیں تاہم کا سے خون کا آنا اکثر کھیں۔ (cirrhosis) کے دوران میں مدرن سے بالکاعظیات بمی ہوسکتاہے' اور عَرْمَعُمولی بلنل شویا نی د با وُکی وجہ سے اِلحقوص مستم اشخاص من تغنث الدم كامونا شا ذبيس .

بعض اوقات من رو (intercurrent) شعبی لتها ب و و مرے راس برطبی یا د احث المری سے سل روی مخفی بوطاتی ہے۔ ایک یا دوسرے راس برطبی یا د احث المری سے سل روی مخفی بوطاتی ہے۔ ایک یا دوسرے راس برطبی اور احت کی تغییر (accentuation) اہم ہے نیز سرگذشت مرش نعن الدم (اگر وہ موجو د ہو) اور ثبیاتی میں مصیوں کا یا یا جانا ۔ تمل الشعب (bronchiectasis) کے ساتھ خلط ملط ہوجائے نے امکان کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے (ملاحظ موجو د ہوتی ہے کا دراگر وہ ششش سے تقییم الصل کے ساتھ بخار بیسین اور لاغری موجو د ہوتی ہے کا دراگر وہ ششش سے بوکر بچوٹ بڑے تو کھانسی اور ریمی بساتی موجو د ہوگا۔ طبیعی اما دات عموماً قاعدے مور موجود موال کے ساتھ و موجود موال کے ساتھ موجود موال کے ساتھ و موجود موال کے ساتھ کے س

إنذار - اودكسي مضمي اصابتيس سنا ذبي ال قدر مختلف بهوتي بي

جمقدر کہووسل رہوی میں ہوتی ہیں۔ اگر نسس کی مشناخت اس کے استعالی ورجه میں ہوجا نے تو یہ استقدر کلی طور پر شغا باب ہوسکتی ہے کہ سریر یا تی طور پر اسکے 'لوئی آننارنبیں مائے جائے ۔ بعض اصام بو*ں میں مکن ہے کہ یہ چید ہی مہینو*ں میں مہلک ہو جائے ۔ یا حکر ہے کہ یہ وس سبس کیکہ بھاس سال تک جاری ر ہے اور اسس سارے عرصہ کے دوران میں و امنع طبیعی إمارات اورعلا موجود رایں۔ میں سرایت کی شبیت (virulence) اور مریض کی قابلیت مدا فعن یه دونو^ل تغتر نذبرعناص ببوتيه بين ادرتا و قتيكه مريض كجيه، وهنك زيرمث به ويا زير علاج ر ہے یہ اندازہ کرنا شکل ہے کہ اُن میں سے کون غالب رہے گا۔ ن بیے کہ علاج بسے فی الفور بہتری و اقع ہوجائے' یا دوران مرض مس وُفعتِ بھیٰ مریض کی محافظ قو تبن اس قدر زیا دہ ہ**ر جائیں ک**ے عصہ دراز کے اس کے عمل کوروک دیں۔ اورکسی حالت میں میں اس کے متعلق بلید بازی سیے پیشین گوٹیاں ن*ہ کر*نی جا رئیبرے کہ خاتمہ کب ہوگا ۔ تا ہم مبض عاملات کے متعملق ﯩﻠﻮﻡ <u>ﯩﭗ</u> ﻛﻪﯞﻩ ﺍﻧﺪﺍﺭﯨﺮﺍ ﺗﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﻮﺗﻨﻰ ﺑﯩﻞ- ﺷﻠﯘ ﻣﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮﻣﯩﯔ (Midhurst) کی مشاہ ایڈور ڈلینغتم کی صحت کا ہ سے فارج شدہ سِلّ کے مریضوں کی سرگذسشنتیا 'ے ما معد (after-histories) بے اخراج کے تین نا مات سال بعد يبلے در جرس ۱ ، ۱ افی صدى اموات (Turban-Gerhardt) در دئه دو برمن . ومرم فی صدی اموات ٔ اور در دئه سویم میں هم د . . فی صدی اموا ظا بْرِكْمُ لَا نْبِبِ تدريْ التّباب مخروبمي موجو دغمّاتُو يه اعدا دعلى الترتبيب و دمه، ۳ ، ۹۳، ۱ ور ۳ ، ۸ ک فی صدی سنتے۔ اِس بیجیبید گی سے اِ تُذارِ کو بهبت بدنرینا دیا' بالخصرص ابتدائی دیون س (5) - دونسری پیجیب رگیول کی موجود گی بھی ناموافق ہوتی ہے ۔ اِنذار اس وقت بہن بیتر ہوتا ہے جب کہ علاج كي وجه سے يا تو بُساق نه جو يا اس ميں عسايت ورنيد نه فرسكيں - إنداركا آنصار اس احتباط کی مقدار ریمی بوت است مومریض اخراج (discharge) کے بعدا پنے متعلق نتیارکرے۔ باہموم و و مرفع الحال اشخاص کے نسبت اہل سرف سرکی مالت میں بہت برتر ہو اہے ۔حل مجی اس مرض پر ناموا فق ا ترر کھتا ہے :

اوریدامرا بتدارٔ زیکی کے احدمثا ہدیں آیا ہے۔

تخریزی نازه ہوا اورعدوغذا بھی کہ مریقن سل کے لیٹے ما لول والدین کے بچوں کے لیے بھی منا سب ہے ۔ ایسے ہی والغ سے وہ اس محصنیہ کے مقابلہ کے لئے اپنی یا فتوں کی تو ت مدافعت ہتیرین طور پر بڑھا *تکنتے* ہیں۔ اُن سلول مریضوں ٹو *چوست و*ی کرینے والیے ہوں اس خطرے ہے آگا ہ کردنیا ماہئے کہ اُن کی اولاد بی اس مرمن کے نمو ایب ہوجا ہے کا ا مکان ہے۔ اسی طرح ایک تندرست زوج کو سرابیت بوما سے کا حریے خطاہ ہے ۔ اگر کسی مکان میں اک سلول مریض ۔ متاہدے تو و و سرے تندرست مکینوں لور ایت کے خطرو سے اپنی حفاظت کرنی ملے سیٹے۔ مریض کو ایس علنحدہ کرے . سونا چاہئے جس میں کوئی دو سرا نہ رہے ۔ دری**ے بی جامے**(underclothes) اورمیٹ**و** کے کیڑوں کو ومعو نے سے پہلے گرم یا نی میں تمبلیا لینا چا ہیئے۔ مکا ن میں وافر ترویج مونی ما سے مام اصابتول میں ساقوں (sputa) کوایک عفونت کش تیال (a فی صدی کاربولک کے محلول) کے اندر تھوکنا (eject) بیا ہے او لِآلاخر أ تفيل وكس منت كم المينة موت يا في مي منكشف كركم بين (unocuou) بْنَالِيمَا بِياسِئے۔ ندرنِ زوہ مائیں اسپے شیرخوار سچوں کو دو وَھ نہ مِلَا مُیں۔ علاج ۔ایک ابتدائی اصابت کے لئے اہم ترن علاج کا ل سکون وارام ہے بہاں کک کہ کوئی تب باقی زرہے اور مزمن اصا بٹوں کے لئے ایک زری عام بہے کہ ہر ہفتہ میں ایک ون مبتر میں گذا را مائے ۔ دیگر ضرور ایت می اروموا (ملاحظہٰ

: ہے کہ ہر مِننتہ میں ایک ون بستر مِیں گذارا مائے۔ دیکر ضرور ایت کا زوموا (طاخطۂ صنعی 5) اور مفرط عدہ غذا ہیں ۔ حتی الامکان مریض کو ہے محنت اور بے غمر زندگی بہ کرنی چاہئے ۔ عورت میں عمل نہ ہوسے و بنا چاہئے 'اور اگر حمل تسروع ہوگ ہا ہوتو اُستہ ابتدائی درمہ ہی میں صنتم کروینا چاہئے ۔

تدرنی مرایت کافیوت ہم کینچنے کے بعد مندرم بالا مقاصد کو دنظر کھار علاج حتی الا مکان فی الفوس شروع کرنا چاہیئے ۔ علاج کے کار آمدطر یقے دوگر و ہوں میں نفسیم کئے جاسکتے رہیں : ۔ عمو هی سینے صحت کا ہی علاج ' تبدیل آپ و ہوا کے سانفہ یا ہمکس کے بغیر۔ نوعی (specific) سینے ٹیو برکیولین کا علاج ' معنوعی استرواح الصدر (artificial pneumothorax) اورسا منوکر آسین (symptomatic treatment) علائی علاج (symptomatic treatment) مجی حب صرورت علایم لانا جائے۔

صحت کا هی علاجے (sanatorium treatment) محت کاری علاج کا اولین متصدیہ ہے کہ مریضوں کو من کے متعلق کا فی معلومات ماصل کراد ہے جامی ک تألهوه اپنی بافی زندگیا ب ایسے حالات کے تحت بسر کرسکیں جوشفاکے لیے ساڑگار ہوں۔ دومرامنصدیہ ہے کہ کم از کم تین مہینوں کے عرصہ کے لئے ' جھے اس سے بہت زیاد و طویل موناجا ہے' ایسے مالات بہم پہنچادے جائیں جوان کی شفایا ہی گی ا تبدا کرنے بیں مد ہوں۔ مریفوں کوصہ سے زیا دہ گرم نہ رکھنا جاہیئے کیو تکرمبردی متول (metabolism) میں بہیج بہنجاتی ہے ۔ وہ علاً دن عمر اور رات عمر کھاکی ہوا میں رہنے ہیں کسی کھلے مقت ام پر کیا ہو ا اور مینہ سے بچاہے و الے مخوط مقامات (shelters) میں بونے کے کرے اور دن کے کرے کامل طور برتر ویج افتہ ہو گاور یہ کرے ایسے بنے ہوئے مول کہ گروو منا کے اجتماع کوروکیں۔ مریفول کوعدہ غذا و یجاتی ہے ' معنے روز اند ساوہ گر مختلف قسم کے تین کھائے دیے طاتے ہمں ا اور کھانے کے بعد بھی ہوئی غذاکو تول کر اس امر کی احلت یا طار کمی جاتی ہے کہ وہ غذاکی کا فی مقدار کمائیں ۔ ورزمشس کی اجازت صرف اسی دقت و پہاتی ہے جب کمہ صبح کی میش طبعی درجه بیر' اورت م کی میش (مستنقیمی) هر و و سے او بریذ ہو۔ ورزگ میں کوغالیاً کچھ عرصہ کے لئے بڑمعاویگی۔اگریش ایک گھنٹہ کے آرام کے بعظ بھی ورجه برنه گر جائے تو ورزمٹس موقوف کروہنی چاہئے ۔ مریض آ ہستہ حلینا شروع کرا ب إور بيمر ورزئس كى مِقدار تبديج برمائي جاتى ہے۔ بيرطال و و كھانا كمعاف سے ایک مکفید سیلے اور ایک مکفید موریک ارام لیاہے ۔ اور اسے تنارورز مشس اور يتجان بيداكرين والدكميلول يا تغريجات لي ما منت ب- مريض كالهاس مواكى تیش کے مطابق ہونا ہا ہئے۔ اس نظام کے مطابق علاج کرنے سے بہت ہے مريضوں کو عارضی طور پر فائدہ بہنچاہے اليکن سس برتمين ما ہ کے عرصہ رحب کے لئے و و بعض ا و قات تجویز کیاجا آہے) سے بہن زیادہ مدت تک علی پرا ہوا اجائے۔

منحتٰگاہ کی ایک ترقی یا فتہ صورت مدنی لوآ آبادی (colony) ہے' جہاں مریض معدا ہے خاندان کے کم وسیش متعل طور پر اضلاع میں موافق حالات کے تحت روسکتے ہمیں اور کوئی ایسا پیشہ انتخام دے سکتے ہمیں جوایک حد تک انکے

علاج کے معارف پوراکرو تیاہے (31)۔

تنب بل آب وهوا عرفا جرمقال نتخب کے جاتے ہیں وہ جسنوبی اور نیون (Davos) کی بلندیا سے کا جاتے ہیں وہ جسنوبی اور نیون کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

مِهِ أَن مُون فاعلى مِورُ اورمونت كرد برِ تغيف بنار عنت الدم وغيره مول وإل

ذراہی کم رکھا جائے میں پر نعامل حاصل مؤتاہے ۔ اِنند بیرنموی اصا بنوں میں معال لرناط ہے' اور تعامل کی مضناخت کی غرض ہے بورے ومرا ن علاج میں تعیشر یه ا منتیا طاد بیمنی جا<u>ست</u> و ۱ بتندام ایک نهابت تختیزی نوراک دینے ^بن نس رِ کوئی خطیرہ نہیں' منشالاً خواہ کوئی تھی تجہنر استعال کی عالے اس کے اور و سب کمی میٹر ٔ بھرتین یا عارونوں ہیں اس کسے ددنی منفدار بعینی ہوں ، کمعب لمی مبشر محبیرات نه بن عرصه کے بعد اس سے دونی مقدار معنی مهور رکھیں کمی میشر م اور بجرانت بي وتفول سنه و يا سبغت بين وويار اسي طرح برُ عني مو في مقدارْ بهان کک که ایک خفیف مقامی اعمدمی نقامل شا بدے بس آئے اسیعے متعام استراب برقدرے دبازت، با بخا ، وروس کمندی وغیرہ ۔ یہ علالمت عمه ما 'بوبيس مُكفنت ميں واقع ہوكر تعتريباً اشنے ہى مرصوب رف ہوجانے ہيں۔ بھير تین با جار دن کے بعد آخری خوراک مکررو بناجا ہے۔ جب کہ تعامل اگروہ واقع ہزتو کم ہوگا' اور طبد ہی میں خوراک کو ئی تعامل بیدا کرنے یں بالکل نا کام رہنگی۔ اس کے بہ معنے میں کہ اس مقدار کا تحل (tolerance) پیدا ہو گیا ہے۔ اب ہر نصف بمفتے کے وقف ہے نبیتہ بہت تھوڑے اِ منافوں کے ما تو مقد ارخوراک كوبرصانا جاہئے بہاں تك كه ايك تعال واقع بوجائے اورعلیٰ بذا لقابات اسی طرح نرصاتے رسنا جاسے ۔ اس علاج کی مت جمعد او سے اعمارہ او یا دوسال مک کی ہے ۔ بنرا نیک (Beraneck) کی بنا کی موئی ایک ٹیو برکٹو لین کا ورون بلدی را وسے انشرار ہے، کیا جا آہے ۔ مُصنّا تِ دَر نبیہ کے شمی غلافت کو علمدہ کر کے بنائی ہونی ایک حدرین کے استعال نے کھے نتائج ستایج ستایج بس (34) _

اگر کہنغہ میدر کے اندر ہوا کا اِشراب کیا جائے تو بھیپیٹر اوَب کر بچک جائے گا 'نیز یہ متلی ہوجائے گاجس سے اندال کوید دہنمتی ہے (65)-

یکلیدان اصابتوں میں خاص کر موزوں ہوتا ہے جن میں ایک شن تو وہ میں خاص کر موزوں ہوتا ہے جن میں ایک شن تو وہ میں ایک شن ترک ہے ۔ گذشتہ زا ذہیں یہ بالخصوص ترقی ہے اصابتوں کے لئے کام میں لایا جاتا تھا 'لیکن موجودہ رجان اسے زیادہ و کسیم طور پر استعال کرنے کا ہے نی المحتیقت بیک جانبی مرض کی ہر اصابت کے لئے جس بی تدفی علی جس میں تدفی علی جس میں تدفی علی جس میں اللہ میں استعال کرنے ہوتا ہے۔ اعدادو شارکی شہاوت موجودہ کہ یہ علاج مغید ہوتا ہے۔ اعدادو شارکی شہاوت موجودہ کہ یہ علاج مغید ہوتا الصدر عل لای کا اللہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ ک

خاص داعيه ہے۔ إس علاج كوم عنه و من واضح كيا كيا ہے ۔

آلدر اسل ایک مبزل اور فولچی (water manometer) برشتل بوائج جواولا ایک آبی فضار بها (water manometer) سے فوق بور انداز ایک آبی فوا بھر انداز بور کے آفذ (receiver) سے فمق ہوتا ہے تاکہ ہوائی ایک نبی ہوئی مقدار سینہ کے اندا واضل کی جاسکے ۔ جلد اور ممبق تریا فتیں ہوئے تاکہ ہوائی ایک نبی کو کوئین (novocaine) سے عدم الحس کر کی جاتی ہوئی یا تو برا و راست یا جار کے آریا رایک خیف ماشکا ف مدم کر کیا یا جاتا ہے ۔ اور یہ امر کر سوئی کہ فی کمیٹر اسکے اندر ہے فضا رہا کے سیال کے سیال کے ایم منز از ات سے سندا خت ہوجا آب ہے ' اور بلا مشہ یہ بیال ایک منی وہاؤفاہم کے امتز از ات سے سندا خت ہوجا آب ہے ' اور بلا مشہ یہ بیال ایک منی وہاؤفاہم کی ایم ایک میٹر ہونے جا بہ ہیں ۔ اور اگر امتز از ات بی سے میں ان کا ایک منی وہاؤفاہم ایک میٹر ہونے جا بہ ہوگا کے اندر نہیں ہے جب اس کا رائے فیص میں کے ایم نوائی کوئی کرنے کو ہوا کہ اندر واخل کری بیا ہوگا کرنے تک ' اندر واخل کری برائے کوئی ہے ۔ ایک بہند کے بعدا در بوا کا اشر اب کیا جا سکتا ہے ۔

بواکی کمر تجرتی (refila) اس گمیس کے جذب کے تحاظ سے . . ه تا . . م سیسی کی مقداروں میں اور ابتدائہ ہفتہ وار یا بیدر و روزہ و قفوں سے ہونی جائے اگر چہ بعدمیں زیادہ طویل و تفے و ئے جاسکتے ہیں'کیو کہ خدب نسبتہ کم موگا ۔ اسے مین سال یاز اندع صد تک جاری رکھنا چاہئے ۔ آخری دبا ویا نی کے بد ۔ اکینٹی میٹر سے

ه زائد دنیو فایلیت به ز ما بهٔ ماضی من نمامس حاوثه مواکی سدا و میت (embolism) باعث برواج - ليكن اگرموني في الخينقت بليورا في كهفه كے اندر بوتو يد كمجي واقع نہیں ہ*وسکتا[،] اور بہی منعبد فٹ ایسا کے رکھنے کا ہے ۔* بالک*امٹ ذاصا* تبول میں ناگوار اشرات ، یعنی بُهراور انتلامات شحوب بلکه بعض او قات بے ہوشی می شاہد میں تنے میں جو بلیورائی معکوسہ (pleural reflex)سے منوب کئے جانے ہیں۔ معض اوقات واسط (mediastinum) كمزور موتاب اوريّا ما في مقابل ما نب کی طرف بُٹ جا آہے ۔ بہس میں مکن ہے کہ بے آرامی اور بُیرِ ہو جائے۔ یہ طالت ما توں سے باسانی سناخت کی جاسکتی ہے 'اور یہاں اس امر مرزور وبینا یا ہے کہ علاج سے پہلے اور شروع سے آخر مک بسراسا بہت کو لا شعاعی بردے پر عکس ٹوال کر دیکھنا(screening) صروری ہے ۔ بعض اوقات ملیور آندرست جانب تُوغبار كي يا فته 'يُوما لا بيا الكري إلى الله balouning'' of the pleura'') تميكن اگر اميا الأكسى علامات کے مؤتوکو فی مضا نفونیس ۔ تقریب ا وصے مربینوں میں علاج کے دوران مِي ايك صاف الضباب نموياب موعا أب يجب يد منودار موجائ تويه علاج لم فاعلی ہونا جا ہے کہ کیونکہ لمپئورا میں الہّا ب موجو و ہے : ناوقیتیکہ میشِ لمبند یہ ہموال ا یال کو نکا کینے کی ضرورت نہیں ٔ ا درِ اگر نکا لاجا ہے تو اسس کی جگر کیس مجروینا چاہئے۔ استرواح الصدری علاج کی ایک توسیع جو بالکل انبتدائی اصا تبول کے کھٹے َل ہے' یہ ہے کہ کہفڈ بلیٹورا کے اندر ہوا کا ایک خیف حجر داخل کر دیا جا ہے ' جو فنش کے درائخیۃ صفےکے گردمجتم یا ماجاتا ہے اور ایک جزئی ہبوط پیدا کروتا ہے ورأنحا ليكة ندرست حصه يجيلا موار نتاب يجزئي استرواح الصدر دوجا نبول بربيدا لیا ماسکتا ہے۔ لیکن ہواکی کرر بحرتی (refills) اِر اِرعل میں لانا جا ہے (35) جب متواتر ہوا بھرنے کے باوجود استرواح الصدرمیدو وہوجائے کا رجحان رکھے'یا جب ایک تدر فی تعییح الصدر (tuherculous empyema) بیما بروجائے تویہ نزئمیط لعمہ (oleo-thorax) على من لافة ك واعيات بي (الماضط بوصني 137)-بیب کمل یک جانبی استرواح الصدر کامیا بی کے ساتھ انجام و ہے دیا گیاہئے تو، 4 نیصدی مریض کام پر واپس جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیکن ک

ريوي ندرن على طب يعلدود

علاج میں خاص دقیت' از عنوا مات (adhesions) کی موہود گی ہے' جو **بہو ما** واقع ہمینے ى مزاحم بوتى بىر) اورسس صورت بى حرف سوس فى صدى كاميا بيا ك موتى بىل-وتستعيدا نتراب كل من لامنے كى كوشش بذكى جاسے انضامات كوتشخيص كر نا ن ہوتا ہے ۔ بعض اوقات متواتر مجر نبوں (refills) کے بعد وہ نو د بجر دِلوٹ عالمیں گے ۔لیکن جب ایبا نہ ہو توا ن کو قطع کر دینے کی کوششیں عمل میں لا فی کئی مین مقام ایک صدر بین (thoracoscope) وانل کر کے کیا جا آ ہے اور پیمران کو کی کردیا جا اسے به بیمتی سے سونتم کے ملیہ کی کا ردوائی تدریی میم الصدر بید اکردینے کا رجحان رکھتی ہے تا وفتیکا نصابی بند کو تشیک تمیط پر نة قطع كياجائ - طال مي من كئي نئي قسم كه ألات بيان كئے كئے بس (57'56)-حال ہی میں وو دوسرے علیے اینی سینہ بیوندی (thoracoplasty) اور طُع عصب و ابا فرائی (phrenic avulsion) کامیا بی کے را تدعن میں لائے ۔ میر بینالے بلونلی (thoracoplasty) میں کیسلیوں کے محصے مصر زاو ہو کے ذراسائے کے نتمام سے لے کر فقرات کے مشعرض زائدوں سے جنعد رحمٰن مج اسفدر قریب تک براول بلیبورانی طوریه (extra pleurally) نکال وی جاتے ہمں۔کامل سینہ بیونہ ی میں تہلی ہے ومنویں کیلی کے رسے کیے ۔ حصے مُكَالِ ویکے جانبے ہیں کیکن کُرُن اصابتوں بیٹ جن میں مرمن زیریس کنچتہ بیس محدود ہموبالائی پیلیوں میں سے جند سیلیا س سالم محیور دی جاتی ہیں۔ بلکی ا نیخری عدم حتیت (light ether anæsthesia) کونز جیجے و نبی جائے ۔ اس عما کے بعد بینتالیس نیصدی مریض کام کے قابل ہو گئے ہیں ((36)) قِلم عصہ دا ما فوا می (phrenic avulsion) می گردن کے ایک نسکات کی را ہ سے ایک طانت کا فرینک عصب اُس کی ڈا اُغرام کی جیسیں دگی کے متعام سے اوپر کھینہ لیا *جاتا ہے جب کا نیتجہ یہ ہو تاہے کہ اُس جا*لنب کا فو ا نُفرامرا دراً ٹلو آ یا اور شدل موحاً مَا ہے۔ یه علمبهم معنوعی استرواح الصدریا سینه پیوندی بی مغیب بیل ^{ای}ا تفاعدی ل (basal phthisis) میں یا کمانسی کورو کنے کے لئے (جب وہشش د ا نعنام ڈا نفرام کے ماتھ ہوجائے کی وجہ سے ہو) عمل میں لایا جا سکت ہے (37)

سینو کو ایسیان (sanocrysin) ، جوسومے اور موڈ ہم کا ایک (thiosulphate of gold and sodium) سے أن مربيغنوں كي عالست يي امتعال کی جاسکتی ہے جنہوں سے دوسری تشمواں کے ملان کی ایمی جمیبیت نہ فاہر کی بور وعوی کیاگیا ہے کہ یہ میں مُصنیا ہے در نید ہر ایک راست متلف اشر ی سے میتیم ایمبولول (ampoules) می تعقیم ایمبولول (ampoules) میں تعقیم ایمبولول ر اگروم کی وزن کروه مقداری موتی میں . ہنتال کستے نی انغور پیلے ہسس کی فلمیں تقیم ا ب منظم نصیده میں مال کر کے ایک وائی صدی معلول بنالیا ما آبیے ۔ اس علول کا *دربدلی ز*اہ ہے اثیرا ب کیا جا تا ہے ' جس ہیں اس امر کی امتیا طارکھی جا تی ہے کہ ستحت إلىجلدى بافت كے اندر تراوسٹس (Lakage) نہ رہوسے باے جہال وہ غِراِلُّ اورا شرر کمتاہے۔ مقدار خوراک کا تعین مربص کے مہم کے وزن اور عیلیم اس کے اس البّها بی تغیر کی نوعیت کے نما طسے کرنا بیاہے کان اصابتوں میں بن میں مرض مزمِن ہوگیا ہو' اور مررات لیفی ساخت ہے تحصبور ہول ایک بری دور آگ دی جاسکتی ہے ۔لیکن حاد اصابتوں میں جن بیں مرض کی توسیع حال ہی ہی ہوئی ،'و' ایک ننبتهٔ بهن کم خوداک دینی چائے ۔ علاج تروع کرمنے سے پہلے اور ورا نِعلِج بیں روز انہ قارورہ کا امتحا ن لیمون کیلئے کرا جائیئے اوڑا وفتیکہ قارورہ اڑ تالیس گھنٹے تک البیمومین ہے معرا نبو دو اکی خوراک نہ دینی چاہئے۔ مریض کے وزن اور ضررات کی نوعیت کے لحاظ سے ابتدائی مقدار خوراک ا ء . تا ۵ ء . گرام ہو گی ۔ مکن ہے کہ تعالى التفاع سرارت عفي البهال إطدير توراني طفيات exanthematous (rashes كي موريت بي ظاهر مو - جول بي كر تعامل دفع بوط ئ إ الركوئي تعامل نه موتو ارسالس مَفظے کے بعد ووسری خوراک دی جاتی ہے جرملی کے كنسب . د فی صدی زائد بوتی سب . رس کے بعد مرساتویں ون ایک مزید خوراک دیجاتی ب من كى مقدار اگرم يض أس كى برداشت كرسكے نوايك گرام تك برمعاديجاتى ہے۔ ایک اس نصاب کے لئے مریض تے لئے اس نصاب کے لئے مریض مقدار مرا اگرام ہوتی ہے اور اسس سے بلکے مرمیوں کے لئے اِسی تنا سب سے لم مقدار دیجاتی ہے۔

علاماتی علاج ۔ صحت گاہ میں دوران علاج میں دواوں سے حتی الامکا استراز کیا جانا ہے اور عمواً یا باجا آ ہے کہ مریض کی حالت میں بہتری ہونے کے ساتھ ساتھ علامات غانب موجاتے ہیں۔ تمام اصا نبول میں بیر مفروری ہے کہ منتعلہ دواول سے مامنمہ بیر خلل نروانع ہونے دا جائے۔

کما نسی ۔ کھنی مواوا تے علاج میں ہمیتہ کمانسی ہیں سریج تعلیل مثافی نی ہے۔ حتی الا مکان مریفن کو کما نسی کوروکنا جا ہئے۔ اگر کمانسی ہونے سے پہلے مئن میں گدکدی محرسس بونوں نی لوزہ (Ingual tonsıl) پر آپر ڈین کی تصبیع ابن مغید برسکتا ہے۔ ور ذکھا نسی کا علاج م سی طرح کرنا جا ہے جیا کہ شعبی لتہا ب

(liquor فین کاکرونیوان کے تحت بیان کیا گیاہے۔
سب عرقی (night sweating) یا گارا پڑو بین سکف atropine sulph.)
الکرا پڑا فرزیک atropine sulph کا ایک قطرہ قدرے یا بی کے ساتھ بخب کو وینے سے یا ایک آل پڑا فرزیک (oxide of zinc) کے ساتھ بنین کے گرمین اکری پڑا بیٹ آف بیلا ڈو تا (oxide of zinc) کے ساتھ وینے سے عمو ما ایک بیل بیٹ آف بیلا ڈو تا (extract of belladonna) کے ساتھ وینے سے عمو ما ایک بیل بیٹ آف بیل ڈو تا (arseniate of iron) کے ساتھ وینے سے عمو ما ایک بیل کی بیل ویک بیل کے بیل آف آئرین (pierotoxine) کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کے بیل کی بیل کرانت کے وقع میں کو تو تف بیل کی بیل کارورش سے طبیب کی اس نگھ داشت پرجواس نے مریفن کے متعلی کی بیل از روزار در ہوتا ہے۔

الزامودار در ہوتا ہے۔

نفث المل مر مض كو بستريس نيم المطاعي وبمع بدلين كو المتريس المعاعي وبمع بدلين كي المات posture)
مين ركسنا جا مين أليكن بب وه جا مين النبي وضع بدلين كي المات posture)
ديني جائب مسب سے زيا وہ كاركر حاليس الدم (hæmostatic) كيليئم كلورائد كي جائب مين كاآ مسترسے وروں وريدى انتراب بے ملك من المام الكرم كورائد كي اورين وسي جائيں الكرم الكرم كورائد كي الورين وسي جائيں ۔

ا سیمال - اس کے لئے ہمیں اصتباط کے ساتھ غذا کی باقاعد کی مل ب الان اور نباتی ما برات (vegetable astringents) معدنی ترشوں mineral) معدنی ترشوں (sulphate of copper) معدنی و acids) کا منافی کے گرین کی خوراکوں میں کمنیٹ آف کا پر (carbonate of bismuth) کا انتہال کرنا جا ہے۔

فلیکول فی التها ب کے درد (antiphlogistine) کثیر الوقوع بی اور المشان میں ایشی فلاجسٹین (antiphlogistine) یا تعربومن و (thermogen) کا تعربومن و (antiphlogistine) یا تعربومن و wool) سے یا سط سینه برنکی آف او دن کی تصبیغ کردینے سے تختیف ہوجاتی ہو۔ مرکن ت سے مسئول کی ضورت برسکتی ہے ۔ بہتوں کا مرکن ت سے کہ بلیورا کی البتها ب کا انصبا ب (pleuritic effusion) تنا کوشش میں مرض کی ترقیبین تا خیر کرد تیا ہے ' اور تا و مسئیکہ دباؤ ا نتہا ئی ورجہ کا نہ ہوجائے و و بزل مرض کی ترقیبین تا خیر کرد تیا ہے ' اور تا و مسئیکہ دباؤ ا نتہا ئی ورجہ کا نہ ہوجائے و و بزل مرض کی ترقیبین بیس لاتے ہیں تھیج العدر میں تنویخ (tapping) کی ترکن کی استصاص (aspiration) علی میں لانا جائے ۔

عل مي لا نا مغيد ، يوسكتا ہے (الم خطه بوصفحہ 137) ۔

ر برگرش انشکسِ ل

علاوه شعبات کے تقرحات کے اور ان سے پیلا ہوجانے والے مسنسیق (stenosis) کے جو ا تشک کے اعث ہوناظامر رہو تھکے میں اور بوشعب بینی (bronchoscopy) کے دیکیٹ خیص کئے ماسکتے ہیں (64) '' خورششش کی بافت اس مض کے اثرات مختلف شکلوں بین ظاہر ارسکتی ہے ۔ ایکشکل عمولی معنیه (gumma) کی ہے 'جو اِلغوں میں نہایت سٹا ذہبے' اگر چیر شیرخو ارول میں زیادہ عام ہوتی ہے' اوركوئي قابل سنناخت سريرياتي علامات نبيس پيداكرتي - دوسري شكل لم تنشكي شیرنیوارول کی نام نهاو ذا وت اگریدا بیض (white pneumonia) ____ے۔ اس میں بمبرطے بڑے سپید کتیف اور سخت بروجاتے ہیں۔ ان کی ترامضر اور فیرشفات بو تی ہے، بعض او قات وہ مزاحم (resistant) ہوتے ہیں، اور بین اور منتشر ملوی التہاب اور بین است کا منتشر ملوی التہاب اور ساته، ی بوفنری دیوارول کی و بازت اور روی سرطمه کاتش (desquamation) اور می انتظا دا ظا ہر کرتی ہے۔ مکن ہے کہ یہ حالت پورے شش کو اوف کرو سے کا ایک حصد کمیا س طور برمتنی موجائے اور دوسرے میں محض انفرادی (isolated) دقیے موج د ہوں ۔ ایک دوئری تسم میں جو فیزوں میں مکتب سرطمہ کا اِستر ہوتا ہے' اور تومیلی! فت کی مگدلینی پیکل (fibrous stroma) لے لیا ہے محرکمب جوفیزی رطمر کے خلیا ت سے در ریختہ ہوتا ہے۔ ان اصابتون میں بیم مویے (spirochætes) یات کئے ہیں۔ چونکہ بہضررات بالمخصوص مردہ مولود بحل (still-born children) مي بي إسع جاتے بي لېذا إن كى كوئى سرير ماتى أبميت بنيں ـ

زمرو ملی کمیں کرمن کو بیلے بیل جرمنوں سے مطاقات میں جنگ میں ستعال *كيا تما مندرجر ذيل نتين : - (١)* أغتصاص آفرين - ان كيسول كاتل النفو^ل تشش كے جونیزوں پر ہوكرجا داً ذیبا عوق شعریة كی علقیت اور شف تی نف اخ (disruptive emphysema) يدارو ما آتما - شفاياب موماسة والمدم يينون ك أ فريما بي سسّيال حيند روز مين غائب جومإمّا تها' ليكن شعبي البتاب اوشعبي ذات الريم اكثر بيد اجوماتا تما اورنفاخ مارى رتها - (۱) اشكس يركيس بريي كولوك میں آستنمال کی ماتی تقیس شلاً زائلال برومائٹر (xylol bromide) اور کلورو کمرتان (chloropierin)- (س ري ري کي گليس (mustard gas)- (يه در هيمت آبات ر دغنی ا مُ ہے جوزمین پر یا کیڑوں پر حیور کی ماتی ہے' اور آ ہستہ آ ہشہ تحارین کر اً را جاتی ہے) ۔ جند گمنٹول کک رائی کی ایک خنیف سی بوکے سوائے عمواً اور تیجہ نهیں محبوسس موتاتھا ۔ تھے رست دیدائتها ب منتھہ (conjunctivitis) شراسینی ورو اور اس کے ما تم قیے ، مِلد کا وسیع مجیلا ہوا احمرار (erythema) اور اس کے ماتھ ا نفاط(vearcation) موكرشديه حرفات بيدا مومات عقر، نيز منفسي خطي كي مثاك فاطی کا البتاب مواب بوماً اتما مس سے نبایت خطرناک طلاعت سدا بوماتے من من من من من المراكب فالبريني جلى سن وصل ما تى منى اوراً وى طورير 177 سرايت زده بهوجاتي عتى إورا كرموت في الغوواف نبوتى عتى توشع في الدينودا موجا اتحا-ا بعدا فرات كس معموم شده ببت معمر النولي جمدى علاميد effort ") ("syndrome رَكُ اللحظريو) نوياب مومآلي - علاات بين شابدي آئي بي ايشات کرمنے یا زور لگانے پر منٹ کا بھول جا، (2) مواقل کھائنی معد ثباق کے (س م)سینے واریا وويانكي (٢٥) انتباع اورمبي عكيرة ما (١١) صبحكابي في المستلى (١٢) ورمر(٩) منعف الاعتبا له - توسین کے اندر جو ار و و اعداد درج کے گئے ہیں وہ آکنور ڈرقنبی دانع ٹنڈم مامابر مِن علامات كافى مدى مدوث ظاہر كرتے ہى -

رائی کی گیس کے زہر کے مختلف ریوی عواقب بیان کے گئے ہیں ہونی بین بی بیت سے اکبس (relapsing) نوعیت کے ہوتے ہیں ' یعنے شعبی البہا ب ' نفاخ ' وَمه ' اُ وْ ہِیا ' اور ریوی خرا جات اور" تدرّن کا وْ سب " - localosis") نفاخ ' وَمه ' اُ وْ ہِیا ' اور راسی لغطات (reseudo ' عبی کے ساتھ لاغری ' بخار ' شعبی البہا ب ' اور راسی لغطات (apical râles) ہوتے ہیں لیکن آبیا قی میں عصنیا ت وَر نبہ نہیں ہوتے ۔ تمکینی فی است ور نبہ نہیں ہوتے ۔ تمکینی فی است ور نبہ نہیں ہوتے ۔ تمکینی فی است ور نبہ نہیں ہوتے ۔ تمکینی کی اوج سے معزت پنجینے کے بعد ہوجاتی ہے۔ کے باعث بیدا ہوجاتی ہے۔ اور یہ کہ تجیمی اول کے حقیقی تدرین کا ملنا مکن ہے ' اور یہ غالباً اُن مربینوں میں بوتا ہے جن میں یہ مرض پہلے رک گیا عقا۔

ربوي سدا دتيت علقتيت

(PULMONABY EMBOLISM AND THROMBOSIS)

رواویت (thrombosis) اورعلقیت (embolism) کی نوعیت برامران عود ق دمویه کیلاب میں بحث ہوسکی ہے کیکن بہال ربوی دوران خون کی انتظام

منکار کاین طاتا ہے۔

استعدادول كابيان ورج كرنامناسب ب بني كى وبديد يراس ماونديس مبلا بوطا

شریان ریوی اوراس کی تمانی و کی باید ایران اوران کی وسطت سے نظامی وریدی تنون (svatemic venous trunks) سے را ست ا بیاط کمتی ایک و ملت سے اسی وج سے دقیق عضو ایول منجوزون کے یالسی وویر نی قسم کے ریزوں کا جو بہت یا جوارح کی وریدول میں آزاد ہو بائیں قلب ہے دائیں کہ غول میں اور وہاں کی اور وہاں کی وریدول میں آزاد ہو بائیں قلب ہے دائیں کہ غول میں اور وہاں کا اندر منفر یا ان وہ اپنی جمامت کے لحاظ سے اس کی کسی بری یا قیمو فی سشاخ سے اندر منفر ذیہ وجائیں گے ۔ ایک بڑا ایران ورقد وار (laminated) متعکا بری گائوں نے باک بنا علقہ (thrombus) ہوتی کو کر سرود کر سکتا ہے۔ بیمن اصا تبول میں مداد بیت ایک بنا علقہ (thrombus) ہوتی کو کر سرود کر سکتا ہے۔ بیمن اصا تبول میں مداد بیت ایک بنا علقہ (thrombus) ہوتی کو کر سرود کر سکتا ہے۔ بیمن اصا تبول میں مداد بیت ایک بنا علقہ (thrombus) ہوتی کو

جوایک متوسط جهامت و الی نظامی *ورید سند تنظیاً ہے اور د*ہرا ہو*ر کمی* بند کی

روی سدادیت کے نسبت رایی علقبت زیادہ عام ہے اور اسے مرات طاہر کرنے والے بہتیں متوالی لاموں کے امتوائی (antopsing) بردہ فی صدی کا مرکز نے واقع ہوئی ۔ پیمیر لمول کے تمام صول میں نمریان ۔ یوٹی نیاث موں می نمون کے محکول میں نمریان ۔ یوٹی نیاث موں می نمون کے تحکے پائے جاتے ہیں اور ان تحکول میں تعضیہ (ante-morten) ارباک کی ترمیب کی ابتدا ان کی قبل الموت (ante-morten) کو ین کی شہادت ہم پنہا تی ہے میں اور یت کی انتخاص ممواً یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک خطر ناک فررموجود ہے 'جو مجسیم لمول کے اندروسیع جسلے موئے اثرات بیداکر دیت ہے جسلے موئے اثرات بیداکر دیت ہے جسلے موئے واثرات بیداکر دیت ہے دیں اور جس سے ملامات مزوری التوجہ ہموئے دیں اور جس سے مداک دیت ہے دیں اور جس سے مداک دیت ہے دیں اور جس سے مداکہ دیت ہے دیں التوجہ ہموئے دیں اور جس سے مداکر دیت ہے دیں التوجہ ہموئے دیں اور جس سے مداکہ دیت ہے دیں التوجہ ہموئے دیں التوجہ میں التوجہ ہموئے دیں التوجہ ہموئے دیں التوجہ میں التوجہ ہموئے دیں التوجہ ہموئے دیں التوجہ میں التوجہ میں التوجہ میں التوجہ ہموئے دیں التوجہ میں ا

مرتیض کی زندگی فوری خطرے میں ہونی ہے۔ ر یوی مدادیت اور رپوی علقیت فغذی ورید کی علقیت سے پیڈیو ہے 'جیسی کہ تپ محرقہ' یاسل رپوی میں' یا بوڑسے اشخاص میں عظم انفخذ کے کمبر (fracture) میں واقع ہوجاتی ہے ۔ یہ دونوں حالیت صاوسرا یتول مسئٹاں' ذات الریہ سے اور ایسے حراحی علمیات سے بھی پریدا ہوسکتی ہیں جن پر شکم کی ما منے کی ویوادمین تنگاف دینے کی ضرورت واقع ہو (بالخصوص بوڑھ شخامی ا (39)۔ بہت سی اصابتوں ہی نون کے تحکوں کے اندر دقیق عصنویات بائے گئے ہیں۔ سداوات (emboli) کے اثرات اُن کی جمامت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر یوی ٹریان کی ٹری سٹاخوں میں سے ایک ثاخ معدود موجائے توموت لاز نی نتیجہ ہے۔ جب سدا د نسبتہ تچھوٹا ہوتا ہے توسشش کے اندرتغیرات واقع ہوئے کے لئے وقت مل جاتا ہے اور بیش دمو بیست (hyperæmia) واقع ہوئے اور بیش دمو بیست (petechial hæmorrhages) منٹی نزفات (petechial hæmorrhages) و نفاخ

ا ذِنْيِرَانِتُكِي اَنْتَيَاضِ (auricular fibrillation) مِنْ جِرِمطرا في خيت

کے ساتھ الخصوص سلازم ہو آہے ' آذہین کے اندر مجوفے علقہ جات بن سکتے ہیں

(میں کا دہ یہ ہے کہ آذہین منقبض ہونے میں ناکام رہ جاتے ہیں) اور کمن ہے کہ

دائمیں جانب کے علفہ جات بھی پر ول کے اندر ہنچکے خرد ترشہ ینو (arterioles)

و مدود کرکے بھی پر کے کہ اندروہ مفامی نزفات پیدا کر دیں جنیس سے یہ ولی

مفح احت (pulmonary infarcts) کتے ہیں۔ اس طرح ششش کا ایک مخوطی

صد ہو طولی ترائش میں فائد نما ہو تا ہے ' اور جس کا قاعدہ شش کی سطح کی طرف

اور داس اندر کے طوف ہو تا ہے ' کٹون مفہوط (firm) رنگ یں گہرا سرخ ' اور ماس اندر کے طوف ہو تا ہے ' کٹون مفہوط (air-vesicles) رنگ یں گہرا سرخ ' اور میں کے جب ہوا ہو جو آگا ہے ۔ اور خرو ہین کے نیجے اس کے حویصلات ہوائی (air-vesicles) اور میں ہوتے ہیں۔ اس مخوط کا فاعدہ سلح مشش پر مرخ جب اب و موجد ہیں ماہ ترین ہوتے ہیں اور اکثر سنج کے دیسے اور ای التباب کے تغیرات (early pleuritic changes) ان پر مخوط کی دائی کو رکو بڑی وسعت تک ماؤف کر دیتے ہیں۔ اسی مورت میں ان پر مخوط کی دائی کو رکو بڑی وسعت تک ماؤف کر دیتے ہیں۔ اسی مورت میں ان پر مخوط کی افاعات کی بیان پر مخوط کی افاعات کی بیان پر مخوط کی افاعات کو ایسی مورت میں ان پر مخوط کی افاعات کو ایسی کی ایسی مورت میں ان پر مخوط کی بیان پر مخوط کی افاعات کی بیان پر مخوط کی افاعات کی بیان پر مخوط کی بیان پر مواج کی بیان پر مخوط کی بیان پر مخط کی بیان پر مخوط کی بیان پر مخط کی بیان پر مخط کی بیان پر مخط کی بیان پر مخط کی بیان پر منافعہ کی بیان پر مخط کی بیان کی بیان

ایک انچے ہونے ہیں کیمن بیش ا تعات اِس سے بہت زیادہ بڑی جامت تکم

ينج واقيرس -

ان وریدی اور قلبی علفہ جات کے علاوہ دو سرے اجمام بھی سدا وات کا فعل انجام دست تھے ہیں۔ یعنے الب کے ذرات اور سٹا ذصور توں ہیں ایس بھوٹا کیسینی و ویرہ (hydatid cyst) کیکن فاضے علم طور پر رہم آفریس وت بی عضو یع بھی۔ جب آخر الذکر " تہنا یا علقہ کے ذرّات کے ساتھ نما تقل ہوکر شش میں کہنچے ہیں ' تو مخر وطی مفعات طلاہی بھوڑے بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کی ایک التہاب کو تاہے کی التہاب ہوتا ہے کا مصلی قیمی کی اقتمی التہاب ہوتا ہے کا مصلی مصلی قیمی کی اقتمی التہاب کی مسلی قیمی کی اقتمی التہاب کی مسلی قیمی کی التہاب کی کیکور ا

ریوی عرون شریه کی شعد میسکا دمیت (fat embolism) تنرکا نتیجہ ہوتی ہے ' ہو چر بی کوعروق کے اندر جانے دبتی ہے۔ جراحی تضرر ات کے سب سے موت ہوجا ہے کے بعد عید میں ماروں کے عروق شعر بیمیں جربی کے گلو یکے خروبین سے بنیابیت عام طور پر نظر آتے ہیں۔

ورشت (harsh) اور مبالند آمیز پائے جاتے ہیں۔ علامات کا آغاز نا گہانی ہوتا ہے۔ ریوی طبقیت (pulmonary thrombosis) میں علامات مائل نوعیت کے ہوتے میں کیکن حکد کا آغاز بندر بج موتا ہے کو اس کا سریع ہونا بھی کمن ہے۔

ایک مغیمہ (infarct) کے وقوع کے علامات بھی مدروونندہ عرق کی جمامت اورعلقہ (thrombus) یا مغروز شدہ ریزے کی نوعیت کے لیا ملے مختلف میوں گے۔ اكروه ايك سبيرً برى عرق ب، تومكن ب كمعلاه ت متذكره بالاعلاه ت عبشابه ہوں گروہ نسبتہ کم شدت کے ہوں گے۔مفعمہ (infarct) کا فی طور پر طرا موقومال میولی ہو کی (breathlessness) انتظاج کی بلکہ قشعریرہ (rigor) بھی ہوسکتا ہے۔ نشش کی ماخت کے اندرخون کی وِعا بدری (extravasation) اَلترا بنی موجودگی نغث الدّم (hæmoptysis) بعنے فون کے غنو کنے سے ظاہر کرتی ہے۔ یہ فون متدارس متوسط بوسكتا ہے الم چوف عدا عدا وموى باقات (blood sputa) میں یا بابا آہے یا صرف یہ ہوتا ہے کہ خاطی بُساقات خون کے ربگ کے یازنگ الوہ (rusty) مروجا تع مين - اگراس كم ساته بى البتاب لمينورا بوتودرو بيلو بيدا بوجائيكا اور مس وافعہ کے بعد کمن ہے کہ کسی قدر تموی تعامل (febrile reaction) مشعر يرو کے ساتھ یا اس کے بغیر ہوجائے معمد (infarct) حرف اسی و تنت جب کہ وہ برت برا بوز ایک اسمیت کار قب اور اموات تنفس کا انقطاع (supperasion) یبدا کرد سے کا میکین کیچہ تکت کہ (crepitation) ہوٹا کیلی مکن ہے۔ اُرکٹٹی جائے تاہیں جائے ہیں مِن مَغِم (infarct) كاستنسه موالهميت كاكوئي وسيع رقبه بإيا جائه يُوبديا وركعنا عاسية كداشلاه (congestion) اوراً: بما كي ده مخلوط حالت ننس كوتَصِلْب مُسنح (red induration) اور بحبو سرا تصلّب (brown induration) كيتے بس مِصاعی من (valvular disease) کا آیک عام تیجه بموتی سب اور اکتر مفهاست (infercts) كے ساتھ موجود ہوتى ہے۔

عفونی مغموات (septic infarcts) تقییج الدم (pyaemia) بین کثیرالوقوع پوتفے بین اور فی الحقیقت اسس مرض کی حاوشکل کے ممیز بدر المات مزرات بیں۔ پداسکات (foci) عام طور پر الکل محبو نے بوتے بین ور پیجیکاتک، (crepitation)

کے موائے کوئی میں طبیعی ا مرات نہیں پیدا کرسکتے ۔ لیکن وہ النہا سب بلیورا (effusion) اور انصباب (effusion) جواکثر ان کے ساتھ ہوتے ہیں معسمولی امارات نظام کرتے ہیں ' اور عنونی قسم (septic type) کا تمری نظام مدقت مریرہ اور بڑھا۔ اور بڑھا۔ اور بڑھا۔ (prostration) کے موجود ہوگا۔

شی سدا و بیت (fat embolism) بمب که بیما فی مقداری موج د بهوا (surgical shock) بمب که بیما فی مقداری موج د بهوا ریسی و وران کون کے تسد د کی وجه سے سد رئم خرامید (surgical shock) کے است یا ہیں :۔۔۔ بهرا است یا بیل :۔۔۔ بهرا است کے علاقات یا بیل :۔۔۔ بهرا است (cyanosis) اور مجمع کے انسان مربع است (cyanosis) اور مجمع کے است (râles) ۔ برلنطات (râles)۔

بی مربی الی الوج و معطیات بر بوتا ہے 'جیسے کہ وریدی ملفتیت کی شخیص کا انتصار سبت کی مسلوم مابنی الوج و معطیات بر بوتا ہے 'جیسے کہ وریدی ملفتیت یا عفو نت کی مسلوم موجو دگئ جومکن ہے کرکسے کمی علیہ (abdominal operation) کے ساتھ متلازم بود ۔ مرس قلب کی موج دگئ رایوی ا نعام (infarction) بدلالت کرسکتی ہے ۔ اور السی الدم (hæmoptysis) کے تمام اسباب بی رہی تمدن قلب ہے ۔ اس مین نعت کی معمون طات محفوظ تشخیص قام کرنے ہیں بڑی حد کمی ممد ہوتا ہے ۔ اس مین ساتھ مون قلب ہے ۔ اس مین ساتھ کی معمون طات کے بعد و و سراکٹیرالوقوع سبب مرس قلب ہے ۔ اس مین ساتھ کی معمد ہوتا ہے ۔

ارتکاز نون سے بیکنے کے لئے مریض کو مکٹرت پانی بیٹنے دینا چاہئے۔ عسلاج ۔ ریوی شریان سے سدا دیت زائل کرنے کے لئے اب ایک فہائتی علمہ (emergency operation) ورجڑ کمال کو پہنچا یا گیا ہے۔

درول صدری نومایه جات

(INTRA-THORACIC NEOPLASMS)

شش كااولى بطاني ملحه

(primary carcinoma of the lung)

سجن أمسياب يشش كا اولى مرطاني مسلمه بروم يس اليكن اكمشر

ہیں ،در در در داہ اسمانی عوال ہیں ہوں ۔ مرصٰی نشر مرمح بیشش کی اولی البیدین اپنے مبدار کے لعاظ سے بین گروم میں مقتم میں و۔ (۱) شعبی سرحلمہ سے نکلنے والی (۲) شعبی مخاطبی غدو سے نکلنے والی

یں (۳) برم شش سے نکلنے والی ۔ پہلے گروہ میں سلعہ بالمفعوض ایک بڑے شعبہ میں محدود بعد ال میں اور شد میں دور معددات میں ال نیاد دونتا تو نہیں مسلمتہ والک

محدود ہو تا ہے اور شعبہ مدود ہوجا آ ہے۔ یہ بالیدزیا دومنتشر نہیں میلی ، ملکه ٹوٹ کر تمدد الشعبی (bronchiectatic) کہنے بنادین کا رجمان رکھتی ہے۔ ایتوانی

ظیوں سے بنتی ہے۔ دوسرے گروہ کے ساتھ (اوریہ مجی شعبات کے گردمحدود

ہو ۔۔۔نے کا رجمان رکھتاہے) برا فراط مخاطی افراز ہوتا ہے۔لین ان سلمات میں خلتے اس قدر تغیر پذیر ہوتے ہیں کہ پیماعت بندی زیادہ مفیدنہیں۔تمام

سلعات بين يس نصغب سيد زائد سلعات بيمية نما خليون والي متم "oat cell")

(type سے تعلق رکھتے ہیں۔ نطبتے اور نواتے' جوزیا وہ گہرار نگ قبول کرتے ہیں'

ک قرمین کے اندر خطوار دو میں درج کئے ہوئے اعداد وہ فی صدی تعدادی ظاہر کرتے ہیں جو اندان ہو ہے ہیں جو اندان ہو ہے اور استانات لاسٹس (autopsies) کے تحب زیر سے لی گئی نیم اور (41) ۔

بعِنوی ہوتے ہں اور اُن کاخلیّہ ایہ (cytoplasm) علیل المقدار ہوتا ہے۔سروطاً (metastases) كمفاني غدو كه اندر عام ترين بوته بي ليكن وه وومسه اعضا و احضامیں منتف حدیک و اُق ہوتے ہیں ۔ دوسری جیب دگیاں حب ذاہ ہے۔ لِمُورا بَيُ انصبابِ(pleural effusion) (۲۸) سينه مَتِي (۲۶۵) وَمُوي (۲۰) صاحت (ه ، ۱۲۰۷) ـ ایک شعبه کا جزئی پاکامل السداد (occlusion) (۶ هه) شبی ایتما تدوالشعب (bronchiectasis) شبي ريوى النهاب بمبولمي كنگرين collapse) (gangrene ' نراج (۱۱۵) نفاخ ' کیف (fibrosis) 'اورربوی عروق کی علقیت اوران برحله "ما مور (pericardial) برحله (ه دسم) مرى برحله يا دما و (ه و ۱۹) نوقانی وریداج ف برحله اور اس کا تسده (چردان) بری نظامی وریدول کی طنبیت (۱۵) جوجو ارح بالا اور جو ارج زیریس میمال کشرت سے واقع موئی۔ علامات ۔ کھانسی (۹۷) اتبدا ءٌ خشک ہوسکتی ہے۔ مگن ہے کہ وه شديد دورول كالشكل مي جو يا تعب ياشعبات برد إد يرم كو وجست مماسي (brassy) بور وه رون كى وريدول كاعارضى التلاديد اكرسكتي - بسيات نصف سےزائد اصابتوں میں موجود ہوتا ہے اور اِن میں سے بیٹیتر میں کمتیعار نفث الله مرموج و ہوتا ہے (۳۷) ۔ دیرد (۴۷) شدت بی تغیریذ پر ہوتا ہے۔ مكن مي كروه قارس (gnawing) و فرى (stabbing) "برى (dragging) إو يا د با وُ يا دَم كَفِينِهُ كا احاكِسِ جو - در دعمواً سينديس جو تا ہے ' ليكن گر دن مشكمُ كم اور جوارح میں مجنسوس ہوسکتا ہے۔ وہ اکثر ریڑھ کے فقر ہ (vertebra) میں مرو ما (metastases) موجا سنے یا امعیاب بروباؤ بڑے سے بیدا ہوتاہے کاغری (wasting) و ۲ ه) کے ساتھ کسلمندی کمزوری اور شخرب (pallor) بوسکل سے م ليكن عموماً مريض مديم الدم (anæmic) نبيس موقع - بحكر (dyspncea) ومناموا ا من مجولی بونی سانس (breathlessness) کے جومشقت کرید یا زور لگانے کے بعد ہوجاتی ہے' اکثر ایک مِتَآ نرطامت ہے' ^ما وقت بیکہ بلیورا ٹی انصاب موجود زیو۔ دو دوروں کی مکل میں بوسکتا ہے اور اس کے ساتھ سنتی مرمرہ (inspiratory) (stridor بوسكنات واكسمريض مين شرياني خون مين وCO كا واركو برمد كسيااد

مین کی سیرسٹ کی (oxygen saturation) کم مو گرم حس سے بنایا رہوتی ہے سے اندر کمیوں کے باہمی تباول میں رکا وٹ متی (7) - اس تفاع حوارت (pyrexia) (۲۹) اکثر سل ربوی کی دانمی میش (hectic temperature) سے مثیا بر ہوتا ہے ' ا ورمكن من أله اس كه سائه مروى لكنا (chills) اور شهان مسلين night (sweats) مول ا عرا) مفوق فلب (tachycardia) بلا ال تفرع ميش كے موجود موسكم تسبيم الله المعض اقعات مريرياتي لموريه النوى سبيعا كو Becondary) (deposits) يائے ماتے بن (۱۲) - اور دوسرے علا است يد بن : -- سرس اق (cyanosis) (۱۱) جوالتر أوس دي متسع (dilated veins) ه ١٩٠٠ كيماتم ہوتا ہے' جومکن ہے کہ ئمراورگروان' جواتح إلا' صدرا ورشکی پیر نظر ' نبن اور اس وجرسے اہم ہیں کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ واسط (mediaztanum) ہیں ت، و ہوگیاہے میں کالنتیجہ یہ ہوتاہے کہ خون قب کے اُن نیسنے الحدید تفیّا ہے۔ (anastomoses) کے وربعہ سے پہنچیا ہے جو بین سلم اورو (anastomoses) اور شكمي أوروه كے ورميان بوقے ہيں ۔ يا ويجود اس توبين (compensation) ك وريدى رُوسِي بهبت كچه ركا وث واقع بوماسة كالمكان بوتاب او تملكن يكسي كا زور لكاسفة برجيره اوريمي زيا ده معلى ادر ازرق بوما ماسه - فرقاني ديداجوف کے تسدو کی حالت کی سطح برخون کا بہاؤ بالکل نیچے کے طرف اور سختا نی در پدا جوف کے تسدو میں اوپر کے طرف ہوتا ہے ۔ لیکن یہ ہمزالذکرمالت دروں صدری ملصہ (intrathoracie tumour) سے شاذری پیدا ہوتی ہے گو کہ ضبیت یا کسیب (malignant growth) كأُوَّا ما فرام سے عین او پڑتھا نی وریدا جوٹ تک ہنچ ما نا عكن ہے۔ أُذِيما (١٨) اكثر ايك متآلز إلارت برتاہي عب كے ماتم زراق اورتنسع دریدیں ہوتی ہیں۔ سروگردن اور ہر دو پاکسی ایک با زوکا اُ ذیما نها بہت مِمير ہوتا ہے ۔ مکن ہے کہ یہ سریع الزوال ہوا او محنیت کریے یا زور لگائے اسمعکنے يا كمعا ننے سے پيدا ہومائے اور آسس كے رائح وم كمنے كا اساس مي مو - يالا ایم موجود ہوتے ہیں ، ۔ حنجری شکل (laryngeal paralysis) موجود ہوتے ہیں ، ۔ حنجری شکل (ایم عسرا لبلع(dyaphagia) (11)- سقة (11) أنكلبول كي كرزشكلي

ورون معدری لؤما به جات

(clubbing of the fingers) (و و و) (غالبایه مدد بهت کرمه کار د من (clubbing of the fingers) کار د من (vertigo) کی عدم مساوات اور عصب مشار کی کے اور د و اس (vertigo) کی عدم مساوات اور عصب مشار کی کے بیجان یاشلل (جو ملا خطہ ہو) کے دو سرے الم رات ۔ سٹی ایکن اکثر ایک سلومی سے اینا ممر بلاکسی مزاحمت سے دوجار ہوئے جاری رکھتے ہیں ۔ بعنی اوقات و مسنومل بوجاتے ہیں ۔ بعنی اوقات و مسنومل بوجاتے ہیں ، بیج ایک کی معملی نبض (peripheral pulse) کمزود یا مطموس ہوجاتی ہے ۔

طلبعی اهارا ست نهایت تغیر بذیر بوتے بن اوران کا انحصارالید

کومل وقوع اور جامن یو اور بیمید گیول کی موجود کی پر بوتا ہے ۔ مکن ہے کہ
ا تبداؤ وہ مرف ایک شعبہ کے تعد دکے اوارات بول ہو بیلے بیان کے جامئی جاکے بین
اور ان کے مانحا اللہ مرم و (stridor) ہو جول ہول سلمہ کی جامت بڑمعتی ہے
اور نامرف شعبی غد د بیں جا و (deposits) بلکہ سنش کے اندر تک بھیلا کو ہوجا ماہ و روجا و ر

نشخنیص - بیض اصابتیں اپنا مر بلاکسی صدی علامت کے ختم کروتی ہیں۔
اصابتوں کا ایک جیو المد ماغی گروہ (cerebral group) مرحات (metastases)
کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ اصابتیں واغی سلم التهاب سے یا (maningitis) التهاب واغ جو المدین التهاب میں ۔ اصابتوں کا دور اگروہ التهاب و اغ (encephalitis) بحوثی ہیں ۔ اصابتوں کا دور اگروہ نختاعی (spinal group) ہے ہو مکن ہے کہ التهاب نخاع (spinal caries) ہشوگی بوسے یہ بوستے ہیں ۔ وہ مرصرہ (stridor) جو ایک شعبہ کے میں سے گروہ میں حا وشکی علامات ہوتے ہیں ۔ وہ مرصرہ (stridor) جو ایک شعبہ کے میں سے دوہ مرصرہ (stridor) جو ایک شعبہ کے میں سے کہ وہ میں حا وشکی علامات ہوتے ہیں ۔ وہ صرصرہ (stridor) جو ایک شعبہ کے

انضغاط مصر بدا موماً آس، علمي سے شعبي التهاب كا فرخره (rhonchus)سم ما سکتا ہے۔ اول الذكر دفت وقوع اور مل وقوع كے لحاظ سے متقل إغير شغير بوتا ینادرا خرا لذکرنغه پدیر مواسی و جند کی منول که اندرامک مگر سه در سرا بگرد ایا آیا کی و قنول من غائب بوجا ماسيد - أرسلعددرون مدى چيدگيان [جيئي واطني النيان انعنا (effusion) ا تبني صدر (empyema) مُتَعبى البَهراب (bronchitia) بمتهدر والتُتع (bronchiectasis) شعبی وات ازیه (broncho-pneumonia) پیداکر دے ادرسىلىد كے بميّز علامات (جيسے كه امتلاءاً ور دُه اور ٱ ذہما)غيرموجود ہوں ٌ نومكن ے کہ اس امرکز سُناخت کئے بغیر کہ او لی بب مرض سلعہ ہے' ان جیب کیوں لی تشخیصر کر بی مائے ۔ س ریوی اور استرواح العدر سے بمی تفریق کرنی جا ہے۔ بزل (paracentesis) کے بعد ایک سریع النگسر عقیم پلیٹو را ٹی انعسا ب واقع ہونا سرطان کی ولا لت ہے' بالخصوص اگریہ انصاب نون آلود ہو' اگرچ یہ بیان کردیا مزوری سے کہ خون آلود الضباب کا عام ترین سبب تدرّن ہے خلو یاتی امتحال (cytological examination)سے عمر اگر تی مدونہیں کمتی۔ اس کے برعکس اگرا ک ا دمیرعمروالے مریض میں سیال کے الارات موج د موں لیکن سسیہ: کا استعقب (exploration) كرمة بركوئي ميال في الصقوملعه كاستبركيا ما سكة مهد مراكات تُن آ نوس سائے آ و مرطی (aortic aneurysm) کے ساتھ آسانی خلط لمط کیا جا سکتا ہو-ا نورسایکے مشہبورومعرو ن طبیعی اِما را ت کے علاوہ بیشنراصا بنوں میں لاشعاعیٰ متی تغریقی متخیص کا نهایت بقینی در بیه بیش کرتا ہے ، الزرسما ایک صاف اورواضح لور رکھنا ہے اور ایک تمدویذیر نبضان (expansile pulsation) ظاہر کرتا ہو۔ کیکن کسی ابسے سلمہ سے بھی مجرا ورطیٰ کے ساتھ منعنم ہونبعنان (pulsation) ہیدا (neoplasm کی جھاوُں بتدریج خود کوار دگرد کے مشش میں غرف کردی ہے 'اور اس کی الی کور بالک نظر نہیں آتی ۔ لیا یوڈ ال(lipiodol) کے استثمال کے بسید امتهان کرنے سے مکن ہے کہ ایک شعبہ کا تند نظر آئے ننیبہ بینی (bronchoscopy) نہایت ہی مذہبے السیماتی امتان کے زرید تنخیں کرنے کے لئے بالید کا ایک اکرا

الگ کیا جا آہے۔ اگر تعنیق کا اصلاع کیا جائے اور مجوس افرازات کو بھلنے وہا جائے تو حارمنی طور پرت کین جرجا تی ہے۔ لا شعاعی امتحان 'جرکہ استرواے الصدر استجام دینے اور اگر کوئی انصراب، موجو و ہوتو اسس کو دور کرنے کے بعد استجام دیا جا ہے جائے ہے بار این بالیدوں کو تشخیص کرنے کے لئے نہایت ہی مغید ہے جدر بنی جی تعلیم جرفی ہوتو اللہ جرب شعبہ بینی کے ذریعہ بالید تک رسائی ہوسکتی ہوتو علاج میں علاج بالید تک رسائی ہوسکتی ہوتو علاج میں ایک انقلاب عظیم بیدا ہو جا آ ہے 'کیونکہ باقاعدہ و قعول بردی ان کے خول مدون کے جاتم استحال کیا جا آ ہے۔ کے جاتو استحال کیا جا آ ہے۔

لجيبيط والمن انوى مطروط

(secondary deposits in the lungs)

تشخیص جب دو سرے اقتار میں بالدگی موجدگی معلوم ہوا یا جب مطان بستان یا سرطان فک بار بعد علیہ کال کرفاج کردیا گیا ہے تو ایسی حالست میں ناقابی توجیہ بہر کے دفوع ہے ہمیں جیسے شے کے اندر بالید دافع ہوئے کا خسیال آئا پاہئے۔ اور اُن اصابتوں میں کہ جن میں دلوی علامات نہا یت نمایاں ہول گردن میں خت غدد کیا خصیہ میں سلمہ کی موجودگی ہے کیا فقرات کی ماکو فیست سے بیدا شندہ مشوکی استواری سے معض اوقات صروری پنہ تیل جا اے۔ ابتالی

ا مها بنوں میں مکن ہے کہ لا شعاموں سے بیسچیر اون میں نمیز کول مُتات (opacities) نظر آئیں۔

اندار برابوتا به اور بس مالت ی مت ایک سال سے زائد مونیدا مکان بنیں اعمال سے زائد مونیدا مکان عمل معسل نے کا نشاریہ ہے کہ درد اور کھانسی میں تضیف ہو اور نمیند آ جائے ۔ عمیق لا شاعی علاج (recession) اور نفید (deep X-ray therapy) اور نشاعی علاج (radium) کوجیہ متا دوں میں شخوں کا دوبارہ بمبدلا و واقع کرتا ہے (62) کا ریڈیم (radium) کوجیہ متا دوں میں انتخال کیا جانگا ہے ۔ بالید کے ماتھ کے ستیال انفیاب کومم میں (aspirator) کے ذریعہ بیال دیاجال جو بائے گا۔ کے ذریعہ بیال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجال دیاجا ہو جائے گا۔

ذات البحنب ورتقبح صسدر

(PLEURISY AND EMPYEMA)

وَاتِ الْبَخْبِ بِیمِنِیْ عَشَاتُ لِمِیْوِدا فی کے الْبِمَابِ کے خاص مطابر یا پیسطی بلیودائی پر کوین کمف' (نشک وَات الْبَخْب: dry pleurisy) یا مسلی سیال کا ارتشاح (انصابی وَات الْبَحْب: pleurisy with effusion) یا پید اسٹس دیم د تقیم صدر : empyema) مِس۔

پیداکردیا سے اور یہ دو سری بہت سی سرایتوں بالخصوص نبتی رہوی سے ایوں لو الله قرمزی کھسدا کر شیتی بخار عفون تا الدم اور انفلو سزا کی سرایتوں کا نیجہ بوتا ہے۔ ذات الجنب مون برائٹ (Bright's disease) کی جی ایک کثیر الوقوع ہج ب گی ج نات الجنب مون برائٹ (gright's disease) کی جی ایک کثیر الوقوع ہج ب گی ج بین اصابتوں میں سرایت نسبیہ زیادہ مائٹ کو بین ہوجائے کی جب د ا) صررات شش کی محدور (fractured) کی بین اس معنات (pyæmic abscesses) کی ایک فراجات (pyæmic abscesses) کی ایک فراجات (pyæmic abscesses) کی توسیع کم بین والی صفر ات است کی مغراجات کی توسیع کم بین والی سطح پر جوجائے ۔

رون یا به خانب البهاب تا دمود اور البهاب باریطون پرسب بک و قت ایک بی رایت سے واقع بو سکتے ہیں موحاد اصا بتوں پر ثبتی عفونی (septic) ایک بی رایت سے واقع بو سکتے ہیں کو حاد اصا بتوں ہیں اکثر تدرنی ہوتی ہے ۔ اسس کو حبیث یا نبتی ربیری اور مزمن اصا بتوں ہیں اکثر تدرنی ہوتی ہے ۔ اسس کو حبیث البتما ب خشدیدہ مصلب (polyorrhomenitis) یا عام البتما سیب انخشیدہ مصلبہ (polyserositis) کہتے ہیں۔

مِنْ حَسُكُ وَاتَ الْبَحْنِبِ مِن " لِمف" بِهذا مُوحِائِن كَمْ معدَمَل بِي أَكِ معلى إمعلى فائبرینی مسیال کا ارتشاح و اقع ہوتا ہے کیا اگریبی کا زیادہ مزمن ہو اتو ملاّ کمف ّ كى القَيْكُون كى اكم معلى بسال كاارتناح وافع بوجا ياب ريسسال كهفه بلیورا ٹی کے اندر ۲ مامل مائنٹ تک یا زائد مقدار میں ثمع ہوسکتا ہے ۔ اُسس کا رَنُکُ زرد یا سنری اُکُل زرد' اور کُنّا فیتِ نوعی ۵۰۰ تا ۱۰۳۰ او ۱۰کر ۱۰۱۵ ا ١٠١٨ موتى ہے - اس ميں جوالبُيومن موجود موتا ہے اسس كى وجہت يدا كالنے رتقريباً عثوس موجاً ماسمے . بيرت ذبنيں كه اس مي فائبر من كے حيث كاسك (takes) موجود بول ما تحور اس مي عرصه بي كي مقدار وطروح بوجائ - يبال ، لکل صراف ہوتا ہے کی جسیرات کی موجو دگی کے باعث دورصیا (opalescent) ياً گَدُلا -حاد اصا نتول ميں إيوسين بنيد (eosinophıl) يا تستشبيرا لانتكال نواتي (polymorphonuclear) خليول كا غلب موتاب اورزيا وه مزمن ما تيول میں غطیۃ ننبتہ متوڑے ہوتے ہیں اوروہ لمف خلیے ہوتے ہیں۔ ماد اصابتون پی گن ہے کہ خلیوں کی مقداراتنی کا فی ہو کہ سیال کو نکا گنے کے معدوہ اسس کی تریں ایک وبیزت بنادی اوراس کے اور گاڑمی بیپ کے بننے کے درمیان تمام مارج اِئ جات كتة بي مبض اوقات يرسيال كم وبيش نون كى جلك ركمنا بي أوريه فون اُن فِمانت وَوق سے اُنوذ ہو اہے جا تھی پذیراف (organising lymph)

مِن بائے جاتے ہیں۔

یدانسباب سیال و ات البحنب کے تنائج میں سے اہم ترین تعیوب بے وہ کہ وہ کہ فی بلیورا کے اندر مقید رہائے کہ داوہ لازی طور پرشش کو وا تقرام اور دو اور سیال کا انصباب بس قدر زیا وہ ہوتا ہے کہ اور سیال کا انصباب بس قدر زیا وہ ہوتا ہے کہ صفتی آئی قدر زیا وہ مضنو طرہ عبا بائے۔ یہ انضنا طرسیال کے دباؤ ہے نہائے گھر شش کی گئیک کی وج سے واقع ہوتا ہے کہ جو قدر تا اس کی بازکشید گی (retraction) میں معد ہوتی ہے کہ بیال کک کہ یہ حالت بائی جائی منی ہو دیکن گومورت مالات اس کی بردیکن گومورت مالات اس کی بردیکن گومورت مالات اس کی بردیکن گومورت مالات اس بردی مو تی ہے کہ باوجو د دباؤ کی خب سے کہ وہ اب بھی منا بردی ہو ائی کے دباؤ کی نسبت زائد موانی نسبت زائد موانی کو دباؤ کی نسبت زائد موانی کو دباؤ کی نسبت زائد موانی نسبت زائد وہ مگر یا طحال کے سینے کو وسکیل دیتا ہے ۔ انہائی اصا تول بی مکن کا خری زیا نسبا دیتا کی اصار تول بی مکن کا خری نسبا نسبال کے سینے کو وسکیل دیتا ہے ۔ انہائی اصار تول بی مکن کا خری زیاد کی دورائی کا دیتا کی دورائی کی دورائ

دوسرے التها بی اعمال کی طرح ذات البحنب عبی بلیکورا کی دونوں سطوں کو رصانکھنے والی فاقبرین کے تعقیٰ (organisation) بینے عروق دمویدا ورلینی مات کی تکوین سیسے مندمل بوجاتی ہے۔ اگرا نصباب موجو د بوتو وہ ہفتوں یا دنوں کے دوران میں جذب بوجاتی ہے اور مشش اور دیوارسینه کیا تو اول الذکر کے بحد رکج بیٹھ جائے کیا ان دونوں اعمال کے ممزوج بولے سے یا لائخر باہم متماس ہوجاتے ہیں۔ خیبف اصابتوں میں مکن ہے کرما تہا با بعد میں اس کی کوئی مثما دت نہ کھے کہ کمبھی کوئی التهاب ہوا بھی تھا ۔ لیکن اس کے مراحک بعد میں اس کی کوئی مثما دت نہ کھے کہ کمبھی کوئی التهاب ہوا بھی تھا ۔ لیکن اس کے مراحک بعد میں اس کی کوئی سٹیا دی دونوں دبا زت کا ایک قطعت (a patch of نظام میں سبید ہو اور اس کی سطح حکمی اور حیکدار ہو۔

عبهج المصلهم به تعتيج الصدر ياريي ذانت الممنب كوبهداكرين والمعضول يبلي بيان كنيرُ جَا حِكِي مِن - تَقِيعِ أَنصدراه في مِوسَنَا هِيُ أَسَ مِنْ مِن كُهُ بِهِ بِيلا يَا واحدالتهاب موتاسه مركه جمين كسي راست عفنويه كحه وافل موماسف بيدا ہوتا ہے ۔ یا مکن ہے وہ قرب او برار کے مرض کے ساتھ و ابستہ ہو شلا ذ است ار پیا مور پہلی یا رہوی خراج کے ماتھ ۔ اور آخرا و وجم کے کسی دوسری ملکہ کے مرس سے فَتْقُلُ شَدو (metastatic) بوكل بي مثلاً تفتيح الدم (pysomia) م - تفتيح العدر لسی دور مری مبکد کے بچوڑے کی ماند میشدایک صاف بیال سے یا سفید خلیات اور فائبرین (fibrin) کے گالوں سے تعنیف طور بر کمدر شد و سال سے شروع موال ہے۔ اس درج کی مدت تغیر بدیر موتی ہے معن افتات یہ طولی موتی ہے مثلاً موقت جب كه ايك در في التهاب لليوراري جد جائد (جوكه ايك نهايت بي ثا و واتعه م)-نبقی راوی تقیم الصدر میں تقیم موسے میں اس سے کم دیر ملتی ہے۔ بب تقیم الصدورات الرام مح ساتحه متلازم بوزايد توعام طورير تعيم بالعموم انحلال (resolution) كه دوران میں پائس کے بعدواقع ہوتا ہے کجس سے آیک حالبعل ذات الر اندی نتیج العدد (meta-pneumonic empyema) فِلُور مِن أَمَّا بِهُ - اسمورت مِنْ ات الربي اولی اور بلینورا برحارا نوی موتا ہے یہ جب تنتیج الصدر نون بامش نبقہ سمیہ کی وجیے بیدا ہو تو تفیع من تاخیر، موجاتی ہے یا تفیع بہت سرعت کے ساتھ و اتع ہو تا ہے، لهذا نبتي مسجى ذابت الريدس تفتيح الصدر بقي بمزال لمور برموجود موتاب سيفيديه هرد ات الري^{ري} (syn-pneumonie) مؤاہدے۔ روسری اما بتوں میں ہم بلی

مرتبه ہی جب کہ لیئورائی انصباب کا مشبہ کیاجاتا ہے رہم پائی جاتی ہے۔ معنیہ ہی جب کہ لیئورائی انصباب کا مشبہ کیاجاتا ہے دیم پائی جاتی ہے۔

بعض اوقات ایک تقیع الصدر تا چه ملینی وائی (ایک (pleural sac) بیا یہ نکل کر ایا توسم میں سوراخ کر د تیا ہے (جس سے بیب کا نفت ہوتا ہے) یا ایہ بین الاصلاع فضا د میں (جو اکثر یا نجر سی فضاء ہوتی ہے) مند کرکے ('' pointing '' خو بجو و بجو و بجو و بین الاصلاع فضا د میں (جو اکثر یا نجر سی فضاء ہوتی ہے کہ ہوا کہ فلہ بلیورا کے اندر در انحل ہو کر د بین است والے الصدر (الفرام کے آریاریا اس کے جیجے سے ہو کر کہ فاضکی اصابہ والی ایک تقیم الصدر (الفرام کے آریاریا اس کے جیجے سے ہو کر کہ فاضکی اصابہ والی ایک تقیم الصدر (الفرام کے آریاریا اس کے جیجے سے ہو کر کہ فاضکی میں کھل سکتا ہے۔ لیکن اگر غیر شخص یا بلا علاج کے رہ جائے تو وہ عرصہ در از تک بلا موانے کے برمتور دہ مکتا ہے۔ اس سے ایک نامکی جربشی (lardaceous) انحفا ط کے فقو ع کے لئے راستہ تیار ہوجا تا ہے۔

معلی اور رہی ہر دوا نفسابات میں ' مجید ول اور عبدر کے درمیان انفاہ ا با جبکیوں کے پیدا ہوئے سے کمغہ کمجی کھی جُدا جُدا فضاؤں میں منتسم ہوجا آب ۔ اسی وزیل میال کو خاضہ بناں (loculated) کہتے ہیں۔ اگر ایسے مریض کا علاج براحی طریقے سے کیا جائے تو یہ حالت اہمین دکھتی ہے ۔

شلارًا ت (accompaniments) بوتے ہیں سینے فردارز یان عدم استنہا اور اسلمندی (malaise)-

سینه کا امتحان کرلے پراؤ ف جا نب برحرکت کی کی کی اور در و کے مقام کے دیسی خربر (vesicular murmur) کی فلت مث یده سی آئی ہے ۔ کین تم برطبیلی المرت ذاست المجنبی سی کو (pleuritic rub) یا سون فرکی (friction sound) کی وجہ سے کھرور نوگئی ہے ۔ یہ ان دو پلیفورائی مطول کے جوار تناح (exudation) کی وجہ سے کھرور نوگئی مقد ار کے بین ایک دو سرے پرحرکت کرنے سے بیدا ہوجاتی ہے ۔ یہ آواز فرک کی مقد ار کے لیاظ سے مختلف ہوتی ہے ۔ ما دا صابتول میں کمن ہے کہ یہ رگر استحتی کے ساتخہ محدود مقا کی نوتی ہے ۔ ما دا صابتول میں کمن ہے کہ یہ رگر استحتی کے ساتخہ محدود مقا کی نوتی ہوا ور با سانی نظرانداز ہوجائے ۔ بلکہ اگر مریض سندید در د کے باوث وہ شہیتی کر کھتی ہوا ور با سانی نظرانداز ہوجائے ۔ بلکہ اگر مریض سندید در د کے باوث وہ شہیتی تو یہ غیر موجو د بھی ہو گئی ہے ۔ مزمن اصابتوں میں فرک اتنی زیا دہ ہو سکتی ہے کہ وہ (stethoscope) سے شرید کر کھی ہوئی ہے ۔ اور بالکل بلا دَرد ہوئی ہے ۔

ولا ذات الجنب جبن کے ساتھ انصباب هوا ور تعیم لسک استان نصباب هوا ور تعیم لسک جب سیال کا افساب ہوجا گاہے تو بلیو داکی دو نون طمیں ایک دو سے علی اور السے علامات اور ہوجا تی ہیں موت فرکی غائب ہوجا تی ہے ، در دکم ہوجا تا ہے ، اور السے علامات اور طبیعی الارات واقع ہوتے ہیں جو سیال کی موجو دگی کا یا بیال جن مختلف اعضا پر اثر انداز ہوتا ہے ان کے مضغوط ہوئے یا جگہ سے ہٹ جائے کا راست نتیجہ ہوتے ہیں ۔ فاص علامت سالنس کا بچول جانا ہے جو مشقت کرنے یا زور لگائے پر فاص طور سے ہوتا ہے ، اور یہ کہر (dyspnæ) انصباب شدہ میال کی مقد لا کے تناسب سے ہوتا ہے ۔ مریفن اپنی پیٹھ کے بل یا او ف جانب کی کروٹ کے تناسب سے ہوتا ہے ۔ مریفن اپنی پیٹھ کے بل یا او ف جانب کی کروٹ پر لیٹیا رہتا ہے ، تاکہ تندرست جانب کو سب سے زیادہ آزادی خال ہو یکن ہم کہ کہ تناسب سے ہوتا ہے ۔ مریفن اپنی پوٹی کے ہو ۔ وات الجنبی نصبا ہیں آئکھ کی تبلیاں کہی کمی غیرما وی ہوتی ہیں اور ما وف جانب کی تبلی نمیٹر زیادہ کی تبلی نمیٹر زیادہ کی تبلی نمیٹر زیادہ کی جو تی ہے ۔

جیدا کہ دوری الہا ہی مالتوں میں ہو آئے 'میش اختلاف پذیر ہوتی ہے۔
مثلاً تدرنی ذات الجنب میں وہ نہایت ہی لمند ہوسکتی ہے ہو کہ شایڈنا فنی سے خدودی المال من کی طرف اسٹارہ ہے۔ سکن عام طور پرستقیمی میش مرف ۱۰۰ یا ہ ۱۰۰ داد م سئی گریڈ تک مرتبع ہوتی ہے۔ تقیم الصدر میں مبی 'خواہ یہ سبی نبتی ہو یا عنبی نبتی بیش اختلاف پذیر ہوتی ہے ' لکن بالعموم وہ ملن اور متوقف یا متفتر ہوتی ہے ' اور بنا افزات اس کے سائے تضعر برات ہوتے ہیں' اور مریش کی طبیعت نہایت ہی خواب ہوتی ہے اور اس کو خراب محوس ہوتی ہے ' میں اکہ دو سرے حاد بخی ارول میں ہوتی ہے۔ میں اکہ دو سرے حاد بخی ارول میں ہوتی ہے۔

ی کرستال شجا ذب (gravitation) کے اثریت سینہ کے رب سے نبح کے تقے میں جمع ہوجا اسے البذا یکھی قاعدہ برطلق اصمیت (dulness) موتی ہے۔ ليكن تونصلي فرير (vesicular murmur) فعوتى ممك (vocal resonance) اور المنسى معوتى ضيف (tactile vocal fremitus) بهنت كمزوريا بالكل غائب ہو باتے ہیں۔ کثیرا مقدار ستال ہو توحب ذیل طبیعی اور ات مشاہدہ میں اتے ہیں: ۔ معاً مُن کرنے پرسینہ کی اوُف مانب نے حرکت ہوتی ہے۔ تفلب اینی طبعی وضع سے بٹیا ہوا موٹٹا ہے: اگر ا نصبا پ دائیں جانب مؤتوصد مقلب (impulse of heart) ایمیں معنی کے نیچے یا اس سے امری ما نب مسوس موسکتا ے۔ اگرا نساب یا بس جانب مؤتوص مرالعلب اکٹر عظرالغش (sternum) کے وا بُيلِ طرف كي بين الأنتلاع فضا وُل ميلُ عمواً متيسريٌ جِهِ مَنيُ اوريا يُجويِ فضاُول میں ملکہ دائیں بننی کے یاس تک اور مشا ذمثالوں میں اس سے بھی اس کے محسوس بوتا بيرمان نعساب ركه والى اصابتون مي مادُف ما نب يرسيه كاميط را ده بنس بوتا عکن ہے کہ وہ کم بوجائے ۔ لیکن تقیم الصدر میں مکن ہے کہ وہ زیا دہ مو ما سے اور مین الا منلاح فضائیل بہلیوں کے بیول ہے بی کسب ہونے کے بجائرہ يُر ديًّا مطوسٌ ﴾ بهو ما تي رمي عكن ب كه ويوارسينه كاكسي قدر اُ ذيما إيرتيبيُّ بهو-طحال إ مُرْبَكُ كريني است بي وفَرَع كرك برسات بنلي ادريتي المريمي یائی جاتی ہے جرمقابل مانب کی اس اسمیت کے ساتھ متلتل موجاتی ہے جو

نی مگرسے سنتے ہوئے قلب کے ساتھ تمنا ظر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی سینہ کی مقابل جا نب پر ب منائش ہوجاتی ہے ۔ خیانچہ عموس ئن کا ایک متلاث رقب ایسایا یا جاتا ہے میں کا راس علم الكتف (acapula) كے زاويد كے بيول كے قريب ريز مدكے ياس ہوتا ب اور قاعدہ رٹرمہ سے لے کرمشش کے زہر س کنارے کے برابر برابرہ اس انج بھیلتا ہے آگر کو کا نیز د فقری مثلث: Grocco's paravertebral triangle)-اس کی توجید حب ویل سے: _طبعی طور پر شش کے مرکزی صفح الجمیلنا (expansion) مرف اسی طرح سے عمن ہوتاہے کہ وا سطِ مؤخر کا تناوز یا دہ رہے ہو اسے حمیس جائے سے روکے دیکھے۔ تناوکی بیزیا دتی مقابل مانب کے ڈائفرام کے عل کی وج سے ہوتی ہے۔جب یہ کم ہو جیسا کہ بیٹورائی انصباب میں ہوتا ہے تووا سِطمِر شبنی (inspiration) کے کساتھ ٹو صیلا ٹیر جاتا ہے بجس کا نیتجہ یہ موتا ہے۔ غراؤن دان کے شش کے مرکزی مصد کو نسبتہ کم ہوا پہنچتی ہے اور مستہ عی سسر (percussion note) كم بيوما تا ب - جب سيال استيقدر بوكه وه مرف سينه كي دو ملت بائدی کا پینے تو بڑتو و کے نیے اور اسمیت کے بیول سے اویر قرعی مرکی وو خاص ترميم سنائي ويه سكتي بي خيس كانام اسكود ائي مكك Skodaic) resonance) میں بوشنش کے ارشخار (relaxation) کی وج سے ہوتی ہے (ملاخطه بوصفحه 123) - ا سنتاع كريغ يرامتم رقب (dull area) يراموات تنفس وسوتی گک اورکسی ارتماسش کی کمی یا غیرموجودگی یا بی جاتی ہے بسیال کے بالائی لیول برجها است وصیلا برج آباہے شعبی نفسس bronchial) breathing) ناما سكتا ہے۔ breathing) ناما سكتا ہے۔ مكن بيے كة شعبه صوتى (bronchophony) ما كتين وي (ægophony) موجود مو-مقابل مانب پراموات تننس مبالغه که سائفه موتیه بن کیکن وه مثلث گری پر کم ہوجاتے ہیں۔ انتہائی اما بتوں میں جہاں سٹش بیک کر عفوس ہوجا آئے مہوات نس غائم موسف کے بچائے ملین شعبی نعنس (loud bronchial breathing) موجو و بومکتا ہے۔ جہاں رحشا ، کی غروضعیت (displacement) زیادہ مؤولاں مکن ہے کہ تنفسی افعال کا اخت لال یا لاّ خرمبلک ثابت ہو حائے ۔ مرین ہاؤو داہ

کبوه (livid) بوتا جا آج نوخرات (rhonchi) در نماطی نفط (mucus râles) می اور نماطی نفط (mucus râles) می شود است که ندرست تعل اور ختاق (asphv xia) می شدرست تعل اور ختاق (syncope) بوج آجی کی طاری بوج آ آج دستی کی معقول توجید یه بوسکتی ہے کہ قلب اور بڑے عوق برد با و بڑتا ہے۔

نوع کول کی حالت میں قرع کرنے پر جو اصمیت ہوتی ہے وہ طلق نہیں موتی اور مکن ہے کہ سارے اصم رقبہ برشعبی نفس سنائی دے اوراس سے یہ کمان بیدا ہوجائے کہ سنسش طوس ہے۔ ایسی حالت بی قلب کی فیرو صنعیت (displacement) سے مدو لی سکتی ہے۔

نهایت سفا و اصا تبول می قلب (یا شاید اور طلی) کا نبخان (pulsation)

ایک لمینولائی انصاب کم شقل بوجا آ ہے ۔ بدا تعقال ایک صدمہ یا موج کے طور برایک طریر ایک طریر ایک طریر ایک طریر ایک بیت از یا دو محدود المقام شاید مرئ نبخان طریم مصلی اجتماع کی بوتا ہے یا ایک نسبته زیاده محدود المقام شاید مرئ نبخان کے طور برایک ایسے تقیم صدر تک جود ارسینہ کے آر پار مخد کررا ہو۔ اسے نابض کے طور برایک ایسے تقیم صدر تک جود او اسام کا با بعض تقیم صدر و المعاد (pulsating pleurisy) یا نابخ صدر و empyena کے برا ہو۔

مبین کختی قذات الجنب (interlobar pleurisy) کے استدائی ورج سیم کمن ہے ور د کھالئی اور دقت تنفس موج د مول گرکوئی تمیز المرتنبی ہوتی ۔ جب ایع جمع ہوکر ایا یا اونس کی صدیک پہنچ جائے تو مکن ہے کہ قرع کرفے سینہ کے وسطی منطقہ میں ایک اسم سر (dull note) اور ساتھ ہی اس سے او پر اور نیج گلک لئے اور مکن ہے کہ اس کے ساتھ کغطات (râles) موج د ہول ۔ بین کئی فیل سے اور اکس کے ساتھ کغطات (hæmoptysis) موج د ہول ۔ بین کئی ذات الجنب کی ایک کثیر الوقوع علامت نفت الدم (hæmoptysis) سے کہ ود ایک فیر ایک کثیر الوقوع علامت نفت الدم (Dheulafoy) اور اگر بیال رہی ہے جیساکہ وہ اکثر ہوتا ہے ' تو مکن ہے کہ ود ایک شعبہ کے اندر وا ہو جائے اور کھالئی کے ذرجہ خالی موکن و د ایجا ہو جائے ' اگر حیب (discharging cavity) میسینوں اور برسول تک باتی سے سیسینوں اور برسول تک باتی سیسینوں سیسینوں اور برسول تک باتی سیسینوں سیسیال

دُا نُفرا مي ذات الجنب (diaphragmatic pleurisy) برانعبا

شش اور ڈاکفرام کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ مقداریں ووعمو کا دافرنبیں ہوتا۔ اس ہے بہتا اکثر شدید در دیوتا ہے اور ساتھ ساستہ دسویں سلی میں ڈاکفرام کی انتہا کے مقام رہائے سے کیا گئر شدید در دیوتا ہے اور ساتھ ساستہ دسویں سلی میں ڈاکفرام کی انتہا کے مقام رہائے سے کیا گئر دن میں عسب ڈوایا فرامی (phrenic nerve) کو باہر سے دیا کی بغیری الی کہفی الیمیت (tenderness) موسس ہوتی ہے۔ او قائیکہ بیدم فن خاص بلیورائی کہفی الیمیت (dulness) نوم ہو اس میں جائے اس موج کے اس میں اور برصوتی (encysted) نوم ہو گئے ہوتا کی دور برس طرح ما مع کے کسی جھو کے اجباع علی جو بیال کو وی بند (encysted) ہو آبانی نظرانداز ہو مانا مکن ہے۔

اسی طرع مکن ہے کہ ایک واسطی استانی اجماع سال آنا کانی : ہوجائے بی بت صورت میں اہرات طاہر کرے اس وقت کے اجماع سال آنا کانی : ہوجائے کہ سینہ کے خط وسطی میں اہر ساختوں پر داؤ بڑے گئے۔ یہ امارات یہ ، میں : ۔ بہر (dyspnæa) میں اہر ساختوں پر داؤ بڑے گئے۔ یہ امارات یہ ، میں : ۔ بہر (dyspnæa) میں اہرائی ہوئی آواز (oppression) کے دورے سول بول کی آواز (stridor) عمرائی ہوئی آواز (brassy cough) نامی کھی اسی (dysphagia) مرائی ہوئی آواز (stridor) اور سطی سنہ پر کی اور دہ کا بچول جانا یہ تھی کہ نظری فقرات (hoarseness) اور سطی سنہ پر کی اور دہ کا بچول جانا یہ نامی ہوئی آواز (paravertebral dulness) اور کہ زامی ہوئی اور اس استان کی مناو اور زوات المیت بائی جائے برائی کا جموری فی کی اور لفظات ہوجو د ہوں یہ ادمور کے اوپر ذات المیت امراؤ (سطامی المیت کی دورائی کہ تسدد پر المیت میں لا شعامول سندی انہو بات کی داو سے ضابع ہوجا ہے کا رجان رکھتے ہیں ۔ تشخیص میں لا شعامول شخص المیت کی دورائی کی کہ تسدد پر المیت دورائی کی کہ تسدد پر المیت دورائی کی دورائی کی کہ تسدد پر المیت دورائی کی کہ تسدد پر المیت دورائی کی دورائی کی کہ تسدد پر المیت دورائی کی کہ تسدد کیا کہ دورائی کے دورائی کیا کہ کیا کہ دورائی کیا ک

می در دو کوسینہ کے دوت البحنب (dry pleurisy) میں در دوکوسینہ کے دوسے در دول سے مام ترین وجہ لینب دو مرت ہوتی ہے جن میں سے مام ترین وجہ لینب (pleuro-dynia) ہے۔ یہ حرکت سے زیادہ مروفاتا ہے ۔ یہ حرکت سے زیادہ مروفاتا ہے میکن ایس کے ساتھ بخاریار گڑ (rub) بنیں ہوتی ۔ بین الاصن لماع

وجع العصب (intercostal neuralgia) أس مجاورت ياتعلق كى وجسے جووہ اعصاب سے ركھنا ہے اور وجع العصب كے انتيازى اليم تقاط كى وجہ سے تعافت ہوتاہے ۔ گرد كبرى البتاب (perihepatitis) اور گرد طی الى البتاب (perisplenitis) اور گرد طی الى البتاب (perisplenitis) ايسے در و بيد اكر سكتے ہيں جو مائس لينے پر بڑھ مبائے ہيں کيوكھ يہ اعضا دوران نہيق ميں ڈ الفرام كے نزول سے مضغوط ہوجاتے ہيں ۔

ورخبرانسباب می برمی آو لا اس برخورکرنا پر آمی که ایکمه نیکودائی کے اندر ما مع موجود ہے یا بنین اور دو وی اس برکد اس ما مع کی فوعیت کیا ہے 'آیا وہ مل ہے یا رہے ہو اور دانت کیا ہے 'آیا وہ مل ہے یا رہے ہو اور دانت الرہ یا کے ابھم خلط ملط بوجائے کا نہا بہت امکان موتا ہے' کیونکہ و ات الرب کے ابتدائی درجوں میں ہوات منتس اکثر غیرموجو د ہو نے ہیں ۔ عمواً و ات البخب کمی ارتعال (tactile vibration) سے منتف اکثر غیرموجو د ہو نے ہیں ۔ عمواً و ات البخب کمی ارتعال (more absolute dulness) سے ممیز ہوتا ہے ۔ اور نسبة ریا و مطلق قسم کی همیت (ملا ملا علی وضع سے ہا دیے نیل می موالی فیصلہ کو اس کی طبعی وضع سے ہا دیے نیل جو ایک فیصلہ کی علامت ہے ۔ لیکورا می انصاب میں لا شعاعوں سے ایک نہا سے نہا کی می موالی فیصلہ کی میں نظر آتا (ما خطر ہو صفہ کا میں نظر آتا (ما خطر ہو صفہ کا میں بیا ہی سا ہی طاہر کا نظر ہو ایک بلی سا ہی طاہر کو اس کی ایک بلی سا ہی طاہر کو اس کی اور ڈاکٹو ام کا خطر نہیں نظر آتا (ملا خطر ہو صفہ کا میں بیا ہو ایک بلی سا ہی طاہر کرنا ہے' اور گا ہے' کمٹیف (condensation) کی وجہ سے ایک بلی سا ہی طاہر کرنا ہے' اور گا ہے آگی تحدیدی خطر مجبی یا یا جاتا ہے (ملا خطر ہو صفہ مر) ۔



بشعاع تکاشین بلیوانی انصباب و رخملال فل برکرتی بین - المد ، ۲ ماری سواه اید بین مظل بوکد انصباب اورش کے اتصال برغ نخی خطب و وظیک راس کک و رواس کے گرد مبالیا ہوکہ انصباب اورش کے اتصال برغ نخی خطب و وظیک راس کک ورواس کے گرد مبالیا ہوکہ جس سے علوم ہوتا ہے کہ بالائی حقد بین بیال کی ایک نهایت بی تین ند موج دہے۔ ہور ایس سے علوم ہوتا ہے کہ بالائی حقد بین بیال کی ایک نهایت بی تین ند موج دہے۔ ہور ایس سے ایس کے ایک مرهب

تن رسن سن کی جاشها د تول کی غیر موجودگی محض آل وج سے کہ یہ بالیدیں یا ا معات کے اجتماعات شش کو اسی طرت بہتے یا ہشا دیتے ہیں جس طرح سے کہ ایک پلیورائی ا نصباب ہم کے ایک پلیورائی انصباب ہم کے لیاب ایک شعبت کا (جو علقی سے اکثر پلیورائی انصباب ہم کے لیاب ایک شعبت کا رجو علقی سے اکثر پلیورائی انصباب کی معادت میں یہ اہمیت عموا اس قدر مطلق نہیں جوتی ہے۔ ڈوا نفرام کے نیچ نہیں جوتی ہے۔ ڈوا نفرام کے نیچ کہ بالد وں کی جموروں یا دوروں (حروں (حروں کو جائی انصباب سے کرز کر ایک سطح کی بالد یوں کی موات میں اور محدب مؤاہے کا اگر می محمن ہے کہ وہ اٹھا ہوا اور مقدس کے ساتھ غیر توک ہو۔ بلیورائی انصباب کی بالائی سطح مقعر ہوتی ہے۔

بردلا آنت کرتا ہے۔ زان البحنب کے علاوہ دورے کسساب بعنی تقای اور کلی استقاء کے باعث بھی کہ غذیلیورانی کے اندز عمل موجود بوسکتا ہے۔طبیعی ارات کا اُس ہوتے ہیں کین میروالت جے اسسقادصدری (hydro-thorax) کہتے ہیں عمراً مزمن تلب

یامض برات البین کے اندر کی بالیکاد باؤی عروق پر پڑے کے بعد واق ہوتی ہے۔
اور ذات البین کے ساتھ جو تموی مثلا زات ہوتے ہیں وہ اس میں موجو دنہیں ہوتے۔
ماداما بنول کھیٹر کردوسری تمام ما بتول پی تخص کی لفر شیں اتنی کثیر التعادی کے ایک مناب سوئی اور پر کاری کے فریعہ کلامی شقصاء (exploration) کے دراجہ فیصل کرنا چاہیے ۔ اس میں ایک مزید فائدہ یہ ہے (جومرف اسی سے حال ہوسکانے) فیصل کرنا چاہیا کی نوعیت دریا فت ہو جاتی ہے اور خرد بینی اور بر تو میاتی استحال کی نوعیت دریا فت ہو جاتی ہے اور خرد بینی اور بر تو میاتی استحال کے لئے مدری : passive effusions) اس بر بر میں خالیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن مدری : hydrothorax) اور خرد بینی اور بر تو میاتی استحال کے لئے نواز کی واقعی ہو گئے ہیں۔ زات الجنب کی اقدام سریہ میں جو بنف سبحیہ یا بنفید یو یہ کے مباس کے بول کئی الانسکال نواتی (polymorphonuclear) اور بر ہے ہیں۔ زات الجنب ہیں ادائی کی اقدام سریہ میں جو بنف سبحیہ یہیں۔ تدری وات الجنب ہیں اندر فی کے ساتھ یا کے جاتے ہیں۔ خواتی (large mononuclear) اور بیں۔ تدری و ات الجنب ہیں اندر فی کورا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے کہوں الکی خواتی آلودا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے۔ میں نوی آلودا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے۔ میں نوی آلودا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے۔ میں نوی آلودا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے۔ میں نوی آلودا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے۔ میں نوی آلودا نصاب کا عام ترین میں تدری ہے۔

یں یں اس بہر اور است نہیں کی جائے۔ اور اگر بارہ راست نہیں کی جاسکتی اور اگر عصب اور اگر بارہ کی جاسکتی اور اگر عصبۂ ورنید کا حاصل ہونا مکن نہو تومصل کا درنی الاصل مونا ایک کبنی گیا۔ کی نطعیہ م (inceulation) کرکے ٹابت کیا جاسکتا ہے۔

جساکہ محدود المقام زان الجنبوں کے علمات کے بیان میں اتارہ کیا جا جا اسلام اللہ میں اتارہ کیا جا جا اسلام اللہ میں اتارہ کیا جا جا ہے۔ اِن کی تشخیص نہ بت مسلل بوسکتی ہے۔ واسطی ذات الجنب اسلام pleursy) کے ساتھ خلط لمط ہو جا با کمن ہے ، خواہ یہ خبیت سلمات مول یا لمفائی غدی (mediastinal growths)۔ (lymph-adenomatous)۔ ایکن اول الذکر کی سرگذشت من عمول یا لمفائی غدی (واحمد کی ہوتی ہے اور حملہ ایکن اول الذکر کی سرگذشت من عمول یا شعاعول سے مددل سکتی ہے۔ مام اصا بتوں میں لا شعاعول سے مددل سکتی ہے۔ مام اصا بتوں میں لا شعاعول سے مددل سکتی ہے۔ ایک اسلام بنی انصاب کے ہو یا مصلی فائسرینی انصاب کے میں مام تہ بھوس کی بیشتر اصابتیں یا تو دوائی علاج سے یا کم بی خارج کرویے کے میں ساتھ بھوس کی بیشتر اصابتیں یا تو دوائی علاج سے یا کم بی خارج کرویے کے میں ساتھ بھوس کی بیشتر اصابتیں یا تو دوائی علاج سے یا کم بی خارج کرویے کے میں

علاج - اگرفرات الجنب تدرّ فی جو توریوی تدرن کے عنوان کے تحت بیان کردہ عام علاج کرناچاہے۔

اله يرخى برأس ايندايولن وكمه رشريط ولميوائي Brice and Evelyn. Wigmore فر لميوائي Street, W I)

گرو نہا بت منبوطی کے ساتھ یا مٰدھ وی جائے ۔ تندر مبت جانب پر پیٹی میں ایک بیتل کی کمانی داخل کردی جاتی ہے تاکہ شہیق کے ساتھ پھیلا وُ مکن ہو جائے۔ بند کہ شبدگی (strapping) جوڙي د مجيول کي صورت مي کرني جا مينه ج ربوه کي بدي سے الع كرعظم الشف مك لكى مونى مول أن طرح بركه تما دل دهميان ترجيم أخ ميس اور کے طرف اور زھیے رُخ میں نیچے کے طرف طامین کہاں تک کرساری جانب وْمُكَ حَالَت مريض كوف وركنت ركمنا جاسية . أكرا نصباب واقع بوجاسي تو مُنكَتات (anodynes) كى ضرورت كم يوكئ اور مالحات (salines) سيسيك اليتييث أف لوثالينكم (acetate of potassium) اور ما نيزيث آف بوثالبيكم) (citrate of potassium) كم إلىمليث إورسا مُرْيبِث أَفْ أَمُونِيكُمُ acetate) (citrate of ammonium & ویئے جا سکتے ہیں ۔ ان کا اثریبہ ہوتا ہے کہ جید اورگروے کے اخراط ت (excretions) زیادہ ہوکرانصباب شدہ سیال کے جذبی مدہوتے ہیں ۔ کچھ عرصہ کے بعد آ بوڈ اُٹر آف بڑا سیم اسقیل (squill) یا دوسرے مرزات (diuretics) الا اے ماسکتے ہی اور مکن اے کہ اسی فنخرال (counter-irritation) ہے جیسی کہ ٹینچر یامحلول آیو ڈین ماؤف جا نب کے اویر نصبیغ کرمے سے حال ہوسکتی ہے، حذب زیارہ ہوجائے۔ ندر في انصاب كي مورت مي آج كل عام ترين دستورالعل يرسي كم بال كومرف اسى وقت خاج كياما اسي جب كروه بلبت زياره مقدارون بين موجود ہو۔ یفتین کیا جآ اے کہ متوسط مقدار بی شش کو بچیکا کرا ور اس کی حرکت کو كم كركة معتبيقة مغيد بوتى بن اسى اصول كيمطابق كرس اصول كيمطابق مفنوعی استرواح الصدر (artificial pneumothorax) مفید ہوتا ہے اگر قلب دوسری جانب کو د حکیل و یا گیاہے یا اگر مینہ کی ایک جانب کے بیشتر حصہ برمطیسات اصمیت (absolute dulness)موجود ہے توایک میزل اور تنو لیے کے ذریعہ کیجھ

سيال خارج كرد نيا جاسيئے _ بہترين قاعدہ بدي كرات اس وقت بك بنظف دما كا

جب مک کہ اسس کا وہا و کرہ موائی کے دہا وسے نیجے نہ ہوجائے سینے جب تک کہ

وهنود بخود تفولميه كيه إبرنكانا موقوف نه كوے ـ وقت بچا ہے كے لئے اكر ايك

مساص (aspirator) استفال کیا ما آئے کو ایک بیغی طل (aspirator) کے ذریعہ ایک خم پذیرا نبوبریں سے بہاکراک طرف میں نکال بیا جا ہے جو کوئن پر پڑا ہوتا ہے۔ لیکن یا ور کھناچا ہے کر ایسے ذرائع سے ان کو آبانی ایسی مقداری نکا لاجا مکتاب ہو مناسب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تا زہ طریقہ یہ ہے کرسیال کی جگہ مواد اخل کر وی جائے کے مسئیل نے میں ساوہ نفسی و زشوں سے بڑی مدہ قال کی جانکتی ہے۔ مریعن کومتوا تر وقنوں سے کہ ی سانیں لینی بگیاں اور مزاحمت کے خلاف یا مرکو چھو نکنا بھی میا ہے۔

ا گرمونی سے انتقصار (exploration) کرنے برظا ہر ہموکہ ما میں رہی ہے (تعتی العدر) تو تراح کوچا سنے کہ ایک مقای یاعام مسدم حس (local or (general anesthetic أستمال كركمة أزاوا في تبكاف دي اورسلي كا الك مرا اقطع کر کے بیب کو با ہر بینے دے ۔ دوسال سے کم عمروا نے بچے پ بی سے بزوی استیصال (rib resection) کی رواشت ایمی طرح بنیں کر عقم - ایک مزل (trocar) کے فرید ایک منولی (cannula) وامل کیا ماسکتا ہے اورا سے جم کے گروفیتے لگاکر تھیک وضع میں اندعہ دیا جاسکتا ہیں۔ ایک رمز کی لمی جو قنولکی میں تھیک مٹھ جائے تقیم العدری کہف کے اندر د اعل کی جاتی ہے اور ائس کے مشمولات کو ایک و بیرو تو ارول والی صراحی (flask) کے اندر فالی کر ایل جاما ہے اور ایک مقطاری نمیب (filter-pump) یا کسی دوسری ترکیب کے درمیم متقل ا منصاص (suction) تمايم ركمامة ما ميد (41) - طويل المدست مغنول تغنی الصدری اصابتول میں با وجود ازاوانمسلیت (free drainage) کے کہندسے بیب کا افراز جاری دستاہے اور زخم بندنہیں ہوتا۔ اگرینز او وعرصہ مک موتا ر إ توج بشي مض (lardaceous disease) كا انديشه بونا ماسيم - اليي حالت في تین طریقہ اے عل مکن میں : - (۱) کہفر کو بوسال (eusol) کے ذریعہ وحوکر صاف كيا جائے يبال تك كداكس كانشمولات مرفومياتى طريقه سے امتحال كرم يرعملاً عتيم (sterile) لمين - كياري كالمل السيليب كاطريقة (Carrel's) method of continuous drainage) کام س لایاجاسک ہے ۔ پھرزغم کوبند

ہو نے وہا سے ساکھ مرتفی ایک ستقلاً مقیم استرواح المعدر (sterile pneumothorax) مِال كرف معمولي ما وتبتيح الصدرين كه فيكونه وحونا بي ببنتريات ہے كيوكر بلتو باني معكوسى غشمان (pleural reflex syncope) كي بوت اموات كا أندراج ہوا ہے۔ یہ بلاکت عالماً عصب البیر کے اتتناع (vagal inhibition) کے باعث موتی ہے او کمتبئب بلیکوراکی خرامش کی وج سے واقع ہوما اسے ۔ مزمن اصابتوں میں بہ ظاہریہ خطرہ نہیں موجود ہوتا۔ رم) ایک خاصہ وسیع جرّاحی علیہ سنجام دیا مائئ مِن بِيلِيول كَي إتني كا في مقدا وكا جزوي استيصال (resection) عمل من الأياجامخ جس سے لم تھ سینہ کے اندر واغل ہو سکے .. وینز شائی بلیورا (visceral pleura) چھیل لیا جاتاہے (تفتیرے decortication) 'اور تھیمھڑا برسوت مبل کر کہفہ کو ير كروتيا يد - (۳) نرقيع الصدر (thoracoplasty) كاعليه (الماخط بوصفى 175)-يمسئله اكثر بيش أن عيك ويعاد لينوراني انصاب كي أن اصابتون ا جو نبقه سبحیہ کے باعث ہوں ' مِرّاحی علیہ کرنا جا ہے' مثلاً اس وقعت جب کرما آ<u>گ</u> كسي قدر كُند لا مواور خرد ببني امتحان كرهن يرائسُسُ من كثيرا لتعداد كست إلا تكال نواتی تطبیہ(polymorphonuclear cells)موجرو پائے جائیں ۔ اِس کا جواب یہ ہے کہ جزوی استیصال صلعی (rib resection) محفیٰ اُسی وقت علی میں لا اطاعے جب كر متيقى ريم موجود مواليكن گندلاستيال اگر مندار كثيرين موجود بوتو است ندرید استصامل (aspiration) قارج کیا جاسکتا ہے ۔ کیتی لی ، وا (Lee, Va.) كمتقام يرامريك شابلت سي سل طريقة على كافائده أن تعيمات الصدري معموم موکیا جوخون یانش (hæmolytic) نبخه سبعید کی وجد سے موٹے تھے۔ ابتدائي اصابتول مي واعد الجنب كيساته اكر وات الريدموجود بموتاسب. مزيد برآ ل اگر جزوى استيصال ضلعي كاعلىد زياده أتبدائي درج مي عل مي لا إجائ قرمکن ہے کہ زخم سرایت زوہ ہو کر عنونة الدم (septicemia) پدا کرد ۔۔۔۔ انصاب کو وہ گند لا بھی ہو' اکثر بلاعلید کے صاف جو جا آہے۔ اِس کے مجس ير عبى مكن ہے كه دويا تين سفتوں ميں بريب مويا ب بوجائے ۔ اميع لت مي جندى المتيصال منكعي (rib resection) على من الأماحيا سبئه - تمتيح الصدر كم عبرًا حي

علاج کے دوران میں مریض کو ہرطریقہ سے عمدہ غذا توسشگوار ہوا اور تقوی تھیا۔ مٹلا کونین (quinine) اور لوہے سے ہما را دیا جا ہے ۔

امتيقا والعبيد

مستنقاءالصدار

(HYDSOTHORAX)

اس اصطلاح کا اطلاق کبند بلینوراکے اندرستیال کے اس اجتاع برکسا جاتا ہے 'جو التهاب كا نبتحہ نہ ہو بكه مرض قلب يا مرض ترائث اكبت مكر cirrhosus) (of the liver كانتيم مو إسية من باليدكي وجه عدودا بن خون من ماخلت و اتع ہوسے سے بیدا ہوجائے۔ یہ فی الحقیقت کہند کیمولا کا استفاعہے، اور کسس سال من اس سے کم البوین اور کم فائیرینوئن (fibrinogen) موجود موسا __ لہ نتنا زات کبنب کی ہوتا ہے ۔ 'سکس کے طبیعیا، رات پیٹورائی انصباب کے م مضابه موسقه میں لیکن رگرد (rub) کا مضبه غیرموجود برتی ہے۔ *و کا جیبا کہ اکثر ہمو تا ہے' یہ ایک عموی یا مرکز ی سبب سے بیدا ہو تا*۔ زات الجنب كحُهُ تنبت بهت زياده مرتبه دو جانبي يا يا ما ما ہے . ليكن كمي كم ببت ٹرایک طانبی انعساب می محض استقا (dropsy) ہوسکتا ہے۔ استها والصالہ كى مشناخت كا انخصار عام طور برسرگذشت مرض (history) اوراس كويداكيك و آمے امرامن کی مسا بقد موجود گئی پر ہوتا ہے ۔جب یہ سیال نکال لیا جائے ٹو انکے اندرموجودر سنے والے طوی عناصری نوعیت تضمیص میں ممد بموسکتی ہے میا کاالیجنب کے عنوان کے تحت بیان کیا گیاہے۔ اگرامسٹک آیٹر (acetic acid)التمالی ا نصباب من الما يا ع أع تو ايك سيد كندلاين (white turbidity) بيدا موجاً اي-ایک انعساب مجبرل (passive effusion)کے ماتھ اییانہیں واقع ہوتا۔ اس کا غلاج بشتر نا نوی ارمیت رکھتا ہے اکیونکہ یا اس کے پدا کندہ <u> مرکے علاج برشتل ہے۔ چرنکہ اگر سیال کو فائج کیا جائے تو اس کا بھرواقع ہو قا</u> تعریباً بقینی نے کہذا برل (paracentesis) یا استعامی (aspiration) موت

، می وقت عل میں لانا چاہئے جب کدایک بہت بڑا انصباب ' (جونو 10 مرفایک ہی جانب پر ہویا دونوں جانبوں برمنقتم ہو) تنفس میں خطرناک طور پر رکاوسٹ پیدا کرد کا ہو۔

صدر دموست

(HAE MOTHORAX)

إس اصطلاح سع مرا دنون كا وه انصباب سع جر شرى مقدارس كمغ المورا كه اندر مو - اسس كا انتمال ممن ان خون آ لود معلى انسبابات كه في نبي كتيا ا ا جوزات الجنب میں اس قدر عام میں مصدروموست مموماً زخمول تعفروات یا صدری انورسا (thoracic aneurysm) کے دنشقاق سے پیدا ہو ماتی ہے۔ رخوں کی طالت میں زندگی کومب سے بڑا خطرہ باہر سے نون کے سرایت زدہ ہو بانے سے ہوتا ہے ۔ سبض اوقات یہ مدرن پلیورامیں واقع ہوتا ہے، یا ایک بل ریوی کے کہفہ (phthisical cavity) کے اندرایک ربوی عرق کے انشقاق اور ازال بعد لمیروراک اندر نوان کی وعا برری (extravasation) سے واقع بوما ہے۔ مستنتی اصابتول میرید ایک نفاخی آلجه (emphysematous bulla) کے تعییط فاسے سے (Newton Pitt) یا کہت مگر فراتی گؤے (Newton Pitt) یا متع قلب (dilated heart) کے ماتھ یائے جانے والے انحطاط یافتہ عروق سے ما نجيت مرض (malignant disease) سے واقع ہو طآ اے۔ اور بعض او قات یدا ولی (primary) معلوم ربوتا ہے اور اِس کے مبار اوکی توجیہ کمجی نیس موتی ۔ طبیعی ا ارات کہنے لیپورائی کے اندر ایع کی موجود کی کے ہوتے ہیں۔ زخول کے بعد پیدا ہوجائے والی مدر وموست میں اسی جانب کا ڈاکفرام ملب داور يعركت بوتا ك يحضن بهت بكيابوا بوتابي، اورسيال سداوير بهت وطيلا موا است عب كانتي يه مو اسب كراكودان مك (Skodaic resonance) خاص طوربر نمایاں موتی ہے۔

تشخیص کا انحصارا فرسائی حالت بن امتی سرگذشت براوراس خشیان (Syncope) ورسوب (pallor) بربوتا ہے اوخون کے سریع الوقع ضیاع برلالت کرتے ہیں۔ مکن ہے کہ صدر و موسیت دون استقصار (exploration) کرتے ہیں۔ مکن ہے کہ صدر و موسیت دون استقصار (aspiration) کا بے بریا جائے آتا ہے والے اور ایکا بی مطابع کو بدر دیا استمام (معابق الما المبتریہی ہے کہ اگر فن را دوبارہ بیدا ہو جائے کہ بہت اسکان ہوتا ہے ۔ استمالاً بہتریہی ہے کہ اگر فن را دباؤ بدا کر کے تکلیف کا باحث نہوت استمام دوبات کو بھر کا بحث المراب ہوتا ہے کہ اور بجائے اس کے آلیجن وافل کر دنیا کہ فائدہ مند بوقارج کیا جا سات میں ایک متوسط صدر و موسیت کو بھر کھنے کے ایک ہفتہ کے بعد استمال کے قد بید فارج کیا جا مکا کہ مند وافل کر دنیا کہ فائدہ مند بوقارج کیا جا مکتاب کا اور بجائے اس کے آلیجن وافل کر دنیا کہ فائدہ مند بوقا ہے ۔ عفونی سدر دموسیت کے لئے آزاران ڈسیا بت (free drainage) کیفور بوقا ہے ۔ عفونی سدر دموسیت کے لئے آزاران ڈسیا بت (free drainage) کیفور

كياس صدري

(CHYLOTHORAX)

ثناف اصا تول میں کمفہ کیئورائی کے اندرکا انصباب سیدادردودہ جیا ہوتا ہے' ان سیالات کے اند جو بیض اوقات کمفہ باربطونی ہی موجود ہوتے ہیں۔ بیض اصا تبول میں بیشتی کمیلو س صلی کی ہوتی ہے' اور بیضن میں ایک کتیلوس کنسا انصبا ب (chyliform effusion) ' جس میں لبنی منظم کیلوس کتیلوس کنسا انصبا میں ایک مرتب کیلوس کا دایک مرتب کے ذرات کے باعث ہوتا ہے (طاحظہ ہو استقائے شکمی کی بلوسی = Chylous کے ذرات کے باعث ہوتا ہے (طاحظہ ہو استقائے شکمی کی بلوسی = Ascites میں موتے ہیں، ۔۔۔ سینے میں فوق صدری (thoracic duct) کو تضر رہنے جائے سے کیلوسی صدر ومویت (مین میں ایک ایک ایک ایک میں موتے ہیں، ۔۔۔ سینے میں فوق صدری (chylo-hæmothorax) کو تضر رہنے جائے سے کیلوسی صدر

امترواح الضدر

(PNEUMOTHORAX)

امراضیات - کمف بینورا کے اندر بواکی موجودگی استوواح الصلی کبلاتی ب - اگر اس کے ساتی معلی می موجود بوتو یہ آبی استوواح الصت ال (hydro-pneumothorax) کبلاتی ہے - اکر بوا کے ساتھ بیب بھی موتوں بھی استوواح الصلی (pyo-pneumothorax) کبلاتی ہے اگر بواکے ساتھ فون ہوتو دھے کی استہ واح الصلی (hæmo-pneumothorax) کبلاتی ہے ا

دموی استوواح الصدی (hæmo-pneumothorax) کیلاتی ہے۔ کیف کیمورائی کے اندر ہواحب ذیل طریقوں سے واعل موسکتی (اللف) وبوارسين كه إندرككسي موراخ كى راه سے الب اسلم تعشش ككنى تفرق کی راوسے کا (ج) کبھیمی قرب وجوار کے کسی ایسے مٹ کے انشقا تی ۔۔۔ جو ہوائیشتل ہو۔ (ااف) استرواح العدر ببلو کے ہرا بیے زخسے سے پیا مولما ہے جو ویوارسینہ کی ساری و بازت میں ہوکرگذرتا ہو۔مصنوعی طور پر بہسکس وقت پیدا ہوما اے جب کہ تنیع الصدر کے لئے مبلی کا جزوی استبعال کیا جا تا ہے دری استرواح العدر = pyo-pneumothorax) كا جبس ريوى كاعلاج معسنوعي استرواح العدد (artificial pneumothorax) سداكرك كيا عا آ ي - (س جب ایک کمور تبلی بلٹو راکی دونوں تہوں کو اس طرح متنقوب کر ویتی ہے کہ موجعت سے کہنے لیئورا کے اندر واخل ہوجاتی ہے ' تو بھی یہ طالت پیدا ہوجاتی ہے ' آ ، فاليكه ملدس المربتي ب -سطح سشش كانشقاق سے خود بخود واقع موجانے والے استرواح الصدر كي دس اصابتون مي سے نوابسي تعين جسل ريوي كيے بامن بيدا ہوئیں جب کہ ایک کہف (vomica) عل تقرح کے فدیعہ کہنا لیکورائی میں کھوا کیا تھا اورنسته كم عام طورس اكب تعتيم الصدر مليموراك اندرس تكل كرستس سي سني ما اور بهوا لميوراني تا چرمي داخل موكرايك ري استرواح الصدر پيداكر ديتم ... فرات الرية بن بليورا كامتنقق بونامعلوم موابث من كالتيحديد ال

امركل كراك الته واح السدرين كياب - اورشش كاتبيع الدخ الم المي المعتود المعت

ا مترواح العدار کو اس کے بید اکنندہ فتحہ کی حالت کے محافظ ہے مفتوح

(open) مسدوو (closed) کی مصراغی (valvular) کرسکتے ہیں۔

مفتوح استرواح الصل (open pneumothorax) - جبکسی

یرونی زخم سے بواسینہ کے اندر داخل ہوجاتی ہے اور نزم مفتوح رہ جاتا ہے اور نزم مفتوح رہ جاتا ہے استرونی نزم سے بواسینہ کے اندر داخل ہوجاتی ہے ۔ اور ندصرف زخی شدہ جانب کشش خودا بنی لویک کی وجہ سے بچک جاتا ہے ۔ اور ندصرف زخی شدہ جانب کاشش کاشش کیکر کاشش کی کہ مقابل کاشش کی کی قدر منقبض ہوکرا ہے ساتھ وہ سط کو گئی ہے ۔ اس کا نیتی یہ ہوتا ہے کہ احت الی کی پینقدر جانبی فیروضنیت الفعاب کی صورت میں ہوتا ہے ۔ جب سل رہوی کے کہ فیدکا انشقاق اس طرح و اقع ہوکہ روزان فیر مدود رہے اور تا جائی ہوجا کے سے غیر وضعیت و اقع ہوتی ہے مورت میں بھی استرواح الصدر و اقع ہوجا کے سے غیر وضعیت و اقع ہوتی ہے۔ ان دو نول حالتوں میں استرواح الصدر و اقع ہوجا کا اوسط و با دکرہ ہوائی کے مورت میں جو تا ہے ۔ استرواح الصدر و اقع ہوجا کا اوسط و با دکرہ ہوائی کے دیاؤ کے برا بر ہوتا ہے ۔

مسل و ۱ ستوواح الصل سر (closed pneumothorax) بب روزن چیوا موتا ہے تومکن ہے کہ وہ لمف سے برسرعت مسدود ہو جائے۔ ایسا ہو سے سے مزید و عابدری رک جاتی ہے اور مکن ہے کہ ہوا تمامتر حبنہ ب برب کیسود بڑی ہے لیئوراکی دریدگی (laceration) ہو جائے کی شالوں میں اور بعض افات مرض سنس کی وجہ سے واقع ہوئے والے استرواح الصاری بہم موہت بیش آتی ہے۔ مسدود استرواح الصدر میں مجبوس ہوا کا تبدر کج ترقی بدیر مذہب واقع ہوتا ہے اور احتار کی غیرو صنعیت (جبکہ دیگرامو افع ہوتا ہے اور احتار کی غیرو صنعیت (جبکہ دیگرامو مساوی هول) اس سے کم ہوتی ہے کہ ختنی مفتوح استرواح الصدر میں ہوتی ہے۔ مساوی هول) اس سے کم ہوتی ہے کہ ختنی مفتوح استرواح الصدر میں ہوتی ہے۔ مصراعی استوداح الصل سراعی استوداح الصل (valvular pneumothorax)

ایک مسال مکان بر ہے کہ ملیورائی جھاتی یا کمف کی ایک وجی روزن برسفکتی رہنی اور (inspiration) بنا دیتی ہے۔ ایسی صورت بن بی بی (valve) مسام (expiration) بنا دیتی ہے۔ ایسی صورت بن بی بی (expiration) کے ذریعہ سے بووانا جُر کمیٹیورائی کے اندر کھنج آئی ہے نیکن ووان فی رائی کے دبا وک میں با ہر نہیں جاسکتی۔ اوسط دبا و تتبت بوجا آہے ' یعنے کرہ موائی کے دبا وک نسبت زیا وہ طرح جا آہے ' اور حکمن ہے کہ احتاء کی غروسنیت (displacement) انہمائی ورج کا ہوجائے۔ اس طرح سے مکن ہے کہ اور سند کا مفاخ (misplacement) انہمائی ورج کا ہوجائے۔ اس طرح سے مکن ہے کہ قلب مفابل کی جانب کو بہت دور آگ وسکیل دیا جائے۔ اس طرح سے مکن ہے کہ قلب مفابل کی جانب کو بہت دور آگ وسکیل دیا جائے' اور ڈوائفرام کے تسطیح بسٹ (flattening) اور از کیا س (inversion) کے با عث مگر یا طحال بھی نیچے بسٹ جائے۔ مکن ہے کہ دو سرے روز نو س کی طرح مصراعی روز ن مجی ا نضا ما سے صدور ہوجائے۔

ر المسلم المورد بوجائے۔ بہوطش اور اعضاء کی غیروضعیت کی مقدار مختلف اسا بتوں پیش کی مابقہ مالت سے انز پدیر ہوتی ہے۔ اگر ششش سِّل ریوی میں وسیع طور پر مرضی ہو' یا بیشتر حصے میں منضم (adherent) ہو' تو بنبوط بدسنب اس وقت کے

جب که وه میشتر تصفیمین مندرگرت موکام طبیعی اِما را ت . گمک (resonance) کا انخصار ایک کهفه کی موجودگی

عبیعی اما را ت. کمک (resonance) کا عصار ایک کہم کی موجودی مرا اسی کیکدار دیواروں کی موجودی میں موجودی میں اور ایسی کیکدار دیواروں کی موجود گی پرہے جو مواکی موجوں کے ساتھ ہم آہنگ موکر مرتعش ہوئے کی قابلیت رکھتی موں (ملا خطہ ہو صفی 122) ۔ دیواروں کی کیک زیادہ تر کہفہ کے اندر کی مواکے دباؤ پر سنجھ ہے ۔ اگروہاؤ بہت بلب دہو میں کیک خواجی استرواح العدر (valvular pneumothorax) میں کا تو مرجم ہوتا ہے ۔ نیز وہ اس وقت بھی اصم ہوسکتا ہے جب کہ واطی دباؤ کرؤ موائی کے

ہ وُ کے را بر ہو' جیسا کہ تنتیجا تصدر کے لئے بیخ وی ہتیصا**ل ضلی کرنے کے بعد مو** اسسے ۔ ز كارفت رى مالات مي خواه يه نشار كرهُ موا كه نسبت زياده إكم بو كرم كرمن ر ایک تکتی سنسر مال جو تابیخ اور اس کے ساتھ حرونیا کی (brut d' airain) با صون جرسی (bell sound) بس بوتی ب (ملاخط بروان صفحات 127'123) م اور نهایت سازگارمالات می ایک د هاتی جمنکاس (metallic tinkling) موتی ہے (ملاخطہ ہوصفحہ 126) ۔ یہ امرکہ حرر فیاسی (bruit d'airain) کا انخصار کیف کی دیواروں کی نجک پرہوتا ہے، اورخو د لخک مشمولہ مواکھ و با و پر نحصر ہوتی ہے ، طالب علم حسب و ل طریقہ ہے معلوم کر سکتا ہے :۔ وہ ایت اکمنہ بندكركَ این كال تعلامًا بن اورگال پرایک مكر رکمکراسے دو رہے سنکہ بھو کتا ہے۔ اگر مُنہ کے اندر کی محبوس موا پر گابول سے میم طور پر دباؤ و الاحاب موسیقی واز بیدا جوماتی ہے۔ ایک دومری ممتز آواز بیدا ہوسے کی ب یہ کرمیال سین کے بالائی حصہ سے سین کے حصر کریں تھے ایم کے اندا مُبِيكُمَا ہے ۔ یہ آواز تقریباً موسیقی صغت کے ساتھ گونج انفتی ہے تبغی نربر (respiratory murmur) اکثر بالکل فرمسموع رمت ہے کیا خیف قدری فس (amphoric breathing) موجود موتات - قدری معنی شیش کے بسوط کے ما عث ہوسکتا ہے ما اُس روزن کے باوٹ جو ایک شعبہ سے کھل کرایئرواج العبکہ كه اندرجاتاب - ليم ايك خيف تراواز كاوتوع اس وقت محى مكن سب جب که انتفاه ت من سنتش کو کبفهٔ پلیئورانی کی طرف سنه مسده د کردیا موصوتی ممك (vocal resonance) او كمسى ارتعاش (tactile vibration) عمومًا ببت کم بوجاتے میں نیکن شعب صوتی (bronchophony) یا صدر کلامی (pectoriloquy) أس وقت موجود بوسكتي سن جب كة قدري تنفس موجود مو-اگر ساتھ ہی ایع انصباب بھی موجو د ہوئو وہ تمام مالات ہیں سے نے النفل ترین حصے میں بدر معیر تما ذب جمع جو طاقا ہے۔ اگر مریض لیٹا ہوا ہو توسیر کا بکیلاحصہ اصم (dull) اور اگلامی فلسی (tympanitic) بوطآ اے۔ اب اگرمریض اُ مُعُکر بلی طائے توسین کا مفل حصه ایک اور پیچے اسم ہو ما ، ہے '


اور بالا في حصد "أكے إور تيجيے" كمك دار ہوتا ہے ۔ اگر هز و بقر ط Hippocratic)
(splashing sound) كيا جائے تو جيككنے كى آن از (splashing sound)
حاصل موكى (الماخط بوسنمہ 126) ۔

استرواح العدد کے علامات نہا یت تغیر بندیر بوتے ہیں اور اُن کا انعام اس من من کی مقدار بر ہوتا ہے آرائن واح العدد ایک الیسے شش برطاری ہوجائے ہو وہ یع طور پر مرضی ہے تو مکن ہے کہ وہ اس کلیف میں جوکہ بینے ہی موجود ہے نہا بیت شفیف سا اضا فرکرے ۔ اگروہ الیسے ششش میں واقع بہوج بشنز یا تمام تر تندرست ہوئو علامات برت نمایاں مول کھے اور با آل خرا اگر سل دیوی کی ایک الیمی اصابت میں جو اس بر استرواح الصدد واقع بروجائے تو مکن ہے کہ نیتجہ بر مرحت مہلک ہوجائے ۔ علامات شدید اصابول واقع بروجائے تو مکن ہے کہ نیتجہ بر مرحت مہلک ہوجائے ۔ علامات شدید اصابول میں یہ ہوتے ہیں : ۔ تا گہائی ور واور اس کے ساتھ یہ احساس کہ گو یا اندر کے طرف میں یہ ہوتے ہیں : ۔ تا گہائی ور واور اس کے ساتھ یہ احساس کہ گو یا اندر کے طرف میں یہ ہوجائے ۔ مائن تیز ہوجاتی ہے ۔ ماوف جا نب پر سینہ میود لا ہوا ہوتا ہے اور بی الاطلام فضائیں شہرتی پر سیت ہوجاتی ہیں ۔

م یں ہی پر بب ہوجی ہیں۔ تمکن ہے کہ یہ تکالیف بڑھتی رہیں ختی کہ جیند گھنٹوں یا دو ہین دنوں ہم موت واقع ہوجا ئے 'یا ابتال کی شدید علامات میں تخفیف موکر اس کے میدانستر آ معلوم ہو' ممکن عموماً ساتھ میز سائنس اور انتصابی نفسس (orthopnea) موجود



الف - أبى اسنه واح الصدركيس سيال كاليول وكها بأكيا ب.



ب - ڈائفرامی فتق اور لپرر سے معدہ کا اور کھنج آنا۔ (بیشعاع کا آسیں مسلم لنڈے لئی برب) مسلم لنڈے الک نے لئی برب) بلعال معد 192 بلعال معد 192

اورائس کی بالائی سطح ایک افتی خط ہوتی ہے ایکن آس کے اوپر ہوا کی وجی شفافیت موتی ہے اللہ سلم کو جبکا ہے برجمی سیال کی سطح برتور فرقی ہے دالم الله برخی سیال کی سطح برتور (diaphragmatic hernia) بیعنے ڈالغرام کے روز ن کی راوسے معدہ یا قولون کا مدر کے اندزیل جانا اپنے طبیعی الح رات یں امتروام الصدر سے قربی سٹ بہت رکھتا ہے اور مال طریقہ سے بینی سینہ کی امتروام الصدر سے قربی سٹ بر ایک ایت بیدا ہو سکا ہے اور مال طریقہ سے بینی سینہ کی وجم فرنسگی (contusion) کے اعت بیدا ہو سکا ہے۔ بائیں شش کے انقاب کی وجم سینہ میں معدہ کی فرز ممر کی طور پر لبنہ وصن قیام ہونا اور ڈالفرام کے نیج ایسا خراج ہونا جو المصاب المصاب الف صنی استر واح الصاب علی استروام الصدر سے مضابیت رکھتے ہیں۔

انداریس بوی می استواح الصدر کاخود کو دوقوع فی البحلایک ایجا واقعیب اور اس کے بعد مربینوں کی حالت میں اصلاح نظر کی ہے (طاحظہ مو مصنوعی استرواح الصر = artificial : neumothorax) موسری مورتوں میں اندار مناسب معالیہ کے ساتھ فی البحلہ ایجا ہوتا ہے ' اگر چر اس کا انحصاران حالات پر ہزا ہے جو کہ ساتھ یا نے جاتے ہیں۔

علاج۔ یہ بنت تعفیقی (palliative) ہوتا ہے۔ قبتی کے ساتھ ہوت اور ورواور کلیف ہوتی ہے اس کے ازالہ کے لیے انیون کا استعال یا ارفیا (اورا کی لیے انیون کا استعال یا ارفیا (اورا کی لیے انیون کا استعال یا ارفیا (اورا کی گریستان اور تکسیدا سے گریستان المجلای اشراب کرناچا ہے ، اورا کرم بیلنسیں اور تکسیدا سے (wine) کا آبا استعال کرناچا ہے ۔ مین ہے کہ انہاں انتخاج کی مالتوں ہی برایدی کی مالتوں ہی بزل (paracentesis) علی میں لانا بسندیدہ ہوئی کے لئے کمکی رقب برلیلیوں کے درمیان ایک برزل (trocar) اور قنو لیے (cannula) وائل کے درمیان ایک برزل (trocar) اور قنو لیے (اور کر ہوائی کے داؤک برابر بہنج کرکے ہواکو با ہر بیکنے دیا جا آہے یہاں تک کہ دیا ورکو ہوائی کے داؤک برابر بہنج جا اور کر اور کر کی ہوائی ہے داور کئن ہے کہ جا ہوائی معرای استرواح الصدیل جن کرکے گریکر فائے ہے۔ اس کے قیاول طریقہ یہ ہے کہ ایک معرای استرواح الصدیل جن کرکے گریکر فائے ہے۔ اس کے قیاول طریقہ یہ ہے کہ ایک معرای استرواح الصدیل

تیرنگل (Sprengel) کا تقطی پیپ (filter pump) استال کرکے ایا متعقل منہ وائد اور کھا جا گھا ہے (63) ۔ اگر سطش کے ماتھ ارتباط کا یہ است مدود ہو جائے تو جا فال مذب ہو جائے تو جا کہ فال مذب ہو جائے تا ہے کہ آگر سے واضل کی جائے تا ہے مائے دور اور الدون کی عرف سے انکی است کی مقدار فی معدی المندر کی جائے ایا کرنے سے فائر وجن منتشر ہو کر کا جا تی ایک رہے ہے فائر وجن منتشر ہو کر کا جا تی است و احدار (hydro-pneumothorax) میں معمل کو و بسے ہی فیورٹر دیا جا است و احداد الصدر (hydro-pneumothorax) میں معمل کو و بسے ہی فیورٹر دیا جا اسکا ہے۔ اگر ہے کی اگروہ زیادہ مقداروں ہی موجود ہو تو اسے فدر بعد کرزل خارج کیا جا سکتا ہے۔ اگر دی واس کو وی جا کا ہے۔ اگر دی واس کا طلح ایک میں طلاع کی طرح جزوی ہی جا کہ و فیرو) بیدا کر دا ہو تو تو اس کا طلح ایک تھیج المصدر کے طلح کی طرح جزوی ہی جا سکتا ہے۔ و فیرو) بیدا کر دا ہو تو تو اس کا طلح ایک تھیج المصدر کے طلح کی طرح جزوی ہی جا سکتا ہے۔ و فیرو) بیدا کر دا ہو تو تو اس کا طلح ایک حقیم (drainage) سے کرنا جا ہے جو مصل فیکن جب یہ صورت نہ ہو تو اس سنال کے ساتھ وہی سلوک کرنا جا ہے جو مصل کے لئے کیا جاتا ہے۔

والفرامي فتق

(DIAPHRAGMATIC HERNIA)

ال الوقوع حالت كا تذكره يهال إس ك كياجاً الم كروزكرده فا معمولات صدر مي لازة ترميم بيداكرد تناجي اورايس طبي الواحب بيدا معمولات صدر مي لازة ترميم بيداكرد تناجي اورايس طبي الواحب بيدا موجات مي جواست و الصدر أكم ا ما وات سے قريبی شا مبت ركھ سكتے ہيں۔ وُ الفرام فتى يہ ہے كہ مشمولات شكر ميں سے ایک یازائد عمواً معدے كا الم ترب (omentum) كا يا قولون كا ایک عقد وُ الفرام کے ایک روزن كى راق اور كو صدر ميں جلاجا آہے۔ يه روزن بينتر قو تغرر كانتيجه بوتا ہے ' جيسے كرمين كا ايک زور كے ساتھ مفنوط بومان يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يه ایک ايک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا کا ايک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشي نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نقص بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نقط بوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نقط بیدا تشی نقط بیدا تشی نوتا ہے ' يا يہ ایک بيدا تشی نوتا ہو با نا کہ بيدا تشی نوتا ہے ' يا يہ ایک بیدا تشی نوتا ہو تا نوتا کیا کہ دونا کی نوتا ہو تا کہ بيدا تشی نوتا ہو تا کا تا کیا تو تا تا کا تا کا تا کہ دونا کیا کہ دونا

فدرتی سور اخ کے بڑا ہو جانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ضرر بائیں جانب پرنستہ زیادہ کٹیرالوقع ہوتا ہے اور سعدہ عام طور بروہ حث وہ جوصدر کے اندر جلاجاتا ہے۔ اور سس عل کے اثنا ہی اور کو کھنے جاتا ہے (محفہ 4 میں)۔

بعطیری آمارات جوسینی میں ویکھ جاتے ہیں یہ ہیں و سعنہ زیری میں جال بروزکردہ جن واقع ہے ' بیشگک (hyper-resonance) ' اورساتھ ہی ہموات نغنس کا فقدان تغریر کی آوازی (gurgling sounds) جو ہزو (metallic echo) و ر کرمے پریا خود بخود سنائی ویتی ہیں ' فلزی آواز بازگشت (metallic echo) اور حرو مناسی (bruit d' arain) ہے ۔

نرمیر ڈا نفوا می ا ستوواح الصلا (subphrenic pneumothorax) بمی کمیقدر مانل طبیعی امارات بیش کرسکتاب مه وه وائیس جانب برزیاده عام موائی اور اس سے جگر نیچے کوش کم کے اند وصکیل دیا ما اسے میس کا امکان مہیں کہ

ائس سے پیدا ہونے والی بیش گمک (hyper-resonance) سیندیں اتنی لمبند واقع ہو جتنی کہ دورری دومور تول میں سے کسی میں واقع ہوتی ہے، اور فالباً سرگذشت ِ مرض مُمِد تعینے میں ہوگی (ملاخطہ ہوسحف ۳۷ العن جوصفیہ 407 کے مقابل ہے)۔

مقابل ہے)۔ تشخیص ۔ ڈائفرامی فتق کی شخیص کسی بیتین کے ساتھ مرف لا شعاعی مخا سے کی جانکتی ہے 'جواک غیر شفاف کھانے (opaque meal) کے معد کرنا چاہئے اللاضط ہوصحفہ مردی ۔

علاج ۔ بیض مریضوں کو ابتدائی کالیف رخ ہوجا ہے کے بعب دکوئی تشویشناک ہے آرامی نہیں محسوس موتی ۔ جراحی علاج یہ ہے کہ سینہ کو کھول کر' اور پہلیوں کے اجزاکا امتیصال کر کے شاکو کو اندر واپس کر دیں اور ڈ انفرام کو سی دیں ۔ سی دیں ۔

التهاب اسط

(MEDIASTINITIS)

البتاب واسطنعتی بوسکتاب یا فیرتشی اول الذکر سینے واسطی خواج (mediastinal abscess) متعدد اسبب سے بدا ہوجا ہے، جن میں مب سے زیار وکٹیرالوقوع یہ بین : ۔ گولی کے تفرات وخر (stab) یا مزب (blow) اولا فیرو میں المجنب سرخاد فیر دانت الرید و ات المجنب سرخاد فیرو میں المجنب سرخاد فیر دانت الرید و ات المجنب سرخاد فیر المین میر محکمتا ہے اللہ المین میر محکمتا ہے اللہ المین واسطی میں ہو محکمتا ہے اللہ المین و سروال الذکر میں ہوتا ہے ۔ یہ خراج الکے ایجھے واسطی میں ہو محکمتا ہے المین ریا وہ تر اول الذکر میں ہوتا ہے ۔ ناص علامات مقتبی رُ (sternal pain) موجود کو بہنے جائے ۔ ایسی حالت میں المین سروال میں المین المین

عظم القعل كوترفان سے كاف و نيا (trephining) أياس كا جزوي سيما (resection) كردىت امائية .

مریت (traumatism) اور عموی امراض ساریت انفست ما می اور عموی امراض ساریت انفست ما می این تقیی البتاب واسط بدا بوسکتا ہے کیکن اس کے عام ترین (adhesive) مثلاز ما ت (associations) وات البحنب اور شیتی البتاب ارمو pericarditis) مثلاز ما تا بخصوص آخر الذکر بر ایسی صور نت میں لمیعی المها المحاسط (adherent می مداکر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر انفعا تی مول و pericardium) مداکر دیتے ہیں۔ اس کا ذکر انفعا تی مول کے محت کیا گیا ہے۔

حوالهجات

REFERENCES

1	M Brown and		
	C G. Imrie	1932	Quart. Journ. Med., N. S 1., p. 319.
2	2 Ff Roberts .	1922	Journ. Physiol, 56, p. 101.
3	Sir W. Hale-White.	1924	Lancet, 1., p. 263.
7	Campbell, Hunt and Poulton .	1923	Journ. Path. & Buct., 26, p. 234.
8	P. HS. Hartley &		
	I. J Davies	1923	Brit. Med. Journ., 1., p. 1052.
9	J. F. Gaskell	1927	Lancet, 11., p. 951.
10	C. McNeil & A. R. MacGregor	1927	Brit. Med. Journ., 11, p 582.
11	C. Wall & J. C. Hoyle	1933	Brit. Med. Journ. 1., p. 597

ليدوك	عل کمپ م	حوالمبات	195
12	W Burton Wood	1930 Lancet, i., p. 1339.	
13	S. Van Leeuwen	1922 Neurotherapie, No. 6.	
14	H. W. Barber & G. H. Oriel	1928 Lancet, ii., pp. 1009, 1	064.
15	S. Van Leeuwen	1924 Klin. Woch., 3, p. 520.	
16	A. Francis .	1917 Parctitioner, August	
17	S. Van Leeuwen	1923 Klin. Woch., 2, No. 27.	
18	J. Freeman	1920 Lancet, 11., p. 229.	
19	S. Van Leeuwen & Varekamp	1921 Lancet, 11., p. 1366.	
2 0	A. G. Auld	1921 Lancet, 1., p. 698.	
21	S. Gilbert Scott	1926 Brit. Med. Journ., 1., p.	939.
22	S. Van Leeuwen	1927 Brit. Med. Journ., 11. 344.	, p.
23	McCrae (Lumleian Lectures on Fore- ign Bodies in the Bronchi)	e 1924 Lancet, 1., pp. 735, 787,	838.
24	Review on Respiratory Diseases .	1920 Med. Sci., 1., p. 462.	
25	A. Abrahams .	1920 Lancet, ii., p. 543.	
26	Zadek	1921 Med. Sci., 5, p. 103.	
27	Review on Pneumonia	1921 Med. Sci., 5, p. 110.	
28	W. Smith	1924 Lancet, 1., p. 257.	
29	S. L. Cummins	1924 Brit. Med. Journ., 1., p.	186.
30	B. Alcock, M. Doug- las, & H. C. Lucey	1925 Lancet, 1., p. 1332.	
31	Sir C. Allbut & Varrier-Jones .	1922 Lancet, i., p. 105.	

32	B. Hudson and Leonard Hill	1924	Lancet, i., p. 1147.
33	Weill & Duront	1922	Journ. de radiol. et d'elect- rol. 6, p. 1.
31	W. C. Bosanquet	1928	Lancet, i., p. 24.
35	R C. Wingfield	1924	Lancet. ii., p. 354.
36	Gravesen	1923	Brit. Med. Journ., ii., p. 506.
37	H. Morriston Davies	1926	Brit. Med. Journ. i., p. 315.
38	C. Lillingston	1923	Lancet, 1., p. 96.
39	W. A. Laster	1927	Lancet, 1., p. 112.
40	H. C. Cameron & A. A. Osman	1923	Lancet, 1., p. 1097.
41	F J. Poynton & Reynolds	1921	Lancet, 11., p. 1100.
42	W S Miller	1923	Journ. Exp. Med., 38, p. 707.
4 3	W. S. Miller	1913	Journ. Morphol., 24, p. 459.
44	S. C. Simpson	1929	Quart. Journ. Med., 22, p. 413.
45	G. H. Oriel .	1929	Guy's Hosp. Reps., 79, p. 376.
46	G. H. Oriel	1929	Personal Communication.
47	R S. Bruce Pearson	1933	Guy's Hosp. Reps. 83, p. 86.
48	F. A. Knott & J. W. Thornton	1933	Guy's Hosp. Reps. 83, p. 63.

49	Argyll Campbell & E. P. Poulton .	1935	"Oxygen and Carbon Dioxide Therapy." Oxford Med. Pub 1935.
5 0	W. E. Gye & E. H. Kettle	1922	Laucet, 11., p. 855.
5 1	S. L. Cummins &		
	A. F. Sladden .	1934	Brit. Med. Journ. i., p. 554.
5 2	L. G. Irvine .	1932	Brit. Med. Journ., 1., p. 693.
53	P. d'Arcy Hart	1932	Med. Res. Counc. Spec. Rep. Ser. 164.
54	P. d'Arcy Hart	1932	Quart. Journ. Med., N.S., i., p. 49.
55	A. Loewy	1934	Arch. Med. Hydrol, p. 261.
5 6	G. Maurer .	1930	Lancet, 11., p. 72.
57	F. G. Chandler	1930	Lancet, ii., p. 74.
5 8	A. J. S. Pinchin & H. V. Morlock	1933	Lancet, i., p. 1114.
5 9	H. C. Cameron	1932	Guy's Hosp. Reps. 82, p. 290.
60	A. Tudor Edwards	1932	Brit. Med. Journ., 1., p. 827.
61	W. Brockbank	1932	Quart. Journ. Med., N S., 1., p. 31.
62	Ff. Roberts .	1933	Brit. Med. Journ., 1., p. 142.
63	E. R. Boland .	1934	Lancet, 1., p. 231.
64	Chevalier Jackson	1930	Proc. Roy. Soc. Med., 24,
65	R. V. Christie	1936	p. 1. Oral Communication.

195

ناک گلے اور کان کے حرال رطبی نقطنہ نظری ا ناک کلے اور کان ناک کے اور کان کے حرال ناک کے حرال ناک کے حرال

بغایرزنده جانم کے منطق امسیوانے ہیں۔ بنقم عندی ابیض Staphylococcus) (albus) مِرْدُولِ بِي مِؤْتِرُورِ إِوْ مَاسِيم عِفُونَ (Bacillus septus) مِرْدَايَك دُفت مِراي (diphtheraid) بَبُ 'اك كيسنت مِن انتوونما يا ماسب مصرد مبقرة الألق (Micrococcus catarrhalis) أنفي بلوم من اور نبته سيد الخضر Streptococcus ((viridans اوزنن مين فالب نظراً أسبع حب زكام تتروع موما سي تر نبق مسجد راخضا سع ببلاعضويه مؤنام ي كم مقدود كي سائدننوونما يا ناسع المحتول المكى زما ده خون ماش نستين اورز ما ده مي باشندول كي بنسبت بيزماده نشو وتما باف كارجاك ر كفنا ب كني در بعدى كاشت إكر مازياده نانوى حله الوروس كى فعالبت ظا بركرتى بدع مثلاً مية فريا لنظر (Freidlander's bacillus) انتقدريو بقسم ميارم اور نبق عنبيه زمید (Staphylococcus aureus) کی اوران سے کو تی تھی جو فرن میں مقامی طور ر بإياجا سكناه بني بشركبيكه النامب مقاى تقيع موجود مور اسى طرح وبالحالحا لاسعابك متسهم كالمحضوير قالب نظر الناجيك اور ميض و يأول مي فيفرك عصيه الفلوميزي Pferfer's Baculus) (influenzæ کے سوایا فی سب عبید فائب ہوتے ہیں سب سے برامُعدِسبب انفی فخار عالیٰ کا ورم اور امنسلاء ہے عمو گا بدایک تر کرؤ ہوائی سنے جس کے ساتھ جی تغییر مذ رتعکین فی البحله مر دارم بیش موا بهدا موما نامے - اسی آخرالذکروافغه کی وجه سعد «سردی لک مانے (catching cold) كامحاوره بيدا موكيات. وبالمن هي البيع بي مالات كے تحسيت واقع ہونی ہیں ۔ملاوہازیں کمن ہے کہ درو*ں خانہ حالات بس کاسبب ہومائیں ۔ لوک* واکٹز ا بسے کرم اور میں وار(stufty) کروں میں بیٹننے بیں جہال کی موارکی مونی موتی ہے کملیکن بوا کے جمرگوں (draughts) سے جن کا فرش کھنٹرا ہوجا نا ہے ۔ اس کا نتیجہ یہ بوقا ہے کہ سُرگرم اور باول تعندسے موجا نے میں ۔ معلیاتی نفظہ نظرسے سرکواور انفی عنا مے خالمی کو مُصَنَّدُ اور مُنغُوک ہوا میں ہونا بیا سے اور باؤں کو گرم ہونا جا ہے (La. Hill)۔ علامات میں ہے کہیں ہے کہیں ہے علامات میں سے ابک یہ طلامت ہوکہ جهینکوں کاحلہ ہو باحلق بر کیجے بن یا نرائنس کا اصاس اور نگلنے بی در دہو ۔ لیکن مکن ہے کہ ان سے بہلے ناسازی کا احساس بؤا درسانہ بی سردی معلوم بوا در در درسرا ورعدم استہا موجود میو یجیسنکو*ں کے بعد میلائی تاک سے ایک ساف مخاط کا اخراج ہونے لگتا ہے۔* اور

مختائے مخالی کے ورم کی موجود کی سے اورس شامہ کے زائل ہوجانے کی وجہ سے ٹاک میں مند مونے كا(stuffness) احساس بونا مع يرم الو الباة (uvula) الجيوم إدر اوزتن برنست اسك کہ جتنے قدرتی مالت میں ہونے ہیں زبادہ مرخ ہوجاتے ہیں۔ زیادہ شدید اصابتوں (تَعَرُّحی خى اش حلق = ulcerated sore throat) من اورتين تالوا ورطبوم بيطمى فرات كيال (abrasions) موماتي من زباك فردار (furred) موتى ہے اور نما بال بيني انتظال (constitutional disturbance) ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آگھیں سُرخ اور سبت (suffused) موتی بی اور اک سے یانی آزاد انظر ریر بہتا ہے بیم وست (fronta) (sinus کی ماوُفیبَنت کے باعث اَبرہ پر دروہو ناسیے' اور پُونسٹینگی'ا نیو ہر کے بندموہانے سے ببرائن بوسكنا ہے ۔ اسكے سات بي تني قار تموى نغال (febrile reaction) مبي موجود مونا ہے۔ اگریہ نازلت (catarrh) صغرہ کک بینی جائے تو آواز بیٹھ ماتی ہے اور متواتر خواش آور کھانسی (irritating cough) موتی سے - اگر نازلت اور آگے بھیسے وں مك من عائد اليع علامات بدا بوماني كي وكد دومرى عدَّ شبى البهاب (bronchitis) كے تخت بان كئے گئے ہيں۔ اكثرو ايك روز كے بعد اس عاد ورج مي تخفيف موجاتى ہے اور س کے رمکس مکن ہے کہ نزلہ کا بہنا جاری رہے اور وہ نماط کے ساتھ ماعت گارها اورز ما ده غرشفات موجائے - إس طرح وه وقین دن سے لیکر دو یا تین مفتول کے تغیر بزیرے صد تک جادی رہ سکتا ہے ۔ اِس عرصہ کے ووران میں اِس امرکا امکان ہے کہ مریض برالتہاب کے مازہ استدادات (exacerbations) مل رسی ہوجا میں ۔

ز کام (coryaa) کی مثالی تھو برالیں ہوتی ہے۔ لیکن دومری اصابتوں میں مکن ہے کہ سرایت مادالہ استخوہ (acute laryngitia) یا شعبی التہاب (hronchitia) کی طرح مثروع ہو کہ بالآخراو پر کے طرف میں کہ کوئی اور ماک میں بہنچ جائے۔ سریر اتی نعشہ مختلف انتخاص میں مختلف ہوتا ہے۔ لیکن فرد واحد میں سرایت کا فرخاصہ کجبال ہونے کا رحمان رکھنا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص میں زکام ہمیشہ النہاب کموم (pharyngitia) کی موائی میں شروع ہوتا ہے ' نو دور سے کسی شخص میں اسلور النہاب مغرہ (laryngitia) کے ہوتا ہے اور میں شخبی النہاب (bronchitis) کی طرح ' اور ملی بدالقیاس۔ اس طرح الوگوں یں اور میں براحد میں شغبی النہاب (bronchitis) کی طرح ' اور ملی بدالقیاس۔ اس طرح الوگوں یں اور میں براحد میں شغبی النہاب (bronchitis) کی طرح ' اور ملی بدالقیاس۔ اس طرح الوگوں یں

ایسی کورسد ا بتوں میں بتلا ہونے کا جوکہ بیٹیز شنمی خطہ کے ایک مخصوص حقے کو او ف کوئی
ہیں انتہائی رمجان ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں کوئن کے لوز نبن نکالد کے کئے موں ' زکام ایک التہاب
بعدم یا انتہاب حنبر و کے طور برشروع ہونے کا زیا وہ رمجان رکھنا ہے ۔ کچے و صفے کے بعد مکن سے کہ صفت یا بی ن زیادہ اور زیادہ تا نبہ موکر ایک مزمن سرایت بیدا موجا سے ' جو لمجافل اس امرکے کے بیطے کون احقہ او فاروا ہے ' مزمن انفی نازلت (chronic nasal catarrh) مرمن شعبی التہاب (chronic catarrhal laryngitis) مرمن شعبی التہاب bronchitis)

یه بادر کینا بیا مینی که ماد النهاب الانعن بعن سادی امراض مشلا انظو سزا که کسسرا که مسرای (glanders) وغیره مین ایک دفتر بیا منطق التاکاری (congenital syphilis) وغیره مین ایک دفتر بیا منطق التاکاری مین ایک دفتر بیا مین التاکاری التاکاری التاکاری مین التاکاری التاکاری مین التاکاری مین التاکاری التاکاری مین التاکاری مین التاکاری الت

نوی سرر (specific lesion) کی میثبت سے واقع ہوتا ہے۔

بہت سی اصا بنول ہیں انعی باشعبی نازلت ال مُدرنیات (vaccines) کے فدیعہ ، چنفسی داستوں میں وباول میں موجود رہنے والے صیتوں (bacilli) اوزمقوں (cocci)سے

ملاح _ فانی تحربہ سے ظاہر مواہ کہ کابات ناماکا کا اوقائی اوقائی

مزمن لتهاب لانف

(chronic rhinitis)

یہ ووسکوں میں دبجہاجاتا ہے۔ ایک میں مجومز من مین پروشی التہاب الانف (chronic hypertrophic rhinitis) کے نام سے موسوم ہے تاک کی اور زیر بی مفتول زائدول (lower turbinated processes) کی غیث مفاطی مہت وبیز موجہاتی ہے اور مکن ہے کہ یہ دبازت مبعوم میں بینے جائے اور سختانی مفتول اجہام کے مہوجہاتی ہے اور سختانی مفتول اجہام کے

تیکیلے سروں کو ماون کردے۔ یہ کم از کم بیشتر اصابتوں میں بجائے ایک المتها بی ورم ہونے کے عرف کے عرف کر دے۔ یہ کم از کم بیشتر اصابتوں میں بجائے اللہ المتها بی ورم ہوتا ہے۔ یہ جو نی مرض (sinus disease) سے بیدا ہوگئی اسے اور وہ بالضوص دین کے دائسندسے واقع ہوتا ہے۔ اور وہ بالضوص دین کے دائسندسے واقع ہوتا ہے۔ اور شائد کی جس کم بوجاتی ہے۔

مزمن ذاولی البقاب لانف (chronic atrophic rhinitis) جس میں مخاطی تعبقی مزبول ہو جاتی ہے اس بدبودار تبی اخراج کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس کی مطبی ہے اور اس کی سطح بر ہے اور اس کی سطح بر ہے اور اس کی سطح بر بیٹر یال (crasts) جم بوجاتی ہیں۔ شامتہ کی میں رائل ہوجاتی ہے۔

تراثین حساستی المهاب الانف (allergic rhinitis)-یه و معالت مے که جس میں ناک بین سے ایک بانی کا سامواد خارج ہونا ہے کو کیفض اوقات بہت وافیونا ہے اوجی کے دوجی کے ساخت جینیکس آفی گئی ہیں کا لیضوس بیمار ہوئے یہ خطار محالحی شاحب اور اسفنی ہوتی ہے کیلٹ برائیڈ بٹ (calcium lactate) گرین ہا کہ دن میں وومزند کھانے سے بہلے دین بہت سی اصالبتوں ہیں موز علاج ہے۔

عَلَاجِ مِنْ مِنْ رَوْشَى نَسْمُ (hypertrophic form) المعلولات كير شاشات (douches) التعلولات كير شاشات (douches) العلولات (sprays) التعلول كرفي جاسئين بن ب كار لولك اكيد و بورك أيسيد و بورك السيد و بورك المسترد و بورك المست

التهاب لاحواف

ناک کے اندرز دانفی اجراف (paranasa! sinuses) کھلتے ہیں نکی مغارات (maxillary antra) بمبهى اجواف اورصفاني عليات كا أكلاكروه الكي اتوان من شامل بي مي ميل معنان طيات اورد نري حوث تحيير كرودس شامل ال

مراحوات وادانفي سراينول مثلاً ركام في متاثر وكي في اوران كفتات عضار مخالمی کے متورم ہوجانے سے ممل طوریہ باجزای طور برمسدود ہوسکتے ہیں۔ اس سے جو احتباس ببدامونا بيلے وہ درد كام حب ہوتا ہے كوك سّائزه وت كے لحاظ سے مخلف مفالت بريايا مانا ہے يسا وقات دردك مائريش كامترب ارتفاع ١٠٢ ف تك ہومانا ہے

مادالتباب الاجواف كاعلاج مخسوص بضائي كتسم ما ماحابيكا كبكن عامرطور مرامكي نوعبت یہ ہونی ہے کہ خوار مناطی می کیٹر (shrinkage) سیداکر نے کے لئے اس کر کوئین

(cocaine) اورابلرربالین تکائی مانی کے ۔ مندمن التھاب الاجواف نے زوانفی اجات کی مزمن سرات کا بنجہ یہ ہو آئے کہ ناک میں سے مواد فارج ہونے گیا ہے کیا زیادہ کنڑت کے ساخت مواد بیجھے کی طرف چلاما آاو ایک سی الغی (post-nasal) موا دخارج بو نے لگتا ہے

جوفوں مبررم کی موجود کی انتضامی علامات بنس ملکسمی علامات برار دنتی ہے۔ بس انفی واد کومکن ہے نکل لیا جا سے ا*ر سس طرح بیرو چینچھ کا مب*ب ہو۔ یامکن ہے یہ منعنسي خطه كوسرايت رده كرد كاورس طرح التهاب تعبى ملكة تمكر والشعب كميمتوالي حليواقع مول .. مزيدران بيموا دمليوم كى لمف اساً بافت كوسرات زده كردتيا ادرس طرح محل كخراش كا باعب بونا ہے۔ ابني مورت بي علمي سے لوزنين كوفعور وارسمي لياجا آہے۔ منتخص ناک اور انفی ملبوم کاریم یا خاطی ریم کے کئے امنیان کر کے کیاتی ہے۔ یا مجمد کا لاستعامی امنیان کرکے کاجانی ہے جبکہ متاثرہ جو صنب میں عتمیت نظر آتی ہے۔

علاج قلوی انفی المولات کے ذریعہ علاج کرنے سے افاقہ تو موما تاہے الیکن زیاوہ کثرت سے جوٹ کی میلیت کی ضرورت ہوتی ہے کہس کے تعقیبلات کے لیے مضوس تضابی کتب الماخط كرني جاميني -

(epistaxis)

رمان یا ناک سے نون بہنے کا انصار مقامی یا عمومی حالات پر موسکتا ہے۔ اول لو میں سے یہ ہں :۔ ناک پر جوٹ لگنا' ناک کو نرینے رہنا' ایک منکنا۔ زبادہ کنزت سے ادباد خود بنور شروع موما آئے۔ نغریم جہشہ یہ آننی فاصل کے اگلے صدیعے اناک کے فرش سے آتے ہوئے بایا مانا ہے۔ وگرمقامی اسباب یہ بین ناک بیں ڈفتھیں یا معیث بالید اوتتو و منبية كم قام الموقا (telangiectasis) - ورميا ني عرب وونسبته كم قام مو ما بيكن

198



شكل الكورروز كانسيلي -

يمرز ياوه مروال انتخاص ميرمن كيعوني مي انطاط متروع موكب موكي الوكثيرالوقوع مواب . مِنْ انْجِهُ وه التَّحْيروة (atheroma) سِتَعَلَق ركمتنا بِعُ - نيز خون كے دَباو كي دياؤني high) (blood pressure) رائك (Bright) كيون عرف عركي كهبت (cirrhosis) على معداعي مرض (cardiac valvular disease) امراض خوان [شیسے کرمناعت تسموں کی عدم وموسی

اورمفیدویویش ائیربرگورا(purpura) اسکروی (scury) } اولیعنی ساری امراض (جیے نب مخرفد اور حميات ناكب اوركم ي كمبي انفار ننزاك تعلق مي ووسر عرمي بوسكتا هيد مکن ہے خون بیجے کوملامائے اور کیلے منخوں (posterior nares) سے اور کیلے منخوں (posterior nares) سے بہنے لگے الیسی صورت میں وہ ملفوم (fauces) کی راہ سے ٹیک شبک کرمیدہ کے انداین کمٹنا اور بالآخر قعے موکر یا برام ستقیم (per rectum) فارج ، وسکنا ہے ' بامکن ہے کہ وہ کھانسی بیداکر کے نفت الدم (hæmoptysis) کا منسب بیداکر دے۔ بند فتار دموی (high blood pressure) کے مراضوں برب بعض اوفات معتدل رماف موقے سے وہ وروسرر فع موجانا ہے جو سلے سے موجود ہوتا ہے۔

ناک کےمعائندسے دمی نقطہ دریا نت ہوماتا ہے' اورا پٹر رنبیسی لیمن گاز (adrenalme gauze) کے زریعہ اصام کرکے مقامی الباق کیا ماسکتا ہے باکن (cauterise) كِبَامِا مِكْنَا مِهِ - الرَّاسِ مِن كَامِيا فِي نَهُ مُوتُوكُو بِرِيوز (Cowper Rose) ك منيلي استعال كى جاسكتى ہے ۔ موفر منور وں كا اصام كرنے كى بہت كم صرورت بالتا جو۔

لوزمن لمف آسا بافت کے نووے ہیں جومر جانب بیطقوم کے انگے اور تھیلے تتونوں کے درمیان واقع میں' اور آخیں لف آسابافنٹ کے دوسر ^لے توووں سے تميز كرنے كے لئے حلقومى لوزيين (faucial tonsils) كتيے بير - إن دومرے تودون مِن سَيْعِ بعِن قاعدة زبان مِن واتع مِن عن كانام لساني لوزمين (lingual tonsils) ب اور مفل الفي مليوم من من جنمين ملعومي لوزي (pharyngeal tonsil) إلوزي كسيكا (Luschka's tonsil) كيتيرس ملغوى لوزنين من لمف أسابافت أظير ل اورجال كي مفرض ترتیبوں پرشائل ہوتی ہے جنویں سرا بات (follicles) کا نام رباگیا ہے ' اور

گرے دانشفاقات (fissures) می موجود موتے بن جو باعوم کے مضل جرم کے میافتہ میں۔ بہ
سطیردامو تے می اور مقا نیجے کیسہ تک بہتے بی جو باعوم کے مضل جرم کے میافتہ متاص ہوا
ہے۔ ان طاقوں میں تندرستی کی حالت بن بھی جرائم کے منغدوانوا علی سکتے ہیں بینے
نبغات سبب نبقات عنب نبقات دائو یہ نن دنبقہ فافرات مصیبہ فریڈ لانڈر و فیمیس و
در تین دمین کے داست سے جو سرایت واقع ہوسکتی ہے اس کی دوک مقام کے لئے ایک
مفالی فعل انجام دیتے ہیں کیکن جب وہ ایک مرتبر سرایت زدہ ہوجاتے ہیں تو سرایت منفی
مفالی فدد میں مقصلہ کی اگل کور کے نیچے واقع ہے مشکر سباتی شریان کی دوشافگی پر بڑا ہوا ہے اور فلہ اور کا دوفرہ اور کیا باتا ہے۔
تصی علی عضلہ کی اگل کور کے نیچے واقع ہے مشکر سباتی شریان کی دوشافگی پر بڑا ہوا ہے اور فلہ اور کا دوفرہ اور کا

التهاب لوزنبن كابيان بهط ينفل سازى امراض كيف و فتحيي ريا ، قرمزيد (acute rheumatism) كالمنسك عن من المرام (scarlatina)

کیاگیاہی۔

برای المهاب اللوزی (follicular tonsillitis) ان سراتبوں کے علاوہ جوکہ ایمی بیان کی گئی ہن کوز تین کے لمف اسما اور جرابی جرم کا النہاب بطاہر خودر وطور بر برتا ہے اور بعض انتخاص میں مہینوں با برسوں کے وقعوں سے طرد ہواکر تاہمے ۔

یہ فالبا سرایت کے باعث ہوتا ہے ' با ان عفولوں کی فتیبیت کے از د باد کے باعث ہوتا ہے ' با ان عفولوں کی فتیبیت کے از د باد کے باعث ہوتا ہے کہ باعث ہوتا تی ہے کہ باعث باعث ہوتا تی ہوتا تی ہے کہ باعث باعث ہوتا تی ہ

علا مات _ اوز وسرخ اورمنورم بوجاتا اورکنی زرد باسبید نمایال و صبح یاداغ بین کرنا ہے ، جوربی ارسٹ ع (extoliated) "سلخ شده (extoliated) مرحلہ ، کثیر الاشکال نواتی سبید خلیول المف خلیول اور مراتیم کے نود ہے ہوتے ہیں اور طاقوں کے دمینوں پر وائع ہوتے ہیں۔ اور لوزہ کی سطح کم ومبن نیاط سے دھی ہوئی ہوتی ہے۔ طاقوں کے دمینوں پر وائع ہوتے ہیں۔ اور لوزہ کی سطح کم مربن نیاط سے دراوہ شموں براسے مموس کیا جاسکتنا ہے ۔ زیادہ شدید مشمول براسے موس کیا جاسکتنا ہے ۔ زیادہ شدید مشمول براسے میں طاقوں کا افراز زیادہ و افر ہوتا ہے اور وہ ٹرے میکدار سیکتے ہیں ایمرابات میں طاقوں کا افراز زیادہ و افر ہوتا ہے اور وہ ٹرے میکار سکتے ہیں ایمرابات میں طرق کی سکتے ہیں ایمرابات میں طرق کی سکتے ہیں ایمرابات میں میں میں ایمرابات کی ساتھ ہیں ایمرابات میں اور وہ ٹرے میں ایمرابات میں اور وہ ٹرے کی سکتے ہیں ایمرابات کی سکتے ہیں اور وہ ٹرے کی سکتے ہیں ایمرابات کی سکتے ہیں اور وہ ٹر سکتے ہیں ایمرابات کی سکتے کی سکتے ہور ایمرابات کی سکتے ہیں کو سکتے کی سکتے کی سکتے ہو کر سکتے کی سکتے

ہم پوستہ موکرا کے اسی حکمتی بنا سکتے ہیں جوکہ ڈفتھے ہا کی غشاء سے قریبی مشابہت د**کمتی ہے۔** اکٹراوقات ہر دولوز نمین مادُف ہم تے ہی ۔معندل بنبی اختلال 'فردارز بال 'کسسلمندی کا احساس' مقامی ہے آدامی' نگلنے ہیں در دہونے کے علامات موجود ہوتے ہیں۔اکٹرنیش ہہت بڑھ جاتی ہے ۔ اور عام طور پرلوزی منقی خدو بڑسے ہوجاتے ہیں ۔

. مرضی تشتر کیجے وزنین کی شمی بافت (parenchyma) کے ملیات اور حرایات کے خلیات تعداد میں زیادہ موماتے ہیں' اور مکن ہے کہ حرایات میں نہا ہے ت

بھوٹے میرنے میورے مبکر طافول کے اندر مجوٹ ٹریں۔

بھوسے جیوں جیور سے مبار کا اول ہے اندر جیوٹ برب۔ استی بھوٹا اوزہ کے ابک طاقہ کے اندرا فراز کے صام کی صری گوبن سے 'یا ایک جانب پرمتعد دصامات کی موجود کی سے اُنگی شناخت ہوجاتی سے کسی فذروست رکھنے والی ایک منفروس بدیکنی کا ہونا' جربظا ہرصرف سلح پر ہو' اور س جیتی کا زم تالونک جیل جانا' وفنیصر یا یا ڈسیر ونسنٹ کی نائید ہیں ہے مشتبہ اصابتوں میں جرفومب انی کاشت کامرس لانا جاسئے (طاحظہ موصفیہ 66) ۔

ارتفاع حرارت (pyrexia) کے لئے علاج ستروع کرد بباجا ہے (الانظہ ہمو صغر 20) - لوز مین بر حابس (astringent) با دافع عفونت محلولات لگا دینے جاہئیں بیسے کی صبغید ابوڈ بن (برنش فارہا کو بہا) گلیسیرین آف ٹینک البیٹ اور مبنید بر کلور اُنڈ آف آئیرن (a قطرے ایک ڈرام گلیسیرین میں) بوٹاسیٹم کوریٹ کے لوزیخ یا رھائی اور فارہالین (rhatany & formalin) کے افرام میں جُوسے جاسکتے ہیں صبغید گوائکم اور فارہالین (tr. of guaiacum) یا گوائکم کے افراص اور سوڈیٹم سکی سکیٹ بھی مفید ہیں ۔ ست دید اصابتوں میں مصل دافع نبقات سبجہ (anti-streptococcal serum) کے انترابات

دئے جا سکتے ہیں دوافع قرمز بدنما (anti-scarliniform) وا معب بنٹی میٹر کثیر گرفتی
(polyvalent) میں معب بنٹی میٹر جوکہ دوون کے بعد کر روبا جا تا ہے۔
تاریخ میں اس میں میٹر کا روبا میں (tropstosia phomoson) کے مالن مرک میں

قر ننیت بلعوم (keratosis pharyngis) نبر ایک مالت بی کشب ب اوزی طافات کے پہنوں رجمو کے سفید روزات یا سے جاتے ہیں ' بوکہ مرا بی التہا اللوزہ کے منظر سے مثنا برمنظر پیداکر نے ہیں۔ بائموم بہ علامات سے مبرا ہوتی ہے' ایم عفراد قا خفیف خواش مان کی تنکایت کیجانی ہے۔ مرض کی تم کے علاج سے متاز بنیں ہو آ کیکن وہ جند جینے قائر رہنے کے بعد خود نور خانب ہوجا تاہے۔

کر د کوزی خراج (peritonsillar abscess) (خیم کو او بعث کو در میان نقیم و اتبع موجا تا ہے بیمور اس حالت بیں کریٹ اور اور اور اور ای مصلی دیوار کے در میان نقیم و اتبع موجا تا ہے بیمور کا فیمک محل وفزع مختلف مونا ہے ' نیکن بیشتر وہ اس فضار کے بالا کی دونتہائی میں واقع ہوتا' لوزہ کو نتیجے اور اندر کے طرف دمکیلدیما' اور حتی بافتوں میں تد اخل کرنا ہے۔

جمعت اسکیاب ۔ یہ ببندرہ اور پھیں سال کی عمودں کے درمیان نہا بہت

عام ہوتا ہے۔ بعض آدی س مبلا ہو نے کابہت ریجان رکھنے میں اور بار بار مبستلا موسنے میں۔ اس کاسب کوزی سرابت کالوزہ کے کید سے باہر میبل جانا ہے (گرداوری التہاب = peritonsilitis) بعدمیں قیم ہوجا تا ہے۔

9/\/\

ورے فے گردی امسین کے اندرنقب لگادی ہے کا سیاتی شریان) کھالیا ہے' یا ابنی بیب حنور کے اندر فارج کرکے افتصاص (suffocation) بیمبیارا - زیدلوزیه (quinay) جرابی القاب لوزی سے مثنا بر موسکتاہے۔ وه زياده اکثر کي ماني موتاي اس س تي زياده سند بريوني ب سري منفر دسون کے میل جاتی ہے' افراز طافوں کے اندر بمع نہیں ہونا'اور ممن ہے کہیپ کا مالآخرمیّہ مِل جائث يعن اوقات يه دونون مالتين ساتفساته اليُ جاتي بن -علاج ـ التفاع وارت كاعام طلاع استنمال كياجاتا ہے۔ وروس رف سے اکثر شخیبیٹ ہومانی ہے ۔ اُسے بوسسناہی میا ہے اور اہر سے مبی لگا ناچا ہے۔ مادعلامتوں میں کی کرینے کے لئے سیلی نبلیٹ آب سوڈیٹم وا یا ہاکرین کا داملی سنعال برمبيرے يا تو تنے تھنے كيا مامكتا ہے كار الك ترشير كار مفول الك في صدى ا مع فرار و کونسکین دیرای اگر کتیج تشر دع موکما ے تر کر مرکمید (hot fomentations) اور پولٹیس غالبًا اس میں سرعت بیداکرنی ہیں جب بریامعلوم ہوجا سے تو میوڑے کے اُمرے ہوئے حقیمیں ایک لمبے نوکدار مِنترکط (bistoury) سے (پراکسن کے آخری نعمف ایج کک باسٹرسے ڈھکا ہوا ہو ناکہ دمن کے دوسرے حقیے محفوظ دم) مُعَلَّاتُ لَكَا وَبِهَا فِياً سِنْ لِهِ ابْتَدَا فَي در جون مِن صلى وافع سَمّاتِ سَبجيه كالمنراب كرنا لوزتين كى منهمن عفزت (chronic sepsis of the tonsils)- بجول مِيكِ إِسِ كَا وَقُوعِ عَامِ بِوِمَا ہے' اور مِهِ اكثر لوزنین كى كِلا نی بیداكردیتی ہے' جومكن ہے كہ مریف کی عرکی زیاد نی انکے ساتھ سانے رفع موجائے یمکن مزمن معونی لوز تین جیو اے

لوزتین کی منهمن عفق (chronic sepsis of the tonsils) - بجول بی اس کا وقوع عام ہوتا ہے اور بداکٹر لوز نین کی کلانی بیداکردتی ہے جو کمکن ہے کہ مریمن کی کا بی بیداکردتی ہے جو کمکن ہے کہ مریمن کی کار بی استان کی استان کے ساتھ سائے رفع ہوجائے ۔ لیکن مزمن مغونی لوز تین جیو لیے اور صلفوم کے سستونوں کے درمیان کو اسے ہو کے حریمی ہوسکتے ہیں ۔ اسبن ما دالنہ بولوزہ سے مرحمن عفونت بیدا موسکتی ہے ۔ احراضی استان براسے ہو کے لوز فن سبنی بافتوں کی بنی پر سلم مرکز تنے ہیں ساتھ ہی طاقوں میں افراز کا کم و مین اجتماع ہوتا ہے اور طاست کی برسے ہوئے ہیں ۔ اور طاست کی برسے ہوئے ہیں ۔

تعلا مات ۔ وزین سیکے گلابی رنگ کے سلی رائت دار اور کنافت بی فت

مو نے بن اورایک اون (spatula) سے دبانے بران کے اندر سے بیب با مبنی مادہ

خوا جا سکتا ہے ۔ جب وہ مرف معتدل جا مت کے ہوتے ہیں تو مکن ہے کہ کو لیکمتا می

علمات نہ بیداکر میں جب وہ مرف معتدل جا مت کے ہوتے ہیں تو مکن ہے کہ کو لیکمتا می

اور بونک انعی مراسے کم کام میں لا کے جاتے ہیں کہذا الحلے منح جینو کے اور ابخد (sha) کیکے

اور بونک انعی راسے کم کام میں لا کے جاتے ہیں کہذا الحلے منح جینو کے اور ابخد (sha) کیکے

ہوئے ہوتے ہیں ۔ تعلق کے لفعل میں وشواری موتی ہے اور دو بیدھنے میں کے مہت ممل

میں آتا ہے اور بولئے میں الیا معلوم ہوتا ہے کہ گویا منہ کے اندرکوئی جیزر کمی ہوئی ہے۔

یوسٹیکیا کی ابنو رہی نازلت کی وجہ سے سے ان کی گویا ہمنہ کے اندرکوئی جیزر کمی ہوئی ہے۔

یوسٹیکیا کی ابنو رہی نازلت کی وجہ سے سے ان کی گویا ہمنہ کے اندرکوئی جیزر کمی ہوئی ہے۔

ابسی اصا بتوں میں رجھے جاتے ہیں یہ بین ۔ ۔ کھالنی الغی نازلست ' سے جینی ادر البی اصا بتوں میں رجھے جاتے ہیں یہ بین ۔ ۔ کھالنی ' الفی نازلست ' سے جینی ادر البی اصا بتوں میں رجھے جاتے ہیں یہ بین ۔ ۔ کھالنی ' الفی نازلست ' سے جینی ادر ا

ورد مرسه علاج _ معیاری طلع نوز وبرآری (tonenlectomy) ب اور مکن بے که آج کل کردن من مدرن غد د کانسب بند شاذ بایا جا نا اسی وجه سے بوک بر علیه کنزت کے سازند

ا فیلم در بیاجا آیا ہے۔ تا وقتید کوئی نہایت ہی واضح دا عبد موجود ند ہو' و اسال سے نیج علیہ انجام در بیاجا ہے۔ اوقتید کوئی نہایت ہی واضح دا عبد موجود ند ہو' و اسال سے نیج علیہ رکام رہ ایک اور بین کے حفاظتی فعل کا ضباغ تتولیث ناکر کوئی میں کہ بن میں لوزہ ہوئی انجام دی گئی میں ' و بائی نازلتی مرابت سب سے ذیادہ شدید سی و اگر علیہ فر بن مصلحت نظر تو رہ کو اور ای دیا کہ جاتے ہیں ' یا بچکاری کے درلیدیا بیسس کر طاقوں میں دباکر افوازات یا جب فی در در افع عنونت اور دافع عنونت اور دی جاتے ہیں۔ سے با سر نکالدے جاتے ہیں اور دافع عنونت اور دینج (lozenges) دے جاتے ہیں۔

ذبحه وننث

(Vincent's angina)

را التها بی حالت دو شکون با بی جائے ہے: (۱) نقر می قرطات شکلی میں اور یہ بین یعنونت زدود انتوں نے گرد جرسی رون کے قرط یا یہ بین یعنونت زدود انتوں نے گرد جرسی رون کے قرط یا یا جاتے ہیں یعنونت زدود انتوں نے گرد جرسی رون کے قرط یا یا یا اور گالوں بر بیا کا عصیب تعکل ہما (Paecillus fusiformia) یا یا جاتے ہیں ونسنٹ (Paecillus fusiformia) ہور قتصہ یا سے مثابہ موق ہے کہ براز و سے بڑھ کر گردی ہیں کی ختا سے مثابہ موق ہے کہ براز و سے بڑھ کر گردی ہیں کی ختا سے مخالی بر معیل جائے۔ بسما اوقات براز و کو ما و ف بہن کرتی گا گھڑ اس کے بجائے ہیں اور تعلق میں وقت موق ہے اور سیال براود اربوتی ہے۔ یہ می مونا ہے ہیں ہوتی ہے۔ یہ می مونا ہے۔ یہ می مونا ہے۔ یہ مونا ہے۔ یہ می مونا ہے۔ یہ مونا ہے۔ یہ مونا ہے۔ یہ مونا ہے۔ یہ مونا ہے۔ اور سیال برونا ہے۔ یہ عدد کبھی معرف میں ہوتی ہے عدد کبھی متنی ہیں ہوتی ہے اور اندار الجھا ہونا ہے۔

علاج ۔ قرحات برسلور نا مُڑیٹ کا ۱۰ فیصدی محلول دوزانہ تعبیع کرنا چاہئے۔ در دکونسکین دینے کے لئے ابسبرین (aspirin) دیجاسکتی ہے ۔ نو وارسسینیو نبزال (novarsenobenzol) کے انٹرابات کے ذریعہ موڑوں کی راتِ دور کیجاسکتی ہے ۔

بلعوى لوزات

(pharyngeal tonsils)

بدلف آسا بافت کا ایک تو وہ ہے 'جوائنی طبوم میں داقع ہے 'اور سرکے ماقا و ومننی گرنم بسمی میں جو روزُن کر (Rosenmuller) کے حفرات کی غشار مخاطی میں وار بلعوم کی جیمیلی دیوار کی فشا سے مخاطی میں وارفع ہوتی ہیں۔ یہ تو رہ لیے ڈنڈی باڈنڈی وار موسکتا ہے 'اور انگنفت نماز اندوں بر مشتمل ہو ناہی بزائد طابعہ شقاقات یا ورزوں کے ذریعہ جملقومی لوزہ کے طافوں سے منائل ہوئی ہیں ' ایک دومر سے سے مبدا ہوتے ہیں۔ یہ استوانی ہدبی سرملہ کی ایک نہ سے ڈھکا ہوا ہو تاہید ۔ زندگی کے برسرے اور دسوس سالوں کے درمیان اسکی کلانی عام ہوتی ہے مکن ہے کہ ایس کلانی بول کے ساتھ واقع امراض کے بعدوا فع ہوجائے 'اور یہ اکثر نازلتی النہا ب الالف کے ملوں کے ساتھ واقع

علامات ۔ واست کانی کی مقدار الداس سے بداہوما نے والے المی مزی مدر کی مقدار کے لواظ سے منتف ہوں گئے۔ رحب زل ہیں : _ بہرای ا عادیًا دہی منس ج رات کوزیاده خراب موحاتا ہے بخرا کے لینا اور شب زسی (night-terrore) اور نا زلتی التباب الانعة، كارمجان بس كرساته افراز مي سي فرن موالي ملفظ كيف من م (M) ارن (N) مروت مسيح كالمغظ خراب طرح ادابرة اسب كبو كممنغذانف بي إن آوازون کی گک بنبس برداکیا کتی . بعض کننه بن که ندو د ه مسع مری تصنیخ المحنی ه (laryngismus stridulus) شبرلل (nocturnal enuresis) کنت صرح اورتضخات مبياني كي نخرك بيدا موماتيه.

علاج _ اگر ملا مات زباده نما بان مون توباییدون کوجراخی طور برخارج کردیما چاہئے ، مکن ہے ک*رنسب*ینہ خصنیف اصابنو*ل کی بسلاح ایسی نفسی ورزشوں سنے ہوجا سے* جن كامفصديد روك بحركوناك تحداكسندس ساس ليناسكملا ماجائ -

لسانی لوزات

(Ingual tonsils) اسانی نوزان لمف آسا بالت کی وہ دو با بین گر کمیں ہی جو قاعد وُزیان مِنط وسلی کے دونوں طرف واقع ہوتی ہیں۔ اُن کی ساخت ولبی می ہونی ہے جیسی کملقوی لوزه کی اور سرایک میں دویا تین طاشفے مونے ہیں۔ و مِلْقومی لوز نین کی *طرح طب*تب تنظيخ بن أن كے طاقوں بن ا فراز كا امتناس تنسبنَّه كم عام بونا ہے كيكن وہ ہم بیش برورد و ہومانے من وکہ بالغوں کے نسب بلوں اس زیادہ کتات سے ب ہے کہ" خراش علق" (sore throat) کا و واصاس وخاوطی یں اور کہیں ملق کے بیچے محرکسی ہونا ہے ' رحتیقت بہت ی منالوں میں کمننب الی اوات ی وجہ سے ہو۔ آخرالذكر " حلق كى اس علم كدكرى" كاسب موتے بى تو " حلى كى كانى بیداکرونتی ہے ۔ نبز کالی کھالنی میں کھالنی انبیں سے بدا موجانی ہے ۔ نبرک کلورائر (ferric chloride) کے سم اگرین کا ایک میراتندہ محلول جو کلیسیر بن کے ساتھ ایک اوش مک بنالیا گیا ہو' ایک سرے رخمیدہ منبہ گرز (wool holder) کے ذریعہ

ہوزات پرلکانے سے کھالنی بر تخفیف ہو گئی ہے۔ اِسے لگاتے وقت زبان کو تا بحدامکان باہر لکا لناچاہئے (2)-

مرمن الهاب البلعوم (chronic pharyngitis)

المسباب _ ببوم کامز من التهاب کر رماد کون سے بیدا ہوسکتا ہے ۔ بھید مخورین (narea) سے سرایت کا نیجے کر رجانا ایک کنٹر الوقوع سبب ہے اور تمام اصابتوں یا کا اور نز دانفی جونوں کی مالت کی تفتیش کر بی جا ہے ۔ علاوہ اذبی و بعض مضراترات ناگر الکمل کے غلط استعمال کثرت نمباکو نوشی اور آواز کے مسلسل استعمال سے بیدا ہوجاتا ہے ۔ اور جب ا بک طبئہ عام میں تقریر کر نوالمنص نیجے لیول پر بیٹھے ہوئے سامعین کے طرف خطاب کرنے میں ایب سرخیج تھکا آئی اور اس ماری اس عضا کو جوموتی تلفظ لگا لینے میں مصروف خطاب کرنے میں ایب سرخیج تھکا آئی اور اس مرض کے وقوع میں مقربوتا ہیں ۔ مزمن التهاب البلوم ہوئی تالو اور نوبی این مقرب کے بیلے نے نے کے ایک مائل تغیر کے سامت ساخت واقع اس مونا ہے ۔

علامات عنتا مے خاطی سرخ ہوسکنی ہے اور س کی در بدی منسع ہوتی ہے۔
بعض اصابتوں بس ملجوم پر کمٹیرالمنداد جھولے رمادی ارتفاعات منتشر ہو ہے ہیں (جیبیہ المجاب البلعوم ہے granular pharyngitis) دور کی صابتوں ہی جھوٹی خراشیدگیاں (abrasiona) بانقر حات ہوتے ہیں ۔ جیبی النہاب البلعوم کے رمادی بروزات بڑھے ہوئے جو این بانیا طی خدد ہیں ۔ خشا سے خاطی بعض اصابتوں ہیں وافرا فراز سے دھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور مرین ہوشتہ کھنکار اور خوکم کارنا اور توکی کارنا ہے ۔ دوسری اصابتوں میں اس کی سطح موتی ہے اور مرین ہیں ہوئے ہی جہتا ہوا در داور کھی النے کی خواش میں میں میں تو کے جہتا ہوا در داور کھی النے کی خواش میں اس کی سطح کھی النے کی خواش میں اس کی ساتھ ہی جھتا ہوا در داور کھی النے کی خواش میں اس کی سے کھی النے کی خواش میں اس کی ساتھ ہی جھتا ہوا در داور کھی النے کی خواش میں اس میں تھی ہوئے ہوئی ہے۔

حبیبی القاب البلعوم (granular pharyngitis) اکر ایک مداکانه عاص تعاد کمیاجا قاسید مکن بے کہ وہ حبیقی طقوم سے منجاوز ہور تلک طبوم کف اور حنر و کک میل جا سے عظامے مخاطی بیشتر اصابتوں بی خشک ہوتی ہے 'کیکن بعض ادقات جرا بات فزی

خلف البلعوم سراج

(retropharyngeal abscess)

اگرمدید ایک جراحی شکایت بئتام بهان اس برخصر اغور کی مرورت به کیوکه ملق کی بعض شکایت بئتام بهان اس برخصر اغور کی مرورت به کیوکه ملق کی بعض شکایتون مشکار خوبی تسد و (laryngeal obstruction) کی تخفیل کے اس سے بیجیبید ، بوجی اف کا اندلیت ہے۔ یہ شوکہ کی بوکسید کی سے اور سلمبوم اکثر اوقات ملت البلعومی لمف آسا بافت کے التہاب سے بیدا بوجا تا ہے اور سلمبوم کی بیت پر ایک ورم بیداکر دیتا ہے و مکن ہے کہ عنج و کو د باکر عشر البلع (dysphagia) ، برکر دیت جنا بنجد اس فی فلطی سے بہر (dysphagia) اور اختماق (asphyxia) بیداکر دے جنا بنجد اس فی فلطی سے کروب یا حنجری ذفتھ با جمجا جا ساکتنا ہے البکن آخر الذکر کی طرح اس بس کھائنی رو کمی یا آواز بمیمی ہوئی نہیں ہوتی ، بلکہ یہ دونول کی فرز تفری گر (gurgling ") ہوتے ہیں۔ اواز بمیمی ہوئی نہیں ہوتی ، بلکہ یہ دونول کی فرز تفری گر (gurgling ") ہوتے ہیں۔

الله عليه عليه

مشكوك اصابت مي على كينت مك أنتكل والأو تجيناجا بين جبر ايك تموي ورم مسوس بوي ئے كار س مي ركرون سے تنكاف ولواد بناجا بئے۔

النهاب منجره

(laryngitis)

المی متا فات و می می مدر مرصر و (atridor) موجود بوسکنا ہے۔ اور بجوں میں میم (dyspnæa) نسبتہ کثرت سے ایک نمایاں علامت ہوتی ہے۔ بخار مفیف یا باعل فیر موجود موسکنا ہے ۔ جنو مین (laryngoscope) سے امتحان کرنے برسوجیات فیر موجود موسکنا ہے ۔ جنو مین (arytenoids) سے امتحان کرنے برسوجیات (arytenoids) کے اویر کی مخاطی تحقیق متوزم اور سرخ ہوتی ہے ۔ اسب الی العموم التہاب زوم ہوئے ہیں کیکن و و عمومًا نہایت کم نفیر فلا مرکز نے ہیں مکن ہے کہ اس کے اویرا ور ان کے درمیان کچر مخاط بری ہوتی دکھائی دے ۔ بطینی مبند (ventricular bands) ماؤن ہوسکتے ہیں۔

نع مدوالتبار عفوه كالك تنماص من المقاب حصير laryngitus) = stridulosa من متلا بول كارجان ركفته من بس كى مميز خصوصيت برسي كم اختصاص (suffocation) في علامتبس كايك اكثر آدمى رات كے وقت عنو ياب موحاتى بس دل وفت مين تعنيف كمالني اور أواز بيمي موئي (huskiness) موني بعي أبكن رات مي بچه د فعیتهٔ کسی وقت خوف زو و موکر ماگ ا نفتها ہے اور ساخه مبی اَسے تندورُم (dyspnoa) اور معبو شکنے کی آواز والی (barking) مار دکھی (husky) کمانٹی ہوتی سے مس کے ابعد رُسْور (loud) اور لما بانگ وار (crowing) شہین بنوناہے ۔ آواز بحرائی موئی اور کرور اورجیره (feature) منتلی (congested) میو تاہے ۔ اگر بیمالت قائم رہے تو من سے کہ جبر و شاحب اور کبو د ہو جا سے اور اغتصاص (suffocation) قریب الوقوع ہو تا ہے ۔ نبین عمر اُنفوزی دیریں ملامتیں کم نندید موکر بچے سو**جا تاہے ۔** یا تواسی اِت وحند تطینلوں کی تعید کے بعد یا بعد کی انوں میں ایسے ہی صلے ہو سکنے ہیں جن میں اختصاص کا خطره بیوتا ہے اور ساختی کروبی (croupy) تنہینی واقع ہوسکتا ہے۔ اِن علوں کے ساقة بخار رمعه فروارز بان بتمتاك موك مرخ جبرك اورگرم طد دغيره كے) اسكے نسبت زياده ہوتا ہے کہ مبتنا بالغوں کے نازلتی النہاب حَفِرہ میں مونا ہے ۔ بدجلے غالبًا اس وجہ سے ہوتے میں کہ مز مارکے اندرازی (tenacious) مخاطر کی موجود کی تنجری شنخ بیداکردتی ہے ۔ مِعْبِ کمبی ایسے بچرکو سروی موماتی ہے تو یہ علامنیں اسی بچہ میں کرر سیدا ہوما کے کا جما ركمنى بن أبكن شاذى مبلك مونى بن ـ ے إنذار - مادالتها بِ مغروز باده تراميدا فزاانلار رکھنا ہے ۔ وہ عمد الصدرو

شخیص ' بالنحدص بالنوں میں ممو ماساوہ مونی ہے۔ ذفتمبریا اس سے زیادہ شاہ بوتا ہے اور اُسکے ساند ملغوم برحمل 'جمتی کانفٹ' با البرمن ارات (albuminuria) کا

ہونامکن ہے۔ علاج ۔ مریض کو بون نہیں جا سے۔اسے ایک بکیاں طور برگرم کر ہوائی میں معلاج ۔ مریض کو بون نہیں جا سے۔اسے ایک بکیاں طور برگرم کر ہوائی میں ر كهناجا ہے ' اور ایک مناسب آلہ میں بار پار معاب كاستنشان كرنا ما نبئے ۔ إس آله كو مركب صَبغيه عود (.tinct. benzoin co) انضف اونس ايك يأتنك يان مي اسع بادكرسكة بِسَ مِيننعال (menthol) (٢ يا ٣ گرين ايك اونس لكو و بسرا فين من روفن لوكالينس (oil of eucalyptus) اوركر ماسوك (creosote) كارشاشات (sprays) بمى مفيد مبوست يربس ـ ملطّعت ما تُعانت (demulcent liquids) كوآزادانه ملور رزوش رناچاہتے ابرت کے محیو نے کڑے جے سے جائیں کھالنی کی خراش کی تخفیف افتیون موجو در کھنے والی دواوں (opiates) کے ذرابعہ کرنی ماہتے ۔ غذا یانظے مغذا لُکُ (regimen) البنة وبي استعال كرنا جائية جوعمونا حموى عالتون من كام مي لايا جا تابيد-صرصری البہاب تخرہ (laryngitis stridulosa) کے لئے اکنز ایک مقتی (emetic) دوامغيد برقى سنة مجيد كالفيث آفزنك (sulphate of zinc) (ما . اگرین) یا عزف الذهب (ipecacuanha) لاسکاسفوف ۲ تا هگرین یا اسکا بنیپ ند ابک درام ہردس منٹ کے دفعہ سے حتی کہ تنے بہت دا ہو جا ہے) مزیر براں گرم من لائین یا ایک گرم است نج کے برنگا یا جا سکتا ہے۔ درمیانی وقعنوں مِن النهاب عنوه كا علاج مرم ونزكره بهوائي (بعاب كي كتبلي)اوررومايّز (bromides) اور کلورُ ل (chloral) کی نفوادی خوراکوں سے کرنا جا سئے ۔

اذيماني الهماب حضي (@dematous laryngitia) برالتهاب مغره كا ' ننبے ہوسکنا ہے جومخنکف طریقوں پر بیدا ہوجا سے ۔ بعض افغات برنا زلتی اصابتو ں **بی** یا مض برائٹ کے دوران میں موجاتا ہے۔ اس کامعمولی سب مغرو کی مادنیتی سبی سرایت ا سے اسکے ہم او شد بربنی علامات یائے جاتے ہی اور اس می بہت عبادا ورسبتعدی كے ساتھ علاج كرنے كى نىرورت مونى ہے۔

غِنا فی التہاب منبرہ کے واقع ہو لئے تھے یہ صفے بریکا اس پر وفقہ یا بی مراب منظراً و

علا مات ـ مقامی علامات اُن طامنوں سے ماثل ہوں کے جوڈ فتھیہ ہا کہ تخت بیان کی گئی بہا' نیکن جب التہاہ کاسبب زیا دہ ممبز طور بہنر بی موتوا یک مرض سادی کا بی علامتیں غیرموج دیا کم نمایاں ہوگئی -

تنفی امر (ringing) کی الی نامر (ورب ایسے بیج بن میں الکسی ظاہر سب کے بہر ' جعنکار وارب (ringing) کی الرب ایسے بیج بن میں الکسی خاہر کا مرت بار دورب الرب اللہ (ringing) موجود ہو اورب کا مرت بار دورب ورم گھٹ جانے (suffocation) کا خطرہ ہو کفتائی التہاب حنج و میں بنال ہوئے ہیں۔ مزید برال الب سبوں کی فالب تعداد میں ڈفتھیر یا ہی اس النہاب غضائی کاسب ہوتا ہے ۔ مذیر کی نامر کا مامکن موتا ہے اور حملی کی موجودگی کا اولین نبوت قصب شکانی سبے امتحان کرناعمر کا فامکن موتا ہے ۔ مرمری النہاب مخرو (tracheotomy) کے علیہ کے وقت یا اسکے بعدماصل ہوتا ہے ۔ مرمری النہاب مخرو (dracheotomy) کے علیہ کے وقت یا اسکے بعدماصل ہوتا ہے ۔ مرمری النہاب مخرو (dracheotomy) ہے اور میں النہاب موتا ہے ۔ مرمری النہاب مخرو (الدین نرکی نمو اور کنے نام کی دور اللہ کی موتا ہوتا ہے ۔ مرمری النہاب میں اللہ کی دورت یا دور کنے نام کی دورت کی اور کنے اللہ کی دورت کی اور کنے اللہ کی دورت کی کا دورت کی کو دورت کی کا دورت کی کار دورت کی کا دورت کی کو دورت کی کا دورت کی کو دورت کو دورت کی کو دورت کے دورت کی کو دورت کی کو دورت کو دور

تنبادل تتنبس ایک جسم فرید کی موجود تی ہے۔ علاج - خشائی النہاب منجو کا علاج اسی طرح کیا جاسکتا ہے جس طرح کے دفقیر یا کے شخت میں بنلا اگیا ہے ' اور به علاج اس وقت جکہ و و دفقیر باکے باعث ہوا دراس وقنت جبکہ و و فر مزی خارکھ سرا یا دوسرے کسی سادی مرض کے ساتھ مثلازم ہے دونوں صوروں بس کیا جا سکتا ہے۔ بہلی صورت بس وفقیر یا کا ضدسم (antitoxin) ہتا گا

كزناجاجي

205

من من ما ذلتی اله اب حنبی المحافی (chronic catarrhal laryngitia) .

به اکتر ماد التهاب مغیره کے بعد موق ہے ' بالحضوص مس وفت جبکہ آخر الذکر کامناسی علاج آواز کو کامل آرام دیجر ذکیا گیا ہو۔ با بالائی تنفنی خقہ کی سرایتوں سے التهاب جنی با ذبولی النهاب الائف یا عزمن انفی نسترد سے بنز آواز کے بیجا است عال سے ہوتا ہے ۔

بوتا ہے ۔

علامات ۔ آواز کا بہت جانا ' اور کھے کی خواش جس سے خشک کھالنی ہیں اہوبا کی سے حیری امتحال کھالنی ہیں اہوبا کی سے حیری امتحال کھالنی ہیں اہوبا کی سے حیری امتحال کو انتہا ہیں د باز تنیں بائی جاتی ہے۔

هل في . جلد دوم طن الهم

تشخیص _ برمن نازلتی التهاجره اور تذرنی اور افتال التهاجره اور افتالی التهاب حنی التهاب حنی الراندالی نوایه که ددیا بساا وقات دشوارم نی سے مربد وانعیت کے لیے طالب علم کو حنی بات کی ضوص نصابی کتب دیمینی چاہئیں -

تدرن حنجره

مرضی انتریج - در نے مخاطی باخت المخاطی بافنوں مین طیوں کے دبتی ابتا کا کے طور پر واقع ہونے ہیں اور تنابد بہ سطی پر خیف اُبھار بنادیتے ہیں ' جو کچھ وصب ہیں گر دو پین سے حصر ان کا کر بہت زیادہ ' ادبی اور ازاں بعد تفرج بیدا کردیتے ہیں مست اخراصا بنوں میں یہ تقریح سبوجیات ' بطبنی بندوں ' احبال ادر بر مزالہ بر وسیح طور پر پھیل موں میں یہ آخر ہونا ہوں میں دیم آخر مین عفو یوں کی مرد وسیح طور پر پھیل میں تقیم ' گر دعفہ وفی التها ب (perichondritis) ادر عفیار کا نیخ (necrosis) سیداکر دینا ہے ۔ جاؤ کے اکثر الوق ع مقامات ' بیکھ ملتی کا نیخ (posterior commissure) کے جوار میں موتے ہیں ' بینے بن سبوجی رفعہ سبوجی میں کیا گلی سطح اور موتی زائم سے (posterior commissure) کیا گلی سطح اور موتی زائم سے (posterior کی ماط سے اسکے بعد

احبال العبوت (vocal cords) آتے ہیں۔

ا سے علا مات مرمن النباب منح و کے علاوات جیسے ہوتے ہیں ادر ممولی شدیقا کی امعانبوں میں بہ موشفے بیں کہ آ واز مبغی موئی ہوگی سے ' روکھی کھالنی بار مار آئی سے ببغرار آ ابتدائي درجول من زلمبني فتفل (functional failure) كى وجه سعة واز بالكل جاتى رمتى ہے۔ اسی طرح آخری درجوں میں احبال صوتی کے تغریم کے بیجہ میں آواز بالکل ماتی منی سے اورجب تفرخ سبوحیات کے یحیطے حسوں رحملہ اور موا ہے تو بافتوں کے ورم کے بام ش^ا یا آن کے إناف اورخنوہ کی کال مسدودی میں مزاحمت ہونے کے باعث نہ صرف نکلتے یں در د مونا ہے ملک تکلنا مشکل موما ما ہے کمبی کعبی کعمانسی شدیدا ور دورے کے ساخھ موتی ہے اور نعنف (expectoration) تغیر فدر بوتا ہے جس کا انحصار خسسره کی مالت بإتناسين موناكه متناجيب وركى مالت برموناب يتفيل التعداد اصابنون ميتفس مِ بِي رَكَا وشُوسِدًا مِومِاتَى ي- r افيصدى اصابَول بِي نَجُومُ وَيُ مَنْهِ عِلامات بِيدامو سُلِخ يرتدرن يا يأكيا-ابتدائی درجون می حفره مین غشائے مخالی کا توب (pallor) ظل مرکرتی ہے اورش دیک کی بہت سی امیا نوں بہر مخرہ کی نظمی عدم دمویت بالکل ایتداء ہی میں واقع ہومائی ہے۔ احبال ا بطيني بندول او تحط لمتعلى نيس امتلاكي فيرمن كل عكيتيال اكت خينيت ورصر كي صفات من يا زياد ورمند يرزامًا بنول مي ايك بطيني بن يا برمز ماريرايك المنسلا قرحت وتجيا عاسكن سرم - حبب وريغتكي وانع موني باتو يدحقت اكثرا كم مغموس رة نشكل امتناركر لينته بن اورسبوي برمز ماري فتكن ابك با دونوں ما نبول برمتورّم ر ایک شاخب گلرسی نمایا نامنسیاتی نمارسولی کی شکل اختیار کر لیقیے ہیں' جس **کا قاعل^{وا}** تھے کے طاف اورنوک آگے کے مراف ہوتی ہے ۔ اورجب ودنوں اوف ہوجاتے ہیں تو به اورام خط وسلی میں متصام ہومائے ہیں۔ برمز مارا بک درستنار نما ورم بنا بمکماہے۔ اور حكن ميك وي و بازت بطلبني بندول كوما وف كروسي ليكن به اكثر مخفى مستع بيد بالآفرمنورم بافتوں يُرنيزاحبال الصوت يرُ بالخعوص ال كے يجيلے تعنول ين قريع ں ۔ یک پید نومنجرہ بنی مناظر سے اور کی بیسیدر ول کی مالت سے كرنى يا يبئه ، جرد من مى اصابنول ميں صريحا تدرّنى بو <u>ندرس</u> سيومي برفراري كمنوں كے ناشياتی نما

اورام اس مالت کا انبیازی فاصد ہیں کیلی جب بیغیر موجود ہوں تو مکن ہے کہ اسے من من مالت کا انبیازی فاصد ہیں کیلی جب بیغیر موجود ہوں تو مکن ہے کہ اسے من من فازلتی النہاب حنجرہ و اول الذکر میں ندر فی النہاب حنجرہ کے لنبت کم ورماور مرف سے بہر کرنے میں فرح مرف از بادہ فرسے اور زیادہ کہر سے بہر کے بی اور انتقال میں فرح مرف از بادہ فرسے اور زیادہ کہر نے میں اور است و بازت وہ ایک سنب نفر رہ ہے کا در مرض اکثر ایک جانب ہوتا ہے ۔ بعض اور اس مرف ای تقریح میں کو تدر فی موت سے مرف ای تقریح سے تمیز کر نا مسلل ہوتا ہے ۔ سرطان کنر کی جانب ہوتا ہے اور سنتھ را دو النب تھے در مادہ مروالے مربینیوں میں یا باجا تا ہے ۔ سرطان کنر کی جانب ہوتا ہے اور سنتھ را دادہ مروالے مربینیوں میں یا باجا تا ہے ۔ سرطان کر کر جانبی ہوتا ہے اور سنتھ را دادہ مروالے مربینیوں میں یا باجا تا ہے ۔ سرطان کر کر دو اللے مربینیوں میں یا باجا تا ہے ۔ ر

ریادہ مرد سے مرسوں بی با با جا ہے۔ اندار کوزیادہ باس کیز بنادیتی ہے (فلا خلہ ہو صفحہ 171) مر سرسٹ (Midhurst) میں التہاب حنوہ سے شفایا ہی ،، ہم مریضوں میں سے ۲۵ نیصدی میں ہوگئی۔اکٹر و بیشتر جیے مسے کہ سل رہوی ترقی باتعتہ قرکرنی جاتی ہے مخبری مالت بھی ترقی باتعتہ قرکرتی سے ۔ نیکن الیا بہشہ واقع نہیں موتا۔ میکن ہے کہ ستی رہی کے خراب نر ہوجانے بر منی حنجرہ شفایاب ہوجائے۔ لیکن اگرستی رہوی میں اصلاح ہورہی ہے نومناسب

م قطوں کے اقطار (instillation) سے مدم عبیت بیداکر نے کے بعد ایک وقت میں اللہ البید و تفظ کے بعد جو دوہ فتر سسے میں یا بیار کی کا ایک البید و تفظ کے بعد جو دوہ فتر سسے کم کا نام و کر دیگا یا جاسکتا ہے ۔ ترتی یا فتہ اصابتوں میں در دکیلیے اقعوف کا (orthoform) اور معد مات حس (anæsthetics) کے در بعد خبر و کے نفوخات کرنا مغید ہے اور جی کہ فرقانی حنوفات کرنا مغید ہے اور جی کی فرقانی حنوفات کرنا مغید ہے اور جی کا انداب کرنا ۔ زبا دو بڑھی ہوئی اصابتوں بن تصد بنگانی کے متعلق فرکیا ماسکتا ہے "ماکہ حنوف کو ارام کے ۔

صخه و کی اکتناک

علامات ۔ یہ میز نہیں ہوتے 'اور ضرر کی شدت کے کما فاسے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ آواز بہند جاتی یا جاتی رہتی ہے 'کسی کمبی ابتدائی درجوں میں کھائی' اور آخری درجوں میں کم دہمین مہر موجو دہوتا ہے ۔ سوائے اُس مورت کے کم برمز مار میں صفیتی تقریع موجود ہو' عسر انبلغ شاذ ہے ۔ مکن ہے بہر سرعت کے سافقہ پیدا ہوجا اور اس طرح تعد شکانی کارخدورت لائوں کہ دھے۔

اورامی طرح تصبیر نکانی کی خرورت لائلی کردھ۔ اور امی طرح تصبیر کی انہاب مخرہ آنشک کی دوسری امارتوں شلاجلدی الفیکا المجاد کی بٹارتشنیں کیا جا کا ہے ۔ نالتی آنشک مصنت تاہ لیک مثالی صنیتی قرح کے میں تھی آ مزمی نازلتی التهاب الحنبره کے ساتھ متابہت رکھنا ہے۔ ایک مثبت وازدمنی کاشف بشخیص کافیصلہ کردیتا ہے۔

کافیصلہ کروبرا ہے۔
عام عقیدہ یہ ہے کہ بولمائے آنٹک طائ مستعدی کے ساتھ عمل میں لا اچاہتے۔ ایک عام عقیدہ یہ ہے کہ بولمائے آب وا اگر کے استعال سے افر برائے مزام (cedema of the عام عقیدہ یہ ہے کہ بولمائی کا ایک استعال سے افر برائے مزام دینے کے لیے اندائی درجوں میں شخیرے وائد کی کاعلہ کر دینا چاہیے 'اس سے پہلے کہ نربی انقباض کی وجہ سے اس کا کیا جا گر در موال انتہاع کی کاعلہ کر دینا چاہیے 'اس سے پہلے کہ نربی انقباض کی وجہ سے اس کا کیا جا گر در موال کا انتہاع کی کاعلہ کر دینا چاہیے کہ اندائی مرا کا التہاع (dilatation) میکا نی طور برعمل میں لا لیے کی کوشنیس کی جاسکتی میں انتہا کہ کا کی کو کاٹ دینے کی کوشنیس کی جاسکتی میں ۔

(electric میں ایک جالے کو کاٹ دینے کی کوشنیس کی جاسکتی میں ۔

حنجره كيسلعات

مدلعہ حلیب (papiloma) ورسلعہ لیفیہ (fibroma) صوئی احبال برمام بین باقی تمام بلیم سلعات شاذین کے دیات برمز مارکے ہم بہلو اور وادیجہ بن بروز کرتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں سکن انوم بہ علامات سے مبترا موتے ہیں ۔

مینی علامات _ آواز کابیٹے جانا۔ اوراگرسلمات کیمیدمتعدد بارٹیجہامت کے ہون تو بہر مرکب مت کے ہون تو بہر مرکب میں مون تو بہر مرکب میں مورست کے بہتے جانا ہے کہ قصید شکانی کی صرورست یرتی ہے۔

مال مرب می میلات میں میں میں میں است کے ذریعہ نکالد بامائے ، جنکی تغییلا کے لئے قارمین کو مراحتی تصنیفات باضوری مقالات طاحلہ کرنے پائیس ۔

معلمات (malignant tumours) ہو تے ہیں ایکن اسلام استان عام طور برسطرانی المعات (sarcoma) ہیں واقع ہونے موسلے اس (sarcoma) ہیں ۔ بہ عورتوں کے تنبیت مردوں میں ذیادہ کنٹر الوقوع ہیں اور عمواً ، ۵ مال کی عمرکے بعد بیدا ہوتے ہیں مغرم کے درونی مس طانی سلعات کی ابتدارذیل کے مقالات ہو

علاج بہ ہے کہ حنجری انشقاق (laryngo-fissure) کے بعب درسولی کا استیصال کر، باجانے ہے۔ یا بیکہ در تی جناح میں سے ایک در سریہ فاجزوی انتبصال کرا جا فا سے اور ایس کی راہ سے آلبد کے بیرونی زخ تک رید ہم سونیاں دائل کی جاتی میں ۔

حنيره مي اجسام غربيبه

(foreign bodies in the larynx)

'خلف او فات بن حغرہ کے اندرکشیرالنغد و جسام غربہ (foreign bodies) د اخل ہو گئے ہیں۔ اعلین من سے مٹر ' بجلبواں کے جج (beans) بٹن ' سکے ' مُدلول کے گڑے ' کوٹر بال ' سنگر بزے مصنوعی دانت ' مغوم غذا کے گڑے' اور بجول سر کھا۔ فدا ریکر گڑے بین

(hoarseness) أُدرُد ' كھالىنى' وغېرہ بىداكر دنيا ہے۔ مېر درجه بين حب بنے بيب ئی دننع كا تغير د فعتَّه موت بىداكرسكتا ہے۔ اللہ مار بند نہ بار الرسكتا ہے۔

علاج - ببیلے درجہ من سرکولا کر سیجے بھا مامید ہے مادہم عربب ابنی مگر سے ہٹ کرنکل مائے - اگر علامات خطر ناک نظر آئبن نو فضیب ہنگا فی (tracheotomy) کاعلمبہ کر دبیامیا ہئے - دوسرے درجہ میں جبی غریب کا تعین مقام کرکے اُسے ایک وروں بن (endoscope) کی وساطت سے نکا الد بنا جا ہئے -اگر جہم غریب لامنعاموں (X-rays) کے لئے نہ شفات سے تو یہ بھی ایکائیں، تمام کیلیم

مغبد بوسكني بب

عضلان حنجره كانتلل

چ که بازگرد تخری عصب (recurrent laryngeal nerve) بینع خبره کا خام مَركَى عَنْهُ إِلَى مِمتَّةِ وَمُحَصُّونُ مُمْرَكُنْهَا بِيعُ لَهٰذَا إِنْ عَصْلات كَاشْلِلُ بِسااوْناتْ اس ہے ہیدن زاد ونشخیفی اہم ت رکھنائے کے ختنی ایک مقامی طور پر بیدا ہو نے والی تغلیف کی ہونی ہے۔ سکن بدنہ صوف اعصاب حنوی کے ضررات سے بلکہ اُن کے میداد سے اور عصب نائبه کے صرات سے اورجہاں نواتے واقع من وہاں نخاع منتظبل کے ضررات مع بيدا بوسكة مع جماني و bulbar paralysis) كامزوموما ہے' یا آنٹا کے سے اور سلفان سے جوکہ نخاع منطبل کواور بھیلے جمجی مفرہ کے ام حافیہ کومتا تزکر نے من کیدا ہونا ہے اور کسی کھی مزال ظہری (tabes dorsalis) تعلل عموی (general paralysis) نخاعی حوزیت (syrıngoryelia) اور منتنز تصله (desseminated sclerosis) کے ساتھ یا ما جا ناسے ممکن سے کے عصب تاریکرون مِن كَ رسوليون اور لرسع موائے غدد سے دك فيائے الكولوں كے زقموں ما حير كول (cuts) سے ' جوجاد ننہ کا بیتجہ ہوں باحراحی علیہ کے دوران میں لگے ہو کے مول متضرر مودا سے بازگر وحنی اعصاب دو مقامات برخطرے بن ہو تے بین سیف سبنداور کرون بن اورجو کا ان عسب مواب اوطی کے کر دخم کھا تاہے اسلنے اسکے منظر موف کا رباده امنان مونا ہے البین دا بال عصب زیرز اونی سفر باب سے بیچے نہیں مانا مزمن سل ربوی (chronic phthisis) میرراسس شش برکی بینی وبازت کے اندران ووال میں سے کوئی بھی ما وُف ہوسکنا ہے 'بہن بایاں عصب محراب اُور ملیٰ کے اُنورساؤ سطی ملعا (mediastinal tumours) برصع موسي فرد اورمطسران منبتي (mediastinal tumours) (stenosis كى اصابت من ابب مسع بائي أذبن سے دب جانے كا ظامى امكان وقعتا سے ۔ گردن میں وونوں احصاب حنی ، کے طرف صعود کرتے موے انصیة الرب اور مری کے درمبان واقع مونے ہیں' جنائج مکن سے کہ آخرالذکر کے سرطانی سلعہ میں دونوں سکتہ اون مومائی ارا مع موار صحر در فی سے دسب جائی ۔مشکل کاوف ع

روسنسر یا افغلو نیزا اراتهاب ر مادالد ماغ (polio-encepalitis) اور دوسری سادی امراض مزمن التعلیست اور سیسه اور منکوبیا که زیرک باعث می برسکتا سبع -

ان فمام مثالوں میں شعل سے پہلے احبال صوفی کے مبغید عضلات کو مثار ا کر آ ہے اور بعد میں مقرب عضلات ماؤ ف ہوتے ہیں جب صرف مغرب عضلات کا نعلی رائل ہو تو عاصب وظیفی (functional) ایسٹر الی ہو تا ہے (طاحظہ ہوں ماعد صفحات)

ابسی صورت بن آواز کر در مونی ہے 'اور آگر زور سے بولنے کی کونسش کیمائے تو آواز کا ارتفاع (pitch) بلند موجانا ہے ۔ مکن سے به دھیمی موکر سرکونشی کی سی بیا کہ کھانسا نامکن ہوتا ہے 'نبند کے دوران میں پر شور صرصرہ یا اِجا ناہے ' حقیقات یہ ہے کہ ڈھیلے احبال کے باہم جیسے جانے کی وجہ سنے جو اعتصاص کا خطو ہے و و نصبہ نزگانی کی ضرورت لائتی کرتا ہے ۔ یہ مالت مثانی طور پر ہزال ظہری (tabes dorsalis) ہیں دیمی جانی ہے ۔

عندلات مُقْرِم (adductors) (حلق مُسُوي جَانِي عضراً الله المعتبر (laterales) والمؤرس و المعتبر والني المعتبر والمن والمعتبر والمناور والمعتبر والمناور والمعتبر والمناور والمعتبر والمعتبر والمناور والمعتبر والمعتبر

نفررکابداز بوناسی که دوران تفس می حبل صوتی بوکه وه کال طور بر تبعید یا فته
(abducted) نہیں ہوتی المدر حبنی وضع میں رہتی ہے اور ابتدا رہوا کے گذر کے لئے
دافر نفیار دیتی ہے ۔ لیکن کی وصد کے بعد مخالف العل عضلہ ' بینے عفراً مقربہ (adductor)
مفیص ہوجاتا ہے اور حبل صوتی تقریب (adduction) کی وضع میں گھنچ آتی ہے ۔ اس لاح مفیل مفیل موجاتا ہے اور حبل میں احبال الصوت منتقلاً نظو سطی میں ایک دوسر ہے ہے
عفرات بعد ہ کے دوجانی شکل میں احبال الصوت منتقلاً نظ وسطی میں ایک دوسر ہے ہے
تزیب ہوانے ہیں اور ان کا درمیانی فاصلہ لیا آنجہ سے کم رہجا تا ہے ۔ نضویت کی گوشن
تزیب ہوانے کی دوسر ہے سے قریب تر تعینچ آتے ہیں ۔ نفیر کرنے پروہ شافہ ہی حرکت کرتے ہیں ' یا
ایک دوسر ہے سے قریب تر تعینچ آتے ہیں ۔ زفیر کرنے پروہ شافہ ہی حرکت کرتے ہیں ' یا
معالی میں جان کی خفیف سی حرکت ہو ڈی اس کی رنگس معنون میں حرکت کرتے ہیں ' یا
معالی میں صرحہ ہو (dyspnoa) ہے ' جو مز فار کی متفل ننگی کا فتیجہ ہوتا ہے ۔ اس کے ساتھ عموا
دوران شہنی میں صرحہ ہو (dyspnoa) ہوتا ہے ' جوزور لگا لئے برخوا ہے ۔ اس کے ساتھ موا
دوران شہنی میں صرحہ ہو ان اس ہے ۔ آواز ماف ' باکسی قدر نبیبی ہوئی ہوتی ہوتا ہے کھا نئے
دوران شہنی میں صرحہ ہو با باسکت ہے ۔

مبر مروکم یا غیرموجود ہوتا ہے۔ تصویت کرنے پر تندرمت مبل موتی مشلول خبل موتی سے شارمطی کر ندہ مل دانی مرکزی داخلیں متن میں

مع الإفراع من منه الداونو بي ومن التون منه الموسكة بي -عندلات منوية تستخيص منه بي التركية من المنظل ان مالتون من الله الموسكة بي -عندلات منوية

adductors) اور المعالم النفخ "تغريب كى وضع من سوجيات كى خبارة (ankylosis) اور

احبال العوت كا برام وافعل من من و دوران غبيق من بجائ بالمرك طرف كه اندركه طرف حركت كرتے من بب سبوير جاسى (ankylosed) مو يا سے وحبل صوتى بالكل

شبت شدہ ہوئی ہے' اور مفصل کے گردو پائیں ہو گا کیجہ دبازت ہوتی ہے۔ شبت شدہ ہوئی ہے ' اور مفصل کے گردو پائیں ہو گا کیجہ دبازت ہوتی ہے۔

یه مادر کفنا امم می وه ندر موعندات منعده کا بک بانی با دو جانبی شال برداکر تا ہے و باز بر (cicatrix) (آتفک) کی وجہ سے ماتھ ہی تصبتہ الر یہ کی تنگی سی بیداکر سکتاہے اور ایسی سورت میں آخرالذکر کی وجہ سے جو قرم و (stridor) ادبیر پیاہوتا ہے وہ فلطی سے اول الذکر کے ساتھ منوب کی جا جا با بالیا ہے۔ قسبی تنگی عوال زفیری اور تہمتی صرحه و بیداکر دبتی ہے ۔ تا ہم خری تنگی کی توبال میں ایک فصبی نند دکو لفینی طور پر شن ماخت کر بیناتنی اور آسان نہیں دینز العظم توقی میں ایک فصبی نند دکو لفینی طور پر شن ماخت کر بیناتنی و رائی آسان نہیں دینز العظم توقی میں ایک فصبی نظر المنظم توقی کی موبال کے بعید میں اور سے مالا مات (مثلاً مثر الن تحال کی اور کری میں مشرا کی طون اشارہ کرنے والے مالدی المدری اور سے اگر دن اور سیدند کی سولیوں کی طوف استارہ کی اور کرکے تشخیص کرنا پڑتا ہے ۔ بائی صراح و تی کے نظل کا ایک

کا احتمال (بایرے۔

افتہ اور مرفاط زاک ہو تاہے۔ بہ استخناء اس مورت کے کہاں افتاک

میب مض مو شفایا بی کی بہت کم امبہ ہے۔ جب دونوں طرف بعیدی شلل موجود

موتر دم گھٹ کرموت کے واقع ہو مانے کا خطرہ جمنے موجود رہتا ہے۔ اگر عضلات مقرم

(adductors) بعدیم شلول ہو مائی نومفس کے نسدد میں محی واقع ہو ماتی ہے آلیکس

ہوموتی (aphonia) بیدا موجاتی ہے۔ ایسے اولی ضرر مست لا سرطان مرک

سرموتی (aphonia) بادور ہے الورسا سے موت واقع موسکتی ہے بران طوال الت

نهایت کشرالوقوع سبب انورسا مے ممل مے دامتوان و اورمن اور رائنی شوا توا

اصابنوں مں بیجیلے طلقی سبوی عفدلات بالکل خربول ہوجاتے ہیں۔ علاج ۔ اگر دو ہر سے تنکل کاسبب مرکزی ہے 'یا اگر آنشک اُس کاسبب ہے' تومستنعدی کے ساتھ دانع آنشک علاج کا انتظام کرناچا ہئے ۔لیکن اگر جبد مفتوں میں کوئی اصلاح خربو' اور اگر مہرستقل ہو'یا شانہ طلے واقع ہوتے ہوں توقصہ شگانی کا عملیہ کر دبنا جاہئے اور کی ہمشہ لگائے رکھنا چاہئے۔

بك جانى شلل مي اختيان (asphyxia) كاخطرونسبنه كم مو تاب اورعلاج

مِن بالمفوض از الدُسبِ كِاخبال ركف جائِبة ـ

210

عضلات مُعَدِّيه ما مثلًا (paralysis of the adductors)-يہ اكفعلى اختلال مع اورتنها ساخت كيضررات سياس كاوفوع شاؤموا سيع عَصْلاتِ مُقَرِّبَهُ بِيرِينِ وَ مُ مِا بَي مُقرِّبات تَعِنى حلقي سُبوي جَانبي عضلات (crico-arytænoidei laterales) اورمركزي مقرّ بيغني عضلت سبوجييه حقیقی(arytænoideus proprius)-عضلته کار قی سبوچی -thyro) (arytænoidei کے اندرونی رینے بینی واعلی عضالت انٹرہ (internal tensors) بمی احبال الصوت کے اکلے حصوں کے مقرب کے طور برعل کرنے میں عصلاتِ مفرّب کی مامترین مسیم میں بہرب ماؤف بوجائے ہیں جنے وہن سے امنحان کرنے برمز مار توڑا کھیلا مِوا دُکھلائی ویتا اینے ۔ یو لینے کی وغیش کرنے بر اخبا آل انسوت مشکل حرکت کُریے بنن^ہ ک حنحرہ کے حوانب میں ساکن رہتے ہیں۔ جو کہ احبال ایک دوسرے سے فریب نہیں لائے عِ سِكَنْهُ 'لِيْدَامِرِ بِضِ مِينَ مِرْكُونِ مِنْ مِاتْ كُرْمِكْمَا بِيُ اوركُونُي حَنْهِ مِي آواز نهُسَ بييدا مو في ا اگرجیمکن ہے کہ بیض ادّفات زورانگانے سے احب ل ایک کمجے کے لیے متاش ہوگاہ کھانشنا'جس می غیرارا دی عکوس فعل کے وربعہ احبال ابھیوٹ ایک دوبر سے سے قربب لا مے جاتے ہیں، عموماً کا مل لور بر ہو تا ہے۔ اور مزیار کی کھلی ہوئی حالت کی وجہ سے بہر (dyspnæa) نس مؤار رفعلی الهسیشیر باقی ہے صوتی functional or) (hysterical aphonia) کیلاتی ہے ' نیکن یہ اکتر حنح و کی تفیم سی نازلت سے شروع بوجانی ہے امثلاً سل ربوی کے ابتدائی ترین درجہ میں ' باخراش ملت سے' یا و ومیری مقامی تکلیف سے منواہ بہ واضح طور بربہ شیر یا ئی اشخاص بی ہوں یا عدم دمویت یا عام کزونگی

ر وسرے مریضوں میں۔ منی مزاولت میں بہ حذیا تی صدمہ (emotional shock) کی وجہ سے نوجوان عورنوں اور لڑکوں میں واقع ہوتی ہے 'اور فروخوف کی وجہ سے ساکت ہوما تاہے۔ میدان جنگ کے معذورالنی مت فرار دے موئے *سبب*ا میں اب ہے موقی کی تشرالتعا^ر اصابزی میں سے بہشتر کی زجید میں مونی جا نسکے الخصوص کی وونو ہوا سائی کولہ باری کی رہ باری کی کرلہ باری کی زومین کی دومین کے بعد مفون اور میں اور طرح سے باور ا زخي بوينكے ہوں لیفن اصابتیں ایسی ہر کا حن من جو بسس انبو یہ نصب برنگا فی (trachentomy tube) كونكالديني كم بعد جنه وه حديم بنات المراجا مواولن سے فاصر رستنا ہے کی میں عصلات مقر بر کے فعلی :: (functional anquetor)

(paresis کے باعث ہوتی ہیں۔ بعض از فات عضلات منظر سر کا ل كمرمسين يؤليع يمكن جركة تنهاو فبا عضلات نامته ه (uternal pensors) بي ما يُولسنت مهول ُ خِي نِيْهِ بِينَ كَيْ أَمِنْتُسْنَ براحبال الصوت كاتماس بررانهين وتأاور مبال صوني البيئة أنكفي نصدق بوبانطي مطمي ع به من ایک مفقر حاست به نیش کرنی سند. در عفن ادفات مرکزی مُ ففر سب طِنعله (central adductor) مُشلولْ مِوجانا بِين ادر سِست صورت مِن احيال القيوت ا کلے جھے مناس ہوتے ہں اور بیجیے سبوی کر بوں کے درمیان ایک مثلی فضا بھلی رہماتی بے۔ یہ انزی و وسین نازلنی التہابِ سخرہ (catarrhal laryngitis) کے دوران میں غيرعام بنيس مكن بيم كه به دونون ايك سانغ والتي بول 'در' ساطرح آگ اور يسجيعة مي دات بدواكروس إسس عالت من كرموتى دائدات (processus vocales) نتاس ريس وال

اصابنوں بن آواز کا ما تارمینا اتنامل بنیں ہوناجتنا کہ پہلے بیان کیاگیا ہے۔ ان مالتوں کی شخص حفر میں (laryngoscope) سے بہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کے بغیر بھی مریض کی فیر آوازی اور بمر کھائنی اور نفت (expectoration) کی غِرِمُوجِود كَنَّ اور بالاراده كَمَا يَسْفَى قوت كافي طور يرميز بي للكن اگر الزلت كى كوئى مرئی شہادت موجود ہوتوامس کے بنیادی ندر فی صرف امکان کو فراموش بنیں

انذار اميدافرا بوتا بعادر ببن برسون كه مربينون كا الآخرشفاياب

ہے۔ علاج _ فعلی بے موتی کومشیریا کی ایک طامت سمجھنا جا بیٹے اوراً سی کی الرح اس كاعلاج كرنايا بيني : بنشر اصابتون بي وه العاذ (suggestion) ورباز تربيت (re-education) کے ذریعہ دور کی مباسکتی ہے ۔ بعض مثالوں میں پہلے بیفتین سمجھا دیناجا ہے کہ یہ کمز وری کسی عضوی مرض کے باعث بنیں ' لمکہ کم ونبیل آیک فرامون الله مارت کی مشتر سے ہے' بیرمریض کو کھانسنے اور اسس شورکو" آ آ'(" a-a-h ") کی شکل مي لمباكر في برأ بل كرناجا سين - إكسس سعائه حرف اليك" ("A") رلى تي من اور اِسى الرع احروف علت سے تشروع كركے ساد مے موف ہتى فتم كراد شے جا تے ہيں ۔ اب مریض کی دسمیں موتی ہے اور اس پر بدروش موجا تا ہے کہ وہ تغظوں اور حکوں کے بنانے بی مغیر طور رفقوت کرسکتا ہے ۔اگر ندرن کا کوئی سنب ہونو بیطریقہ نہیں استعال کرناچا ہے۔ دورری اصلِ بنوں میں با مرکے طرف صحرہ کے قرب و موار میں ماحق کی منت رفراوي رو كالكانا أيك أنكو العازي طلج (crude suggestive treatment) ك الفية كم طوريم فيد بوسكت بي أكرا ليسط بقول سع علامت يراثز في ما وه حودكراك على الرودمشيرياكي دوسري شهادنوب كيساغدمتنلازم بوتومز برعلاج أن اموا يرانتياركرنا يا ميدين كى سفارش اس عنوان كے تخت كى كئى ہے (الماحظہ بوسنعہ 791)-

211

(spasm of the glottis)

ا سى من من النات مُقرّبه (adductors) شبى لوريمنعيض بموكر مزاركي کائی مسدودی دا تع ہوجاتی ہے جو ہو اکے داخلہ کور مکدی اوراختناق (asphyxia) بکہ موت بدارتی ہے۔ یہ زعری ہوسکنا ہے کیکن شیرخواروں میں اس کی مندرجہ ذیل

المنافع (laryngismus stridulous) المنافع المنافع المنافع المنافعة : spasmodic croup نعيب الطفل: childerowing) - يرتين ماه اوردو مال يكي مر كدرميان واقع موتاب اورادكوں كيسبت الكون مين باده علم احد إسس ي

ناتعن ستى حالات مُدّر ہونے ہن' اور پرغربا من اوران كون من زماد ، كثير الوفوع ہے جنبيں کی غذادی کئی موئر پاینجیس بهار اورنیم فاقدزده ماوُل نے دوده پلایا ہو۔اصابُوں کی غالب ر ها، فیصدی) م کسامنت (nekets) کیآ تارموجود مو نف بین اور به مض کنز ا ان بول من لافق بو ما ہے و کرز (tetany) کے علامات ریفنے میں ۔ صرَ صرَ کی است تج عنوہ کالی کمپانسی کے بعد بھی واقع ہوجا نے کا ام کان رکھنا ہے۔ اسکے حلے سنسانہ روز ہوئے مِن ليكن منعدو أسساب شنج كي نخ بك سيلاكر خَلْتِ مِن مثلاً رونا ومواني حِما أي ح حر**کات**' حنچرہ سے نیعے دود ہ کا داخل ہو جانا آمعہ ہ من نا فال ہضم عنب نہ اسکی موتود کی' اور سخت غضه من ألما يُكين اكثر لأكسى البيسے ما بال ا و فغول کے سانفہ کرر ہوا ورکونی ایدلٹ متر ببیدا کرے' يكن بتدريج البيازياده مار مار مونيه لكناج تمنعس مراحلت جوانتداء صرف سے ظا ہر ہوتی نفی کیجہ عرصہ کے بعد زیاد و زیاباں ہو یاتی ہے ۔ سانس موفون به بهجیے کو گرما نا ہے م **موصاتی ہے 'سیبنہ مثنیت اور حبرہ شاحب اور کبود موصا ٹاہے' س** اور وحي عنسلات من فدرے تحفیکے واقع ہو نئے ہیں۔ یفوڑ – مسائره افل بولي ب بند تعیب نما شور کے ساتھ مزمار کی راہ یمی نامل طور برسی کھلا ہوا ہو تا ہے سبحہ اور حند ہی مینط کے بعد ایتے ر نوں میں بھر متنول ہوجا تا ہے۔ شدیدنرین اصابنوا اس مزمار کے سنج کے زز (tetany) کے سمنی قدامی انقباصاً (carpopedal contractions) مى موقع مي - انكليان تميده موكر تعبلون من اجاتي من الكوتها الكول كالدر ا خذیلائی برخمب ده موجانا ہے۔ انگیر میل مانی من باوک انگوں الموے اندر كي طرف مرجاتے بن اور باؤں كا الموضفا دوسرى ف ما ما مع م الى يمومي تشني المواقعة (general convulsions) اد ہو کیے ہیں کمبی مون کورے کے دوران میں بتنفس مالک موفوف وطانکی وجه سعے مون واقع ہومانی ہے۔ اور یو کانعبب دراصل اس امری علامت ہے کہ

شنج وْصِيلا بْرِر } ہے لہٰذا بہ و بجها ما مے گا کہ مہلک اصابتوں میں موت نہایت ٹمونٹی کے ساتھ

ہے۔ علامات نہابت مِبتز ہونے بین اورکسی دوسرے مرض کے علامات سے برآسانی خلط ملط منبس موتے ، بخار کی غیر موجودگی ملہ کی قلبل المدّ تی ' دوروں کے درمیا حالت کا بالک تندرست ہونا بیسب اِسے التہاب تغیرہ سے متبز کرنے ہیں جسم غریب موجودگی اس سے منابہت بیداکرسکتی ہے (ملاحظہ ہوصفحہ 207)۔

ا نڈار۔ بیشتر مربقن کلی طور پرشغا باب ہوجانے بیک لیکن ک

اندراج ہوا۔

ہے۔ علاجے ۔ اِس برمریض کی عام صحت اور طوں کے د نوع کے لیماؤ سے فورکر نا يرْ نا ہے ۔ بجہ کو فی الفورحتی الوسع ہنتر بن انعمی مالات کے تحت رکھنا ما ہیے ؛ ۔ ۔ بیعنے · نَازِهِ مِوا ' نُوبِ نُرُوبِجِ وِارْكُرِے ' اورجَهال أَسِ كَي غذا باكا في ياموروں بُو رُسس بِلِ علاق کی جائمیں (ملاحظہ ہوکساخنہ) اور آنتوں کی طرف توجہ کی جا سے۔ وواع کا ڈیمجیل کاتیل (cod liver vil) كاكا ومحفل كانتل معة خلاصه مالث (malt extract) كے نهايت مفیدیے اوربوٹامسیم روائد بی عمر کے لحاظ سے اتا ہ گرین کی توراکوں ہی دون ہی بنی بار' اور کلوزل (chloral) کی تفوری مقداریں دیجاسکتی بن - اگر صلی خفیف مول بیچه کوستر<u>سمه</u> یا وُن نگ روزانه ود با تبن بار به *تعاظ موس* سے اسفنج کر وکنے سے و وجلدرک جانے ہیں۔ زیادہ شدیددوروں میں سرکوا عماموار کھنا یا میئے اسرد بانی سے عبکو کے موے تولیہ سے اسکی حب م کی سلم اور جبرے کو تنبیکنا جائے۔ ا : اورنتسنوں کے قریب ایمونما یا ایب بلک ترشد تقام رکھناما بیٹے ' یا اسکے بدان کو گرم بابی میں ڈبوکر مئراور جبرے برخفنڈایانی ڈالنا جا بیئے۔ انگلی ڈالکر آسکے برمز مار (epiglottis) کو

نشب من ماربالغوں میں ریز بادہ اکثر التباب حغرہ 'اُدیما کی حغرہ 'نَسَلَلی مالنوں ' بااجسام غریر کی موجودگی کے تعلق میں واقع ہونا ہے ' نیز بیرع (epilepsy) ' داءالرقص (chorea) كزاز (tetanus) أب ترسى (hydrophobia) اور مزال طري (tabes dorsalis) مِن ایک خطرہ ہوسکنا ہے۔ آخرالذکرمرض میں بیخبری حرصہ

علائج _ بہلی جاعت کی اصابنوں میں کلرد فارم (chloroform) أيمبل نائٹرائٹ (vapour coninæ) و ببرکو نائنی (amyl nitrite)) با جلتے ہوئے سٹرا مونیٹر (stramonium) کا استیشاف کر انا جائے کے بنظریکی بہ وقت برمب آبیائی وریڈ مکن مے کہ نفعہ نشکانی کی ضرورت لاحق ہو ۔ منوالی حلوں کے یکے دائیز (bromides) وریڈ مکن مے کہ نفعہ نشکانی کی ضرورت لاحق ہو۔ منوالی حلوں کے یکے دائیز

ببيدالتنى حنبرى صُرصُره

(congenital laryngeal stridor)

کھی کھی شبہ خواروں میں ایک صنجی اختلال لافق موجا ناہے ، جس میں سانس کے ساتند ایک مخصوص وغمیب فرخوں کی آواز (croaking sound) سنائی دبنی ہے۔ عمواً بر بہلے بریائش کے بعد طَلد ہی سنسان دیتی ہے' اور طویل عصوں کک سنساید سادے دن اور رات بھرجاری رہنی ہے ' بیکن کی ہے اور بانو ایک وقت میں جبد گھنٹوں کے لئے فیر وجود ہو۔ بہ فوفون تہبی کے ساتھ واقع ہوئی ہے اور بانو ایک گرخت (rough) آواز ہوتی ہے ' بازیادہ صاف اور مُوسبقی ۔ زئیر (expiration) خابوشی کے ساتھ ہو آ ہے۔ کھالنی اور بیر کارونا می اطبی قسم کا ' ہو تا ہے ۔ مکن ہے کہ بین الانسلاع نضا میں قدرے اندر کو گھالنی اور بیر کارونا می اطبی قسم کا ' ہو تا ہے ۔ مکن ہے کہ بین الانسلاع نضا میں بہ شور بُسور بُس ہوئی ہو ۔ بعض اصابوں میں بہ شور ووران خواب میں بہ بیت موجود ہوتا ہے اور بعض اسابوں میں غیر بوجود موتا ہے جب بیت موتان بھا موا ہوتا ہے اور بعض اسابوں میں غیر بوجود موتا ہے جب بیت مشاش بھا موا ہوتا ہے اور بعض اسابوں میں غیر بوجود موتا ہے جب بیت مشاش بھا موا ہوتا ہے ' میکن شر فر گررکٹیلر (Sir Frederic Taylor) کے آسے ماتا ہے یہ کم ہوتی بانگل شندرست نظر ماتی سال کی عمر میں برستور موجود با با ۔ دیجر امور کے لحاظ سے بیج بالکل شندرست نظر میں برستور موجود با با ۔ دیجر امور کے لحاظ سے بیج بالکل شندرست نظر میں برستور موجود با با ۔ دیجر امور کے لحاظ سے بیج بالکل شندرست نظر میں برستور موجود با با ۔ دیجر امور کے لحاظ سے بیج بالکل شندرست نظر میں برست ور موجود با با ۔ دیجر امور کے لحاظ سے بیج بالکل شندرست نظر سے سے میں برست ور موجود با با ۔ دیجر امور کے لحاظ سے بیج بالکل شندرست نظر سے ہے ۔

ووران جبایں اور موت کے بعد و ونوں وقت مز ماری روزن نہابت منگ فطرآ نائے برمز مار (epiglottis) ابنے اور دوسرا با ہوا 'اور سبومی برمز ماری وومرا وُنقر بیامتاس ہو بیں۔ لیکن برشیرخو ادبحہ کے منے و کی طبعی حالت کی مض ایک مبالغہ آبیز مالت سے 'اور واکس ر بیٹرسن (Dr. Patterson) نے با بیخ مریفول میں بلا واسطہ تاہدہ سے تلاد ما یک مرورہ نہو جیا کے اور طفیدی بالائ کور بری واصیلی مؤلی کی برشہ بی کے دوران میں خرو میں تھیج آنے اوران فین

اور میں مرتبی ہوئے کا بنجر ہوتا ہے۔ میں مرتبی ہونے کا بنجر ہوتا ہے۔ ۔

جوں جوں بہ حقے نمو باب موقے ہیں اس تشوی (deformity) سے بیدا ہوجانے والانسہ وکم ہونا جانا ہے ۔کوئی راست علاج راس نہیں آیا۔ اگر اختنان سے زندگی نظرے میں ہو (جوایک ننا ذوانعہ ہونا ہیے) نوفصہ شکانی کی ضرورت بینی اسکنی ہے۔

حنجره كى عُدْم بتبت

(anæsthesia of the larynx)

ریه دفته بریا بسل شکل (bulbar paralysis) مزال طب ری tabes ریا بسل شکل (bulbar paralysis) من اور مصب تائید یا فوقانی مخری dorsalis) من اور مصب تائید یا فوقانی منافق می مصب کے تعدر سے واقع مروجاتی ہے ۔ اسکی شنافت حنجری غشاء مخاطی کی عدم ما سبب

(insensibility) سے کی جاتی ہے اس وقت جبکہ حنو ، بن کی دوسے ایک سلائی ڈاکر اسے مجبوا جائے ۔ اکثر اسکے ساتھ محسر البلح (dysphagia) اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مذاکیے ریز ہے منح و کے اندر وامل موقاتے ہیں 'جو مُسکنزی (Mackenzie) کی دائے میں ان عضلا کے شکل کا یتجہ ہے جنعیں فوقائی حنو نی عصب سے رسد بہنجی ہے ' یعنی و وعضلاات جو دوران اشلاع میں برمز مار (epiglottis) کو نتیج لاکر مز مار (glottis) کے بالائی روزان کو بندکر دیتے ہیں ۔ اس عدم میں کو وقعیر یائی وجہ سے ہو عمو کا شفا موجائی ہے ۔ کو بندکر دیتے ہیں ۔ اس عدم میں کو وقعیر یائی وجہ سے ہو عمو کا سفا موجائی ہے ۔ اندار عمو کا ترقی پذیر یعبلی شکل (progressive bulbar paralysis) اوراس سے مائی حالیوں میں فراب ہوتا ہے 'کیو کہ اس کا اس کا اس کا نام کا نیا ہے کہ غذا بھیجھ و دل کے اندر عبلی جائے وراس طرح ذات الر سر بیداکر دیے ۔

علاج سیر آن اور قرآدی لاسفات کے ذریعہ سے ہونا جا ہئے۔ واض طور بر اسٹر کنیا (strychnia) دیا جا سکتا ہے' اور مکن ہے کہ عسرالبلغ کی وجہ سے مراوی انبوب (@sophagial tube) بینے اُنبو بُر مُری سے غذا بہنچانے کی ضرورت بیش کئے۔

كان

کان کے ضروری اجزاتین ہیں ۔

(١) آلةِ الصَّالُ ضِ كُهُ ذَرِيدِ آوازي

٢٠) ٱلدُّاورَاكَ مِينَ طَرُونِيَكَ مِنِيمَا فَي جَاتَهُ مِنْ فِيكَ اندروني كان كَى كُتِيف بْدى مِن واقع

ہے۔ ہاں سے صدات -

(۳) عصب سمی (طرونی شاخ) کے ذریعہ دماغ میں بطے جاتے ہیں۔
ایس ای الم میں میں اللہ (pinna) ہیرونی سمی منفذ اور طبلی غنام کہ درمیالی
ا ذن کی بیرونی دیوار ہے ' شامل میں اور ورمیائی اذن میں استخ انجے بعنی مطسرقہ
(incus) شدان (incus) اور رکاب (stapes) واقع میں ۔ آخرالد کرایا۔ بانی بندمور کے درید بیضوی کھڑکی (incus) کے اندر شمصا موتا ہے جو کہ اندرونی اذن کے دوسمائی تھا تی ہے جو کہ ایک غنا کے ذریعہ وعلی تقات میں سے ایک ہے۔ ووسمائتی ایک تول کھڑکی ہے جو کہ ایک غنا کے ذریعہ وعلی تقات میں سے ایک ہے۔ ووسمائتی ایک تول کھڑکی ہے جو کہ ایک غنا کے ذریعہ

بند ہے۔ اندرونی اذن کے بال سے بھراہو ہا ہے۔ درمیانی اذن بی بوسٹیکیائی ابوبہ
اند ہے۔ اندرونی اذن کے بال سے بھراہو ہا ہے۔ درمیانی اذن بی بوسٹیکیائی ابنوبہ
ایک طحہ کے لئے کھل جانی ہے تاکہ درمیانی اذن بی طور با و باہر کے د باؤ کے برابر رہیے اور س طرح مرکن بذرطلی ختا دابنی طبعی وضع قائم رکھتی ہے۔ سمی سدمات بطور صوفی امرائی برونی سمی منفذ میں داخل بوکر طبی ختا پر آ پہنچتے ہیں۔ غتا کے ادفعا شات ابنی باری برمطرخه مندان اور رکاب کے ذریعہ نتفل ہو کر بیضوی کھرائی پر آ پہنچتے ہیں۔ ایک ننباول موج علی سندان اور رکاب کے ذریعہ نتفل ہو کر بیضوی کھرائی پر آ پہنچتے ہیں۔ ایک ننباول موج علی کی ہوا کے ذریعہ کول کھڑی بر بہنچ سکتی ہے۔ ازاں بعد یہ امواج اندرونی اذن کے بیال کے ذریعہ کول کوئی کر بین سیاں سے صدمات کر فرائی عقد و کی داہ سے مختصوں کے ذریعہ کی داہ سے مناز بی مناز اسی مختصوں کے دریعہ کی داہ سے مناز بی مناز بی مناز اسی مناز بی دراسی دائت میں جانے ہیں۔ اسس میکا بنہ میں ذراسی دائت میں جانے ہیں۔ اسس میکا بنہ میں ذراسی دائت مسمی پر فتیج ہوتی ہے۔

صهم - بهر سے بن کی بین سیس شاحت کی جاتی ہیں -(۱) ابصالی سم - اس بین بنبوی اور گول کھڑ کی کے مقام کک تمام اسباب شال ہیں - اور اسس کی مثالیں یہ ہیں: دہسسنے (wax) با اجب ام فویبہ جومنف ڈمیں حکمی ہوں ۔ درمیب انی اذنی نازلت کی تمام اقتیام ۔ ورمیانی اذن کے صاواور

مزمن النبابات -

(ب) ادراکی سم و و اسباب سوکه حلز و نبه مرفولی عقده اوسمی عصب کو ماون کرنے ، بی ۔ اسکو اندرونی او نی سم سم کی کہتے ہیں ۔ مکن ہو شیخونی اسباب انشک و مزی نب اور تب محرفه کا نتیجہ ہو۔ یابعض بینیوں کا نتیجہ ہو مثلاً جرشار و گروں یا عمّال المعناص (caisson workers) میں کا ربوالوروں (revolvers) رابعلوں (rifles) بابندونو کے فائر کی آداز سے نے رہنے کا نتیجہ ہو۔ یابعض و وائیں خاصر کو نبن (quinine) اور سبلی سلمہ (salicy lates) لینے کا بازیادہ تمباکو بینے کا نتیجہ ہو۔

سلمر (salicylates) لینے کا ہا زیادہ تمباکو سینے کانتی ہو۔

(ج) عصبی سم نور معنی عصب کے اور نبز اسکے مرکزی تعلقات کے ضرات ۔

بہ ہمننہ کمل ہمراین ہونا ہے۔ بہ کھی (۱) یک جانبی ہونا ہے اور نگاف (mumps)
یا صاد التہاب تنی (labyrinthitis) کا یاسلمان میں معی عصب کے ماون ہوجانے کا

نیمو ہوتا ہے۔ بار ۲) قدر جانبی ہونا ہے'اور نخاعی د انمی النہاب اسمیہ کا' باخلقی آتشک (اس صورت میں اس کے ممراہ جبشہ رخنی النہاب قرنید اور دوجانبی سمی عصبی سلعات موجود ہوتے ہیں) کانتیمہ ہونا ہے۔

طبنن (tinnitis) ووار (vertigo) اورٌ مِني اربٌ (Meniere) کے مرض

ملاحظه هو" نظام عصبي كدام انس".

کان کا در می باکان کے گرووییس در ہونانفریبا ۹۹ فی صدی مثالوں میں مقامی النہا ہے النجہ ہوتا ہے۔ بقید ۵ فیصدی مثالوں میں کوئی مقامی مثالوں میں کوئی مقامی بریافت منہیں ہوتا اور در دبعید السبب (referred) ہوتا ہے۔ ان مثالوں کو دجم الاذ (otalgia) کیتے ہیں۔

صبوان الآدن ببرونی منغذ اور لمبلی نشا، کا امنحان کرنے سے کوئی مقای سبب وربافت بوم ان الآدن ببرونی منفذ اور لمبلی نشاء کا امنحان کرنے سے کوئی مقای سبب ما ایک سرخ اور ابھری بوئی طبلی غشاء اور ابھی صورت بیں مناسب علاج کرنے سے دردکو تسکین بوجاتی ہے۔ کا ہے منفذ مین نقر مات با درمیانی اذن کا سرطان یا ہے جاتے میں۔ حب کوئی مقامی سبب دریافت نہ بونو وجع الاذن کا سبب دریافت کرنے کیلئے تعتیش کا میں میں سبب دریافت نہ بونو وجع الاذن کا سبب دریافت کرنے کیلئے تعتیش کا

دائرہ بہت کوسیج کرنا بڑنا ہے ۔ درد' دومرے حصص سے کھن کی رسدانہی اعصاب سے آتی ہے کھن سے سے سوقت کو میں سے نہیں تھیں درد نہ نہ کر کی حقیق کے جیسے

کاره کی آتی ہے مول بوسکن ہے (۱) ستھ ای (trigeminal) یہ کمن ہے تنبقی وجی اب ہو۔ وجع الاذن بساا وفات بوسب بده زبرین دائنوں اور غیر شخر (unerupted) عقل کی دار هوں سے جوکہ فقر بیا ہوشہ زبرین جر ہے میں بائی جاتی ہیں۔ زبان کے مرض 'بالبید' اور نفز حات سے۔ فارہ نکفیہ کے الہا بات اور صدغی جانوی مفسل کے الہا ہے۔ مول ہونا ہے۔ (۲) نسانی لبومی ۔ کمن ہے بہ نفیقی وجع العصب ہو۔ لیکن ور دور شکیا انبو یہ 'اور انفی لبوم (سرطان) بالوزہ 'برمزار' زبان کی لبنت 'سبوجی برمزاری تنبیہ اور نامنی بانی نماحفرہ کے النہا بی اور تقری ضرات سے مبی مول ہوسکتا ہے۔ (۳) اور نامنی تنبی نماحفرہ کے النہا بی اور تقری ضرات سے مبی مول ہوسکتا ہے۔ (۳) شوکی عنقی دوسرا اور تب راعصب یہ جویل مراوں کا النہا ب اور اسکے سائف جلدالر اس اوسیوں پر فیلہ (herpea) شدید وجع الاذن کا باعث ہونا ہے 'اسی طرح عننی منفیرہ کو متاثر کرنے والے

افرار معی درم عصب المائیه (vagus) کا اُذبنی شاخ مجوکه طالب وجی عصب کے رکبی عنده کا رکبی مخذه کا رکبی مخذه کا وجی عصب کے رکبی مخذه کا انتہاب واقع ہوتا ہے جب اس مخذه کا انتہاب واقع ہوتا ہے تراس رفیه برجوکه افرینی شاخ سے رسے لیٹا ہے نمار بیدا ہوجا ما ہے۔ مکن ہے اسکے ساخہ وجی شلل اور بہراین اور دُوارموج و ہو۔

سخت الحاوالتهاالإ دن لوسطى

(sub-acute otitis media)

اس سے درمیانی اُ دُن کی خبیف سرایت مراد ہے کہ حبن کے ساتھ کیسٹیکیا گی اُ نبوم کی نازلت موجو د موسہ والذکر مسد ود موجانے کارتجان دکھتی ہے کہ جس سے ہواجذب موجاتی ہے اور کمن ہے مصلی ارتشاح موجود مولا ورطبلی خشا اندر کو کھنجی موٹی ہوتی ہے۔

علامات - کان من بے آرامی باخصیف سادر دم تراہے 'اور بہراین بایاجاتا ہے ' جومکن ہے بچوں بی نظر انداز ہوجائے ۔ مریض کو سرکے دوشاف (tuning-fork) کی دریانی سر نیاں سنائی دیتی ہیں' لیکن لیبت ترین اور بلند نرین سر تیوں کا ادراک جا قارم تاہے۔ علاج یہ ہے کہ انفی جونوں اور انفی لمبوم میں اگر عفونی ما سکات موجود موں تو ان کو دورکیا جا تا ہے 'اور بوسٹ کیائی نشد د کا از الد نجا جا نا ہے اور بعض اوقا سنت سیال کو نکالا جا تا ہے ۔

حادري النهابالأذن سطي

سیحت ایب ورمبانی اذن کی بهرایت نقریبا به بیند ایک نبید ایب نبقه سبجیه (streptococcus) کی وجه سے ہوتی ہے اور بسا او فات ذکام النہاب لوزین اسپ قومزی کھیدا الفار کنز اکے بعد نمو وار ہوئی ہے ' باعفوت الدم (septicæmia) کاج دیون کھیدا ' انفار کنز ا کے بعد نمو وار ہوئی ہے ' باعفوت الدم (مویت منوطر ہوئی کاج دیون کے مئن سے سادے کاسارا ورمبانی اذن ماؤٹ ہو۔ بش ومویت منوطر ہوئی ہے ' اور اسکے بعد بسل کے امار خون الورصل کا انتشاح ہو تا ہے جو کہ مرم کمند میں فیمی ہوجاتا ہے۔

علامات كان كاور دالعرم بيلى علامت بوتى بياكين بورسي براس تل

خیب ہونا ہے کہ کمن ہے نظرانداز ہوجا کے اور بالنوں ہیں کمن ہے تند بدور دہمر ہو۔ ہمرائی اور کمین ہے انداز ہوجا ہے اور بالنوں ہیں کمن ہے تند بدور دہمر ہو۔ ہمرائی ہے موجو و موقا ہے۔ کسلندی جوکہ ہر خار کے ساتھ بائی جاتی ہوں موجو و موقا ہے۔ و وارشاذ ہے بشہر خوار بجے بعض او قات سر کو او صوا در محد النے ہیں اور مکن ہے ان کا امتحان کیا جا تو بیطے مہل مطرقہ کے دکھنے (handle) کے بیجے ایک خطا میں سرخی نظر آئی ہے بیجیس ر تشعبی جو ق اس نقطہ سے منتاء کے معبط کی طوف جائے ہوئے و کھائی د بتے ہیں بعد زا تسمی میں منت ہوجا کی منت ہم بند ہیلے اور سرخی منت ہوجا کی ہوئے ایک خطا کی ایک خطا کی ایک منت ہم بند ہم بیلے اور سرخی منت ہوجا کی جو انتہا بی ارتبا ہی ارتباعی ارتباعی منتاء ہوئے ایک خطا کی ایک منت ہم بند ہم بیلے اور اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ التہا بی ارتباع سے غشا انجر آئی ہے اور کمن ہے بیلے لفت

مینی بیر کرال ابعض اصابتون می غناکا انتهاب بوکر اورگائی اسکے بغیر صحت بابی بوجانی ہے۔ نا کمل صحت بابی سے مندرج و بل حالتیں بیدا بوجاتی ہیں۔ (فی اسم خوکہ بعد میں بوسٹ بلیائی ا نبو بہ کی راہ سے درمیائی اذن کی تنبخ کر کے کم کیاجاسکت ہے۔ (ب) مسلسل اخراج مواد سعن او قات اسکی وجو کوئی ادر کو (polynus) (سعدانہ کوروکتا ہے ۔ اگرمواو کا اخراج جار انتهاب کے اندر بروز کے بوئے ہوئے ہو ان اور اس طرح سیات کوروکتا ہے ۔ اگرمواو کا اخراج جار با نیج ہمنت بہت ماری رہے تو فالبًا صلیب مرایت زوہ موجائیگا البکن قبل اسکے کہ ملینی علیہ انجام دیاجائے ناک اور انفی لمجوم ہیں سائے ہوئی ماری سے اور موجائیگا البکن قبل اسکے کہ ملینی علیہ انجام دیاجائے ناک اور انفی لمجوم ہیں سائے کے کاخات ماری اسکان خارج از بی وجی تلل کا فیز سے کی وجہ سے ۔ (ک) جھٹے جمی عصب کا تلل جیکے کی وجہ سے ۔ (ک) جھٹے جمی عصب کا تلل جیکے کی وجہ سے ۔ (ک) جھٹے جمی عصب کا تلل جیکے ساتھ جبی اور حیث بدایک معلی التباب سمائی کا نتیجہ ہوتا کے دوروث بدائی معلی التباب سمائی کا نتیجہ ہوتا کے دوروث بدائی معلی التباب سمائی کا نتیجہ ہوتا کے دوروث بدائی معلی التباب سمائی کا نتیجہ ہوتا کے دوروث بدائی معلی التباب سمائی کا نتیجہ ہوتا کی دوروث بدائی معلی التباب سمائی کا نتیجہ ہوتا کے دوروث بدائی کا میکھ ہوتا کی دوروث بدائی کا میکھ ہوتا کی دوروث بدائی کا میکھ ہوتا کی دوروث بدائی کا نتیجہ ہوتا کی دوروث بدائی کو دوروث بدائی کا نتیجہ ہوتا کی دوروث بوتا کی دوروث کی دوروٹ بدائی کا نتیجہ ہوتا کی دوروث کی دوروٹ کیا کی دوروٹ کی دو

ے - (س) التهاب طبیه جس کو ان علامنوں سے بھیا ناجاتا ہے کان کے بیکھے دروُطبیه اور اس کی نیکھے دروُطبیه اور اس کی توک کو نوم بسونی میں میں میں میں کانورم بسونی سے دن کر کو نوم بافتوں کانورم بسونی سے دن کر کو نوم اور اس کی توک کانورم بسونی سے دن کر بافتد اصابتوں میں اسلی

215

سمی منفذ کے میق ترین صف کا بھار ایک قبمتی ا مارت ہے۔ ترقی یافتہ اصابوں میں املی زائدہ پر اور کان سے اوپر مبت تورم ہوتا ہے اور طدسرے ہوئی ہے۔ اِلہّاب طب کی وجہ

راندہ پراور کان سے او پر بہت تورم ہوتا ہے اور طدسرے ہوئی ہے۔ الہناب طب فی وجہ سے یہ مالنیں پیدا ہوتی ہیں۔ (س) جانبی جوف کے ام جافیہ بر عیور اُ اج کہ مکن ہے جوف کو مفنوط کردے اوربعد میں طقبت کاموجب ہو۔ دص) درمبا نی حفرہ میں ایک بر**وں جانی میڑا** جوکہ نتاذ ہے۔ د ط) و مانی بھو^ڈرا 'جس کے متعلق معلوم ہے کہ بہ طمید میں بیب بہدا ہو سے بغیر معی منو دار بوسکتا ہے۔ (ع) فنجی النہا سے ایا۔

حواله جات

REFERENCES

- 1 E. P. Poulton and F. A.

 Knott 1936 Practitioner, January.
- 2 M. Hovel ... 1924 Brit. Med. Journ. i., p. 497.
- 3 Sir St. Clair Thomson. 1924 Lancet, ii., p. 948, and Med. Res. Counc. Spec. Rep. Ser. 83.
- 4 Sir St. Clair Thomson 1922 Lancet, i., p. 164.

216

امراض عضائے دوران ون

طبعی قلب کے فعل کی انجام دہی ہیں دو تسم کی ساختیں حصہ لیتی ہیں ، یعینے اُس کے کہفول کی انقباض پٰدر یمضلی دیواریں ' جو خون کو دھکیلنی ہیں' اور مصارفات (valves) بونون کے بہا وُ کے رُخ پر ا تتزار رکھتے ہیں۔متوازن انتہاض کی قوت عضلهٔ قِلب كا فطري فا تند ہے۔ گذشہ چندمالوں كى تحقیقات سے ہم رہ چیزی ظ مراوگئی ہیں : مصلہُ قلب (myocardium) کے اندرسے وہ نقاط حب آب انتبامنی تبتیات عام طور برآ فاز پذیر موتے میں وه راستے که بن مسیم اذین (ventricle) سے اسلیمال مواہد (auricle) كى طبعي يا معمولى نمرح ، اوريه واتعدكه أكرجيه انتباض اكثراً ذين كه اندر شروع ہو کر بطین میں پنیج جاتا ہے ، تاہم وہ تعفی حالات میں بطین کے اندر بھی آغاز بدیر کتا ہے - مرتبطینی إ كماش (ventricular systole) ك بعدا يك عرصة ارام في جس میں انتقاض بنیں ہوتا اور یہ اُ ذین کے اِنکماش بِنتم ہوتا ہے اور اِسکے بعد في القُورْبِطِينُ كا إنكمانش وا تع مو تاہے ۔ إس عمل بي بين ساختيں حقد لديتي بي، اولاً عصبی بافت اعضلی ریشے اور حلیوں سے بنا ہو آ ایک اطالت یا فنہ جو گا تو دہ جو اس مجگہ جہاں فوقانی وربد اجوف اُ ذین کے ساتھ جیبیدہ ہونی ہے واقع ہوتاہے' اور صع جو في أذيني كرع (sino-auricular node) بخارياً ايك جوا تود جراً زینوں کے فاصل میں جون اکلیلی (coronary sinus) کے فتحہ کے قریب واقع ہے، اور بصے اُ فینی بطینی کو (auriculo-ventricular node) مِي ـ ثالثًا اعضلي ريشول كا أيك فاص بندا بوا ذيني بطيني بسن أل (auricuto-ventricular bundle) کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ بیندازی بُلینی گره سے پیدا ہوکر نحلتا اور چیرائی میں تفریبا ۵ دم می میٹر ناپ کا ہوتا ہے۔

یه اُ ذینی فاسل مصرُ طبینی فاصل کیراندر حیاا جا ما ہے ' اور پہلے اس **فا مسل مج**ے بعزو بعثائی (pars membranacea septi) کے نیچے واقع ہو کر میاں دو حصو مين منتسم بوجانا مندا بيماني أبك حصد فاصل بليني كعراس طرف اور دورا صد رورری طراف وافع بوتاہے۔ وائیس شاخ بندمعتل (moderator band) کے اندار بلی جاتی ہے۔ ہرشاخ اپنی طرف کے بطین کی دیوار میں دسیع طور پر توزیع یا فست موتى عد اور ريشهائ يركنج (Purkinje's fibres) ين منم أوماتي سه، جو بُطيئوں کے تقریبًا ہر مصدی دروں قلبہ کے نیجیے واقع ہوتنے ہیں ۔ اوپنی بُطیبنی گرہ اوراً ذين بُعليني بَنْ لَ بعض اوقات الحاقى با نسون (junctional tissues) ك تام سه يا دكي مات بي قلب ك مله فعل كي اننا مي بَيْني ، جوني أوي كرم (sino-auricular node) میں نمروع ہوتا اور اُذنین میں منتقل ہوتا ۔۔۔۔ بندا انقبانى مون حبس سے درا بہلے ایک برتی موج مینی موج تحکیب excitation) (wave يائى جاتى ہے 'ج - اگرد (S. A. node) سے شروع ہوتى سبے اور نصف تُطری اِ شعای صورت بی صیلی اور نمام سمتوں میں مما وی رفیار سے مما فت ملے کرتی ہے۔ اس کے بعد ا ۔ ب گرد (A. V. node) مما فت ملے کرتی ہے۔ اس کے بعد ا ۔ ب گرد سے-۱-ب گره (A. V. node) سے توکی پدا ہورا۔ ب (A.V.) بندل كى را وسعد اس ك مختلف تفرمات برجلى جاتى ب اور تبطينول سيد ورول تلب برسم يُرْ يَنْجَ كے جال مِن مِيلِ ما تى ہے۔ يہاں سے بہزا ويُرقائم بنا تى ہوئى بُطين نے عسٰل کے اندریھیل جاتی ہے۔

مفناد قلب کوعفبی رئیوں کے دو سٹوں سے رسر بہنجی ہے:
(۱) عصب ائی سے (۲) عصب مثاری سے ۔ان کا فعل فرب میں ترمیم کرنا ہے ۔عصب مثاری کے متعلق اس سے زیادہ کا س کا ہیجان قلب کو تیز اور فرب کو قوی کردتیا ہے اور کچھ معلوم نہیں ۔عصب تائید کی شاجس ہے۔ ۲ (.8.A) اور ا۔ ب (۸.۷) گرموں دونوں میں مختم ہوتی ہیں ۔ اس کے ہیجان کا یا ٹر ہوا ہے موج تحریب کامبداء (دفار راز) ہے ۔ الا کا کہ کے بالائی سرے سے اسکے رہین مرے سے اسکے اور کی محمد کا درسرے اثرات بھوالقلب (bradycardia)

کے تحت بیان کیے گئے ہیں

امنحان فلب

یمیں پھٹ ہو اس کی طرح قلب بھی آگے ۔ ہا تھ اور کان سے استحال کرنیکے گئے موزول ہے ۔ وہ بھی پیٹ ول کے اسکے حالت بول کے درمیان دیوار سید ہے تو بی طور پرمتاس ہوتا ہے ، آیک ابیعے رفیدی جو کہ خط دسلی سے بائیں طرف عظم لنعص کے زیرین نصف ، اور چھمی اور پانچویں با ہیں ضلمی کر توں کے اندرونی مقبول اور انسانہ و کہ دیا ہے ۔ حک کرم (لقلب impulse of the) ان کے پنچ کی فضاؤل سے تما ظر ہے ۔ حک کرم (لقلب heart) معائندا ور جس سے دریا فت ہوسکت ہے ۔ پدش قب سی قب می اور اس خاری کا دو رقب ہو کہ قلب پر واقع ہے ترزع کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے ، اور اصوا مت اور اصوا مت اور اصوا مت اور اصوا مت کا مطالعہ استاع کے زایعے میں جاسکتا ہے ۔

معائد (inspection)

معائنه سے طاہر ہونا ہے۔

تندرست اشغاص میں بین الا ضلاع فضائوں کی ایک خفیفسسسی مرفی اِنکاشی باز کِسُنبِلَ گی (systolic retraction) ہونا عام ہے ۔قلب کی بیش پروڈگی (hypertrophy) کی حالت میں ایک زیادہ نمایاں بازکشیدگی واقع ہوتی ہے۔

تجسس

(palpation)

صَدَم كالممل وتوع عمواً بُسّ سے اس سے زیا دہ فریبی کورمیتیین کمیاماتکتا ہے کہ متنا معائلہ ہے۔ وہ ایم بطین کی بش برور دگی کی صورت میں باہر کو آور نيج كى طرف منا هوا بهذاب، اورانتهانى إتساع من بنل مي مسكس كيا ماسكتا به-نعرب قوی یا جاشی(heaving) اور سریع ا ورب قاعده بوسکتی سبعه مکن سبعه که وه بالكل بُس پذرير نه بو - لاشعاعي امتحال ظاهر كرتا بيك كذاب كا با يال كنارا با تعموم اس نعطیست تناظ ، دوا سے جوکہ بائیں طرف سب سے زیا دہ دور میرا ہے ، جہال ا أنكليول كوكسي بيزكير وانعع طور برسائن كوا ورأفتي لوربر أتضفه كا احساس بهزنا سيسه (63) مذكراس رقبه كے بيروني اورزيرين صف سے كمس پرارتعا شات محسوں كئے جاسكتے ہیں' اور جس كينتعلق لاشعاعوں سے بہ طاہر ہوتا ہے كہ يہ تعلب كے رقبہ سے بالبرواقع اوتاب - ايك منال مي بس كاكرا فمف منا بده كيا بأي بلين يحد الله مقصصے چیمی فضایں ایک طاہری مَدم پیا ہوگیا تھا شمارسنگ برایک إنكاشی صدم (systolic impulse) ایک بیش پرورده دائیں بطین سے اور می سے مبک به افراسا في بوناب يا رسولى سد ابصال شده اوناب يا نابض عمر pulsating) (liver سے پریا ہوسکنا ہے مکن ہے کہ تنسع دایاں اُ ذین عظم القص سے دائیں مرفکم ندرب لگاتا ہوا مسکس ہو۔ اُ وَرَجِي انورساكي بعض اصابنوں اُمِي قا مدہ تعلب ير ركماً بوا با تداك مدرم مسول كراب بس كو انبساطي مدر مع diaatolic) (shock) ما إنبساطي ما زكتنت (diastolic rebound) كيت بي، بواية م آبانی میس بوتی بیک انورساشش کو میکاتا ہدا ور دیوار صدر سے قریب تم

تماس مال كريتيا ہے -

قرع

(percussion)

گوک قرع کرنے پرسید کا بینتر حقی شکس کی موجودگی کے باعث ممک دار (resonant) ہوتا ہے تاہم ایک چوٹا رقبہ اوپری یا مطلق اصمیت کا بھی ہوتا ہے ، بوقلب کی آگل سطے کے اُس حقے سے تناظر ہوتا ہے بوکشش نے مکام ا نہیں ہوتا ۔ اِس رقبہ کے گرد ایک رقبہ عمیق یا اضافی اصمیت relative dulness) اور اس طرح اُس کی حقیق جا ایک نعشہ بناکر پیش کرتی ہے ۔ اور کو یہ تمیری فضاء کی پہنچی ہے۔ اور کو یہ تمیری فضاء کی پہنچی ہے۔ اور دائی طرف یہ صدم القلب تک پہنچی ہے۔ اور دائی طرف

10.

براکشر طلم الفقس کے وأی کنارے سے نصف انچہ باہر کہ مشنا خت کیجاسکتی ہے۔
عظم الفقس نودگلک دار ہوتی ہے۔ اضافی اصمیت متوسط طور پر کھکے قرع کی مدسے
ہرترین حاصل ہوتی ہے۔ کہرے میں خاموشی ہونی چاہئے۔ لاشعامی امتخان طاہر کر ایک
قلب کا کنار اعموماً اس نقط سے نتاظر ہوتا ہے کہ جہاں اوّلا اواز کی گلک میں مقدبہ
تغیر واقع ہوتا ہے۔ اصمیت فلب کی زبرین حد، جگر کی اصمیت سے متناز نہیں
کی جاسکتی ، اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ قلب کا فاکہ مَدُم القلب اور اسمیت کے
دامیں کنارے کے زیرین ترین نقلہ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔

قلب کامی و توع کسیندر مربض کی دمیع قیام کے ساتھ بدل جا تاہے۔

دیوارسیند پر قلب کا رقبہ برآ کہ (area of projection) انتھائی وضع میں اس سے

کسی قدر زیادہ نیچے کہ بھیلے گا اور نبستہ کم چڑا ہوگا کہ ختنا افتی وضع میں ہوتا ہے۔

بسب بھیسیے ہے ۔ میسیے ہے ۔ میسیے گا اور نبستہ کم چڑا ہوگا کہ ختنا افتی وضع میں ہوتا ہے۔

بسب مسیع قبل کا شنا نمت کرنا عموا گا ایکل فیرمکن ہوتا ہے ، اور مزید برال مسکم لملب

اکٹر اتنا کم ور ہوتا ہے کہ محسوس بنیں کیا جا سکتا۔ اضا فی اصمیت کے رقبے کی زیادتی

کا ایک اہم سب تا پہتا اور میں ہواکی موجود کی سے یہ رقبہ ممک دار ہوسکتا ہے۔

پیش قلبی اسمیت کے رقبہ کا اور کے طرف سے یہ رقبہ ممک دار ہوسکتا ہے۔

پیش قلبی اسمیت سے رقبہ کا اور کے طرف سے یہ رقبہ ممک دار ہوسکتا ہے۔

پیش قلبی اسمیت سے رقبہ کا اور کے طرف سے یہ رقبہ ممک دار ہوسکتا ہے۔

پیش قلبی اسمیت سے رقبہ کا اور کے طرف سے یہ رقبہ ممک دار ہوسکتا ہے۔

پیش قلبی اسمیت سے رقبہ کا اور کے طرف سے یہ رقبہ ممک دار ہوسکتا ہے۔

پیش قلبی اسمیت سے رقبہ کا اور کے طرف سے میں ہٹا دے۔

استاع

(auscultation)

مسماع الصدرسے سننے بر تلب کی آ وازی کب ڈپ الفا (syllables)
معص الم المعلوم ہوتی ہیں۔ پہلی آ واز نسبتہ زیا دہ دمیمی (duller) اور لمبی اور
دوسری آ واز نسبتہ زیا دہ سے (sharper) ور مفقر تر (shorter) ہوتی ہے۔
پہلی آ واز کچہ توعفلی انقباض اور کچہ اُ ذینی بطبیع صافر valves کے بند ہونے سے بعد اُن کے پکایک تن جانے (streching)

کی وجسے ہوتی ہے اور دوری وازنیم طالی مصرا عول (semilunar valves)
کے بند ہونے کے بعد الن کے کیا کی تن جانے کے سبب ہے۔ دونوں معرافل کا معدد معدد میں جول ہی کہ دہنوں کی دا و سے نون کا بہنا بند ہوتا ہے دا من محولا ساتھ ما تیرنے گئے ہیں (1) ۔ یہلی آ واز راس قلب کے قریب بہنوین اور دوری آ واز قامہ پر بہترین منائی دیتی ہے۔

م منتف الم يماست اصوات - قلب كي آوا زيمنظ (accentuated) يا لمند يم منتف الي تعداد مي زياره موسكتي مي إلى ال سعارا في تعالمتاً (time-relations) متغم موسكت بن -

تفخیم (accentuation) متعدد اسب پیدا موجاتی ہے 'جن میں سے

ایک سبب شش کی بازکشیدگی (retraction) ہے 'کہ جس سے قلب دیوار صدیم

قریب ترا ما باہ ۔ بہلی آ وازکی تعظیم اور دصاین (dulling) یا فعلی (muffling)

بطینی بیش پروردگی سے پیدا ہوجاتی ہے ' سکت غیر نیر رضیمے پن کے

(accentuation مرانی ضین میں مام ہے ۔ دوری درائیس بین ضلی ضنا ہیں

دوری آ وازکی تعزیم کی وجہ سنے بانی فون سے دباؤی زیادتی ہے 'کہ جس سے مصاع بند ہونے کے بعد افیر سمولی قوت سے ما تھ تن جاتے ہیں [طا خطہ ہو صحفہ ۱ ب (۱)] ۔

اسی طرح دوری یا تمبیری جامیس فضایس دوری آ وازکی تفلیم مال طور پر رئوی معراد اس طرح دوری یا تعبیری جامیس فضایس دوری آ وازکی تفلیم مال طور پر رئوی معراد اس

دوسری واز کا تضاعف (reduplication) موهٔ قاعدهٔ تلب بور ساجا کا ہے، بالخصوص ربین رقبین اوربیض اوقات اُس کا ایسال راس یک

ہو اسے ۔ وومصرای مرض کی ان اصابتوں میں واقع ہوتا سے جن میں مجیمیر مول کا ا متلاء ہواہے اور ریوی دور (pulmonary circuit) میں رہا و بڑھا ہوا ہو اے۔ وہ اس واقعہ کے بیب سے ہوتا ہے کہ ریوی اور اُور لی مصاعات بالکل ممزال لحدرب بندنہیں ہوتے مکن ہے کہ پہلی آواز کا تضاعف ' جوراس پرمسنا ما تا ہے' بعض افتات ا ذینی بطینی مصراً عات کی غیر بمزمال مسدودی کے باعث ہو۔ حدود اکھن (canter-rhythm) ميں راس بربهلي يا دوسري آواز كا إكيب نها يت نما يا ك تضاحف ہواہد ، جس سے تہری کے (triple rhythm) کی دوسیس نودار ہوتی ہیں ایعنے نَی َنْبِ بِ 'اوْرَابْ بِ نَی تیروراکض (canter-rhythm) کے سبیت ہیں،۔(۱) زائد یا فاقعہ آواز (extra sound) اُسی سب سے پیا ہوتی ہے جو اکثر اِس مفام را کی عامل وسط انبساطي (early mid-diastolic) يا أُ ذيني انكماشي فرير بيدا كردتيا المح ميعيدوه مطرا نی ضیق (mitral stenosis) کی علامت. ہے۔ (۲) یا و قلبی مسدودی ربط ظف جد) کے سبب سے میدا ہوتی ہے، اور مکن اور کا مورائل بجنسہ وہی آ واز موجوانقبان أ ذين تحسب عد موتى ب معولى مالات بن به إسوم سدنهي سنائى ديتى كالمين ملے تقدر قریب ہوتی ہے کانزالذکر کی اواز اِس کو دصانک لینی ہے۔ قلبی مسدودی میں ا ذبن بطبین سے تجہ بہلے مقبض اوا ہے، اوراس سے انقباض کی آواز انبیا لم کے دوران میں جلدیا دیرسے سنانی دیتی اور علی التر حمیب دور مری یا ہلی آواز کو متضاعف (reduplicated) نا رتی ہے (Lewis)-

قلب بسقدر زیاده موت سے فرب گا آ ہے اسبقدر دومری آداراور
اس کے بعد کی پہلی آواز کے درمیان کا وقفذیا دہ مختہ ہوتا ہے ۔ اس مربع فعل می
وقلبی سنگی (cardiac exhaustion) کی بعض قسموں کے ماتھ ہوتا ہے یہ دونوں
وقف مساوی ہوسکتے ہیں ۔ ضرباتِ قلب کم ور ہونے ہیں ' پہلی آواز دومری آواز
سے تیزنہیں کی با علی 'اورجنین قلب کی آوازوں سے قریبی مشاہبت پائی جاتی ہو۔
اس مالت کو جنینی کے (fætal rnythm) ایجنین قلب (embryocardia) ایجنین قلب (fætal rnythm)

تندرست انتخاص يوس يركى بوبلي وازموتى بدوه قامده برأ ورلى

رقبہ کی دوری آوا ز کے نبیت وگئی شدت رکمتی ہے۔ مضل قلب کے انخطاط ک اصابتوں میں ہیں آ واز جواس بیسی جاتی ہے اپنی شدت بی کم ہوجاتی ہے بیانتک وہ قاعدہ پرکی دوری آ واز کی شدت سے ساوی یا اُس سے کمۃ ہوجاتی ہے ۔ اِن دونوں کا مقابل کرنے کے لئے ایک فاص قسم کا سماع العمدرا یجاد کیا گیا ہے لیک معا ایک معمولی مساع العمدر کی مدسے کا ن اِن کے فرق کو مسوس کر لینے کی پوری

727

مض کے باعث مصاعی وہنوں برخریات مصاع کاکوئی تنگی (narrowing) مستی (stenosis) با تست د (obstruction) ان کارہ جانے والی نون کی رومی ارتعاشات بیدا کردیکا دریه ایک خربر (murmur) یا حرو (bruit) كے طور يركسنائى وينگ بس كوا بتدائح ومنفاخى (bruit de souffle) کہتے تے ۔ بنا ف أنبن اگروہ مصاع على يم الكفايت (incompetent) ہے تو کھے خون اُس کہف کے اندر جازی وہوجائے گاجسس میں سے وہ آیا تما ' اوراس سے بی ایک فریسنائی دیگا۔ یہ خورات نوطبعی اصوات (adventitious sounds) ہیں وطبعی اصوات قلب ی بگر لیت بین - اگرابب یمان سوراخ رکھنے والے تل بسسے ایع نہایت بندرفارسے بزور گذال جائے تونل کی دیوار پررگر سکتے سے مُلاطم انگیز حرکت بیدا بوگی اور ایک آوا زسنا بیٔ دیگی _نسبتهٔ کر رفنار بوتو بهساؤ يحيال ہوتاً ہے اور كوئي آواز نہيں بيلہ ہوتى اور يبي حالت اُسوٰقت بھي ہوتی ہے جبكه انع ايك زياده چورك لي سين على كرايك نسبة جوف لي يرجا تاب لیکن جب مانع ایک مجولے ل میں سے ایک نسبتہ بڑے کل کے اندر' یا اکسنگلٹ من سے عکراس کے آگے نسبتہ چڑی فضایں جاتا ہے توایب آواز بدا ہوجاتی ہے۔ اِس کی تومید یہ ہے کہ یا فی کی وطار (stream) ایک نسبنہ مچوسٹے ال یس زیاده بلندرفارسے بہتی ہے اوراسی واسطے ده ایک نسبندرسے ل کے آست حرکت کہتے ہوئے مستال کے اندر ایک منجدهار (fluid vein) کی تعلیم آگے كوم مينكي ماتى سب أور إس كى ركز كرداكردك سيال ير لكن سے وه مسور ول كى على مي ياره ياره موجاتى ہے - إس سے بيدا موجاف والے ارتعاثات

بصورت وازسموع اوتے بیں - اس اصول کی ایک شال جروزان دیکھندس آتی ہے ایک آبشار سے متی ہے ایکن جسم انسان پراس کا اطلاق کوسی طور پر موتاجہ ینانچد مصرا عول کی تکی اور عدم کفا بیت (incompetence) سعربدا اون وال نررات كالتذره بيكياكيا مي موريال يه تلادينا جا محك خرر كا أيك مزرسب مصراعوں کی کوروں کے یا اُن کی روئید کیوں (vegetations) کے وہ ارتعاثات می ہوسکتے ہیں جوجائے فون کے اندر ہوتے ہیں - منجدمار (fluid vein) کے ا صول سے اُن خریرات کی توجیمی ہوتی ہے جو قال کین (septum ventriculosum) كيكسى انتقاب مي سے ون كركذرف سے يبدا بوماتے ہيں ۔ لمبقا ، جكم ون راسے تراین سے چوٹے تراین کے اندر ما ماہے کوئی آواز نہیں سنائی دیگی ایکن أَكُرْ تَهْرِيانَ يردبا وُيرِْے تواكِكَ آواز يبيل ابوكى - في التقيقست إنبسا في فنشار (diastolic pressure) بیدری زرایع سی تعبین کیا جا سختا ہے۔ اسی طرح آگر برسعاً ورده پر دبا و پڑے تو ایک نوبر مسئنائی دیگا ، اور نشریانی انورسما اور تمریانی ورید انورسما میں بمی - بالآخر؛ بری اُ صول اُس وقست بھی کا رفوا ہوا جد جبکہ دوراً نبغس میں ہواکی رووں کی حرکت سے آوازیں پیدا ہوماتی ہیں - آوازیں مند میں پیدا ہوسکتی ہیں بید کسیٹی بیانے میں انیز اک کے اعلی ایجیلے منزوں میں مزار (glottis) میں ا يا منفسى شعيبات اور بوائي ناچ سك درميان -

مریات تلب ایک دورے سے امور ذیل میں مختصف ہوتے ہیں اس (۱) برلحاظِ وتت ۔ (۲) تلب کے دہنوں کے ساتھ اپنے تعلق میں ۔ (۳) آواز کی

نوعیت میں ۔

خردیات کا وقت و و فریات بو پهلی آواز کے ماتونائی دیتے اور اس کے بعد ہوتے ہیں، بطینوں کے انتباض کے دوران میں واقع ہوتے ہیں اور انکاشی (systolic) کہلاتے ہیں۔ وہ جو دو سری آواز کے ساتھ 'یا اُس کے اور انکاشی کے بعد کی پہلی آواز کے درمیان سنائی دیتے ہیں 'اِس اعلیٰ الله کے دوران میں واقع ہوتے ہیں اور انبساطی (diastolic) کہلاتے ہیں۔ یہ فریات انبساطی (early) کوسطی (mid) اور

آجل (late) انسامی کہلاتے ہیں۔ آخرالذرکور بادہ مام طور پر قسب اسکاشی (pre-systolic) کہتے ہیں اور جب وہ ' جیسا کہ بیٹیۃ اصابتوں میں ہو اسبے ' افرین کے ایک تیک فقہ میں سے بزور گذرنے کی وجہ انسی اذین کے ایک تنگ فتہ میں سے بزور گذرنے کی وجہ ہوتا ہے تو اسے اُخ ینی انتما شعی (auriculo-systolic) کہدسکتے ہیں کسی مام خرید کے وقت کی تعیین کے لئے 'اس کامل قوع مذیبہ قلب کے لیا ظ سے ' یا غضروف در آئی خرید کے وقت کی تعیین کے لئے 'اس کامل قائم مقام ہوتی ہیں ' سکن بعن عبری احمانی محت کے باس سباتی شریان کی فرب کے لیا قائم مقام ہوتی ہیں ' سکن بعن عبری احمانی اسکانی بعن سے اِسکیٹر بعد واقع ہوتی ہیں ' سکن بعن عبری احمانی (radial میں موتی ہیں۔ وی بیاتی شریان کی نبض سے اِسکیٹر بعد واقع ہوتی ہیں۔ وی بیات کی نبی سے اِسکیٹر بعد واقع ہوتی ہیں۔ وی بیات کی نبی سے اِسکیٹر بعد واقع ہوتی ہیں۔




شکل ۱۱ - مطرانی نمیسی کی فریات کی فرمیه لوهمی (Lewis) کے مطابق .

ه - م - بلا لی معرا مول کی مسدودی جوکه دومری آواز کا وقت اور
انساط کی ابتدا طام کرتی ہے - \ - ب - \ - اُ دینی بطیعی معرا عات کا
انعتاح ۲۰ اُدینی آگائی فریر کاممل و قوع ظام کرتا ہے - ا وسلمانب کی
فریز ظام کرتا ہے - آ فرالذ کر حقیقت میں ایک خلط نام ہے کیونکہ یہ فریر
وسط انبیا کی سے بیلے واقع ہوتی ہے ' لیکن چونکر یہ انبیا کی کہ ما فالسے
بعد شروع ہوتی ہے لہذا اِسس کو عامل انبیا کی نہیں کہا ماسک آ۔
معتبقت میں بیرتا تھی ہوتی جال انبیا کی ہے ۔


أور فى دمنه برتسددى مالت بس بطين كا انقباض ، فون كوتسدد كه با بزورگذاركرايب خرير پيلكرتاب اسى وجه سعه وه ايب انكاشى خرير بوتى سبه اوراگر قلب كى لمبى آ وازي كب دُپ سعه ظاهر بوتى بين تو إس خرير كه ما ته كى آوازي كف دُپ (است الله الله الله على جاسكتى بي (معفه ١٠) العنب) -اور فى دمند بركى بازروى ارزى ربطين كه دوران مي ايک خرير پيلاكرديتى سبه ، جو دوم ي آ واز ك ساته تمروع بوتى سه - اسى واسطه وه عاجل (نبسا على early) . دوم ي آ واز ك ساته تمروع بوتى سه - اسى واسطه وه عاجل (نبسا على early) .

مطرانی رہندیر بازروی مبطین کے انتباض کے دوران میں ایک خربر بیدا " كرديتى ها - اسى واسط أيك المكاشى خرير بيا إوجاتى هد (معند اب اورس) -مطراً في مصارع كم منفام يرتست و جوسف سه ايك انبساطي ترييدا برجاتي سهه ، بو اُس وقت وانع بونے کا رجمان رکھیگی جبکہ خون اُ زین سے بطین کی طرف اعظم شدت كرسا فدبة ربا ہو اليف بب دباؤكا فرق كبيرين ہو ملى دور ك دورات بس م ذين ادطبين كددبا وك تغيرات كاعمرهمين دوران انساطين دو اليسد مواقع فلامركر اسب جبكه به حالت يائي جائيعي (ملاحظ موشل ١١) - يبلا موقع انبيا طريحة فاز كه ذرا بي بعد ہے ' یعنی دومری آ وا زکے بعد ' جبکہ بطین کا مل طور پر مرتنی کیکن خالی ہوتا ہے' ا ورا دین اس خون سے متعن ہوا ہے جو مجھیلے اور ین انکمانش کے وقت سے مع ہوگیا ہے۔ دور ا موقع خودا زینی انکماش کے دوران میں ہوتا ہے، جبکہ دروں ا ذہی فشار بهت بند بواسه- إس كانتجريه بواسه كمطراني فيق مي دو مام زين تريرات میں ہے ایک نووہ فریہ ہے جو وسطِ انساط کے اوائل میں ہوتی اور معنی ایک مطانبیا خرر موسوم کی جاتی ہے (معفر اج ، داورس) ، اور دورمری و قبل انکاشی یا آزمی انحماشي فرييه وانساط كنماته ك قربب شروع موكريبلي وازمي فتم موجاتي ب (ج اور ق) - بب يه خررات بكراكب بوجاست أي توكأمل انبساطي (full) (diastolic کہلاتے ہی (ب اورج) - اس مقبقت کا تذکرہ پہلے ہی ہوچکا ہے کہ راس پر ایک متعنا عف دوسری آوازگر طرانی منیق کے باعث ہوتی ہے۔ وو اسی طریع سے پیا ہوماتی ہے میں طرح کہ ایک وسط انباطی فریر بیا ہوتی ہے یعفل فقات


اسوات فاب كنسجيل وررني نك يخانمين



الف اور طی مینی سبی نیریان بهلی آوار کی بحالے ایک اکلمان خربر (کو موتود ہے اور دویل مواز ۲ مل کے فی الفور بعد ایک کم زور البساطی خربر ۱ ۲ ، ہے۔




م به مرطرانی ضین اورباز روی به به به به آواز بر کس انقلب (هpex) کے ذرااند رکی طرف نتیجبر کمگیری. بهلی آواز بلندہ اورایک کماننی خربر موجود ہے به دوسری آواز اور کال انساطی خربر جی طاہر کمگیری میں میں میں آواز کم خررہ اور دوسری آواز غرب بہلی آواز کم خرارہ بہلی کم خرارہ بہلی کم خرارہ بہلی کم خرارہ بہلی آواز کم خرارہ بہلی کی خرارہ بہلی کم خرارہ



ح مطرا فی ضبن دل و " اکامل انساطی خریر و او او صاحدا فین کانتی حربر و عود اعاصل سطانساطی خریر حس کے بعد کیک خاموش و فقہ ہے ۔

ی مطرافی شین او جزوی مدود کی قلب د ب ل فاصله بندر بیج براه جا آئی بیا ننگ که یک ضب سافط بوجاتی به بیبل آوازی نرسیم کے نشروع اور آخری فقم بوجاتی می اور یک جیموٹی سی آذی سافط بوجاتی به دوسرے انگاش برا ذیخ کانتی خرید (۱) وربیلی آواز ایک دوسرے انگاش سلنے جا این که ف ل فاصله طویل بوگیا ہے ۔ اسکے بعد جب طبینی ضرب کانب ہوتی ہے تو افریخ کانتی خریز نہا موجود وق ہے ۔ "ا ماجل وسط انبساطی خریر ۔





و۔ ایک مفتوح قناۃ شرابی کی اصابت بی سبانی نفن گارش اوراصوات قلب کی سجیل۔ ایک انکمائنی فریر موجود ہے ہوکہ انحاش کے ختم برضر نبینی کماؤ کے مقابل مخرج اور ابساط کے بینیئر صحب بی جاری رہی ہے۔
موجود ہے ہوکہ انحاش کے فتم برضر نبینی کماؤ کے مقابل مخرج اور ابساط کے بینیئر صحب بی جاری رہی ہو اور اسلانی فریرات بہی دواور میں۔ ایک مطافی فریرات بہی دواور انحری دوفر بات کے ساتھ جو فریرات بائی جانی ہی جو بلسل ہوتی ہیں جب ضربات کے درمیان وفضا ویل ہوجا تو ہیں۔ (یانصاویر واکر کر اس براموبل کے اندا جات تو دو انکھائنوں کے درمیان خاموش وفضا درج کئے جانے ہیں۔ (یانصاویر واکر کر اس براموبل کے اندا جات سے لگئی ہے)

ل هب - جدر دوم

جَدَ قلب تيزى كرما ته نمارب بوتا ب مطالى فيس من ابك عامل انساطى وينائى ديني ب ايس ايس نورج دوسرى آواز كرما ته شروع بوتى ب -

وسط أنب عى خريرا بني نوميت من زم (soft) اور في (blowing) اوراكل

مختر (short) بوسکتی ہے، یا مکن ہے کہ وہ قرقری (rumbling) ہو اور انہاط کے
ریمشتر تھے میں جاری رہے، اور یہ ایک بلند درجہ کی ضین کی علامت ہے۔ اور انکاشی فریہ بندر بیج بلند تر ہوتی جاتی ہے، اور ایک فقر (accentuated) پہلی آوا میں ختم ہوتی ہے۔ وہ " ر - ر - ر ب" ("r-r-rup") سے طاہر کی جسکتی ہے۔
مین ختم ہوتی ہے۔ وہ " ر - ر - ر ب" ("r-r-rup") سے طاہر کی جسکتی ہے۔
انگلسط انہا ملی اور اُذینی انکماشی فریرات دونوں کا ایک ہی دقت میں موجود لمنا مکن ہے (ج اور د) یا مکن ہے کہ ایک اُفینی انکماشی فریر ایک متضاعف دومری آواز کے ساتھ ہو۔

یہاں بوکچہ اُ ورطی اور مطرانی معراعات کے متعلق باین کیا گیاہے وہی برتبر بلیک الفاظ ربیری اور مثلنی مصراعات کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔

<i>19</i>	خرد	وبمئ
انتحاشى	[تستر	اً ورطی
انميسا في حريط	اِزرُوي	ي رئيي
انجسالمی انجسالمی (عاجل انجسالمی (صفی (سجل - دِنبِلْ کَماتُی یَا دِبُالِکَاشی) وکیانشی	اً تستد	ملانی
انكاشى	يازتوى	وسیا مشکنی

انیں تصربوی بازروی (pulmonary regurgitant) کے خریرات اور انسی تصربوی بازروی (pulmonary regurgitant) کے خریرات اور دوی مثلثی تعدد کے خریرات نہا بت شاذہیں۔ اور دیوی تشدد کے خریرات بقتہ یا بیج کی نسبت ناورالوقع ہوتے ہیں ، تا ہم ربوی تریان کے خطہ پر ایک اِنکاشی خریر کا مخون کی مقطاریا صفت کے تغیرات کے ساتھ یا یاجا نا

بانکل عام ہے اور اُسے دُموی فریر (heomic murmur) کہتے ہیں۔
یہ امرا ہوہے کہ مندر فہ بالا آٹھ اس فرات (جار دہنوں میں سے ہرایک تشدد یا بازروی) معنی ان کے فریات اور قلب کی آواز وں کہ باہمی تعلق برسے نہیں شنا خت کئے جاسکتے ۔ سکن ہمیں پیش آلمبی رقبہ کے اُن مخلف نقطوں سے میں پروہ بہترین سے جانے ہیں ' اُن کے تمیز کرنے میں مدد لمتی ہے ۔ پینفطے سطے کے بعن پروہ بہترین سے جانے ہیں ' اُن کے تمیز کرنے میں مدد لمتی ہے ۔ پینفطے سطے کے نبی مصراع کی اصلی جگہ سے نہیں تعین ہوتے ' بلکہ دہنے ہے گذر کر بہت و الے نون کی روکی سمت سے اور آس سمت سے جس میں صوتی ارتعا شات بدا ہوتے ہیں میں موسی تا ور آس سمت سے جس میں صوتی ارتعا شات بدا ہوتے ہیں میں توی ترکی کی گھر

ریوی تر این می قبل سے اور کی طرف ائیں رفع میں اور قلب میں اذین سے بطین میں ہوتا ہے ، ہزر کو ایک خورات میں ہوتا ہے ، ہزرر کو ایک خاص راستہ سے تنظمتال کرتا ہے۔ اور بازروی کے خورات میں خون کی بازروی (reflux) اور کمی

معرا ول من مصابلين من اورمطرا في معرا ول من سعاً ذين من اليعلى طريقة معرا ول من اليعلى طريقة معمل كرقي من المعلام (مطرا في رقب أورلجي رقب) كا إطلاق

اکژیمیش قلبه (præcordia) یا متصله دیوار مسد کے اُس حقه پرکیا جا تا ہے۔

جہاں ایک خاص نور عموا مسئی جاتی ہے 'اورمعاطی مف کے لئے استاع قلب کرتے وقت اِن رقبوں کا یکے بعد دگیرے امتحال کرناچا ہے ۔

أورطى تسدت كريات سب سيزيا وه شدت كم ما ته دومري وأي بين ملى فضا واي من فضا و و و و من الله و و الله من الله و الل

یج وی طی با زروی کے نورات اور لی رقب پرسے جاتے ہیں۔ نیچ ان کا تعاقب منا استی یا اس کی بائیں ہاتھ والی جانب کے برابر برابر الرسس قلب کے رُخ میں کیا جاسکتا ہے ، پیعنون کی بازرو دصار کے خط کے ساتھ ما تھے۔ وہ عوا علم النقل ك بأين جانب بلندترين موت بن الديعن الوقات صف بني وه جَدَّرُنى المرابعة الموقات صف بني وه جَدَّرُنى ال

مطل فی تست د کے فریات مدر کے مالق صدم الفلب کا بونقد ہو اس (مطافی رقب بربسسے نیا دہ طند سند اس (مطافی رقب بربسسے نیا دہ طند سند فی دیتے ہیں گربعض اوق ت وہ اس نقط اور فلم القص کے درمیان کم و بیش ہوع ہوتے ہیں اور اس پر ہمیشہ بہتون سند فی دیتے ہیں اور اکثر ایک یا فریر ہو انجہ کے رقبہ پر سمتی کے ساتھ محدود ہوتے ہیں ۔ اسل کو نا مرف اس مقام پر رکھنا جائے کہ ہمال مَدم کو طبعاً اللہ کا مہت میں مقام بر رکھنا جائے کہ ہمال مَدم کو طبعاً اللہ کا مرب ہماک میں لایا جائے تو وہ بہتون سنا فی دیتے ہیں۔ دا فرجی کام میں لایا جائے تو وہ بہتون سنا فی دیتے ہیں۔

ملم افی بازروی کے فربات بیتراس قلب برسب سے زبارہ شدت کے سات میں اور قامدہ قلب کے سات کے سات کا در قامدہ قلب کے ساتھ سے نامدہ قلب کی طرف وسیع طور پر بھیلے ہوئے ہوتے ہیں 'اگرچ بالعموم وہ بالی جانب کوتعا قب کرنے برزیا وہ زور سے سنائی دیتے ہیں یغل میں اکر مان کی بلندی جاتی رہتی ہے' کینے برزیا وہ نام میں علم الکتف کے زا ویہ پر بھرسنائی دیتے ہیں۔

ولوی کست د کے فریات بڑی شنت کے ساتھ دوری اہم بنیلمی فضادی اس کے اندرونی مرے (ربوی رقب) پرسنائی دیتے ہیں اور اُ تکا تعاقب اُ س فضاریں باہر کی طرف اور اویر بائیس ترقوہ کی طرف کیا جاسکتا ہے۔

دیوی با زروی کے فررات تمیری باین ملتی کرتی کے فلم انقق کے ماقہ اتعمال کے مقام پر' اور وہاں سے نیچے کی طرف دائیں بطین پر' خلم انقعل سے بائیں کنارے کے برا بربرا برمسنائی وسیتے ہیں۔

مُثَلِّتی تسد کا کے خریات بعض اوقات (مطرانی تسدد کے خریات کی طرح) ایک قبل انجاشی یا وسط انباطی نے کے ساتھ مظرالقعس کے بائیں جانب اس کے اور چنمی منطق کری کے مقام اتعمال پرسنائی دیتے ہیں۔
مُثَلِّحْ مِلْ وَ وَ یَ کُمِنْ مِلْدَة عِظْ الْقَقْ کِمِنْ مِینَ نِعِنْ مِنْ نِعِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

مُثَلِّتْی با زووی کے فریات عظرالفس کے زیرین نصف پر' اُکسس رقب پرمسنائی وسیتے ہیں بوقلب کے اُس حصے کے ماقد خاصے قربی لور پرتنا طر

ہوتا ہے جو دونوں بھیں پھروں کے دریا ن کھلا ہوا رہ جاتا ہے کیکن وہ اکٹر عضروف مخری کے قاعدے (مُشَلَّتی رقب) یرمحدود ہوتے ہیں۔

قلب، کے بیدائش ننائعل دراور قی انورسماکے با مت پیدا ہونے واسے خربات بعدیں بال کئے جا تھیا ہے۔

خدیدتی نوعیت - آواز کی نوعیت اکثرا وقات نفنی (blowing) اور بعض اوقات نونی (sawing) اور بعض اوقات ریلے جیسی (rushing) ارده چلا نے جیسی (sawing) موتی ہے ۔ بعض اوقات خربرات مربح موجتی نوعیت رکھتے ہیں معلی کے نبیم علی دو شدو کرائے و دموی روبیں کھیلتے ہوں 'معرا موں کے انتقا بات اور خصیلے احبال وتری (chordæ tendinæ) بعض اوقات اسے ہی خربرات بہدا کر بنتے ہیں ۔ بعض اصا بتول ہیں ایک خریر ، جو گو موسیتی نہیں ہوتی 'ایک نقط براس ارتفاع (pitch) کی نبیت ایک مقل با رتفاع (pitch) کی نبیت ایک مقل اوقات اسے وک وہ ایک انجے فاصل پر رکھتی ہے وک وہ ایک انجے فاصل پر رکھتی ہے ۔

فالبا نون کی رونوں کی رفتار (velocity) پرجا ذیہ (gravity) کے اثر مین منت مریبات مریض کی وضع کے نواز سے مختلف ہوتے ہیں۔ شکل بیٹی ہوئی وضع سے خریبات کی مبند (recumbent position) میں اکٹر اُور طئی مطرا نی اور شکٹی انکما شی خریبات کی مبند میں ایک زیادتی ہوجا تی ہے۔ اِس کے برعکس کھڑی وضع اکثر مطرا نی تندد کے اور میں ایک زیات کی شدت کو بڑھا دیتی ہے ۔ یکن اِس سے معلق کوئی قطعی اور (hard and fast) قاعدہ مقرنہیں ہے۔

خورورامت کی ا همیت - یه ایک جیرتناک امرے کر نون جس راست ا (اورده اُ ذین بطین نربان) میں سے بوکرگذر ناجے اس کے قطریہ (calibre) میں بڑے تغیرات موجد ہونے کے با وجد قلب میں کوئی خریرات موماً نہیں پیدا ہو ۔ تے پیتصور کرلینا آسان ہے کہ کوئی چوٹا تغیر جو کوئی امراضیا تی اہمیت ندر کھتا ہومورت مالا کو ایک بدل دنیا اورایک نوریریدا کردیا ہے ۔

دوران جنگ یں ماصل شدہ ، خصومنا لیوسس (Lewis)اوراس مے درات کی ماصل شدہ ، خصومنا لیوسس (Lewis)اوراس کے درات کی ا

В

ہیں۔ دستورہ ہے کہ جشخص میں انسا کی خربات موجو د ہوں اوراً ود کی بازروی یا مطانی ضیق طاہرکریں اسے طازست کے لئے دیا دہ موزوں تصور ندکیا جائے۔ تاہم انکاشی خریر کی موجود کی کو باعل نظرانداز کردبنا جا ہے ۔ کہ کہ یہ پایگ ہے کہ جواشخا سئالز نرا ایک انتخاب کے کہ انتخاب کے کہ انتخاب کی موجود کی کو باعل نظرانداز کردبنا جا ہے۔ اس کا سبب طامشہ یہ ہے کہ نظام بر جو کوئی خریر بائعل مذر کھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کا سبب طامشہ یہ ہے کہ نظام بر تنکریست انتخاص میں جو انتخاب مول قبلی تنکریست انتخاص میں جو انتخاب مول فی بازروی موجود ہو توبعض ا وفات برول قبلی ہوسکتے ہیں اور ہوئی بس خرکی تنونی بازروی موجود ہو توبعض ا وفات اِس ضرر کی تنونی اتنی احجی ہوتی ہوتی ہوتی ہو کہ دو سرے ملامات کی فیرموجود کی ہیں قلب کی کارکرد کی ہیں کوئی قابل شناخت فرق نہیں یا با جا ا۔

وه خربراً ت جوگه چارمصاعی دمنوں میں سیمسی ایک کے حقیمی من پرمنحصری ہومیں ۔ مندر مبالا بیابات کا اِلملان اُن آ وازوں پر ہے ہو میار مصاعی دہنوں پر تسدوات اور ترا وشوں (leakages) سے پیدا ہو جاتے ہیں ۔ لئے سیشہ قلعی قریر ایس فرطمہ تر جازی محربرین کی دسکتہ میں جدورہ سے ماریتاں

کیکی پیش قلبی رقبہ پر اسی فیر لمبئ آوازی می سنائی دسکتی ہیں جو دو سے طریقوں سے بیدا ہوجاتی ہیں ۔ إن میں سے بعض دخلی غی خورا (functional murmurs)

كِلا تَى أَيْن بُرِين بِمِقالِداك فريرات كم بو فلب كى ما فت كم مِن كم با من بوتى إين كم لا تَن مَن بوتى إين الم

' minute volunie' کی وجسے پیدا بوجاتی ہے) ایک اللم انگیز مرکت با خربر پیدا کردیتی ہے۔

برول قلبی خریرات (exocardia! murmurs) بینفی نومیسند ("blowing characte) كي وازين بن أوا الرون قلب كم تنبرات سعنين " بَد ، وازك أن ارتعاشات سعربياً موجاتي من بوفلب سعدام نودارم قيس-إن بي سيعبي مرضرب ك وفت مسامت قلب يحد بدل جاتے كه باحث ہوتى ہیں ' جس سے شش کے منصار حصدیں ہوا کے حرکات مودار ہوکر قلبی کے محصالات معنظ نفسي وازول كالكيسلسلافلبي مريوي وcardio-pulmonary) بيا موما تأسه - ان مي سيدمام ترين ايك مختر بلند ارتفاع (high-pitched) كي انكما نتى مُرِيرِ توتى ہے ' بو اکثر ٰ لِاکسن تک معدود ہوتی ہے اور مصبی المہذاج (inervous) اَلْمِدِارَةُ مِوسِدُ (excited) اشغاص ميں اُل كم لمبتى امتان كو تت سنانی دبتی ہے۔ ایسی نریر بعض ا وقات سیھیے اُس علم انگنف (scapula) مراور سامنے می سنائی دینی ہے۔ آگر بیساع العددر کے سخت دبا و سعد خانب مومانے تو بعن اوك إس كه برول مبى مبدأ وكونا بت تعدر كريسكة بي بيكن ا ومورى وك ی آوازیں (pericardial friction sounds) بویقیناً قلب سے با بریدا ہوتی بین اورغلطی مصاندرونی مروات (internal bruits) سمی ماسکتی بن ر با وس اکثر زیاره معطاتی میں - ایک انجماشی راسی فریر ، جومن معرات بیتی (inspiration) میں سنائی دے یا سف اس وقت کے سنائی دے متک کشیف بھیلا ہوا رہے، غالبًا كترتبي ريوى بوني بعد -

دور سے برول قلی خربات قلب کی فرد ضعیت (displacement) سے پیدا ہوجائے ہیں ، جیسے کہ اس و فلت جبکہ دہ لیول فی انصبا ہے یا تعقق ہا سے اللہ ہوجائے ہیں ، جیسے کہ اس و فلت جبکہ دہ لیول فی انصبا ہے یا تعقق ہا سے مضغوط ہوجائے ۔ اور دوسرے برول قلبی فریات قلب المال ہم بیادا ورزیادہ با میں جانب برشش اور طبخول کی مرضی ما لتوں سے بریا ہوجائے ہیں ۔ بعض اوقات جبکہ ایک بڑا ریوی کہنہ قلب کے قریبی تماس میں ہو، نہا بت فرمول خریرات سے اللہ عرارات کے ساتھ مواکمنے مریرات سے اللہ عرارات کے ساتھ مواکمنے مریرات سے اللہ کے ساتھ مواکمنے مریرات سے اللہ کے ساتھ مواکمنے مریرات سے اللہ کے ساتھ مواکمنے میں الفلاب کے ساتھ مواکمنے میں الفلاب کے ساتھ مواکمنے مواکمنے میں الفلاب کے ساتھ مواکمنے مواکمنے میں الفلاب کے ساتھ مواکمنے مواکمنے مواکمنے مواکمنے میں الفلاب کے ساتھ مواکمنے میں مواکمنے مواکم

کاکیب ہاہر خارج بوجاتی ہے۔

ورق اللهي الماري المراج المرا

قالب کی قابلیتِ جہد کی تخین علب کی قابلیتِ جہد کی تخین

و، رہی پرسوار ہونے کے لئے کھی نہیں دوڑتا اکیونکہ اس کی سانس بحول ماتی ہے ا يركه وهمي وواكرزيند برنبين جرامتنا اورعلي بوالعتاس -

ورزش بالمنية كي ميسيت خررات كي لمندى سيكولى تعلق نهيل منتقبت فرج ك لئ ركروثول كاستان ك وقت شابده مي آئى -ببت سے اليهداً دميول مي بندميني قلبي فروات يائه كير، جوء دكو بميشة تندرست سبحة ر المان المان كالموب في ورزش كى باكل لمبي مجيبت ظامركى - إس كم بنكس م ورطی با زروی کی اصابتوں میں شدیدترین اصابتیں اکٹرزم ترین خرداست طا مرکزتی ہیں۔ قلب کی جا من کی تعین سے اس کی شکل سے اور عضالہ قلب کی میس پردردگی کی مقدارسے تعویف طلب ضرکی وسعت کا بہتر اندا زہ ماسل ہوسکے کا کجش اور قرع عدكام بيا عباست الميكن لا ننعا عول مع نهاب يقيني معلوات ماصل موسطة

مي - يمي تشين ميم ورون عارى طورير (orthodiagraphically) ليني عالى بين مروم واکارجی- ایج بنت (G. H. Hunt)، جنول نے ورزش کے بیلے

ا وراس كعبعد منرع تبض يركير التعداد شادات كف يقبن ركيته تعدكم يرض كي مالت میں قلب کی کارکردگی کی تین کے لئے مفید سے ۔ ایک معین مقدا کے کا م

کی موقرفی میں بعد پہلے دومٹوں کے دوران میں ضرات قلب کی تعداد شارکی سال بداوراً س كامقا بدنجالسنة الم دريافت كرده نبض كي ترح عصري جانا بها و

اكية نسبت قائم كي ماتى ہے - شلاي فرض كيا جائے كا شرح نمض بحالت الله ، متمی اور ورزش کے بعد ۱۶۰ ضربات شمار کیئے گئے اور سیست ۲۰۲۹ ہوگی ' رہے۔ . متمی اور ورزش کے بعد ۱۴۰ ضربات شمار کیئے گئے ' تونسبت یا ۲۰۲۹ ہوگی ' رہے۔

ا كيب الله النج بلندم فرحى (قدم) مع جرا مصنه ا در أتر نے ميشتمل ہوتی ہے سبی رسد .

ا فرادمی جب وه اس وردشش کونی منطقیس بار کے مناب سے تین منٹ کیگ وہ ویتے ہیں تو نبض کی نبت تقریباً ہو، ابوتی ہے۔ مریض کے لئے یہ ورزش اسلاج

معنب ى جاتى جەر شلادس، پندرد، يابس سيرسياب فى منك، يمن ملول كەليى

ك بس سعنبض كى نسبت ١٥٥ يا ئى جائى - فرض كييج كر شرح ١٠ تى ، تويير كاركون

بن شاری ماتی ہے ایعظمیری لے سین اس ترح کا لحاظ رکھنا بھی مناسب ہے ا عس پرنبض ورزش کے بعد کم ہوجاتی سے۔





العد منتدل درجه كامطرا في نبق والعظم كوار مام وطوت اوطى وكبيا كي في في قلب كائنا والبدلات



ب نزقی با فند مطرانی نبیق و طاحظه بوکه بائی کنار پراورطی دکیامفغو و ب اور ربوی قمع منسے بے و داہی کنارے پرجو ملکار فبہ ہے مکن ہے وہ دائیں طرف کو بھیلا ہوا باباں اذین ہو۔ (بیشعاع کا نیس مرہ لنڈسے لاک نے لی ہیں)

لاشعاعول كى مددسة فككامتحان

اِس ذرید سے جماست قلب کی ٹھیک تعیین کی جاسکتی ہے۔ بہ طربقہ نفاخ کی اصابتوں میں فاص اہمیت رکھتا ہے کہ جن میں قرع عموم نیم معتبر ہوتا ہے۔ یوکہ شعاعیس ضدر پر برقیر و (anticathode) سے شعکس ہوکر ایک نقط سے خارج ہوتی ہیں' ہذا وہ متوازی نہیں ہوتمیں' اور اِس واسطے پر دے پر کا سابداُ س سے بڑا ہوتا ہے متن کہ قلب مقبقت ہے۔ اِس کی اصلاح کے لئے قلب کی پیائش صبح درون کا می طور پڑ'' (orthodiagraphically') کرنی چاہئے۔ ڈانفرام کو شجے روک دیا جا ما ہے' اور ٹی کو اِد سراد صرح کت دیجا تی ہے' جس سے فلب کی کوریں پر دے پر نگ میدان سے وسط میں نظر آتی اور نم یاں ہوتی ہیں۔ دوم الح بعد میدان سے وسط میں نظر آتی اور نم یاں ہوتی ہیں۔

دومراطربیت یہ ہے کہ مریض کو بی سے ساعظ ہ فیٹ پررکھکر تعام کارٹ (radiogram) لی جائے۔ اِس فاصل پرننعاعوں کا اِنفراج اِسقدر ہوگا کہ کوئی تُنڈ غلط یہ اِندی مسکد

نلغی بیدائیس ہوسکتی۔

ا کی بہت کسیم مونوع ہے اور کا امتحان ایک بہت کسیم مونوع ہے اور بہال اُسکی بوری کے اور بہال اُسکی بوری کے اور بہال اُسکی ہوند نہا ہے اور بہال اُسکی بیاجا تاہم چندنسٹ زبادہ اہم امور کا تذکرہ میاجا تاہے۔ میاجا تاہے۔

کیا جاناہے۔ شکل۱۲می ٔ (۱)طبع قلب کی شکل اوروض ٹکا آرشیکے ظا ہرکرتی ہے 'یکھو اور فی محراب اوپرکودائیں طرف بروز کرنے والا ایک نیال ڈکیا (knuckle) بناتی ہے۔ (۲) اسوقت جبکہ مریض دائیں اگلی ترجبی وضع میں ہوا شعاعیں اشیت سے سے اسے آری ہو

(۲) اسوفت ببلیمرین داین ای حای دی بی او معنا میں جب سے سے ارجاء طبعی حالت کو**طا ہ**رکرتی ہے۔

مول کی نبست ریاده انتصابی ہے۔ اکوین شع ہوستے ہیں ادمیدام پر پیم تکلفہ کے میں ترجی وضع میں میساکہ (۲۱) میں بخوبی نظرا آسنے۔ مری نمنی ہوماتی ہے۔ بایال اذمین بسا اوقات بہت ہی تشع ہوتا ہے (انور سل کی اتساع) اور دائیں طرف اس سے ریا وہ بھیلا بوتا ہے کہ جتنا بایال آؤین ۔

صعفه ۱۱ الف میں جو تولیں یا فتہ (compensated) اور طی با زروی کی ایک اصابت طاہر کا ہے۔ بایاں بطین گول اور اس نیچے اور باہر کی طرف ہا ہو ہے اور کی سے ہے اور کی است بی اور ایاں بیت بی قایات کی اس پر بحثرت نبضان ہے ۔ اور طی مسع ہے اور کی (knuckle) بہت بی قایات کی مسلم ہوا اور بالکی ہو دو اور دایا گذین فالص پر یا نشی ریوی فنیق میں وایاں بطین بیشس پر ور و دا ور دایا گذین مسلم اور بایک ہو تا ہے اور بایک ہو تا ہے اسکن اس کا سبب فیروا مع ہے ۔ بعب فالل ایک بھی ناممل ہو تا ہے تو قلب کی شکل طبی ہوتی ہے ، اگر جو وہ بڑی ہوتی ہے .

اس کی تعین ایس کی تعیین ایس کی تا الله بغیر مولی ہے ، اگرویہ وہ بڑی ہوتی ہے ۔

اس کی تعیین ایس کی تعیین ایس محمولی الشراعی منصوب (X-ray installation)

بھائشیں مفید میں ، جواکیہ معمولی الشراعی منصوب (X-ray installation)

سے باکل آسانی سے طال کی جاسکتی ہیں - بہترین بھائش جرتی جاتی ہے عضی والی کے جو کے شکل ۱۱ (۱) میں دو گرا وں د اور دسے بنی ہوئی ہے مطلوبہ تعلیل کے مقام کی تعیین دشوار ہونے کی وجہ سے طولی بھائش عربا اتن تسی بخش نہیں ہوتی مقام کی تعیین دشوار ہونے کی وجہ سے طولی بھائش مورا اتن تسی بخش نہیں ہوتی طبعی تعدرول کا انحصار فرد کے وزن بررہا ہے ۔ رائل ایر فورس سے دررہا :


امین تعربی تا بخ کا مساب جدول میں خاص طور پر لگا یا گیاہے (63) ۔ قلب کا عونی قبل النہ بہترین تنا بخ کا مساب جدول میں خاص طور پر لگا یا گیاہے (63) ۔ قلب کا عونی قبل النہ بہترین تنا بخ کا مساب جدول میں خاص طور پر لگا یا گیاہے (63) ۔ قلب کا عونی قبل النہ نہ بہترین تنا بخ کا مساب جدول میں خاص طور پر لگا یا گیاہے (10 میں ہورا انتخاب کی خوب کا وزن انداز دلگا یا گیاہے (طل خطہ ہوجد واسخہ 272) اور طرسے کہ ہوئی وزن انداز دلگا یا گیاہے (طل خطہ ہوجد واسخہ 272) اور طرسے کی جو سے میں موضوع کو طبعی سجمنا جا ہے ۔ جب موضوع کا وزن انداز دلگا یا گیاہ ہو۔ وزن سے زیادہ ہوتوا عظم کی صورت ہیں بی اسی میں معاست کرنی ضروری ہے ۔




الف اور کی اروں کول طینی سب با ورمنس ورمی طاحصہ ہو۔ اسمانکا نسین مسلم لنا کانسین مسلم لنا کانسین مسلم لنا کانسین مسلم لنا کانسین مسلم لنا کانسیاں کا در انسان کانسین



ب خانص ربوی نین میں ایس طرف انساع اور نیس برور دگی ہے . سر سر





(۲) وأمي احقدم ترحي ۱- بع - بإكنسن) -

(۱) قلب كي شعامياتي تشيخ مقدم

نرندكولذا وربرتن

(Treadgold and Burton)

هب ل يوران (۵ + ۵)			
	ادما	اتل	وزك (موند دراي)
10	1774	17.57	r
۲ عرسما	سووسوا	Ir	19.
۲ د ۱۹	1754	1124	IA-
۸ و ۱۳	1754	1124	14-
15.0	1838	19	14-
اء ۱۳	<i>و د</i> اا	1.56	10.
1856	11 90	ماد ۱۰	15.
ir ir	1131	16.4	11.
185.	1-51	956	1r·
11 ×4	سم مح ۱۰	950	11.
11.50	1.51	931	۱۰۰ (قیاس کرده)

عروق دروبیکامتحال نبض عبری (radial pulse)

نبغن قلب کے فعل! ور دوران نون کی حالت معلوم کرنے کا ایک ایم زیعہ

ہے۔ نبض کعبری پرمثا ہات کے لئے کا نی سی کجری تر پان (radial artery) ہے۔ نبض کع است مام طور پر کام میں لائی جاتی ہے ۔ لیکن نبض کا استخان دومہ ہے مقا است میں کیا جا تا ہے ' مثلاً زندی تر یان (ulnar artery) ہیں کلائی میں مضدی شریان (carotid) ہیں کلائی میں مضدی تر یان (brachial artery) ہیں بازومیں ' سباتی شنہ یان (facial artery) ہیں اس مقام پر کہ جال وہ نیچ کے جراے کے کر وکمومی ہے ' اوری صدفی تریان (femoral artery) ہیں کان کے اور فوزی تریان (posterior tibial) ہیں کان کے اور فوزی قدمی شریان (posterior tibial) کے پیچھے ' اور فوزی قدمی شریان (internal malleolus) میں اندرونی کعبیہ (dorsalis pedis) میں اندرونی کعبیہ (dorsalis pedis) میں ہی بعدحارتی (metatarsal) کمری کے قا مدے کے قاست

بریا در کمنا جائے کہ کعبری تر بال ہمیشہ ی اپنے طبعی مقام برنہیں رہتی ،

بکد بعض ا وقات کوبرو (radius) بر کموم کر کلائی کے جور سے ایک یا دو ای ا و پر
کلائی کی بیشت پر مپلی جاتی ہے ، اور ایسا ایک یا دونوں طرف ہونا مکن ہے ۔ نب بنہ
شاذشا لوں میں کوبری تر بال نور معمولی طور پر چھوٹی ہوتی ہے ، اور اِسی تونیفن فیم میں اور اِسی تونیفن فیم میں اور ذیل نوٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں :۔

منظم میں امور ذیل نوٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں :۔
منظم میں امور ذیل نوٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں :۔
منظم میں اور نوا زیل وٹ کرنے بنی یا نبض کا تواتر اور اس کی کے

ما نظر دولوں قلب محفعل يراستدر كلي طور يرانحصار ركھتے ہيں كرأن كے تغير إست ير ﴾ من أوقت غوركزنا ببتر ہوكا مبكرنعل فلب كى غيرطبعي ماليوں عصر بحث ہوگى۔ بيال ا ى قدر بان كردبناكا في جه كطبعي طورية قلب اكي منت من نفزية موتر بالانظم كمري ضرب لگا ناہیے، جس میں بچانش اور انٹی تھے درمیان انتظافات ہوتے ہیں۔ میٹمہ نف کیری کی موج ، مدرم القلب (impulse of the heart) سے نسبت مقدم ومد کے بعد مسکوں ہوتی ہے۔ اور کا اگرکسی وج سے تبلین کے انتہا ضامت اور الی تے معراموں کی را ہ سے کوئی نون نارج مذکری تونبض کی ضربات کبلین کے انتنامیا ك نسبت العدادي كم بوجاتي بي ـ

> نبعثان (pulsation) ى مقدارا ورزق باضغطانبض (pulse pressure تعيبن كاطريقه بهيص كمرشركيان بر

المحلى كا دما وُمِرْمِها تحدِها بُينِ مَنْكُ مُ اتم نبضان مسكس جو-آخالذكر منعطالنبض كانماكت وسهد

نبض سريع (pulsus celer)

مِن به دما توبر مرمت نموما البع جا ما

بے (الا منط بوراً ورطی با زرو = aortic regurgitation) - نبض بطی pulsus) (tardus ميں بيتا خيرك ساتھ نموياب ہوتا ہد (ملاحظ موضيت الاورطلي eortic عtenosis) - ضغط النبض ترمان كى جمامت كرماتح النون كى اس مقدار كرساته جو ہر ضرب تلب کے ماند تربان کے اندر بھیجی جاتی ہے اور اس سرعت کے ماتھ كمس سع قلب فون كوا ورطي ك اندرداخل كرتا جه، اخلاف ندير بونا جه -جب ضغط النبض قابل الميان ب**وتونبض ك**وبعض ا وقاست مُمَّتلي (full) ^{بم} كبه (large) بِإِنْمَشْرِفِ (bounding) كِيت بي - جب صُغط النبض كم درجه كا بوتونبغر كوهيغ

(small) کمتے ہیں۔

1

شك ١٢ لف لبعي زم من - دباؤ ٢ ادس - ب يفر

كى صلىنىش .

منسولی فی دبوار - اگرنبض کو ایکی کدد با وست روکا جائے اور ون سے فالی کرد با جائے اور است کے طور پرمکس فالی کرد با جائے نو است بھالت کے ایک جدا گانہ را خت کے طور پرمکس موالی ہونا جا سے دین اگرو تریا فی تصلیب (arterio-sclerosis) کی وجہ سے دبیز با استواد ہوکئی سے تو آب سے تو آب سے اور اگراس بی انہا درجری تحلیس ہوگئی ہے تورک کی لمبانی پرانگی اور اور نیچے بھیرنے سے کسی جاؤگی نا ہموار یا محسوں ہوگئی ہے تورک کی لمبانی پرانگی اور اور نیچے بھیرنے سے کسی جاؤگی نا ہموار یا محسوں

الرميد اموراك تربيت يا فية

لمبيب كى الحلى سعدايك خاص عديك ننانست بوسكة بي، تا جم زياده دقيقي ميلا

مف آلات کے وربیہ سے ململوم ہو کسکتے من مبنس سفیفن گار (sphygmograph)

اوفرنغ النغيثي (sphygmomanometer)

کا استعال عام ہے۔ مبضی گار (sphygmograph)۔

اِس آومی آیک مکی کمانی کعبری تشعریان کو وہاتی ہے، اور ٹریانی ولیار کی موکت کیک ہیرم کو متعل ہو ماتی ہے!ور اِس بی ایک

باریک نوک سکی دوئی بوتی ہے ، موتلیر المنة

به ایک گری کا (magnified) مرکات کی ترکسیم ایک میاه کا فذیر کردی ہے 'جوایک گری کل (magnified) کے درید افغا حکت کرتا رہتا ہے ۔ بہت را ان پر کمسانی کا نسخط (clockwork) جمعیح انداج ماصل کرنے کے لئے ذوری ہے ہمالت کے ساتھ منتقب ہوتا ہے' اور بہترین آلات وہ بی جاستہال کردہ نسخط کی مقد الرک تسمیل اونسول (ounces) میں کرتے ہیں۔

f

شکل ۱۴ اُنف فرشینی نمبغن تپ می - تمیش ۲ ۱۰۲۰ اُ - ب - بیش فرشینی نمبن شب می (تب محرقه) - تمیش ۱۰۴۰ - تواترا ورنظ (regularity) کے ملاوہ 'جونی الفور محتوں کے جا سکتہ ہیں '

زر داج کے دور بے حصور سیات ہی ہی ہی بن کے لئے خاص مطالعہ کی ضرورت بہتے۔

نعن تریانی کی ہر ضرب کی ترسیم میں (ملا خط موسکل ۱۱) ایک وصاعد (mpstroke) نعن تریانی ہو تا ہے ! ورا کہنے نازل (downstroke) '

زقاہے ' جو غیر منقطع اور تقریباً انتصابی ہوتا ہے ! ورا کہنے نازل (interrupted) ہوتا ہے جبکہ درمیان نشیب مائل ہوتے ہیں ۔

درمیان نشیب مائل ہوتے ہیں ۔

جزوناذل (downstroke) كفر برك ارتفاعات مي سب سعارياده متنقل ض بتدي موج (dicrotic wave) به (تشكل ۱۱ الف ج شكل ۱۱ الف ج شكل ۱۵ الف ج) يه بيشة نبضول مي موج د اوتي ب يب بنهايت نمايال بو، جيس كشكل ۱۱ ابن ، نواس موج كوانتكي مسوس كرسكتي ب، مس كا يتو يه بولمه كم بيس كشكل ۱۱ مناعف (reduplicated) معلوم بوتي سه، حوام نها و" ذو فيرتين"

ا دیدارته ات ماری کی مفی گارے لئے گئے تھے۔ ایک لمبا اور رہے بروما مدیکی کا طرف اس جرے خیدہ ہے کہ مو گی ایک لمیدیم کے مرے برنگی ہوئی ہے، بواکی اسیع نصاب (fulcrum) پر کام کر کہ ہے، جس کا تحور کا نذکی حرکت کے خط سے وضی رخ میں ہے۔

7

('dicrotie') نبض ہے۔ یہ ایک موج کے اِعث ہے ' بومدود اُور کی معارفل سے اور اُور کی دیواروں سے معکوس ہوتی ہے۔ اِس سے بین پہلے ایم نشیب ہوتا ہے ' بس سے بین پہلے ایم نشیب ہوتا ہے ' بس کا نام ض بتدینی کمٹا و (dicrotic notch) ہے ' بو بطینی اِ کماش (ventricular systole) ہوتا ہے ' اور اُور کی معاول کی مدودی کا نمائندہ ہے۔ اِس طرح ' موج القرع (percussion wave) کے ' فاز اور نشینی کا نمائندہ ہے۔ اِس طرح ' موج القرع (percussion wave) کے بیند سے کے درمیان کا فاصل ' (نکما شی عرصم کمن اُور فرائندی کا فرائندی کا فرائندی کے جب ضربتینی کا و قاعدی خط کے بہنچ ما تا ہے اس من شینی کا و قاعدی خط کے بہنچ ما تا ہے (systolic period) کہنا تی ہے بین اوقا (fully dicrotic) کہنا تی ہے بین اوقا

وہ قا **مدی خط سے نیچے** واقع ہوتا ہے' اور میر نبض بیسترض نتلینی

(hyperdicrotic) كلاثن م

(شکل ۱۳ س)- اس صورت می دو سری فرب کی موج القرع فرتینی موج کے تما مرز گذر طبنے

سریی وی سام معرف است سے پہلے آئی معلوم ہوتی ہے' اور مکن ہے کہ فی الحقیقت یہ اقعہ

ضرابت کی برمی ہوئی *مرحت کے* باحث ہو۔ خسر بتلینسیت

شکاح ا الف ما دم ض برائٹ د دباؤم اونس ۔ ب ۔ ما دم ض برائٹ ' ہ ہفتے کی مست ۔ دباؤے ؛ اونس ۔ ج ۔ مزمن مرض برائٹ ۔ دباؤہ اونس ۔

محمیمی موج القرع کے بعد ایک یا دونمغیف سے تموجات دیکھ جائے ہیں (شکل ۱۵ الف ۷)۔ یہ صرفِ لمنة تناؤ والی نبضوں کے ارتسامات میں واقع سے

ا ورلمندترين نقطه كدرميان بوناسه .

ہوتے ہیں۔
صغط النفس بیما (sphygmomanometer)۔ بالائی بازو کے کرد
رُبر کی ایک چڑی جیئی تعمیلی بیبیٹ دی جاتی ہے، بوکسی فیروسعت پُدیر ما دہ سے دُمکی
ہوئی ہوتی ہے، اور جس میں ایک انحاقی ربر کی کی کارہ سے ایک ربر کے کوسلے اور
مصارع کے فردی ہواندرسے بحری جاسکتی ہے۔ اِس تعمیل سے تعلیفہ والی ایک فی مری کی
ایک ضغط پیا (manometer) سے جڑدی جاتی ہے، اور ربر کی تعمیلی کے اندر کا
ضغط سیما بی لی میرول میں نا یا جاتا ہے۔ بازو بند کے اندر ہوا بیب کی جاتی ہے

یہ نتک کہ اس کا دبا کو کا ای کی نبغی کوروکے کے لئے کا فی سے زائد ہوجائے۔ بھر ہواکو بندر بچ باہر بھلے دیا جا آب ہے ، بہر ہواکو بندر بچ باہر بھلے دیا جا آب ہے ، بہا نتک کہ دبا و کسٹ کر ایک ایسے نقط پر آجا ہے کہ بہاں بفن ذرا می مسوس ہوتی ہو ۔ بیمانہ (cale) یری وہ عدد جبال پر دو اِسوقت نمایہ بوا ہے ، آنکا شعی ضعفط (systolic pressure) کا نمائنہ ہے ، جسس کی تعیین بدریئہ جس (palpation) ہوئی ہے .

اَوسطانباطی ضغط (diastolic pressure) کی بہترین پیائش استماع (auscultation) کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ اسماع الصدریا سماع السوست (phonendoscope) کی کے خم کے مقام پر عضدی نثریان کے اوپر لگا کی جائے آر بین کو نوبر در بیج کمٹ با آر بین کو فعظ کے ذریعہ بائل معلم س کردیا بائے اور بھراس دبا کو کوبر در بیج کمٹ با جائے تو اواز کی جا رہیتی (phases) علی التر تیب سنائی دی ہیں۔ بہتی ہیئت ایک دسی سی تیک (faint throb) ہے ' بو ابتداز ایسے دبا کو (استماع کے ذریعہ دریا فت کردہ اِ نتماشی ضغط) پرمشا ہرہ میں آتی ہے جو جس سے دریا فت کردہ اِ نتماشی ضغط سے جند لی میٹرزائد ہوتا ہے۔ یہ ایک بلند مختصری فریس تبدیل ہوجاتی ہے ' بو دو سری ہیئت ہے۔ اور بھی کم دبا کو یہ پر میر متنقر بوکر ایک بند تیک ہوجاتی ہو باتی اسلامی ضغط (loud throb) بنجا تی ہے۔ یہ جو تیسری ہیئت ہے۔ اور سط اِ نبیا کمی ضغط (inean) مینجا تی ہے۔ یہ جو تیسری ہیئت ہے۔ اور سط اِ نبیا کمی شخط میں تبدیل (diastolic pressure)

کِل گور (Kilgore) نے سولہ اور میتیس سال کے درمیان عرکے انتخاص پراکیہ کوسیع سلسلہ مشا ہدات کیا ہے۔ اوسط انجمائی ضغط ۱۲۰ ملی میٹر تھا انکی اس کے إوسراورا دصر اکیہ کوسیع جولانی (range) پائی گئی' اور ۲ فیصدی شالول میں ضغط ۵۹ ملی میٹرسے نیچے' اور ۱۳۰ ملی میٹرسے اوپر پایا گیا ۔ انبیاطی ضغطی بیانتو نے اِنستای طریقہ سے ۱۸۰ ملی میٹرکی اوسط قدر (mean value) کل برکی ایکن بہت سے مقروآت (readings) ، داور ۱۹ ملی میٹرکے تھے۔ ۱۰۰سے کم سے دموی ضغط میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کا می صحت موجد در بو' اور موضوعات قلیل الوزن ضغط میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کا می صحت موجد در بو' اور موضوعات قلیل الوزن

ہونے کارجمان رکھتے ہیں (67) - بہاں یہ کہدینا بھی قرین انصاف سیم کہ ضغط النفس پیما کے متعلق اعراضات بیش کے گئے ہیں کہ یہ بہت بلندنتا کج ظامر کرنا ہے (3)-

إسسناع تساكين

أكرسباتى اورزريرتر توى نربان كاإستاع مساع الصدر سعابا منعطكيا مائے تو عموا دوآ وازیں (sounds) منائی دی ہیں ، بینے ایک شی آواز systolic) (sound) جرعرق کے مجیلا وُ (expansion) کی وج سے ہوتی ہے ' اور دو سری انبساطی آوازه (diastolic sound) جو ایصال شده (conducted) اورطی دوری اواز ہوتی ہے لیفن اوقات اِن میں سے پہلی آوازنبیں موجود ہوتی سٹکی اُور طی اور فوزی ترليان يريمي أبير إجماشي آواز منذكرة بالا آواز مبيئ سنائي ديتي بي - وومر ترأين ين بالعموم جبَّدك كرسهاع الصدر عددبا وُن لكايا مبائ كيد صح مُنا في نبين مَّا-. حب مبلم ككسى حقد يا جوارح مي كسى تمريان كا نامكي إنساع saceular) (dılatatıon یا اُنورسما واقع ہوجاتاہے تواکٹراوقات ابک اِنکماشی خمسسرمہ (systolic murmur) منائی ویتی ہے ' اور اس کومنعدها را ورصنوروں fluid) (vein and eddies سے مسوب کیا ما تا ہے ہونون کے دسمند تریان سے ملکر ایک عريض ترفضاء ميعزتا في أنورساني من عباف سعيدا موجانية بن - ج مكه أنورسما أكثر ا ورطی کے قاعدہ اور دلوار کے تعلق می تبخاتے ہی المجفلب کی قریبی مجا ورست (close proximity) مِن الوست إلى المدار على المدار المارة الم (close proximity) (area مِن فريرات بيداكرون ، وأن فريرات سي ، وقلب يح دمنون مي سيدا ہوماتے ہیں بمشکل ثنافت ہوسکتے ہیں۔

نبض وربدي

(venous pulse)

جسم کی بڑی وریدول می کسیقدر بیضان مونا ایک طبعی (normal)

منارب اوربعض الكل تندرست دوران نون والدا شخاص كى برونى اور اندرونى دونول وداجى وربدول من اكيت توجى (undulating) يا ايض (pulsatile) كرت دونول وداجى وربدول من اكيت توجى (undulating) يا ايض (pulsatile) كرت ويكي ماسكتى ہے ليكن عمواً به مفقود الوقى ہے يا نما يال نہيں ہونی و سا دو معائد ست بغض كفرى الم تعلق شاندت بغض كفرى الم تعلق شاندت كركات كا اكم تعلق شاندت كريا اكر مشكل ہوتا ہے - برونى وداجى وربدترقوى لدى سے مين اور دكتي جاسكتى ہے اور اس كے حركات تربانى حركات سے إس تصوص ميں اختلاف ركھتے ہيں كه ان كا اور اس كے حركات تربانى حركات سے إس تصوص ميں اختلاف ركھتے ہيں كه ان كا اور اس كے حركات تربانى حركات سے اس تصوص ميں اختلاف ركھتے ہيں كه ان كا بسية زياده يسلاؤ (collapse) نسبة زياده يسلاؤ (collapse) نسبة زياده يسلاؤ (rises) تعربی تربان كا در اور ان كا جبوط (collapse) نسبة زياده اور ان كا جبوط (rises) نسبة زياده الم ان اور كوبري تربان كي ارتفاعات (rises) كي استان الم اور كوبري تربان كا جبوط (rises)

اندرونی وداجی وریدگردن که اطراف پر جبای کهزاویه اور قصی طمی مضل که درمیان ایک برسی نموی وریدگردن که اطراف پر جبای که درمیان ایک برسی نموی می منست اور آباد نسبتهٔ زیاده مربع بوتای به اس حرکت کوسباتی شربان کمه نبضان سے خلط ملط نبس کردنا چاہیے۔

ANT, vi in it is in it is it is in it i

کری کری کری کری کری کری کری (polygraphic curve) جو فعلیاتی ور یکی نظر کارئی منی (ور در الی ترسیم مین طاه کرتا ہے ' جو گردن کی وریدوں سے بیمن کی تین موجیس اوپر والی ترسیم کعبری شریان سے لی ہوئی ہے کی بطین کے مراکا کا کی ہے۔ نیمچ والی ترسیم کعبری شریان سے لی ہوئی ہے کی بطین کے مراکا کا وقت کے ساتھ دو موجیس 'ج اور وہیں ۔ ہر دوریں ج سے پیمٹ اور بھا کا وقت ایک پنی اِنگاشی (pre-systolie) ' موج ' کو ' نظر آتی ہے' جو اُ ذینی

اِنكائش كانتيم موتى عدد (T. Lewis)-

سے بیچیے کی طرف ایسال ہو اے۔ میں مندن کے کی سیدہ

وریدی نبس کی ایک اہم رسم وہ ہے میں موج البخر موجود ہوتی اور مرف ج اور و امواج واقع ہوتے ہیں (فاظ برشل مام سفر 243)۔ موج ال فرموجود گی سے پرستنط کیا جا بات کہ اُذین طبع طور پرست میں ہور اسے اور اس واسط متدرب امواج معنی بیستنط کیا جا بات کہ اُدین طبع طور پرست میں ہورا جی ترک مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب میں ہور ام اج ہیں۔

تمستماع أورده

اکرمساع العدد کونها بت عدیم الدم (anæmic) اشخاص مین اور تندرست بوس مین و واجی ورید کے حصد زیر پر اس نقط پر کھا مائے کہ جمال قصی علی ضاری قتی بیر برکان و العد (sternal attachments) اس کی ترقوی جسب پرگیوں (clavicular چید پرگیاں (sternal attachments) اس کی ترقوی جسب پرگیوں (humming) یا معرف الموان و ایک نسل مجنب المست وار (humming) یا و ایک نسل مجنب المست وار (rushing noise) یا حدو خون روف از (diable) کہتے ہیں (وایا بل "diable" ایک فرانسی یا حدو خون روف میں اواز کلتی ہے الی فرانسی کا منان کیا مار المست اللی وضع بن میں مواند کھا تا ہے اس میں بات سے میں کا امتحان کیا مار المست اللہ واجو ہو۔

فعل قلب كي غير عي التي

(ABNORMALITIES OF CARDIAC ACTION)

فهب قلب كے لمبی ميكانيه بر پيد فور او جيا ہے ۔ يه دريا فت كرنے كے لئے كه

اس مبكانيد مي كوئى غيرطبى مالت موجود بيديا نهيس ادراكر بي تووه كيا به رطب يمرأ دوم منافع و ملبي مواقع ومنافع ومنا

بیلے طریقہ بین ایک کتر نگار (polygraph) کے ذریعہ سے وداجی نبغی اورایک تربی افرایک تربی اورایک تربی اورایک تربی اور بین افتیان الله است کی موجودگی و فیرموجودگی و اور بین افتیان المان کے درمیان مال ہونے والے وقت کی لمبانی کے درمیان مال ہونے والے وقت کی لمبانی کے درمیان مال ہونے والے وقت کی لمبانی

ظاہر کرتے ہیں اور اگریہ وقست اسیکنڈ سے زائد موتو کرنگ قلی مسدودی -partial heart

(block موجود ہے۔ دومرا لحریقہ بزراعہ اک

برقی قلسب نگار -electro)

cardiograph) کے دیا ت

ایک مشاکس متنا کمیسی برق پیما

(galvanometer) براج،

ہرضرب کے ماتھ تعلب سے بیدا ہونے والی برفی رووں کا اندراج وراتی - روسی آور سیلی آوار سیلی آوار


شکل ما- وداجی وریدا وربرتی ملب گاری ترسیم کافاکه ا اورایک نرب ملب عیمتنافرا صواست ملب.

م المركار الشد حركت كرام العبر أور أس كى جواست (excursion) الكيب دورمين كر ذريعه سع تكبرمال كرك أبب مدينكار معنديا أيك كاعذ تكبيل (projection) بوتى بعديديا رقی قلب کارش (electro-cardiogram) بون سے ۔ ایک مدیب قلب سے منا فرتیم كا خاكشك دا من دكملا باكباب د وداجى ترسيم مى دكملانى كئى بيدا اوراصوات قلب كى تعریب مائے وقوع می - برنی قلب محارش بی ایک موج اسی ہے ہو ا ذینی انتباض سے مناظرا ورأس ميك يقدر بيله واقع بوتي ها ورأسه عموا رف ن (P) سيطا بركيا مانا ہے۔ اس کے بعد ایک نظیب ق (Q) ایک وکدار ارتفاع ل (R) ایک الک الکا فی نشیب م (S) اور ایک تدریمی ارتفاع ن (T) بوتا ہے ۔ ق ل م ن (QRST) کی پیمیدی*تک نبطینیانن*باض سے تناظر ہوتی ہے ا*ور اُس کے مین سامنے شرکوع* ہوتی <u>س</u>ہے۔ مياكه وداميم فن (jugular pulse) كى مالت ين بوتا ها اكي برقى قلب محارش أكن تعلقات كوطا بركرتي ب جوا ذين انتباضات بطيني انتباضات كما تمرر كمن بي نيه: أُس عرمند وقت كوجو إن ك درميان ما كام قاليعة ف ل (P-R) فاصله يمكن علا إُورِّين اِ مِنْ کَلِمِینِ طلائمیہ (ventricular complex) کی تعل سے بعض استنبالگا بھی کینے ما سے کتے ہیں -اس میں اُسوقت ترمیم یا فی مباتی سے حکدا ذیبی بطینی ناٹدل کی بعض شاخیرم بدوم (blocked) بوما أي (branch-bundle block) (ما حظه بوتسكل من أبي بب أيك بليني انقباض أُ ذيني تبطيني كرُّ (an iculo ventricular node) سيحسب مريقية معمولي نبمُل معنيعية أف كرباك فلب يركسي في معول مجر سعيدا بوف لك - (نيز لا خطه بو قلب كي مِش روزگی .hypertrophy of the heart)- پرتقوید ا اور م س ن (T) موج كامتوارًا ربياس (inversion) بس سيخ ي مي الكينسيد مدار مومايات يدم من كوانشين كدمال كا مِنْ بِرِهِ إِبِو الوركَ مِنْ مِنْ مُنْ أَرْ يَجُ السَّحَ أَرْ (digitalisation) كَي فَيْرِو وَبُرَّي من صفارة قلب كامر ص (myocardial disease) فلا بركرتاسهد (4) - قدرتي طورير رونون طريقول مي ايك معیم وقت شار (time-marker) استعمال کیا ما تا ہے' اکد مخلف مقرر کے معیر آنی تعلقات فابر ابومائي -

کثیر نگاری طریقہ کے فوائد یہ ہیں کہ اِس میں آلات قابل نقل وحل اور سامد ہوتے ہیں۔ اِس کے برعکس یہ ہے کہ تعبیل اوقات کسی ترسیم کا ماصل کرنا اگر نا مکن نہیں تو

نهایت سل ضرور بوما آسه اور گونتائج آمام علی اغراض کے لئے عمواً کا فی ہوتے بی آائم است وہ نفسیلات نہیں عال ہوتے جربر قی طریقے سے حال ہوسکتے ہیں - برقی قلب کا دلا طریقہ بیں ہوتے ہیں - اس کے طریقہ بیں ہوتے ہیں - اس کے بیکس یہ ہو کہ جب و ترشنی بخش طور پرکام کرتے ہیں تو تائج ہمیشہ نہایت آسانی سکے ساتھ بگل ہوسکتے ہیں اور مریض کو کوئی تحلیف نہیں ہوتی ، بلکہ ضرورت ہوتو و مسی دو سرے مکان میں بہتر پرلیٹا دہ سکتا ہے ۔

ين النهي كرلينا جائية كرية وتحت طلب طريف اب قلب كي معمولي بيقاعد كيول



شكل ۱۰- بأي بندل كى نشانوں كى مدودى . ق ل م (QRS) وقف ورا يه اور ل اور م كنا كو داري - اس قسم كى ترسيم مباا وقات اور طى من يا مرض مضاية للب محدم او لتى جه - (برقى قلب تكاريشان جه ـ ايم - ا ي كيمبل كى لى هوتى هابى) ـ .

جَوفی بیقاعب کی

(sinus irregularity)

> تفلیم مدودی اوراً پرمٹوس کاعلاً تمییہ معرب کا اوراً پرمٹوس کاعلاً تمییہ

فلبی مسدودی (heart block) کی وجداً ذین بطینی گره -auriculo) کی وجداً ذین بطینی گره -weutricular mode و ذینی بطینی بندل ایا آس کی شانحل میں سے کسی سناح کی قوت نے مصال میں کی آجا نا ہے۔ وہ حاد امام ساری المخصوص رو اللہ میں کمی آجا نا ہے۔ وہ حاد امام ساری کا المخصوص رو اللہ میں کمی آجا نا ہے۔

ور المسلم المسل

بعلی جیز جو واقع ہوتی ہے ف ۔ ل (P-R) فا الد کا نعنیت کور پر بڑھ ما ناہے (جلی مالت بین ۱۱ و۔ ۔ ۱۱ و بسیکنڈیا تا نیے کے برا بر ہوتا ہے) ۔ لو ۔ ج فاصلا ۲ و . میکنڈسے زائد ہوتا ہے ۔ یہ صرف کبی اتفاق ہی ہے سربر یا تی امتحان سے سنا انت کے تحت وسی کی شناخت ہوتی ہو ۔ جسی مالات کے تحت وسی کی شناخت ہوتی ہو ۔ جسی مالات کے تحت وسیلی مساع العمدر ہے اُذینی انقباض نہیں سنا جا انتحا ' جس کی وج مالباً یہ ہے کہ وہ بعلینی انقباض کے استعدر قریب واقع ہوتا ہے کہ آخوالذکہ کا شوراً سے ڈباکر بائل پر صوب ساتا یہ ہو کہ انتخاب کو درمیان کا فاصلا نسبنڈ زیادہ ہوجاتا ہے تو اُذین کی آوازجلا گائی سنی جا سنی جا سنی مالئوں میں راس (apex) کو سفتہ وقت مکن ہے کہ ایک دو ہری بیلی آواز سے اُن ایس انتخاب و اُن ایک موجود کی انتخاب و اس کی انتخاب کے درمیان کا فاصلا اور می زیادہ و ایس کی انتخاب کی انتخاب کو ایک دو ہری در بری دو ہری دو ہری

(intermittent character) ظاہر رکھی۔ اِس سے بی زیا دو ترقی یا نہ اصابتوں میں اوری کے است اسکتی ہے جے ۱-۱ یا ۳-۱ تلبی مدودی کہتے ہیں، جس میں اُلاین کی موس مودی کہتے ہیں، جس میں اُلاین کی موس مرده مری یا تیسری نسر ہی ایک مجلینی اُنقباض کی تحریب پیدا کردیتے میں کا رکم رہائی ہے۔

رمدا ہے۔ ابتک ہمنے صرف اُسی فلبی سدودی پرخورکیا ہے جس میں اُ ذینی اور فطینی انقبا کے درمیان کا فاصلہ بڑھ جا آ ہے ؟ یا جس میں بعض آ ذینی استباضات منا ظریطبین انقباضا کی تحریب نہیں پیدا کرتے۔ بیسب بُحز کی قلبی صدودی کی مالتیں ہیں ۔ کا ل قلبی سدودی میں اُ ذینی انقباضات میں کوئی انقباض جی کہیں کہ با عل نہیں بہنچ سکتا۔ خوش سمتی سے اِلٰ مالات کے تحت کیلین اچنے آپ ضرب لگانا تروع کردیتا ہے ایکن اس کا ابسانیقی


نسکل ۱۹- ایک ۱-۱ قبی مدودی کی مالت سے لیا ہواکیر تکاری سفن۔
بالائی ترسیم کردن کی وریدوں سے ب اور زیرن ترسیم رڈیئیل سیسے
گفبی نم پان سے - ہر کھبری ندیب کے ساتھ ایک اِنکماشی ارتفاع ہے جہ
منحن میں باقاعد خاصلوں پر، او نشان والی دومری اور موجیں می موجود
ہیں جوا ذینی اِنکماش کی وجہ سے واقع ہوگئی ہیں - اُذین بلین کی نسبت،
دو کو نہ شرع سے شغین ہور ہا ہے - (براتباع لیکس: Lewin سامب) -

توازن نهایت سند اور عموهٔ فی منط چالیس سے تیجے ہو الجد برقی قلب کا این اُن اُنی انتہا نسات کا ایک دورایا قاعد الله اور بلینی انقبانها ت کا ایک دورایا قاعد الله المرکنی ہے ایکن یہ دونوں ملیلہ ایک دورے سے باعل مفتری بوتے ہیں۔ بهذالیں مالت میں ایک فی منط چالیس سے کم والی منظم نبش کال قبی مسدودی پر دلالت کرتی ہے اگرم بدیتلادیا ضروری ہے کہ فی منٹ بینیسی تا چالیس کی شرح نبش والی مالتیں ہے کہ فی منٹ بینیسی تا چالیس کی شرح نبش والی مالتیں

اليي هي لمتي بي ، جن مي توازن طبعي بنوياسه ليكن ايك دور ، ي إ مارت مجي سهي تحسيسه ابتداء عميالآبن (Galabin) في مصف أبي بيان كيا ، اور وكائيز بمسيّال Guy's) (Hospital كَنَ أَسَى مَالَ كَي رِيورُول مِن شَائِع كَي كُنْ -بديبِي رَا مُعَنِي كَ انسان مِن أُونِي ا ورُبِطِيني توازنات (rhythms) كاكال افتراق (dissociation) بوسكما جداس مريض بن ترج نبض في منت بين اور مي كدرميان تمي اور آس ف بدريعد إستاع أذني انعتاضات في المقيقت كين و وكهتا حداد" بهال بم ايك ايها قلب مات بي كمب كا اُ ذین ، بُطین کے اِکماش سے ذراہی پیلے منتقب عن نہیں ہوتا الککہ روبطینی نبضات auricular) (pulsations کے درمیانی وقف مرکعبی دوبار اورکبھی ایک طویل و قف (pause) کے دوران میں ایک ہی ہا رمنقبض ہواً ٰ۔ایک اور اِ مارت ہے جس کا انحصار اس واقعہ پر مِوْمَاهِ بِهِ كُورُ وَمِنِي نَدْرِ بِصُنَى مِاسَمَتَى هِنِهِ اور إس رِيكَ وه دُوربيمي مِمْلَفُ نُقطول مِر واقع مِقْل رمتی ب منالاً مكن ب كركس وقدت اكب بطا برمتضا مف (reduplicated) دوسرى آ وا زموجود ہوئ دورسے وقت ایک متضاعف پہلی آ وا زیلہ ' اورکسی اور وقت بہلی آ وا منعتبض ہوں ۔ اس آخری ما است میں عکن ہے کے گردن کی وربیعال میں ایک ناگھانی بڑی موج ہم زبان طور پرنظر آئے۔ یہ اِس مقیقت کی وجسے ہے کہ اُنین انقبا مات نون کو آ مے ومكر كوليس أندنه بن إياسكة اسوفت جبكه و منقبض بورا دو - إسى واسطه أ ذين مي سعت نون پیمیے کی طرف دسکیلہ مانے کا رجمان رکھتاہیے۔

ایگرنسطوس کا علامید (Adams-Stokes syndrome) بخاشایوی اردان (Adams-Stokes) بخاشایوی (V. Stokes) نوشایه اردان (R. Adams) به به بوشی (W. Stokes) به به بوشی یا شنها میا که فیرسمولی طور پرسست نبین والے مریف غشیان (syncope) به به بوشی یا شنها میا که فیرس می متلا بوسکته بین و است فوکس نے تو بیها نتک مشایده کیا که گردن کی ورید نیم کوبری کے معلول میں مبتلا بوسکته بین و ارد تیزی کے ساتھ ضرب نگا دہی ہیں ۔ اور ان استدائی استدائی استدائی است مریف اصاب و اور ان ایستان (Spens) بندل مریف بوا بوگا - انجینس (Spens) نے ایسا ہی ایک سرمین رکھا (Lea) ایستان و کیا (Lea) ا

یمات راغی عدم دمویت (cerebral anæmia) کے اِمت ہوتی ہے ہو قلبی مسدودی کے بیب سے دوران خون کا ناگهانی نظر (sudden failure) ہوجانے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ آگر چقلبی مسدودی مام ہے تا ہم یا علمیس (ayndrome) مادولی میں واقع ہوتا ہے جوقلبی مسدودی کے زیادہ شدیم نا درالوقوع ہے۔ یہ اُن بوڑھے لوگوں ہیں واقع ہوتا ہے جوقلبی مسدودی کے زیادہ شدیم درجول میں یا کا مل مسدودی قلب ہیں جتلا ہوتے ہیں کی بھین دفعت نہایت سے دفقاری فریب نگانے نگتا ہے کا انجھ عرصہ کے لئے بائک رک جاتا ہے۔ علامات کا انحصار اس مدت پر ہوتا ہے کہ حسس کے دوران خون ناکانی رہتا ہے۔ ایک بوڑھے معمل کا مشاہدہ مدت پر ہوتا ہے کہ حسس کے دوران خون ناکانی رہتا ہے۔ ایک بوڑھے معمل کا مشاہدہ



شمل ۲۰ کا ل قلبی سدون کی برقی قلب نگارش ۔ اُ ذین اوربطین کے توازنات مفتر ق (dissociated) ہیں اوراب بطین اُ ذین کی جمیدیت نہیں ظاہر کرا بطینی اُکماش ل (R) اوران (T) غیروضعیت بدا کرتا ہے ۔ اُ ذینی اِنکماشات ن (P) حرکات پیا کردیتے ہیں ، جو ترسیم میں یکمان فرر پھیلے ہوئے ہیں ، اورکطینی حرکات سے کوئی متعل تعلق نہیں کھتے۔ اورودان کی نبست تقریباً وگئے بار می تے ہیں ۔

(بمأمماع كسيل وبلس ،Russel Wells)

كياكي ، بس مي مردومن كالمبعد چاليس كالله كالب كى كال مدودى موجاتى تى -منانچه إس امركاكم علامات مسيكس طرع ترتى كرته بي بار باردان بده كزي موقع تعا (5) -

ب محد بند بومانے یر فی الفورشوب (pallur) اورساتدی صیف کبودی لما ری جواتی۔ رویاتین سیکنڈ کے بعد آس نے بولنا موتوف کردیا اور ایک آہ (groan) کے ماتھ جیکے چکواکرگرگیا . یا بخ سے سات گین سمے اندر بے ہوشی لها ری ہوگئی . بچرند تعن طا ت سمے انقبان سه دروار من مع برارادی ترات دیکے گئے۔سانس بندر سے زما وہ گری اور زواد تشغبی(convulsive) مِوَّتُیُ اوْرَنفس کے معین عضلات مِی کا م رُنف کی ۔ تقریباً میں مکینڈ میں وہ چالیس فی منٹ کی تمرح سے اور نہایت گہری سانس لے رہا تھا تنعنس اسس الم نینے (panting) سے مشابہ کما ہورنے سخت تربع ضلی ممنت کے بعد دکھیا جاتا ہے۔ وم کبود اور تناحب يزاكياتما - قرنيدا ورروشني كيمعكوسات (corneal and light reflexes) مِوقوف بوگئے تھے ۔جب قلب بھر جاری ہوا تو پہلے دویاتین نہ بات کے بعد مرم موج مرخ رَبِّك معيم المما يسيندا وردمى افراز كنزت كرما ته موا اورلتمات (conjunctiva) متلی (congested) موگف به میراُس کی شکل و بیئت به مرعت از مرفوطبعی مالت م**یآگئی** به إ بندار ينبي مسدودي كي الهميت مختلف مالتول يرمنح مربوتي ج يفلتي قلبي مدودى جوكه ابتدائ عمريس الطاء نبض كاموجب اوتى بدا ورجس كعدما تعربا اوقات خلقی مرض قلب ہو ما ہے اورجو المیم اسٹوکس کے حطے واقع کرتی ہے 'بالعموم مجین میں ہی موت واقع كردتي ہے ۔سب سے معرمریض میں كا زندہ رہنا معلوم ہے اسنتیل سال كاہے . أن مارضي مالتول مير ، جوروما ترم جيبيدراري امراض كحدما تحد متلازم بوتي بي اس مح يه معن بوست بي كمفداد اللب واضح طورير ما وف بوكيا ب الومالية شفايا بي واقع بوما أيكى -اسى والسطه آلام اوراحتيا ط ضروري بينستقل صابتول مي فلبي مسدو دي عمو أبزات خو م بهلك بين بوكى الروه إس مدك المم بوتى الله كراس سے مينيت بموع مفاد قلب ك تنارستى (healthiness) كا يتملِتا في - الرا ذي بطيني بندل من كوئي ندر موجود ميقو مكن بك كعضل كرمار على وعض من ميليد بوئ فرا ت موجد بول المذاعضا والس ك انخطاط كى شهادت كاش كرفي ما منه اورمكن بدكرين الماسك (heart-failure) كاسب بور بب دور ميول و اندارزيا ده تشويشناك بومانا به كيوكه كان ميكم يددورس كائ فود ملك بوماس . علاج متلبی سدودی کی اصابتوں میں ملاج قلب کی عام مالت کے لیے ہونا

چاہتے۔ اِس وف ہے کہ مبا وا فریم الس قبی سدودی کا درجدا ور بڑھا دیگا ، اس کے اتعالی سے اجتمال کرنے کی کوئی وجہ نہیں ، بشر طبیکہ وہ اُ ذیبا و فیرو کے کہ کہ نے کے لئے دوسری طبی فروری بھی جا جا بات یعنی اشخاص ، جغیر قبی مسدودی کی شکایت تھی ، محنت و مشخدت نے فروری بھی ابنا ہے کہ ن میشر مالتول ہی مسدودی کی شکایت تھی ، محنت ہے اجتمال کرنا چاہئے۔ وورول کی مقداروں کی کا میاب تا ہت ہوا ہے ، کیوکہ وہ بطینی شرح کو بڑھا دیتا اور قریبایسال (conduction) کو زرو کہ کو کر اور اور اور قات دیا جا تا ہے ۔ ایشروین (extropine) ہے کہ اور اور قات دیا جا تا ہے ۔ ایشروین (extropine) ہے کہ اور اس سے اس اس میں جند کھنٹول تک آمیم میں بارہ اور آبیر کو را آمد کا مسامل کرنا نہا ہت ایم ہے۔ ایک دین میں جند کھنٹول تک آمیم میں مانس میں لیسند سے کمل مسدودی قلب قائم ہوکر ا ٹرم مئوکس مطروق فس ہوگئے ۔ نیز بریم کو را نسینہ کمل مسدودی قلب قائم ہوکر ا ٹرم مئوکس مطروق فس ہوگئے ۔ نیز بریم کو را نسینہ کمل مسدودی قلب قائم ہوکر ا ٹرم مئوکس مطروق فس ہوگئے ۔ نیز بریم کو را نسینہ کمل مسدودی قلب قائم ہوکر ا ٹرم مئوکس مطروق فس ہوگئے ۔ نیز بریم کو را نسینہ کمانی دریک کے دین میں مرتبہ ، مطر بند کرنے کے لئے کا میا بی کے ساتھ دیا گئے ۔ وہ فی اور بنی مسدودی (ephidrine) ہوگئی وہ میں مرتبہ ، مطروق کی خارک دوران میں بریدا ، وہ ای اور اس سے ۔ ربعنی اور قات ایک مادؤی بخار سے دوران میں بریدا ، وہ اتی اور اور میں میں اور اس ہے۔ ربعنی اورات ایک مادؤی بخار سے دوران میں بریدا ، وہ اتی اور اور وہ کا دوروری مالت ہے۔ ربعنی اورات ایک مادؤی بخار سے دوران میں بریدا ، وہ اتی ایک مادؤی بخار سے دوران میں بریدا ، وہ اتی اور اور اس

مالت ہے۔ یعن اوقات ایک مادنوی بخار کے دوران میں پیدا ہوجاتی ہے' اوردوری مالت ہے۔ یعن اوقات ایک مادنوی بخار کے دوران میں پیدا ہوجاتی ہے اوردوری مالتوں میں مغیلہ تعلب کے مرض (myocardial disease) کے امالت موجود ہوئے ہیں نیبغ سُست اور فیر ختلے ہوتی ہے 'کیونکہ اذین جونی اُ ذین گرم کی تحریب کی باعل جمیدیت نما ہر نہیں کرتا اور ایک فرب قلب باعل فائب ہوجاتی ہے مکن ہے کہ ایسا متوا ترکئی بار ہوجائے' اور قلب ایک وقت میں کئی سیکنڈ کس فرب نہیں گا آ۔ ایسا متوا ترکئی فرب ہوئی قلب محلال ایک وقت میں کئی سیکنڈ کس فرب نہیں گا آ۔ بی مالت کی نوا میں یا برقی قلب محلال اور نبطین دونوں کا توا ترکم ہوجاتا ہے۔ ایک مریض میں میں اور نہلین دونوں کا توا ترکم ہوجاتا ہے۔ ایک مریض میں میں میں مور ہوگئی ایکن جب نبض سُست ہوئی تو پر نوطاد ہوگئی ایکن جب نبض سُست ہوئی تو پر نوطاد ہوگئی ا


ببش از وقت ضربات میتنزاد انکماشا


(premature beats; extra systoles)

تلبی بے قامد کیوں کی یرضم سب سے زیادہ عام ہے ۔ بر مورتوں کی نسبت موون

یں زیادہ عام ہوتی ہے۔ فالبا البید بہت سے اشغاص ہیں جو ادمیر عمر یا بڑھا ہے کی ویک بہتے ہیں۔ معمولی مزادات کے دوران میں بہتی ہیں۔ معمولی مزادات کے دوران میں بہتی ہیں۔ معمولی مزادات کے دوران میں میں اُن کوکوں ہیں سب سے زیادہ عام پائے جائے ہیں جو مرضِ قلب کے آ فا زطا ہرکہ تے ہوں کی اُن کوکوں ہیں میں میں میں میں نودار ہوجائے ہیں۔ یہموگا اُسوقت موقوف ہوجائے ہیں جبد قلب تیز ہوجائے 'جیساک درزش میں ہونا ہے' اور قلب کے پھرست برجانے ہیں۔ اگر بھر پیدا ہوجائے ہیں۔ اُن بھر پیدا ہوجائے ہیں۔

خفیقات سے طاہر ہو گیا ہے کہ بضرات یا نوا دین میں یا۔ ب گرہ اللہ ماموں کی بیش تو یک مصوں کی بیش تو یک مصوں کی بیش تو یک مصوں کی بیش تو یک بیری (node کے مقام بر ' یا بھین میں پیدا ہوتے ہیں ' جس کی وجہ ان حصوں کی بیش تو یک پیدری (over-excitability) ہے۔ مین ہے یہ ضرب فلٹ کے ایصال کے طبعی لاستہ کے ایک حصد میں پیدا ہوں ' اورا یہ ہو تر تی قلب کار (الاس امریس کریہ اُسوقت سے پہلے کے ذریعہ ایک طبعی ضرب سے تمیز نہیں کے جا سکتے ' الآاس امریس کریہ اُسوقت سے پہلے واقع ہو جاتے ہیں جبکہ اِنسی ہونا چا جائے اور اِسی واسطے فلب کے تواز ن میں اختلال واقع ہو جاتے ہیں جبکہ اِنسی ہونا چا جائے اور اِسی واسطے فلب کے تواز ن میں اختلال میں ہونا ہو جا ہو اِن ضربات کو '' مثا فرالمقام " منا فرالمقام " اس سے بیا ہو جا ہو اور اِس مورست قلب کے ایک اسبے حصے سے ہوں جو طبعی لا وا یصال سے با ہم ہو ' اور اِس مورست قلب کے ایک اسبے حصے سے ہوں جو طبعی لا وا یصال سے با ہم ہو ' اور اِس مورست یا را نوفیر مثابہ الشوین (heterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام (heterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام (deterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام (deterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام (deterotopic) یا نور اِس کو فیر مثابہ الشوین و استواد کی ایک ایک کی ایک کا میں اِن کو فیر مثابہ الشوین (deterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام (deterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام (deterotopic) یا فیر تینا فرالمقیام کی کو میں اُن کو فیر مثابہ الشوی کی دوران کی کو میں ایک کو کی دوران کو کی دوران کو کی دوران کی کو کر بھوں کی کو کی دوران کی دوران کی کو کی دوران کو کی دوران کی دور





مُنعَل ا أَنْعَل مِوسَنزاداً ذيني إِنكَ ش ظا مِركَ في مِ إس وا تعديداً فين شرح من طل نبير اقع من أن يوكواس بقا مدكى من أن معدليات بندا اس كعقازن من الله واقع بومانا بعد وومري فراب سير ميغدر جلدي آتي ہے اميني منكل ٢٠ ين أنى جدر إس سفالم بربوا بعدكب ج فاصل . ب كه دو گفت كسيقدر كم بوكات (ميراتباع ليوس) -

نئل الميكل ممشزاد بليني إكماش طابركرتي جة ا و زينيويد بوتا من تلب كا املي توازن بعدي يعرواقع بوماليه بيب عج فامل ا-ب سے ٹھیک ڈگنا ہونے سے ظاہر رہواہے (بدانیاع کرس Lewis)۔



شكل ٢٣ . ووتنافر المقام (homotopic) متزاد أفيني إكما ثات من من من مرمين اورب - ل فاصطلم عي أن ا وزهيف سي تعويفي وقف (compensatory pause) بي مدين ماكداك بوريقيض مصرايا كباب من كان واكبار نا وباند تعاليبي منز كي ف موسي ميدرمي في ·



فعل ١٣ - دو تعذا لم المقام منزاد إلكما شات بوا دين ي نيج بدا بوتي من اورا يك نوجوان ورسي المستعد بين من من الله على كوفى ننها وسند فنعي تنزاوا كلاش كى ف مور الرس المرس (inverteal) بير ف. ل فاصل طبي بيداورا كم على طررتيونفي قند (compensatory pause) مرجود



شكل ٢٥ - كريبى متزاد إنكاسش (nodal systole) منا فلسر المقام الك بورسطاً يتميروائي (homotopic فللمنطقة) شخص المتعامي شخص المتعام الكي بورسطاً الكي بورسطاً المحمد المعروبائي المواسم المعروبائي المحمد المراقي المائي المحمد المراقي المائي المحمد المراقي المحمد المراقي المحمد المراقي المحمد المراقي المحمد المراقي المحمد المحم

بدستے بیں کہ قلب کی متزاد ضرب قوی ہے یا ضعیف سیعن آیا وہ اُ ور طی معراعوں کو

アントンシント

شکل ۲۱- ایک گئری نفس کی ترسیم وکد (X) تعدمقام برای تبل ازوت درین الم ایک برای تبل ازوت مرب الما برکرتی ہے ، وک خالب بلینی ہے ۔


rinner

شکل ۲۰ متوقف کُعبی بنش کی ترکسیم ، جبکه خبل از وقت ضرب کلائی که پنجید نبیر باتی - غالباً بربطینی ہے -

اً مناکر کیمنون بابرد مسکیلا کے سات کا فی ہے یا نہیں ۔ اول الذکرمالت میں جارآ وا زول کا ایک کردہ سنانی دیگا ، جو لمبعی اصواتِ قلب کے ایک ملاک وسطی ایک دو مرسے سے



قريب يا ئي مائيس گي - مه جيار آوا زس" لي" (lub)" 'ري"اد 'dup' هُمْ "(tum')" يُي " ("ti") كالفاظ (expressions) عداواكي ماسكتي بس -" كبروب" طبعي مسرسيدكي دواً واليون كي مائند كي كرا عديد إس كروه كي تيه ي آواز بين الله متزاد بعليني إنعاض كى آ دانركى " اور" ئى " أورنى مصاعول كى سه ودى كى قائم مقام - به من بيراد إنكماش إِنَّنَا قَوَى نَهُوكُ أُ ورَبُّي مِما يُولَ كُواُ مُعَاسِكُ ولا إِس رُّوهُ كَي جِنْنِي آ وازبيعة في "("ti") غرموجد و في ١٥- ايسي صورت من من أوازون كا أيك كروه أيك ساتح مسنا في ديكا ب" " فرب" " فرم " كما الفائط من طا بركيا جا تاب -اكب نوع شخص مي ستزاد إنكما شات فاعلى البّاب قلب (active carditis)



شكل مع مختلف المفام (heterotopic) متنزاد إنكما شات (م ك) جنبون نے این طین سے بیدا ہوگر ا م تغوید سل میں اور ل تغوید علمیں زیادہ واضح ب) نبض سقوا مي (pulsus trigeminus) يبدأ كروي أكب اليبي المركي من مس ي من قلب كى كوئى تنهادت من فى (ج - ايم - ايم كيا مبيل) .

ُ کا ایما کرنے ہیں ۔ میکن میشر اِلنول میں وہ کوئی اِ نداری مفہوم نہیں رکھتے۔ تاہم دَوری مُرعبّ (paroxysmal tachycardia) كى نبيتة زياده خطراك مالت ان سے كلى مذكك تعلق ركسى بداوراس مالت كالمارى بوجاف كوا مكان كويش نظر كمنا ما بيد إس كانواد و نبوت نبي موجود ب كريد واقع اواجه حب من قلب والمنت عمول من

متزادانكانات بون تو إنداري تخين من ندرات كى نوميت كالحاظ ركعنا جاجعة اورنزاد إكما ثمات كى موجود كى انداركو بترنهين بناسكتى - جب وه بائل تندرست اشخاص يس واقع بون تومريض كو أن كى مدم المهيت كصنعتى الحمينان دلانا ما جدّ ـ

فلب كاكتبرالوقوع فعل

سيعتدالقلب

(tachycardia)

منتف مالات میں قلب اوراسی کے ساتھ بعمول کی نبست زیادہ باربار فرب لگاتی ہے ۔ منت کرنے پر قلب کی رویت لمبئ تواتر (normal frequency) کی نسبت دگئی سے زیادہ ہوجائے گی ایکن منت کی موقو فی کے ساتھ چندہی منٹ میں نبض اپنی لمبئی تمرع پر مجرآ جاتی ہے ۔ عمبی اثرات کے تحت بھی یہ ترع برصرماتی ہے۔ بذبات ہو ما ترکیف والے اسب (vagus) کے فلس کے فعل کی موست فلب کے فعل کی موست فعل ہوا کافی شہور ہے۔ اور عصب تا نبد (vagus) کے فلل سے بمی موت فعل ہدا ہو جا تی ہے ، جیسی کر بعض اوقات الہاب اعصاب متعدد اور مراحل نے یا کھٹا دینے کی موست کی ایک میں افراد ترج فلب کو بالا اردہ براحل نے یا کھٹا دینے کی میں دیکھا جا تا ہے۔ شاذ شالول میں افراد ترج فلب کو بالا اردہ براحات میں اکثر ایک میں اور اور پر نیا در کھنا جا ہے کہ میں اور میں میں اور پر اگر چر یہ یا در کھنا جا ہے کہ تما با واسفہ وارث میں اگر چر یہ یا در کھنا جا ہو اسفہ وارث میں اور بین اور

دوسراسب قلب کی ساخت کا مرض سیان تواه یمضا قلب کا ہویا معراع کا کیونکہ اسی معوست بیں ہروا مد ضرب کی کارناکردگی (inefficiency) کی وجست کا فی دوران حون بہا نہیں کیا جاستا تا وقت کے اندر مذیات کی تعداد زیادہ نہ ہوجائے ۔ اِن تمام اسب کے علاوہ وقت اُن وقت ایسی مالتیں می واقع ہوجاتی ہیں جنمیں فرجت القلب میں ایک دوری مرست واقع ہوجاتی ہے اور جن یواب خورکیا جاسکا ۔ فرجت القلب میں ایک دوری مرست واقع ہوجاتی ہے اور جن یواب خورکیا جاسکا ۔

سأده دُوري سرعت القلب

(simple paroxysmal tachycardia)

ماده دوری مرصت القلب سے وہ حالت مرا دہے میں قلب کی المبی میا اللہ میں اللہ کی المبی میا اللہ کی اللہ کی اللہ می کا خاتمہ ہوکر اس کی بجائے دفعت مربع اور با قامدہ ضربات کا ایک ملسل پر ایوما آ مہے

وفی منٹ ۱۱۰ اور ۲۰۰۰ کے درمیان ہوتے ہیں ۔ یہ فرات ایک نے مرائے ا میت ہوتے ہیں ، یو قلب ہیں پیدا جیجا آہے اور جو بطور خود فرات کا آفاز کتا ہے اجماع کا رماز اس جو قلب ہیں پیدا جیجا آہے اور جو بطور خود فرات کا آفاز کتا ہے ۔ لبذا یہ فرات است (nermal pacemaker) ہوئے ہیں اور انصیں ستزاد آکما اُت کا ایک مبدا اس منا کیا ہے ۔ یہ نیا مراز یا تو (۱) اُزین کے اندہ بوسک ہے ، یعنی جوفی اُزین کو ایک کے قریب اُزین کے مغلی نظام (general musculature) میں اُزین بطینی کر و اس مسلم السمان کے قریب اُزین کے مغلی نظام (general musculature) میں اُزین کو اُزین کے اندر اور اُزین کو با سات کی جو کو اُزین کی جا سات ہیں اُزین جو موات اُزین کو بوت ہیں اُزودہ ہیں کو اُزین کی جا سات ہیں اُزین جو موات اُزین کو ہو اُزین کی جا سات ہیں اُزین جو موات اُزین کو ہو تھے کو اُذین کی جا ساک ایسے رُخ می سیل جلتے ہیں اُزین جو موات اُزین کو ہو تھے کو اُذین کی جا سباک ایسے رُخ می سیل جلتے ہیں اُزی ہو تھے کو اُذین کی جا سباک ایسے رُخ می سیل جلتے ہیں موات اُزین کی جا سباک ایسے رُخ می سیل جلتے ہیں موات ہوتے ہیں اُزودہ ہی کو اُذین کی جا سباک ایسے رُخ می سیل جلتے ہیں میں جو کہ ہوتے ہیں اُزودہ ہی کو اُذین کی جا سباک ایسے رُخ میں میں جا ہوتے ہیں اُزودہ ہی کو اُزین کی جا سباک ایسے رُخ میں ہوت ہیں جا ہوت ہیں اُزین کی جا سباک ایسے رہے میں جا ہوتے ہیں اُزین کی جا سباک ایسے رہے میں ہوت ہیں جا کہ میں ہوتا ہے ۔

یہ مالت ہر عریں واقع ہوتی ہے۔ طبعی انتخاص (normals) یں مجی یہ تقریباً اسینغدر مام ہے جتنی کہ بور مصروما تزمی مریضوں میں اور عضلہ تلسب کے انحطاط (myocardial degeneration) والے مریضوں ہیں ۔

إس مالت كا مميز فاصد به به كداس كا آناز الهانی بوتا به - إس كا حله بندسيكندس كيردومفته كدرميان كى عرصه ك مرى روسكا به - قلب بيزاور باقا مده بوتا به اورمريض كى وفع (posture) سه متا درنيس بوتا - به امراسه مرعت القلب كى دومرى قسمول سه متاز كرفيس مدديتا به اموات قلب مرعت القلب كى دومرى قسمول سه متاز كرفيس مدديتا به الموات قلب بيك أيك أيك (tic-tac) نوعيت كربوت بيل ادراكر كي فريا سن (murmurs) موجد رسم بول تو وه فائب بوجات بي فين فتظم بوتى جهد و دور كا فاتمه اسيقد مدد فعد بوا به جمتناكر إس كاآفاز او زبن بيلي فيرليل فير لمبي لور پرسست بوجاتى بيا فراره مال كرف سه بيليمتناد إنكا ثما

. کل پرکیسے۔

باتی رہے۔ استیان پر ہوتا ہے؛ بیکر آت کے براحتیا طاستان پر ہوتا ہے؛ بیکر آت کے براحتیا طاستان پر ہوتا ہے؛ بیکر آت بردیا فت کرنائی ضروری ہے کہ آیا اسی ہی نوعیت کے دو مرے مطے پہلے بھی ہو ہیکے ہیں۔ بین منبق اوقائندان اصابتوں کی تشخیص تنفو ہوں کا ورجرا می علیہ بھی کردیا گیا ہے۔ نیز ما داتیا ع قلب " ulcer کے طور پر کی گئی ہے اور جرا می علیہ بھی کردیا گیا ہے۔ نیز ما داتیا ع قلب " acute dilatation of the heart") کے طور پر بھی نیوں کیا جی میں بیا ہی میں بیا ہی ہوں کیا ہی ہوں کیا ہی ہوں کیا ہی ہوں کی سے۔ بین میں بیا ہی ہوں کیا ہی ہی ہوں کیا ہی ہوں کیا ہی ہی ہوں کیا ہی ہی ہوں کیا ہی ہوں کیا ہی ہی ہوں کی ہونے کے کی ہونے کر ہونے کی ہونے ک

ا ندار - اندار کے خاص نکات یہیں، - (۱) مضلیقلب کس مذکف الله م ہو، کیو کو مکن ہے مطرخالصتہ مصبی کا کا نتیجہ ہوں اور عضار ظب تندر ست ہو۔ (۲) محول کی شدت اور خاصر خشل القلب کے امارات ۔ نوعم اشخاص میں ایک یا دوسرے متی سبب سے ایک دو انغرادی حمول کا ہوجا ناخیر طام نہیں، اور دیجہ دنہیں ہے۔


جب منسلهٔ قلب تندرست ہو، بالنصوص اُن نوعراِ شنام مِن مِن مِن فِي periodical)
علام عنسلهٔ علب تندرست ہو، بالنصوص اُن نوعراِ شنام میں منتا اور اِن مول

إ سيكنة

Men Mension Minde Manumund Men In Ja

شعل ۳۰ و وری مرصت القلب (paroxysmal tachycardia) کے ایک مریض سے لی ہوئی خریا فی ترسیم - دو مخترز وسے دکھلائے گئے بین بس میں سے مراکب تقریباً با بیخ سکین دمیا ن بار دروں کے درمیا ن بفس فی منظم ہے (جه الداع لیوس) -

نجات ملے کا اچما فامه موقع ہو اسے ۔ اگرچہ اکثر دورے زائل ہوجاتے بین تا ہم ایک لیے دورسے مرائل ہوجاتے بین تا ہم ایک لیے دورسے میں بلاکت واقع ہوگئی ہے ایک ملیب کوکسی حلے کے دوران میں مریض سنے



شكل ۱۱- دورى مرمت التلب تيتويه ۲ ي كنبن تبادل فيرمول به (جه-ايم - ايج كميا مبيل) -

بلايا ہے تومريض ياكس كے دكستول كويتين دلانا نفرية يقيني فرر رميم مركاكدوه إس

مخصوص دُور سے سے شفایاب ہومائے گا۔

علاج ـ احتياط كم ساته سوال كرف ي عض ا وقات علول كا واضح سبب معنوم موماً المب ميسك دسركا في (coffee) أكة ت تماكونوشي " شراب و مدر (emotion) عرايت بيدكر ما دركام الكهاني باريانا- إن سب عدمينا ما جي-ليونس (Lewis) با ن كرام الم كم موراً في سع يبل أيك المكم بند Lewis) (binder كَاكُوائس دن مجرين رمنا عاجيه اكيونكه ايساكرف مصطرك رجة بن بعض ا وقات و يمينانس (digitalis) يا كوئيني وين (quinidine) كا ايك بورانعت (full course)مغید ہوتاہیں۔ بہت سے طربیقے ایسے ہیں جن سے نو دیملے ہی سند كروك المناركون ميد كداك مام ويئت (attitude) اختياركونا المثلا مَرُوكممنول كه درميان كفكرممكنًا والمتول اوركمشنول كهل رئيكنا الأركبي موقتي ولميع بي مجبير عرمنا إ جيت (supine) نيٹنا - قع كرانا ، ريجيت دوركنا ، بيش قلبه (præcordium) بيہ برف يامشكم كروايت منك بندش لكانا الكردن مي اعساب المبيد (vagi) كو دباناء فریجیٹالین (digitalin) یا اِسٹروفینتقین (strophanthin) کا وریدی اثمرا كرنا ، كبري شبيق ورزفير بلد مبلدكر يضنس كوشش كرنا ، برسب ملول كوروكد بيني كامياب بوئ إلى يعض اوقات مريض نود البيض ليه كوئى اليي چر دريا فت كريف ہیں جس سے وہ تعلے کو بالارا دہ روک کنے ہیں کے ٹینی ڈین (quinidine) مکن ہے كأمياب أبت موا اور ١٠ . گرام مص تروع كى جاتى ہے ، اور دو كمند كے بعدم وال دے کرمیرین من منطول کے واقعہ سے بایخ خراکس دیجاتی بن میلیس (digitalis) ایکل اشن (Eggleston) کے طربیتہ سے سرز مائی مباسکتی ہے، معیاکر اُ ذینی رمیشکی انقباض كي تحت برأن كما كيامه .

طبل ملوں کے دوران یں یہ نروری ہے کہ دین کو ہارا م رکھا جا ہے اور اگر فروری ہے کہ دین کو ہارا م رکھا جا ہے اور اگر فرورت ہوتو افیون کے مرکبات (opiates) کے ذریعہ سے میں مروری ہوتو گا افتحاد تربیب الوقوع فشل قلب کے اورات کے لیے مناسب علاج کی فروری ہوتو ملوں کی مرکز شست (venesection) مغید ہوسکتا ہے ۔ اگر کوئی علیہ فروری ہوتو ملوں کی مرکز شست ایک عمومی معدم سے اور وصلات کا معرمی معدم سے ان محمدی سے ان محمدی معدم سے ان محمدی معدم سے ان محمدی معدم سے ان محمدی سے ان مح

نېس كرتى -



شکل ۲ م یکرین وازن (nodal rhythm) ۔ ف رومیں (ف) بطینی طائریو (ventricular complexes) سے بہت قریب ہیں ۔ ببعض برقی قلط از رو میں مریکس (inverted) موتی ہیں ر۔ جد ۔ ایم ۔ ایم ۔ کیا مبیل) ۔


اذبني رفرف (بعر مجيزايث)

(auricular flutter)

ینام مرحت القلب کی اس کودیگیا ہے، بس می اُ وین ہمایت بعد مجلاض ہوا ہے ابیعے مختف مثالوں میں ۲۳ سے لیکر ۲۵ باریک الیک الیک موار سے
اوسے یا چھائی توانز کے ساتھ ضرب لگا آج، بس کی وہ یہ ہے کہ کسی مذاک اُدین العینی مسدودی قلب قائم ہوجاتی ہے ۔ صرف ہردوسرے الیسرے یا چستے اُدین العیاض کا ایصال کھیں کہ ہوتا ہے کہ کھینی شرع می فی منٹ ۱۲ ہوجاتی ہے اور موجود نہیں ہوتی مس کا خیوبہ ہوتا ہے کہ کھینی شرع می فی منٹ ۲۲ ہوجاتی ہے اور مریض عوقا غشی کی حالت میں ہوتا ہے کہ کھینی شرع می فی منٹ کا اس خابی مسدودی کی موت مریض عوقا غشی کی حالت میں ہوتا ہے ایکن ۲ کے پیھے اوالی قلبی مسدودی کی موت مریض عوقا غشی کی حالت میں ہوتا ہے ایکن ۲ کے پیھے اوالی قلبی مسدودی کی موت مریض عوقا غشی کی حالت میں ہوتا ہے ایکن ۲ کے پیھے اوالی قلبی مسدودی کی موت مریض عرفا خشی کی حالت میں ہوتا ہے ایکن میں ہوتی ایکن ہوتا ہے۔ استفارے بعض مثالوں کے ا

إس كريكس إكربيليني نترح أذي نرح سه مرف جونما أي ينج تويه صاف واضح جه كنعفن بو أنى منت مرف متراياسى بهدا مرعت القلب كى موجد كى كاكوئى مشدنيس پدا كرى ك تا مراكيب بست ارتفاع كي وازج في منك ٢٠٠ كى ك ركمنى جد بمسنى ما چكى ہے (62) - اليبي مالت مين مفن بعوصرف الديول كي روحت التلب بيع معف وريد في فب كى ترسيم سے شنانت بى أسكتا جو، يا برقى قلب آگارش سے، بس بى برقى فلب آگارش سے، بس بر برقى فرب رل = R) كه بيميم أذي ضرابت رف = P) دويا عار بونظ اليكن يه ا قامد كما بهيشه نهيں قائم رہنی ٔ اورممن ہے کہ فرینظم نبضیں واقع ہونے نگیں ۔ یں موت القلب دفعنۃ تروع اور معم ہوتی ہے ، اور مریض کی وضع اور ورزشس سے اسی طرح متا تر ہوتی ہے جس طرح که و واری مروت القلب، کی زیاده عام شکلیس بسکن به مالت طویل عرصول ک**ک** ماری رہنے کا نسبتہ بہت زیادہ رجمان رکھتی کیے، اور کمز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ يه عارضي بوتي سهد (ملاحظ بوتسل ٣٣) - اگرنبف مربيع بيد توبرتي قلب مگار كيفارىعب تشغیع کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔ ایسی صورت پر کسباتی جوف (carotid sinus) پینسبط دبا وُ ڈاکلر غلب کوست کیا ماسکتا ہے' جس ہے موجوں کا سرعت سے مودکر نا کلسا ہر بومانا ہے، جیا کشکل ۱۳ کی تقوید یا اور میں ہے۔ ڈیجیٹلیس کے زیرا ثرال نے ا ور اسطرع قلب کومست کرفے سے بھی صحیص میں مدولتی ہے ۔ اُذین کی بھڑ پھڑ اہٹ نیا نے روماً تزمی مریض کی نبست اُس مریض میں زیادہ تو اتر سکے ساتھ اوتی ہے جسے تریابی تعبیب (arteriosclerosis) یون کے دباؤک زیادتی کی سکایت ہو۔ ا مرا فسیات ۔ اگرا ذین میں سے ایک مفتل صفہ کاٹ کر سکال بیا جائے ا وراسے ایک نقط بر تہینے کیا مائے تو اس نقط سے انقباض کی دومومیں ترمع ہوتی ہیں جو مغالف سمتوں میں مسا وی رفتار سے بجر نگاتی ہو ٹی حلقہ کی مغالف مبانب پر بھر ل ماتی ای - جو که عضار ان مصطف کے وقت منتبض بور است لبندا وہ حالت گریزی (refractory) مين مي مواجه من كانتجريه مواسيح كه يا مومين أيب رومرسية كو عبورنبیس کسکتیس اور ضائع بوماتی بین (Mines) اُذین کی لمبی قلبی ضرب سیمتعلق ي مجدينا ما من كريد إسى قسم كد مرات كا تواتر (succession of beats) بيدا جو أ ذين كر وكرا كاكراك دور عسدوما رموسة إي الدول مانع بوجات إي -

اب فرض کیج کرامسی ملقہ میں ایک ناگہانی ما رضی سدودی (block) پیا ہو مائے اور
اس طرح مون مرف ایک ہی ست میں چکر لگا سکے ، تواہبی صورت میں وہ اسی سمت میں
بار بار چکر لگاتی رہے گئی کیونکر اب منالف سمت میں کوئی موج نہیں رہی ہے جو معند کو
گریزی بناکر اسے روک سے ۔ اِس کے چکر لگانے کا سلسلہ لا تمنا ہی طور پر جاری رہے گا۔
اُذین کی چڑ جڑ ایسے میں صورت مال ایسی بی ہوتی ہے ، موج اُ ذینی معند کے کرد کر لگاتی
رمہی ہے ، اور برقی قلب بھارش کی ف موج ایک ایسے میں کی تی ہوتی ہے ورار سے
رمبی ہوج بچریک چکر لگاتی ہے تو یہ شاخیں (offshoots) کا لئی جاتی ہے ورار سے



شکل ۳۳ بون طالعینی نوط (exophthalmic goitre) کی اصابت سے مامسل شدہ اُ ذینی پیر میرا اسف (auricular flutter) - اُ ذین کی شعری فی منت ۳۲۰ ہے ۱۰ اور ۱۰ مغربات کی متنظم نبغی کے ساتندم: اسدودی موجودہے (محو آ تقوید ایس پیر پر ایسف واضح نہیں ہے) - (حے ۔ ایم ایم کی امبیل)

اُذین مضلہ میں بھیلکو انتباض بدلاکردیت اور کبلینوں کو متبتج کردیتے ہیں۔ تا ہم کے قدر اُدین بطین مسدوری (A. V. block) ہمیشہ قائم ہوماتی ہے، جس کا تیجہ بیر ہوتا ہے کہ بطین صرف ہردوری 'تیسری یا چتی اُذین ضرب کی مجیست طامر کرتے ہیں۔ مطلح ۔ یہ پایا گیا ہے کہ ڈیمیٹانس (digitalis) اُن ا میا بتوں ہے مغید از

ا ذِین کا کشیکی انفتیاض (auricular fibrillation)

کے تجزیہ سے فل ہر اواکہ ہم فیصدی ٹر اِنی تصلب والے تھے ، دم فیصدی روا تزمی تھے ا دا فیصدی کو درقبہ کا مرض تھا ، اور دا فیصدی یا تو طبعی تھے یا تمباکو ، الکمل و فیرو سے یا مرایت سے مسمون میکن مرایت فالبا ابتدائی تر اقدام کے بہت سے مریضوں بر موجود تمی (9) ۔

ا مراضیات - انسانی موضوع می افرین کیشکی انتیان ابندائر شفائه بن راتحد برجر (Rothberger) اور و آخر برگ (Winterburg) نے مدا کا نہ طوریز اور میر اس مک میں ایونس (Lewis) نے بیان کیا - مدیریاتی حالت ابتدائی ترین زما نہ سے معلوم تمی ' اور اس میں نبض کو دائمی فیر تظمیم نبض (pulsus irregularis perpetuus)


شکل ۲۳ - ایک کفیز گاری ترقیم ایک ایسے مریش سے میں تلب کی کا ل بے نظمی تھی ۔ بطین کے ہر اِنکماش کے ساتھ بالائی یا وریدی عمنی میں سہ (c) اور و (v) موجیں ہوتی ہیں ۔ عمولی پیش انکماشی موج و (a) باعل فانب ہوتی ہے ۔ او (a) کی فیرموج دگی ا در بے نظمی کی موج دگی ا ذیں کے رکیشکی * انقباض (fibrillation) سے ضوب کی ماتی ہے ۔ (بداساع لہوس)۔

کہتے تھے۔ میکنزی (Mackenzie) نے شاہرہ کیا کہ وداجی رسیو (jugular tracings)
یں موج و (a) فائب تمی اور اس نے سب سے پہلے اِسٹ شکل اذین کا نینج سجما۔ اس
سریریاتی مالت کی حقیقی نوعیت اُسونت بہا فی گئی جبکہ ریفول کی برقی قلب بھارشوں
jugular pulse tracings) اور وداجی نبخل تی رسیو (glugular pulse tracings)
کا مقابلہ اُن گتوں سے لی ہوئی ترسیموں سے کیا گیا جنمیں فرادی روسین ہمتیج کے ذربعہ
اُ فزین کے ریشوں ہیں انتباض (fibrillation) پیدا کیا گیا تھا۔ لیرنیس اور اُس سے
دفقائے کا ریکے فارہ تجربات نے اِس مالت کی امراضیات (pathology) پرمزیدرون

قوی ضرب ویکمی جائے (الما خطر او شکل ۳۳) -

اُسوقت جکر قلب کی ترج تیز ہو ضرب قلب کامقا بدمیسی کہ وہ بدی ایک اُسی میں کہ وہ بدی ایک اُسی میں کہ اُسی میا تا میں میں میا تا ہے۔ اور یہ دیکھا میا تا ہے کہ قلب کے بہت سے منزات کا اُن کے ختمال ہونے ہیں سرامزاکام رہتے ہیں۔مطرانی منین کی اصابحات کی معابول میں مراسزاکام رہتے ہیں۔مطرانی منین کی اصابحات کی اسابھا تا ہے۔

حفیقی اُونی انکماشی تورید (auriculo-systolic murmur) کبی نہیں ہوتی ہی کو کہ اُونین نے ضرب لگا ناموقوف کردیا ہوتا ہے۔ آگر خریکی کسنائی مجی دسے ، تو وہ ہمیشہ ابتدائی انبساطی یا وسط انبساطی (mid-diastolic) ہوگی یعض اوقات وہ باطل ہر پیش اِنکماشی (presystolic) ہوتی ہے ، لیکن یہ ایسی مرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پیش اِنکماشی (presystolic) ہوتی ہے ، لیکن یہ ایسی مرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ملب بعض اوقات انبساطی خریر کے دستے ہوئے سے چہلے ہی عبض ہوجا اسے ۔ جب تعدا تنا کی لویل ہوکہ وسط انبساطی خریر ہورے کو دیر خدم ہوجائے ، تو حقیق اُونی اِنکماشی خریکی بہیں کسنائی دیتی ۔



شكل ۲۵ - أ ذين كريشكى انقباض كى برقى قلب كارش كيلمينى ل (R) اور او يئ ف موجي ال (T) موجي نهايت بيقاعد كى كساخة واقع بين اورا ذيئ ف موجي (T) موجي نهايد وجي أن كري أن كى مجد كري النعدا وجيونى موجل ، ومنعنى مي نشتر بير - (بسد التباع رسيل ويلس (Russel Wella)] ...

جب قلب بے قا مدگی کے مات اور ایسی ترج سے ضرب لگا تا ہوکہ جو نیات اور ایسی ترج سے ضرب لگا تا ہوکہ جو نیات اور اسے زائد ہو اور اندین کے رکشکی انتباض (auricular fibrillation) کی اصابت ہے بیکن جب قلب سنی کے ساتھ کا یا یوں کہنے کہ ۔۔اسے کم بار ضرب لگا تا ہو اور اس کی بیتا مدگی بھی چنداں زیادہ نہؤ تو شنا خت زیادہ شکل ہوتی ہے ۔۔ اہم ایک مزید تیستی امارت یہ ہے :۔ مریض سے کسی بلی ضم کی ورزمشس کے لئے بیسے کہ ایک مزید تیستی امارت یہ ہے :۔ مریض سے کسی بلی ضم کی ورزمشس کے لئے بیسے کہ ایک مزید تیستی امارت یہ ہے :۔ مریض سے کسی بلی ضم کی ورزمشس کے لئے بیسے کہ ایک مزید تیستی امارت یہ ہے :۔ مریض سے کسی بلی ضم کی ورزمشس کے لئے بیسے کہ ایک مزید تیستی امارت یہ ہے :۔ مریض سے کسی بلی ضم کی ورزمشس کے لئے بیسے ک

ا دیر نیچ جسکنے کی بہتریں ایک دوبار اُٹھ کر بیٹھنے اور پیرلینٹنے کو کہا مبا ہا ہے۔ آگرا ذیخی کیگی انتباض موج دہد تو اِس ورزش سے قلب اور بمی زیا دہ نیز شکم ہومائے گا۔ دوسسری اسابنوں ، مثلاً متذاد انجماشات یا قلبی مسدودی میں ورزش کے سنے کا نیتج بیر ہوتا ہے کہ نہن زیا دہ یا قاعدہ اورنشلم ہوماتی ہے۔

245

محرنبغس ١٠ يعدزا كدموتوم يغس كوبستريس ركمكراس كاطلاج سغوف لمريجيثالس (pulv. digitalis) أمَّا لَمْ الرَّمِنُ بُوكِ معياري مبغيه (tincture) كه. ١- ١٥ قلرات م رابه وتا ہے، دن میں بین یا میار مرتبہ دے کرکرنا میا ہے یا تا زہ نمیساندہ (infusion) استعل ي ماست به اكرنبن كى رفيار مي كى نهوا تواس كى مقدار خوراك كوبر معا يا ما يا بيه يبانتك كه ويجينان كيتم ك واضح علامات للهم بوائروع بون - وه علامات يراني: -متنی سقّے ، اسبال ، اورور دیسر۔ اب اِن علا مات کو دور کرنے کے لینے مقدار خوراک کو كا في همثًا دينا جا جنه و اور إسعى ملكوبه اثر ما مثل جوني كك جارى رجن دينا جاجيَّا -ُعادیا نهایت خطرناک امهابتون بن امٹرونینتمین (strophanthin) ' لیے مرین، کمبعی مالع (normal saline) میں طاکر وروں وریدی کوریر دیکیتے ہیں ' اور ی تعدا كرر ديماسكتي هيد إسع تحسن المئدي يا درول عفسلي الوستع بمي ديسيكت بين - درول وديار إسرونينتمين چنداں فالی از خطرنہیں ، کیوکر مغیبہ ترین علاجی اثر حاصل کرنے کے لیئے ووا کی جو متعدار ضروری ہوتی ہے وہ زہریلی مقدار خوراک کے قریب ہوتی ہے۔زیا وہ دیزیک یڑا رہنے پر اس کی قوت تا نیر دیں کی ہوماتی ہے۔ اذینی رکشکی انتباض کی ما واصابتول کے علاج کا ایک زیادہ نمالی ارخطر لویقہ اِنگلت من (Eggleston) کا ہے، میں نے بتلادیا ہے کہ جب أيك مهاي ا وركال اثر بيداً كَرْناً ضرورى بتوتوا ذيني *ريشي*ى انتباض ا و*رف*تل القلب ^{وا}لير مریفیون میں و کیمینانس کی اُن متعداروں کی نبست جوعمواً استقال کی ماتی ہیں بہت زیا دہ بوی نوراکیں برام دہن دیجاسکتی ہیں ۔ یہ فہوری ہے کہ ڈیجیٹالس کی ایک معتول کھر رِمعیاری بنائی اوئی تجمیز (standardized preparation) استخال کی جائے ۔ امریجہ میں ڈریجیٹائس کے علاج کی اِکائی (unit for digitalis therapy) معرکربداکائی " ('cat unit') بُحِين و يجيشانس (كيسفوف كية بوسع بتول كى في رامول مي ظاهر کی ہوئی) وہ اقل مقدارجو دروں وریدی انتراب کرنے پر تبی کے لئے دہلک تابت ہو۔ اِس مك مين ديجيداس كى بيشتر عده تجهزول كى محربه كائى" سغوف كرده تيون كيد ١٠٠ بالكاكم کے برابر ہوتی ہے۔ اِن مالاَت میں ویجیالیں کی دو مجموعی مقدار جوایک مریض کو دیکائی ہے ذیل کھے ضابطہ میں دی گئی ہے ۔۔

مبغید وی در در در می میرون کی تعداد = x . در ما وزن

رمطلول م*یں* ۔

سفوف كرده يتول كے گرامول كى تعداد = ٢٠٤٠١ جسم كا وزن ر **طلول م**ل. «ریض کے جسم کے طبعی مزرن سے کا مرلینا جا ہیئے ' اور اِس کی نمین مریف^ل کے حقیقی وزاہتے كرفي بركسي الأياكا بوموبود بولها فاركمنا جاجف - جسماني فول يرسع قياس كرده وزن کا مرمی لایا جائے تنا ہے (لاخطہ ہوصغیہ 472) - آثرالذکر کی بیمائش نمتالاس (vertex) ا ورطغلم الورک کے مدیبا سند(ischial tuberosities)کے درمیا ن اُسوقت کرنا ماہیج مبكه مريض بسنز برلينا موامو شايدنيا ده مالى ازخطره بي بهدكه اندازه كرده مقدار كالوري كام ين لايا مائے - يغين كرنے يراكب الغ كے لئے مواً صبغيد كى اورام إنى ماتى ب بہترین برہے کہ بیتین یا میار خواکول میں جید چھ تھنٹول کے فاصلہ سے دی مائے اسلم يركم محوى مقدار ك نصف سے تروع كيا جائے ، بھراؤ ، بھر لا ، بھر اللہ - ترح نبض لُركرنے يں الملم الراكب ووكيفيظ بي اسطرح عال كيا جائتا ہے كه ويجيالس كے بتوں سے آکی خانعل کلوکوسا ئید و کاکسسن (glucoside digoxin) کا ورول وربدی ترز کیا جائے 'خوراک دے و بلی گرام اور ہ وہ کی گرام کے درمیان 'جس کے انتحلی محلول کو آگ مالح کے ساتھ کمکا لیا جا تاہد ۔ بیجوں سے ڈیجٹیالبغریم (digitalinum verum) ا من اشراب كي جاسكتا هم الموراك ه ملي كرام جوكه دار المي كرام وكاسن (digoxin) اورمعیاری مبنید کے ۵ م قطرات کے معادل ہوتی ہے۔ وگاکس براہ دمن مجی فعال مرتی ے - دونول زیر جلدی با فنول کے لئے خواش آور نابت ہوتے ہیں (60) -


فیجیناس علاج کا مقصدیہ ہے کہ بب مریض بہتر برلیٹا ہوا ہو تواس کی نمبض ، اور ۹۰ کے درمیان رہے۔ جب یہ مقصد حال ہوجائے تومریض اُ فی مکتا ہے اور پھریہ مقدار بتدریج گھٹا دیجاتی ہے اور پھرا ہوا ہے کا کہ نبض اب بجی مستدمتی ہے اس کے لئے جواتل مقدار خدوری ہے اس کا تعین کرلیا جاتا ہے اور مریض کو اس متدار کو اپنی کا اور دخرے مبض کو اپنی باتی زندگی بھر لیست دبنا چاہئے کیکن اگر فی بحیث اس کے علاج کے باوجود خرج مبض کو اپنی باتی زندگی بھر لیست دبنا چاہئے کیکن اگر فی بحیث اس کے علاج کے باوجود خرج مبض مدست ور بلندر ہے تواس تسم کی دواسے اس سے زیا دہ نہیں کیا جاست اور در کیا جائے ، میرا بت مقتضیات (indications) یہ ایس کہ اور حق الا محال تندر سے رہا جائے ۔ عمومی معد احس

(general ansesthetics) مفِ اسيوقت ديين جائيس جبكه ايب عليه سے مريش كى زندگى ببت زياده برمياني ماسكه ، يعن حب عليه علا ناكر بريو -

تولت کرد کے است کردیے میں ڈیجٹیائس کا فعل قبی سدودی پرداہوجا نیکے با صفح ہوتا ہے ' جو اِس درج کی ہوتی ہے کہ اُن کٹر التعداد صَدمات کوروکے کے لئے کا فی ہوتی ہے جو او نیوں سے پیدا ہوکر بھین پر پیرش کردیتے ہیں۔ قبیبی سدووی فالبا معطار براست فعل کے باعث ہوتی ہے ' جو فالبا او بین بھینی ٹرداست پر است فعل کے باعث ہوتی ہے ' جو فالبا او بین بھینی ٹرداست فعل کے باعث ہوتی ہے۔ تندوست قلوب میں او بین بھینی ٹرداست کا اِمناع (A. V. node) پر ہوتا ہے۔ تندوست قلوب میں او بین بھینی ٹرداست کا اِمناع کی اور کہ ہوتا ہے کہ سے کہ اور قلب منباد لا فوت کے ساتھ اور کہ وری کے دوس کے ساتھ اور کہ وری کے ساتھ طرب لگا تا ہے ۔ جب یہ واقع ہوجائے تو ڈیجٹیائس کومارسی طریر مذف کردیا جائے۔ خطرے کی امارت ہے ۔

بِها مُعلَقَى ؟ توازي رئيكى انتباض موقدف بوجائك كا اور كلب ابنا لمبى توازن لميمنياً كرياتياً كرياتياً كرياتياً كريكا و الما تنوياً نسب اصابتول مي بوناجه و بقية نصف بي بدوا بمكارموتي من اور مكن به دور معالى عنالب رهن كي وجسع بو -

کو نیڈین کا طاح کرنے سے پہلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مریش کوبستریں رکھکر ڈیمبیائس کے علاج کا آکیہ ابتدائی نصاب دیا جائے اور بطبینی شرح کو ، یہ اور ، پر بورمیان کھٹا کر ایک حالت میں اصلاح کرلی جائے ۔ اگراس سے مریض میں کوئی احسسلاح نہ یا تی جائے تو یہ اصابت کیونیڈین کے لئے اموزوں ہے ، کیونکہ مریض کی اصلی حالت کا



منظل 1949 : لا يمبينالسي مزووجيت (digitalis coupling) ...
(عجر - انهم - المبيح كيامبيل) -

سبب کوئی نیر طبعی توازن نہیں ہے بکد زیادہ ترخود ملب میں نقائص ہیں۔ اذبی رشکانتہا کی وہ اصابتیں بھی کیونیڈین کے ملاج کے لیے چنداں موزوں نہیں، جن میں ڈیجیٹالس وٹ بغیری بطینی ترح ست ہو۔ تا زہ مُداویت (embolism) کی مرگذشت بھی کیونیڈین کے استعمال میں مانع آتی ہے ، کیونکہ اگر اذبین میں ایک ملقہ (thrombus) موجود ہے تواسونت جبکہ اذبین بھر طبعی طریقہ سے ضرب لگانا تھ وہ کرے ، مکن ہے وہ آزاد موکر سدادبت بدیا کروے ۔

برید. اگر کیونیڈین سے ملاج کرنے کا فیصلا کرلیا گیاہے تو ڈیجیٹانس موقوف کردیا ما تا 247

قلب کا توازن طبی ہوج نے پر مریفیوں کو مویا زیادہ آرام محسوس ہوا ۔ بے اور اسی وج سے کیونیڈین کو ویجیٹالس پر جورشکی انتباض کورفع نبیس کرتا ، فوقبت مال ہے ۔ دائی اور نوبی دونوں قسم کے اذبی ریشکی انتباض میں کیونیڈین دیماسکی ہے۔ در تی سنگی انتباض (thyro-toxic fibrillation) کی اصابتوں پر کیونیڈین کا اچھا اثر اسیوقت ہوتا ہے جبکہ بیش درقیت (hyper-thyroidism) کا معقول ملاج کیا ہو ۔ کیونیڈین اور ڈیجیٹالس کوساتھ ساتھ نہیں دینا جا ہے ۔

تنبض متبا دل

(pulsus alternans)

قلب کی فرطبی ضرب کی اِس قسم میں چوٹے اور بڑے ضرابت نظم کے ساتھ تمادل ہوتے ہیں الیکن نبض دونوامی (pulsus bigerninus) کی مزدوج ضرابت کے برمکس (بس میں ایک چوٹی ضرب کے بعد کا وقفہ اس سے بڑا ہوتا ہے کہ متنا ایک بڑی ضرب کے بعد کا وقف شروع ہے آئر تک وقفہ تفریقاً شمیک طور پر کیسال ہوتے ہیں ایک ایک مجوری اور برای ضرب بنی کے درمیان کا فرق زیادہ نمایاں بہوتو مکن ہے کہ وہ انتخلی ایس بہوتی کا دراس کا دریا سات کو بتلا نے کے لئے بفت گار (aphygmograph) کی مودد ت بڑے ۔ اگر فرق نمایاں ہے ' بیعن اگر منبا دل کمزور ضربات نمایت جوئے ' بین ، تو مکن ہے کہ انفیس انگلی محسوس نہ کرے ' اور ایسی نبض فیر سمولی فور بڑسست مجھے کی عبائے ' بیعنے وہ در اسل جتنی ہے اس سند نصف سند ۔ منعلم النبغی بیمیا مجھے کی عبائے ' بیعنے وہ در اسل جتنی ہے اس سند نصف سند ۔ منعلم النبغی بیمیا وہ کا فیا اس میں انگلی میں مالت بہوائی ماکئی ہے وہ در اسل جتنی ہے اس میں دور اس میں انگلی میں مالت بہوائی ماکئی ہے وہ ان کو بینے سے بھی یہ مالت بہوائی ماکئی ہے وہ ان کو بینے سے بھی یہ مالت بہوائی ماکئی ہے کہ نومائی ہے اس میں دور اس در کا کہ وہ ان کی سند میں اور کلائی کی نمایس بوقی ہیں اور کلائی کی نمایس بوقی ہیں کی نمایس بوقی ہیں کہ در بین میں دو موجود ہے ' میںا کہ ل م حالت (R. S. برکی شکل ۲۱ ' نتویہ میں وہ موجود ہے ' میںا کہ ل م حالت (R. S. برکی شکل ۲۱ ' نتویہ میں وہ موجود ہے ' میںا کہ ل م حالت (R. S. برکی شکل ۲۱ ' نتویہ میں وہ موجود ہے ' میںا کہ ل م حالت کی کا در ان کی تناول تو نمینی سے خلاج کی میں دور ان کی تناول تو نمینی سے خلا ہو کا ہے ۔

علاج - قلب كى قرت كوممفوظ ركف كه ك الت سكون وآرام دينا عاجة - في يمين السي النام المنابق من المنابق ا

قلباال*وقوع*فل

(bradycardia = رَبُطُ التلب)

اگردیمن کوبی اور قلب کاطعی واتر اکثرسته فی منط سمجما ما نا ہے ، تا ہم مائف فی منٹ کی بین ایکل عام ہے یعمی اضاف سی بیاس کی سفر لمبی ہوتی ہے اور کمن ہے کہ ان کھی النبض (slow pulsed) و شی میں آ دسی راست کے ہمر دکمنوں میں یا علی العسباح نبیش کی نترج کھٹ کواٹر تا لیس ہوجائے ۔ فاقد کشی (starvation) میں یا علی العسباح نبیش کی نترج کھٹ کواٹر تا لیس ہوجائے ۔ فاقد کشی راست کے اور بلا شدینی کی ترج سست پائی جاتی ہے اور بلا شدینی کی بیسستی تحق کی کئی تعلیم کی ترج سست پائی جاتی ہے اور بلا شدینی کی بیسستی تحق کی کئی تعلیم کی وجہ سے ہوکہ واقع ہوجاتی ہے ۔ اس مالت کے لئے اسمان کرنے وقت بلاشہ قلب اور نبیش کھی کی دونوں کا مشا ہر می کرنا مروری ہے ، کیونکر کئی مالئیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمن قلسب کی ضرب کلائی تک نہیں بینج سکتی ، شکل نبیش میں دیکھی جائے تو گو القلب (pulsus alternans) یہ خود وقوای کا شبہ ہوتا ہے ، گوکہ قلب طبعی شرح سے ضرب لگا رہا ہوتا ہے ۔

رُبطُ القلب کی بہت سی طالتی کھ سب انہے کے بیان (vagal stimulation)
کے با عدت ہوسکتی ہیں، جومعکوس طور پر پدیا ہوسکتا ہے۔ چمانچہ و فرمغن طی جک ضفلت الدمُّ کے با عدت ہوسکتی ہیں، جومعکوس طور پر پدیا ہوسکتا ہے۔ چمانچہ و فرمغن طی جک ضفلت الدمُّ (cerebral compression) میرقان اور دوسرے ما دامراض ساریہ کے

بعد کی نفتہہیت (convalescence) سے طور میں آئی ہے اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ الفاظ پورے قلب کی سست رفتاری کے مقلق کیے مباسکتے ہیں کو جس سے بوشی کا وہ حلہ بوما تا ہے جس کا مام سبب جذبہ (emotion) یا دی کے کمرا ادنہا

ہے یا مکن ہے کہ بوشی کے وہ حصے بیدا ہوں جوا ورفی مرض میں ہوتے ہیں۔

روران منس می قلب کا متبارلاً سُت اور تیز اوجانا (بو فی مسدم توازن sinus arrhythmia: بین وه کسی قدر فیمی مسب تائیه کے نعل کے سبب سے ہے : یز وہ کسی قدر فیروام میکنی بیتا عدگی "("phasic irregularity") بی جس می تنفس کے علق کے بغیر

اورباكسى كابرى سبب كد بوراً قلب نوبي لمدريست پرمانا عدا

ایک دومری نیرمام مالت بو بُط انقلب (bradycardia) پیداگردبتی ہے بونی اُذینی صدودی (sino-auricular block) ہے کین نور بونی ا ذینی مسدودی کا عصب تائید کے بیجان کے باعث ہو امکن ہے۔ لویل المتت بُط القلب کا ایک خاصہ مام سبب اذینی بطینی مسدودی ہے ' بالخصوص اس دقت جبکہ بیسدودی کا ل درعبہ کی موہ معمومی اس دقت جبکہ بیسدودی کا لرمنے کی المقد اضل

(ventricular fibrillation)

برتی قلب نگار کی وریا لمت سے رکٹنگی انعتباض کا وقوع بطین میں اسی طرح ہوتا دیکھا گیاہے کہ مس طرح افزین میں -

بالعموم بر موت عدقوراً بلط دیجها ما آسم بگوید فروری نبیس محکدید موت کا سبب بور کیکن ما نورول بن اور شا ذیوقعول بر انسان میں می ، یہ کچی عرصه کے بعد موق بوکرشفایا بی واقع ہوگئ سے معقد (lightning stroke) بین موت کا سبب بی معلوم بواجه ، اور معضول کا یقین ہے کہ عدم میں سے کوروفارم کی معض مہلک واروا نول کا توجہ میری اِسی سے بوتی سے -

فلب كي توضي

من بن قلب بها اوقات کسی قدراز کارزشگی کے تحت فعل کرتا ہے۔ جب
قدرتی اعال کے دریعہ قلب کی لما قت بڑھ کراس از کارزشگی بیفلہ مال ہوجا تا ہے۔
توقلب کو تعویف یا فت مرا جا تا ہے۔ قلب کی لما فت اسطرح بڑھ سکتی ہے کمشلی
دیواروں کی دبازت بڑھ جائے۔ اِس کو بیش ہیں وریش کہتے ہیں، جس کے ہمراہ
مکن ہے کہفوں کا اتساع بایا جائے یا مکن ہے دیا با مبائے۔

بعب یه از کاررفتگی که جس کے تحت قلب نعل کرتا ہے اونی درمہ کی جوم تو بیش پروش اس مذکب واقع دومائے گی کہ قلب سے نواہ کوئی کام مجی انجام و بینے کا ملالبرکیا جائے اس کی میں ہیں ہوٹر ہوگی میسی کرسی لمبی نخص میں بخائج شدیرترین تسم کی عنملی مدزمشس سے بعد مجی مریض عمول سے ذیا دو مسستہ نغس نہیں تا اسبی از کاروفتگی کو میکل طور دہر تعویض یا فت۔ کہتے ہیں۔

اگریداز کارز تنظی بندتر درجه کی ہی ہو، تو مریش کو آرام کی مالت میں یا ہلی نہ کے دوران میں توکوئی کی بندتر درجه کی ہی ہو، تو مریش کو آرام کی مالت میں یا ہلی نہ کے دوران میں توکوئی کلیف نہیں ہوتی، لیکن جب ورز کشس شدید تر ہوتی ہے ۔ اس مورت میں گویا قلب بلی ورزش کے لئے تنویش یا فتہ ہے، لیکن شدید تر ورزش کے لئے تنویش یا فتہ ہے، لیکن شدید تر ورزش کے لئے تنویش کا ماملاح تنویش کی اسلام کا کہ ستمال کیا جا سے اسکا مورت کے لئے جزوی یا نامکمل تعویض کی اسلام کا کہ ستمال کیا جا سے اسکا ہے۔

اس سے می شدیر تراصابوں میں جبکہ قلب کا فشل ہور ہا ہوتا ہے ، مریف بستہ پر آرام کی مالت میں بڑا ہوا بھی سستنسی اوردگی ملاءت فل ہرکر تاہے ۔اِس مورت میں تعویف کا کمل فشل ہو جکا ہے ، اور قلب کے منتف کو تنک اس سے زیادہ قسع ہو چکے ہیں کہ جتنے وہ تعویفی کے فشل سے قبل تھے ۔

بنش پرورشس


(hypertrophy)

قلب کی بیش پرورش میم کی قدرتی جمیت ہے جو کہ قلب پر بڑے ہوئے زائد کام کی وجہ سے بلوریں ہی اورج اُسی دفت کہ واقع ہوسی ہو جب بہ کہ خون کی ایک معتول رسد پہنچ قلب کے تغذیہ کو بخوبی قائم رکھے ۔ جب بطینوں کی بیش پرورشس منا فر کہفول سے ازدیاد (اتساع) کے بغیروا قع ہو تواسکو ہم مرکز بیش پرورش کہتے ہیں اور اس امر کے پیش نظر کرزا کہ کام قلب کی کس ما آب پر بلیش ہراوریش کہتے ہیں اور اس امر کے پیش نظر کرزا کہ کام قلب کی کس ما آب پر بڑتا ہوں ۔ چپ مانبی بالاست مانبی ہوسکتی ہے کیا مکن ہے کہ دونوں مانبین مائی فرر پرمتا تو ہوں ۔ چپ مانبی بیش پرورش جب بائیں بطین کے اقداع کے بغیرو آواس امباب مسب ذیل ہیں۔ (۱) اور کمی معراعوں کا مرض ، جبکہ اُس سے دہنہ کی تنی واقع ہو۔ (۲) نہایت شاذ طور پراور کی کربیائشنگی۔ (۳) بڑھا ہوا تریانی شاؤ۔ (۳) افلب کا سرمین فعل ،

(ventricular compl. xes) آیک دورے کی طرف رخ کے ہوئے آب (کی پنی مانی ظلبہ میں اس کے برکھ سے اور ان علی نسانت ایک دومرے ہے۔

پنی جانبی ظلبہ میں اس کے برکس حالت ہوتی ہے اور ان علی نسانت ایک دومرے ہے۔

مرخ ہجرے ہوئے ہیں (شکل ۴۸) ۔ لیوس (Lewis) اور کائن (Cotton) نے بیس رہ کے اس نے مومت سکے معاقب کے اس طریقہ تخیرن کی جسمت اس وقت تابت کوری جب کہ اس نے مومت سکے معاقب کے اس کی مقلبیم احتیاط کے ساتھ کرکے دا میں بطین کہ با میں طین سے علمی مور کے حرب اس دولوں کے وزنوں کا مقابلہ کیا ۔ مبری مثالوں میں با میں جب رودا میں بطین کے درمیاں موروا میں با میں اور دا میں بطین کے درمیاں میں وہ ۲۵ و درمیاں موروا میں با میں اس میں وہ ۲۵ و درمیاں موروا میں با میں اس میں دوموں کے درمیاں موروا میں با میں دوموں کے درمیاں میں دوموں کے درمیاں میں دوموں کے درمیاں موروان کے درمیاں موروان کے درمیاں میں دوموں کے درمیاں موروان کی دوموں کے درمیاں میں دوموں کے درمیاں موروان کی دوموں کے دوموں کے دوموں کے دوموں کے دوموں کے دوموں کے دوموں کی دوموں کے د




شکل بر مطرانی نسق (mitral stenosis) کداکید مریض عدمال شده راست مانی نامبد - رج - ایم - ایم کمیا مبیل) -

بقابد اتحا بس سے وائیں لبلین کاظر بلا ہر ہوتا ہے۔ اور کمی مرض میں آف صابق کے بیت بہت باہد میں ہوتا ہے۔ میں بانس کی بیش پرورش مجی است میں بانس کی بیش پرورش مجی است نمایاں تھی جست مراہ یا ٹی جانس کی رخنگی التہائی دو (terstitial nephritis) سے بمراہ یا ٹی جانس والی بیش پرورش میں عموماً نعنیف ساچپ جانبی ظریما کا جسکی سست اور ملآ ، دی مقابد اتمی ۔

لاشعائ انسے مکن ہے کہ ایک زوسے معل کتا ہو اسیشس پرود ا ایاں بلین نظرائے یا زویں وائیں معد قلب پراکیہ نبغان نظرائے جو کہ ایکٹیس میعد ا

دائیں بطین کی طرف استارہ کرتاہے 'میکن قلبی سایہ کی جسامت (وٹرکل) میش یروش اورانساع کے درمیان املیا زکرنے کا موقع نہیں دیتی۔ اس مسم کے زرائع سے دیا نت ہواہے کہ قلب کی جسامت ' میشکر کام کرنے والوں کی نسبت ایہ ہوا نوں میں زیادہ ہوتی ہے ' اور انڈرگر یجو سیس (indergraduates) کے آباب گروہ یں بہیا یا گیا کہ



شکل اور طینسی وربازوی (aortic stenosus and regurgitation) مشکل اوربازوی کی ایک مریض سے مال شده بیب مانبی کلید.

بب وه با قامده منقت آمیز ورزش کے ما دی ہو گئے تو اُن کے قلب کی جساست بڑگئی جساست کی بیزیادتی غالباً بیش برورش کے باعث تھی ۔

إنساع

(dilatation)

محت اسباب - إنساع كى اسطلاح كا اطلاق قلب كه مؤل كا معلاح كا اطلاق قلب كه مؤل كا معلاح كا اطلاق قلب كه مؤلى جمامت كى زياد تى بركيا ما تا ہو ان انباط (diastole) ميں واقع ہوتی ہو۔ مكن ہے كہ بعض امرامنیاتی مالتوں میں بلین اپنے ما فبد پر فلی طور پر منقبض نہ ہوسك جسكا نتیجہ بیم وکہ کیویس ماندہ نون (residual blood) باتی رہ مبائے ، لیکن ہمس کے تعلق السان میں ہم کویقینی طور پر کچر بمی نہیں معلوم ہے ، اگر میکن ہے کہ مع قلب مشت می تجہزیر مبياكة بخولمي تييك (exophthalmic goutre) مين بوتام - (٥) انضامات ما بهوا ، مبياكة بخولمي تييك و مركات المعربي من المم بوكر قلب يرزائد كام كا باردُ الدينة أي -

رأین بنین کی بیش پرورش ، ریری دوران نون بی تسدد به بمانے سے بیدا بوجاتی ہوجاتی سے بیدائتی سفو بات کے بدائتی سفو بات کے بدائتی سفو بات کے بدائتی سفو بات کے اکتسابی مرض کیا تر بات کے اکتسابی مرض کیا تر بات کے تاحدہ پر اور طی اور سما کے دباؤ کے ۔ (۲) بھید پھر ول میں واقع ہو سکتا ہو نفاخ ، مزمن شعبی انہتاب ، تمدد الشعب (bronchiectasis) ، اور کا ہوجہ مزمن سل روی کے ۔ اور (۳) فلب کے باس جانب کے اولی مرض کی وقت واقع ہوسکت ہو جس سے بایاں اور روی دوران خون محتین (engorged) ہوکہ بھیدیم ول میں خون کا دباؤریا مع ہوج تا ہے۔

اور طی بازردی اور دیگر ازرو ضرات مین ، میا کد بعدین میان کیا جائے گا ،

منویض امیشه اسطرح واقع مونی بے کہ وہ کہفدکہ میں اور میں سے نون بازروہواہ اولی (تعریفی) کوریشہ موجا آج، اور بیش پرورش اتباع کے بعد ثانوی کوریر موجا آج، اور بیش پرورش اتباع کے بعد ثانوی کوریر موجاتی ہے۔ اس کو منعی ف المرکز (excentric) بیش بروس ش کہتے ہیں 'اور یہ اصطلاح اور کی بازروی ہیں أیس بطین کے متعلق خاص کوریر استعمال کیجا تی ہے۔ یہ اصطلاح اور کی بازروی ہیں أیس بطین کے متعلق خاص کوریر استعمال کیجا تی ہے۔

اُ فینوں کی بیش پرورش سٹاندونا درہی اتساع کے بغیروا نع ہوتی ہے لیکن مطرانی ضیق میں بایں ازین ہی بیش پرورش کا علیہ ہوتا ہے۔ یہ اذینی بطینی مصراعوں کے

تغنين يا عدم كغايث يي پيدا ہوتى ہے ۔

مرضی تشریح - اور فی از روی (aortic regurgitation) می بنی ور سب سے اعلی درجہ کی ہوجاتی ہے ۔ مکن ہے کہ بطینی دورار اپنی طبعی دبازت کی تسبت دگئی ہوجائے - ایسی مورتوں ہی ہمیشہ بطین کا اِتساع ساقد ساتھ موجد ہوا ہے اوردوسے کہفول ہی بھی تمناسب تغیرات ہوجائے ہیں 'جس کا بیتحہ یہ ہڑا ہے کہ قلب کا وزن مور درسا کرام کے درسیان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ۔ ایسی مثالوں کو قلب النور موری کی بیت ہیں۔ دائی بین کی بی برورش میں اس کا داسی متالوں کو تعلب النور کرے راس قلب میں متداخل ہو اے اور نمایاں امعا بتوں میں جب سا صف سے قلب کے دی مائے توبایا سلمین اشکل نظر آ آ ہے۔ دایا سطین دائیں مانب کی طرف می س سے زیادہ آگے کا معیل مانا ہے کہ جہال برمعمولی طرر پر ہوتا ہے۔

دائیں بلین کی بیش پرورش کے امارات چپ ما نبی بیش پرورش کے امارات سے مال ہوتے ہیں بھن چورش کے امارات پی مال ہوتے ہیں مکن ہے کہ تمراسیف (epigastrium) پر ایک انکما شی صدم (systolic impulse) نظرا ہے، بچوں اور دُ بلے پہلے افراد میں جب ہاتھ کو تمراسیف میں اور اُمین مسلمی ماست یک نیچے رکھرا ویرکو گھسا یا مباتا ہے تو دایاں بلین حقیقتا اسے ہیں اور اُمین ملی ماسس سے کہ خد بتہ الراس (apex beat) بمی کسیقدر اُمین طرف کو متعل ہوگئ ہوا ور بیش قلبی اصمیت بڑ ماکئی ہو۔

استاعی ا مارات پر خور بودیکا ہے (طاحظہ بومن مد 218)-

دائیں اور بائیں بطین کی اضافی بیش پروردگی کے متعلق فالبَّ معیم تربن معلوات برقی تعلی خالبَ معیم تربن معلوات برقی قلب کارسے مامل ہوسکتے ہیں (الانطروں اشکال ۲۰ اور ۲۰) ۔ راست مانبی للب یس م انعراف (S. deflection) ہیں ، اور ل انعراف یس م مانعراف (R. deflection) میری توریعی براہ کھے ہیں ، جنائج اشکال کے اندر بطینی ملاکسیات (R. deflection)

("heart lung preparation") من يرتجر بنته واقع بومائ (heart lung preparation")

امراضیات _ إتماع کی دوسی ہیں - (۱) اور طی اور مطرانی بازروی (compensatory کا توہینی اتساع و compensatory) کا توہینی اتساع و مناص کوشک خون کا طبی مقدا (aortic and initral regurgitation) بر اس و ب سے ہوتا ہے کہ قلب کا وہ خاص کوشک خون کا طبی مقدا کے علاقہ در ہو اس بی شخص سے آتی اور عام و وران خون میں آھے بھیجہ کی مباقی ہے ازرفتہ خون کی فاضل مقدار کوئی اینے اندر مبلا در سے دیتا ہے ۔ یہ حالت اس امر کے تناقض نہیں ہے کہ عضار قلب بائل تندرست ہو - (۲) پروہ و آتساع ہے ' بود ہا کہ کا فیل تعلیم کی وجسے ہوتا ہے ' مس کا فشل توہیم کی ایشار لیک افغار میں کا مشروب کی سے دور می کا دی تعریف کی ایشار لیک (Starling) کے تیم بات سے مرشع ہوتا ہے کہ اِ تساع کی یہ دور می قسم می ایک تیم نوی میں کی نیس ہوتا ہے کہ و اس کے عضلی دیشر کا ارتباء (relaxation) مینا زیادہ ہو' ضرب آنا ہی نوی و قدی ہوگا ۔ اِست تانون قلب کوزیادہ زور کے ساتھ ضرب نگانے کی قابلیت بمثلی ہوتا ہو کہ ایسے میں ۔ کیونکی قلب کونیادہ (relaxation) مینا زیادہ ہو' ضرب آنا ہی نوی و قدی ہوگا ۔ اِست تانون قلب (relaxation) مینا زیادہ ہو' ضرب آنا ہی نریا و قدی ہوگا ۔ اِست تانون قلب (relaxation) کینے میں ۔

ظلب کا نعنیف سا إتساع معنلی ورزش کے دوران میں ممبری موریہی ہوتا ہے' اور اس کا اثریہ ہوتا ہے کہ ہرفرب کے ساتھ نون کی برآ مدزیا وہ ہوجاتی ہے لیج لاشعای شہادت کی بناء پر یہ بائکل یقینی ہے کہ ورزش کے فرآ بعد قلب ملبی موریپر سکو مباتا ہے۔ اوراس کی جمامیت برنسبت اس کی سکونی جمامت کے کسیقدر جوٹی ہوجاتی ہے۔ اِسکے برطس کی یا پامی ہے کہ آنا زبدِ یوفشل قلب کی اصابتوں میں قلب معنلی ورزرشس کے بعد

إتساع كما مركز أبيهي -

مُرضَى تَنْمَرَح قلب كى جامت اوتوس يرجوا ثرات پدا بوت بي ووكه فله كالم المورون الله المورون الم

وتناع كے ساتم ديواروں كا بتلاين موجد ہوتوبليني ديواري مسكر! اَنج كے برابر ' اور رُس پر اِس سے بھی کم ہوسکتی ہیں ، لہنداراس مو آسب سے زیادہ تبلا مِعد ہوتا ہے ۔ ا ذین بنگینی د ہنے اِ تساع میں ترکت کرتے ہیں ' اور اکٹر اِن کے معرافوں کی مدم کھایت (incompetence) بدا موماتی ہے۔ مکن ہے کہ از منوں میں بھی بہت زیادہ اِتساع واقع ہومائے 'اور اِس تکے ساتھ اکٹر اذینی دیوا رول کی کسینقد ۔ بیش پر ورکشس ہوجود

هیمی اوارت به تلب کی برمی بوتی جهامت و امیسی که پیش قلبی اسمیت (præcordial dulness) کی زیارتی سے یا لاشعا عون سے پیلا شدہ قلبی حیا ایس کی كلانى سے ملا ہر ہوتى ہے ابیش پر ورشس الا إنساع الا إن دونوں كے امتر آج كيے با عن موسکتی ہے الیکن اغلب میں ہے کہ اگر اِن طریقول سے کوئی بہت بڑی کائی مثاہدہ میں آئے تووہ خاصکر اِ تسائع کے باعث ہوتی ہے۔ کوئی کلانی جوعظم الننس سے دأمیں میانب مو ا ذینی *اِتساع کے باعث ہوتی ہے ، کیونک* اُ ذینی دیوار م اگرچہ ^ا وہٹر پیرزا بھی ہو^ہ تا ہم بالکل میتلی ہوتی ہے۔ اور یہ تعریباً ہمیشہ دائمایں ا ذین کا اِنساع ہو^{اک}ریس^{ہے} لیکن مطرانی مرض کی متعدد اصابتوں میں ' جن میں بائیں افرین کی ہے انتہا کلانی ہونی ے ایس اذین فے حقیقتاً قلب کا دایاں کنارا بنا دیا ہے (11) اکور وال اذین بمیشه دائیں طرف ہی کلافی یا فتہ ہوتا ہے۔ بین الاضلاع فضاؤں می قسع ازین برانحسال رككر اكفوضرب قلب كومسكس كرلينا مكن اوتا يد مكن بهدك بأمي اذين كا اتساع مرى يدوباً وُوالْكِر عُسرالبلع (dysphagna) بيدا كردسه اور بأيس عبابي عصسب (phrenic nerve) يردبا وُرُ الكرنظام رأيس حجاب ماجز كا إسترفا رمبي بيدا كردس ورا قم الحروف فے ایک مریض میں دیکھاہے۔ مکن ہے کہ وہ بائی شش کے زیریں جعے کو یا بائیں شعبند کو دبا کر بھا دے ایا بائیں عبل الفسوت (vocal cord) کا شکل پیداکردے۔ بب مریض لاشعاع میوب (انبوب) کی طرف مندکرکے اور اپنا وایال شانہ مَثْ بدی طرف رکھکورچی وضع میں کھڑا ہوتواُس کے بائیں اذین کامشا ہوہ لاشعامی پُریسے ركيا ماسكاك - اكر بريم (barium) سعمرى كا فاكدما مل كيا مائ تويداني ملك

المعنوں کا اتساع 'پیش قلبی اصمیت (sternum) او۔

المنعا ی جیا وں کی زیا دتی عظم العقر (sternum) کے بائیں طرف بیدا کردتیا ہے۔

انتہائی اصابوں میں بہ جیا وں سینہ کی بائیں دیوا ترک پہنچ مباتی ہے اور مُدُمُ الم بغیر میں بہ جیا وں سینہ کی بائیں دیوا ترک پہنچ مباتی ہے اور مُدُمُ اللہ بغیر میں مصوب کیا جاستا ہے 'ایکن مکن ہے یہ مُعتنزا ور کمزور ہو۔ بائیں طبین کے اتناع کے ساتھ اللہ ایک انتمانی فریر (systolic murmur) موجد ہوتا ہے 'و و دائیں مطرانی بازوی (mitral regurgitation) کے باعث ہوتا ہے 'اسی طرح دائیں بطین کا اتساع اکثر متلثی بازروی (tricuspid regurgitation) ہیدا کردتیا ہے۔

تعریض (compensation) کانتال

فشل نعویض ، تلب کی دونول ما نبول میں بیک وقت ہوتا ہے، یا راست جانبی ، بیب مانبی ہوا ہے۔ آخرالذكرنستة مال بی میں دریافت مواہد۔ ا مراضبیات - تندرست موضوع برلا شعاعی مشا برات کرف برید است ہواہے کننہیق کے ختم ری فلب ا ور میں پیم وں میں اس سے زیا دہ فون ہونا ہے کہ متنا زفیر کے حتم ری^ں نیز ^این کہ حزما ر بند کر *کے زُ*ور دار شہنن کی کوشش کرنے میر فلب اِور بعیر ہے خون کسے متعن ہوجائے ہیں [' کمر (Muller) کا سخر ہے ' مالا کہ مزمار مندا کے زور دارز فیر کرنے پر بہنون سے خالی ہو جاتے ہیں [والسلوا(Valsalva) کا تجربہ] مبلّا معمنهٔ نمبر ۱۳ میں دکھا یا گیاہے۔ ان مثا ہات کی وا مرنوجیبہ بیہ ہے کہ بأیں اور دائیں بلينول كه رميان أيك مارضي البهم أمنكي واقع موجاتي في ملبعي مالأت بي أيك دی جوئی منت کے اندر ایمینی وائیں دائیں بطین کی برآ مدا ورنظامی دوران ون میں ب*ائیں بطبین کی برآمد مساوی ہوتی ہیں ،* اور اگر بہ رونوں برآ مدیں مساوی نہ ہوں تو بعيدي السلوا كم تحروم المعتمن بوجاتين - والسلوا كم تجربي بي خون س ووم ہوجاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رائیں بطین کو بھیمیٹروں کے اندر ایک بلند نمبت دبا فوسمه نملا ف فعل کرنا پڑتا ہے اور ہائیں *بطین سے م*قا بلہ میں اس *کاعا مِن اور* بنشل ہوما تا ہے۔ حمر کے بخرب می دائیں بطین کومننی دبا فیسے مدد ملتی ہے اور پیسے مو یس کسس سے زیا وہ نول بیپ (pump) ہوتا ہےکہ متنا باً میں بلین کے ذریعہ مارج



الفد است په طبق تا بین کے فتم برت (والسواکا نیز :) سانس کوروک کرت، د کے خلاف زور دارز فیرکرنے کی استهانی کوشش کی جاتی سے نبین کلائی مجسوت نبیس کی جاسکتی تھی سیکن بروہ برسایہ وُ النے برفلہ نجفیف حرکات کرنا ہمو ا و کھائی دیا ۔



. د سینه طبعی مینی کے ختم پر اسانس کو روک تسدد کے خلاف ننمینی کرنے کی انتہائی کوشش کی جاتی ہے ۔ (جی ۔ پی کروڈن G. P. Crowden) کا مشاہدہ جو مجلہ شفاخانہ کائی سے طبع کیا گیا)

بالمقابل مغر 252

بوسكتا جه برا متقان اضافي جب بانبي فشل ظامر رباه -

معنلی قلبی انحلا کا سے آب منیس براب سدود دوری نفسی آل کے ذریعہ
متا ہات کرنے سے یہ نابت ہوا ہے کہ قلب اور یوی دَورکا ایسا احتال ' بوکر س و
یب مابنی مشل کا بیتے تھا ' عضلی منت کی اثناد میں پیدا ہوا اور آرام کے پیلے ایک دو
منٹ کے اندر غائب ہوگیا ' اور اس صورت مالات کو آسیمی کے ذریع تشکیاں ہوئی
منٹ کے اندر غائب ہوگیا ' اور اس فومیت کا ماد چپ جانبی فشل مقابلتہ بہت مام کہ
اور اس کے نیچ کے طور پر آ نبی مال و میت کا ماد چپ جانبی فشل مقابلتہ بہت مام کہ
شنج واقع ہوتا ہو اس فومیت کا ماریس ' مبکد استا کے درید معکوس طور بیشعبنوں کا
شنج واقع ہوتا ہو اسے ' اور انہا نی اصاب تول میں ' مبکد استا کے بعد از دیا واقع ہوجا اسے
موٹے چوٹے چوٹے شہنتی ہا نبول (gasps) سے تعلیم ہونے والا المالت نبر کھنگر و دار زفیرا فی
موٹے ہو ایک مما فظ میکا نہ ہے کیونکہ المی لت پنریز فیر ' بیمیسیمٹروں کے اندر دبا وُ
کوزیا دہ کردیتا ہے اور اسطرح بیش فعال دائیں طین کوروکا ہے ' نیز دروں رہی دباؤ

دومانبی بو - ارزشا ماست اکثراس مبانب کومتا ٹرکرنے کا دجمان رکھتے ہیں کرجدم مربیز لیٹتا سبھ ۔

کبدی وریدی تخانی وریدا جون کے اندر دائیں اذین سے القدر قریب وا ہوتی ہیں کہ مرض قلب کا اثر جگر کے دوران فون پر آبا نی سمجہ میں اسکیا ہے۔ مگر بہت بڑا ہوجا کہ ہے اور ترقی با فقاما بو بہت بڑا ہوجا کہ ہے اور ترقی با فقاما بو بہت بڑا ہوجا کہ ہے اور ترقی با فقاما بو بہت بڑا ہوجا کہ ہے اور سبید دصنوں کا ایس عمیب منظرا فتایار کرلیتا ہے ، جس برجو نری میں سرخ ، زرد ، اور سبید دصنوں کا ایک عمل کیا گیا ہے ۔ تراکشت پر ہر لفتک میں آب جگر (nutmeg liver) کے نام کا الملاق کیا گیا ہے ۔ تراکشت پر موفعا کٹ کئی ۔ برعی ہوئی کبدی ورید کی بینک (rootlet) جا گریں نظر آتی ہے ، جوموفعا کٹ گئی ہے ، اور لفتک کا منطقہ ہے ، جو اس کے اندر معنوا، مجبوس ہونے کی وج سے ایک زرور نگ کا منطقہ ہے ، جو اس کے اندر معنوا، مجبوس ہونے کی وج سے ایک زرور نگ کا منطقہ ہے ، جو اس کے اندر معنوا، مجبوس ہونے کی وج سے

ایا ہے نیکن گفتک کا ہیرونی منطقہ سپیدیا رمادی رنگ کا ہے ' بو نود بین کے نیمجے اسے فلیوں پڑھ کا ہے ' بو نود بین کے نیمجے اسے فلیوں پڑھ کی الست ہیں ہیں ۔
مسیو فلیتوں پڑھتال نظرا آتا ہے جو ترتی یا فد اِسبوج سے نسبتہ بڑھ اور سیا ہ رنگہ ہے ۔
میکن کے درکھ یا المرتب امتلاء کی وج سے لیفی یا فت کی کچہ مقدار نمویا ب
ہوجائے ' اوروہ اپنی بیقا عدم تو زیع اور انقاب میں سے سطح کی وراتی حا لست
پرانکردے ۔

پیرا کردے۔ طحال سخن اور سمیل سے زائیں سے اور موباتی ہے اور اگرجہ اس کی جساست مختلف ہوتی ہے سیکن اکثر وہ مجوئی ہوتی ہے۔ معلاے اور آئت کا اِ متلا ' طمال کے اسلاء کی طرح ' بلاٹ بر بگر کے اسلاسے ٹانوی فور پر ہواہے کیونکہ اِن امتاء سے ماخوذ وریدیں خود کو بابی ورید (portal vein) کے اندرخالی کرتی ہیں۔ فتائے مناطی منتلی ہوماتی ہے ' اور مکن ہے کہ موت کے بعد عروت کا بڑا تمدد ' اور معض او قات فتائے مناطی کے جوم کے اندر زفات نظر آئیں۔

عضار فلي المراض النهاب عضاد فلب

(myocarditis)

الهماب عضلة قلب يا توحاد موسكت به يا مزمن - مزمن الهماب عضلة قلب (chronic myocarditis) معنى تغير كم آخرى درج من شأت موسكتا به و اور أس كا ذكر لينى انخطاط كه بيان مي شال به (طاخط مواكلامنی) موسكتا به و الهما ب عضلة قلب (acute myocarditis) بينة حي روائز كه مز و كه طور ير الهماب عضلة قلب (pericarditis) يا الهماب قل (endocarditis) كم منز و كه طور ير الهماب ا ومور (pericarditis) يا الهماب قلب عضلة قلب كم منطق من واقع الوتا به اور بعدي بيان كيا مائك كا منكن عضلة قلب كسى مى ما و مخاري ما وف الهرس ما وف الورخاق وبانى (طاخط بو) من علامات ست زاده مميز

بوت بر منه فلب كا اكم زياد دمقاى التهاب اللي علقبت ورضبيث التهاب و الما علق التهاب اللي علقبت ورضبيث التهاب الما علق التهاب الما علق التهاب الما علق التهاب الما على المحمد معلى كاتقت التهاب معلى كاتقت التهاب على المحمد على المحمد التهاب على المحمد التهاب التها

انحطاطعضائ فلب

ے ہوئے ہوماتے ہں۔ اول الذكرمالت یعنے حتینی سمی انحلیا ط میں منسل ریٹکہ نور دقیق شمی درات کامسکن بومات بین موحقیق لحی مناصر (sarcous elements) ی جگہ لے لیستے ا ورمضلہ کی اتنی ہی انتباض پذیر ؛ فت کو کمف کرد ہتے ہیں - بیتیتی شمی إخمطا طامنى لمنب نسكلون من واقع بوياسيد ، يمكن بيد كمفنلي ديوا ريجيا ب لوريرا وُف ہومائے' یاشمی تغیرات ایک جونی میکنی تک محدود ہوں'یا اس تہ تک جو اُ رمور کے نیمے واقع ہے' مبیاکہ الہاب مضار ُ قلب (myocarditis) میں بیان کیا کیا ج یا به انخلاط قلب کی اندرونی شطح تر دهاریون اورخلوط کی معورت میں ہو۔ جب پہ عار ضد عمومی ہوتا ہے تو قلب کا قوام نسبتہ زیادہ نرم ہوما ،۔ ہے وہ زا دمآسانی کے راہم ررید ہ (lacerated) ہوجا تاہے ' اس کا رسک بھیکا گلا بی یا زر د ہوتا ہے' اور ماوت عضلی با فت کے دمیلا برمانے کی وجسے وہ ممول کی نبست کسیقدرز یا دہ بڑا ہوما ہے۔ جب چربی خلوط یا دمعاریوں کی صورت میں مبتی ہے تو اِس سے ایک میز تعل پیرا ہوماتی ہے 'اور میکے زر در تک کے خطوط نسبتہ زیاد مرسما و مُرخ مفسلہ راکٹر ایک چت کبری بلی محانثانات کی لمرح مرتب ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ ترمضلات ملیمید (musculi papillares) پر دونوں بطینوں کی مجھلی دیواروں پر ، اور دائیں طین میں نامىل ىردىك**ى ماتے ہ**ىں شىمى انحلا طابىش بروردە قلوب برمام ہوتا <u>س</u>ەبى ، اور اسوفت بمي موجود بوسكما بح جبرعفدلطبي رجك كابو-

بسکون امراب ورحائ المحاری المحاری المحاری المحاری المحری المحری

اکید دتمین زاتی مالت کی وجه سے اقلب کا قوام متبدّل ہوجا آہے اور یہ مالت فالب المباشعی انحلا طبیعہ مبلاگا : نہیں ۔ تب معویہ اور کما نفس (typhus) میں زرد کا خماق وائی ، چیک اور کم سازیں ہی مالت ہوتی ہے شعمی انحلا ط التجابِ مضارِ اللہ مناق وائی ، چیک اور کم سازیں ہی مالت ہوتی ہے شعمی انحلا ط التجابِ مضارِ اللہ اللہ اللہ اللہ من اور کرنے کے مرض کے تعلق میں دیکھا ما کہ ہے۔

تعلب کی شعبی بیش بالمیدا گی یا در دیختگی سابق بی به ایک مدالاً من کے لور پر بیان کی ماتی تی - اس بی ندر ف قلب کا بیرون شم سے لدا ہوا ہوتا ہے ، بلک شمی دماریاں مسلی دیواروں کے اندرکسسی ہوئی نظر آتی ہیں - یہ فوجی کی امیازی معمومیت ہے اور اِسی عنوان کے تحت بیان کی گئی ہے -

کی بحکسیدینی یا توسیلی بافت مے لیسی ہے ۔ بیٹر سٹالوں ہی یہ تغیر نی ہوتا ہے ' بس کا کی بھر سیدینی یا توسیلی بافت مے لیسی ہے ۔ بیٹر سٹالوں ہی یہ تغیر نیز کرنی ہوتا ہے ' بس کا کہرائی میں سبید ' زردی الل سبید ' یا بمور سے دیک کی تغیر یہ ہوتا ہے کہ مضلی برم کی گہرائی میں سبید ' زردی ایک نلف ' فاصل کے زیری ایک نلف ' فاصل کے زیری ایک نلف ' مضلات ملیمی ' اور ببض اوقات مرضی معرا فات کے قامد علی کو اور کا ہے کہ بطین تقریباً تمامتر لینی ساخت میں مُبتدل کرتا ہے ۔ مرف کمبی کہی ایسا ہوتا ہے کہ بطین تقریباً تمامتر لینی ساخت میں مُبتدل ہوجا ہے ۔ میف کو بیسی مورت میں بھرا شدہ قلب عمراً بیش پروردہ ہوتا ہے ' اور کمن ہے کہ وہ بامرکو اُ بحرکر منسی بھرا ہوتا ہے ' اور کمن ہے کہ وہ بامرکو اُ بحرکر ایسا فکلا ہوا ہو کہ ایسا وی اور سابنا دے ۔ ایسا فکلا ہوا ہو کہ ایک نمایاں اور سابنا دے ۔

بحث اسباب سليني انخطاط اكزروما تزى التهاب مفسلة قلب (rheumatic myocarditis) انتجربوا بدا ورزياده نمايال اصا بتول بن (rheumatic myocarditis) ورول قبي (endocardial) درات كي اورزياده نمايال المرات كي موجود كي بعض اوقات اس ك التهابي مبلاركونلا مركرديكي (مزمن المهماب عضلة قلب interstitial وضلك لتهاب عضلة قلب chronic myocarditis قلب

شراً مِن كى مسدودى كے مجى باعث بوتا ہے ، اور مكن ہے كشمى انحطاط كے ماتحة مكارم فرامن كى مسدودى كے مجى باعث بوتا ہے ، اور مكن ہے كشمى انحطاط كے ماتحة مكارم بوء ان مالات میں نون كى رسد فاعلى مضد كے نفذ به كے لئے ناكا فى بوتى ہے فرائد مضل بو الله فرائس كى مكر شمى ياليفى بافت لے نبيتى ہے ۔ اگر اكليلى ترائس كى مدودى مضل بدول بور ماسى تي موم نى ہے تو تقمى انحطاط بيدا بوجاتا ہے ليكن أرمدورى نما من تي يى كے ساتھ واقع بوم نى ہے تو تقمى انحطاط بيدا بوجاتا ہے ليكن أرمدورى نبيا دوم من بوتوليفى آخير كا فليد بوتا ہے ۔ قلب من مليف الكيلى علقيت يا افعام نبيا دوم من بوتوليفى آخير كا فليد بوتا ہے ۔ قلب من مليف الكيلى علقيت يا افعام (arterio-sclerosis) كو الكيل منظن (chronie bronchitis) كا ايك تا نوى نتيج بھى بوسكتا ہے ۔ نيز وہ عموقا مز من شعبى التها بنغاخ كے ساتھ مثلازم ہوتا ہے ليفى انحطاط الكوليت يا طويل لمات استالاً (congestion)

کی وجہ سے بوسکتا ہے۔ آتشک ۔ اِس مِس کے ضراِت التہابِ تمراِ فی (arteritis) لینی ندا

(اَتَشَكَى المِمَا بِعضل قلب=syphilitic myocarditis)، ليني تورول، يا واضع صمغيه (gumma) كوريروا تع بوت من مكن مك يصمغيه بُبني (cheesy)

ہو، آوریہا تک مکن ہے کہ مرکز میں ترم اور ما ہو اور قلب کے مفتل جرم کو اسی طرح اور آس یاس کے مقتل جرم کو اسی طرح کا ادا دی مفتلات کو اور آس یاس کے مقدر التباب بدیا کردے۔

ما و ف ارتيجس طرح كه إرا وي عفلات لو اور اس باس ميتدر البهاب بيدارات ممند (gumina) عموا بطينول كي ديوارول بي واقع بوتاسيد ماسواست ان طلامات

ك و حضلا تلب ك انملا ط ك عنوان ك تحت بيان بوغيك بي، وه اوركوئي مميز

ملامات نہیں پیداکرتا یعض اوقات اذین بطینی نبٹرل (A. V-bundle) او ف موکر ملائمید آیڈم اسٹوکس (Adams-Stokes' syndrome) پیداکردیتا ہے۔

سَّرُدُونَ عَلَى مِن (tubercle) - التهابِ ما ومورك تعلق مي دَرِنُونَ كَا بَنا شَا وَنهِين.

مب ایسا ہوتاہے تو وہ سیدی اُس را دی ایا زردی اُس آریکا (granulations) مب ایسا ہوتاہے تو وہ سیدی اُس را دی ایا زردی اُس آریکا (pranulations) کے طور پر اُس میٹ یا مفالے کا ذب کے خور (visceral pericardium) کی سیم میں کیا بعض او تا سے مقیقة حتائی تا دمور (visceral pericardium) کی سیم میں کیا بعض او تا سے مقیقة حتائی تا دمور (visceral pericardium) کی میں کیا ہوئی کا میں کیا ہوئی کا میں کیا ہوئی کا میں کیا ہوئی کا میں کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کرنے کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئ

تہ کے نیچے با مے جاتے ہیں۔ وہ عموی مدن کے دوران میں واقع ہوسکتے ہیں اور کن اورکن سے کہ دوران میں واقع ہوسکتے ہیں اورکن سے کہ دوسری جگہر تی افتا نانوی مدر ان موجد ہو۔ ان مالات میں شفیص مرف المتالج مو

پیدا ہومانے سے ہوسکتی ہے الیکن یہ یا در کھنا چاہئے کہ اس کے علاوہ ایک المهائی مور ا وی ترفی نہیں ہوتا اسٹی رہوی کے دوران میں پریا ہوسکتا ہے۔ ورنہ کے مدا مداجاؤ (isolated deposits) نبایت شاذیں۔

انخطاط عصلة فلب كے علا مانت - ابتدائي اصابتوں مي مريغ منت پرسانس كى مجول مانے كى نسكايت كرتاہ ، مكن بے كم بن قلبى درد موجود ہو، جوورت ا کے بعد معلوم ہو، یا واضع ذبی حلے(anginal attacks)ہوں مکن ہے کہ مریفر ماغی حلول (cerebral attacks) میں بنلا ہومائیں ' جن کے سانقہ بیے ہوشی ا ورتشخیات ہول' لبکن یہ حلے فار آ قلبی میکا نیت کیسی ایسی فیر طبعی مالت کے باعث ہوتے ہیں ، جیسے کہ قلبی مسدوری (heart-block) ' یا عصیب تا سُیه کا ہیجان (vagal stimulation) -المشتها بمیشه کم بوتی ہے، اور مکن ہے کہ مریض سوء مضم کی شکا بیت کرے یعض اوفات مرفِ إنميس علا ات كى شكايت بوتى ب اوروريا فأت كرف يرمحنت كرسف بر سانس ہیولینے کی سرگذشست سے بہتہ میلیا ہے کہ معدی علامات کا اولی سبب قبلب ہے۔ طبیع ا مارات جومضار تلب کے انحلاط سے نسوب کیئے مانے ہیں یہ ہیں،۔ كرورمَده انقلب، جس كرساته قلب كى پېلى اواز دسيى بوتى بيد، بومكن بيك اور کمی رفته ایر دوسری آواز کی شدت کے برابریا اس کی سبت کم ہومائے شدائیاز کی اِس کمی کی وجہ سے مسماع العدر کے ذریعہ امتحال کرنے پر آوازیں کی۔ ہمک توعیت کی بنوعست انبیا لمی وفغه (tic-tac character) بوماتی بی اوران کی به نوعست انبیا لمی وفغه كه إنبا في معرسه اورمبي زياده نمايال موماتي هيم كيونكه وم وازول كوزياده مساوی ممکن (more evenly spaced) بنا ریتا ہے۔ قلب متسع یا یا ما آ ہے ۔ مال ہی میں عضلاً قلب کے تغیرات کل ہرکہنے والے مربینوں کے ایکوہ میں علا ات (symptomatology) کا نہایت غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا گیا ہے (12) - يدا صابتين نهايت عام لوربريائي ماتي بي - مريض زيده عروال بون ایں - اس سانس بولنے کی شکالیت ہوتی ہے، جو ابتدا ، محنت کرنے پر بیدا ہوتی بعد ایکن بعدمی وه کم و بیش متنال فور پر بهور (dyspnæic) بوما تدیمی بعض بینی مر مین اسٹوکس کا تننس (Cheyne-Stokes breathing) میتا ہے اور بعض دوسر

مرمینوں میں ہے انتہا گسستہ نفسی کے ناگہا نی حلے ہوماتے ہیں ، جونما مسکررا سے تھے وقت ہوتے ہیں' اور جوا کی اصطلاح قلبی د ملہ (cardiac asthnia) کے نام سے بان کئے ماسکتے ہیں۔ دوری ُبرکے یہ حلے بسا اوقات ایک کسیقدر ہے قاعب او مِین بِرِی مِنْنِفس کی مَبری مِینت ہوتے ہیں مِنَن ہے کہ انتہا تی نفس (orthopnea) موجود ہویا نہو۔زرا فی مثا ز کوریر غیرموجود ہوا۔۔ ۱ در اگر موجود ہو بھی تداس کی مقالِر اننی نبیں ہوتی کہ جو برکی توجیہ کے لئے کا فی مجمی مائے ۔ قلب کی شرح عموما زیادہ ہوما ہے ممکن ہے کہ ضرب کی میکانیت طبعی ہو الیکن عام بیقا عد گیاں اسی کہ وہ جو تلبی سدودی ا ذینی رکشیکی انتیاض (auricular fibrillation) ستزاد انکما شاست ' اور تباول (alternation) کی وبدسے ہوتی ہیں ، موجود ہوسکتی ہیں ۔ تعاب جسا مت یں زبارہ ہوجاتا ہے ۔خربرات (murmurs) موجود ہوسکتے این ۔جسمانی تنش در مُطبعی سے نیچے(subnormal) ہونے کا رجمان رکھتی ہے فشل قلب کے ترقی مافتہ امارہ جیسے که اِستسقائے کمی(anasarca) بیمیپیداروں اورمبگر کا اِمثلاء ، موجود ہو کیکتے ہیں۔ نون میں بوریا (urea) کا کسیقدرا حتیاس (retention) ہوتا ہے ' لیکن اُسس کی تُدرين(values)انتها ئي نهين هوتين 'يعضريا وهست زيا ده اء ، فيصدي اورعموماً ۵. د. فيميدي (لمبعي قدر ۱۰ د و موتي مهد) - ألبيومين بولبت معدباك (casts) کے موجود ہوسکتی ہے' اور اوقلنیکہ وریدی رکود (venous stasis) کے امارات موجود نہویں ، تا رورہ مجم میں زیا وہ ہوما آہے۔ امتی ن بعدالممات ظیا ہرکرتا ہے کے تعلب کی تر قی یافتہ اکلیلی میلابت (coronary sclerosis) موجود ہے' اور مکن ہے کشیمی خطا بمی موجود ہو ۔ گردے عرون کی دبازت اور کسیقدر لیف (fibrosis) اللهمر کرستے ہیں' جو اکثر اکیے مکبتی دا رنوعی*ت کا ہو تا ہے۔ گو کییں (*glomeruli) اکثر ممثلی یا در بَعْض زما جی آموتی ہیں ' لیکن گو بیوں کا رکسیع ا نطل س نہیں ہوتا' جیسا کہ مزمنُ رَمْنَیْ لہمّاکمِیْ میں اسوقت ہوتا ہے جبکہ مریض تسمر بولی (uræmia)سے مرگیا ہو ۔بعض ا وقاست اِن مریفیوں کو قلبی کلوی اصابتوں (cardio-renal cases)کے نام سے بیان کیا ما آ ہے الیکن برمیاف معلوم ہواہے کہ آگر دیگر دے ہمیتہ کمچہ تغیرات ظاہر کرتنے ہیں ا اورشیخوخی شریان میلابتی گردے(senile arteriosclerotic kidneys) کملاتے

علل ج برصنعه 276 برغور کيا گياسيد -

انتفآق فلب

(rupture of the heart)

ہوماتی ہے۔ ننا ذاصابتوں میں کچر کھنٹوں بکر دنوں کے زندگی قائم رہی ہے، مرکب ساتھ شموب (pallor)، ٹھنڈے بیسینے کرورنبض، اورننفس آ م کے فرر پر (sighing) ہوتا ہے۔

فلب كاانورسا

قلب کے انور سمے ماویا مزمن **بوسیکتے** ہیں۔

حاد انورسے دواریقین کے تقریم التہاب دون قلبہ الورسے دواریقین کے تقریم التہاب دون قلبہ الورسے دواریقین کے تعریب کرمس طرح نہیں کے حس طرح نہیں کا مسلسک وروں قلبہ (malignant endocarditis) کے تحت بیان کیا جائے گا کا التہاب دروں قلبہ (pars membranacea septi) یا فضائے فیرمنوظ اور یہ فاصل کے جزو غشائی (pars membranacea septi) یا فضائے فیرمنوظ کے انور سما نیز معرا مات کے انورسا کا کسیقد داکہ الوق سبب ہے۔ بنو غشائی کے انور سما مورتوں میں تائے انورسمائی بائیں بلین کیا نہیں جنام صورتوں میں تائے انورسمائی بائیں بلین کیا کہ کملتا ہے۔ یہ مالت دوراین زیر کی بین شناخت کے قابل نہیں۔

قلب کے مزمن افور سے موا اینی انحلا کو کسلسلای پدا ہوجاتے ہی۔

ا وُف شدہ کہذا اپنے عضلی ریشے کے لینی افت میں ہوں تبدیل ہوجانے کی وجسے

ایک مقام پر کمزور پڑجا گاہے ' اور خون کے دباؤے شمسے ہوکر ایک تا چربن جا ہو ایل لین افور ساؤل کا عام ممل وقوع ہے ' اور دو رہے بین کہ غول کے افور ساؤل کی صرف چند ہی مثالوں کا انداج ہوا ہے ۔ مین اصابتوں ہیں سے دو میں ہواس پر واقع ہوتے ہیں 'مکن ہوان تا چوں اور بطین کے درمیان کا داست ہوا ہو جو تو دتا چرک ہے ' یا مکن ہو کہ یہ داست نہا ہو۔ جب یہ داس پر بریا ہوجاتے ہیں تواول الذکر قسم زیا دو اکٹر الوقع ہوتی ہے ' یعف یک افور ساکہ نا کہ بلین کے ساتے مسلس ہوا ہے ۔ آ ٹوالڈ کر قسم زیا دو اکٹر الوقع ہوتی ہو ۔ آ ٹوالڈ کر قسم زیا دو اکٹر الوقع ہوتی ہو ۔ میں این کا مقابلہ نشک کر سے بریوں (nuts) ' مری کے انڈوں ' یا چو کے مسلس ہمامت میں این کا مقابلہ نشک کر سے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ' یا چو کے مسلس میں سے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ' یا چو کے مسلس میں سے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ہیں ۔ اِنکی مسلس میں سے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ہیں ۔ اِنکی مسلس میں ایسے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ہیں ۔ اِنکی مسلس میں ایسے کیا گیلہ ہے ۔ چند اِس سے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ہیں ۔ اِنکی مسلس میں ایسے کیا گیلہ ہو ہوں ہے کہ ایک میں ہیں ۔ اِنکی مسلس میں ایس کے بہد اِس سے بہت زیا دو بڑے یا نے کے ڈیوں ہیں ۔ اِنکی مسلس میں کو سے کیا گیلہ ہو ہوں سے کیا گیل ہو ہوں سے کیا گیلہ ہو ہوں سے کیا گیلہ ہیں ہوت نے دور بڑے یا نے کے ڈیوں ہوں ۔ اِنکی میں میں کیا گیل ہوں کیا گیل ہوں کیا گیل ہو ہوں سے کیا گیل ہو کے کو ایک کو دور سے کیا گیل ہو ہوں سے کیا گیل ہو ہوں کیا گیل ہوں کیا گیل ہو گیا گیل ہو گیا گیل ہوں کیا گیل ہو گیل ہوں کیا گیل ہوں کی کے انگوں کیا گیل ہوں کیا ہوں کیا گیل ہوں ک

علا مات اگرمو و دہول توان اصابتول میں جہاں انورسما معند مقلب کے انحطاط کے بعد انوں مور پرواقع ہوا ہو ؟ اسی انحطاط کے بعد انوں طور پرواقع ہوا ہو ؟ اسی انحطاط کے ہوتے ہیں۔ لاشعاعی متما تصنیع کا ایک مغیر کا کا معام کے اندر انورسماء کا دفعتہ انشقاق ہوجانے سے موت واقع ہوگئی ہے۔

نوبالبيركب<u>ال ورطفيليا</u>

نوما بد (neoplasm) قلب براس کا حد مختلف شکول بین بوتا ہے المنی سامد (neoplasm) کی سامد (neoplasm) اور الانمی سامد (neoplasm) کی سامد (neoplasm) کی سامد کی صورت بیں ۔ اکثر اوقات واسلی غدد کے لی سامد یا لمنی سامد کے مقد کے لور برقلب اور نوب بوجا آ ہے ایسی صورت بین برسامد براہ اور دو بین کر مقد کے لور برقسایال اور بوتا ہے اور ایر برخس اور برخس اور اور برخس اور برخس اور برخس اور برخس اور برخس ایک کا نوبی متیجہ ہوتا ہے ۔ ایک مند و اولی جا کو کا بونا نہا بہت شا وہد ۔ ایک نانوی متیجہ ہوتا ہے ۔ قلب میں ایک مند و اولی جا کو کا بونا نہا بیت شا وہد ۔ ایک است میں ، میں میں سامد دائیں بلین اور روی فتی برمل آ ور بوکر اُن کو برغ ملموں اصابت میں ، میں میں سامد دائیں بلین اور روی فتی برمل آ ور بوکر اُن کو برغ ملموں کرکیا تنا ، مسلسل شدید زراق موجود تنا برمین کی موجود تنا سامند میموگوبن دمویت اور برمین کا است اور میں ایک است اور میں ایک دروں مدری بالیدی کی موجود کی برسے دخص اصابت میں اس کا است اومین ایک دروں مدری بالیدی کی موجود کی برسے بعض اصاب توں میں اس کا است اومین ایک دروں مدری بالیدی کی موجود کی برسے بعض اصاب توں میں اس کا است اومین ایک دروں مدری بالیدی کی موجود کی برسے بعض اصاب توں میں اس کا است اور میں ایک است اور ایک است اور میں ایک است اور ایک اور میں ایک اور میں ایک است اور میں ایک اور اور میں ایک اور ایک اور میں ایک اور ایک اور میں ایک

کیا جاسکا۔ والشے(Walshe) ایک مریش کی مالت کا اندلاج کرتا ہے جس من اُسی اذین کی اگلی دیوار کے مرطان میں مبدّل مجانے کے با دجود الیبی کوئی مرمر باتی شہادت موجود مزمّی جوقلب کی طرف اشارہ کرے .

طفیلیات گمعی مرم قلب کے اندر کیسیتی دویوہ فالب کے اندر کیسیتی دویوہ (hydatid)
(cysts) نمویاب ہوکراپنی بالیدگی کے دوران میں یا تو تا رمورکی سمت یں یاکسی ایک
کہف کے اندر اُ بحرآتے ہیں ۔ یہ دویرے منفرہ ہوتے ہیں یا مکن ہے کہ اِن کے اندر
دور دویرات (daughter-vesicles) موجد ہول۔ قلب براُن کے اثر کا انحصار بابنہ
اس امریر ہے کہ وہ بڑمورکنتی جامت اختیار کر لیتے ہیں۔

خزیمی فیتید (tænia solium) کا نبان ک نبید (cysticercus) بھی بعض اوقات فلب کی دیواروں میں یا یا جاتا ہیے ۔

حملئ روماتزمي

(RHEUMATIC FEVER)

حاداورتعت الحادروما تزم

(acute and subacute rheumatism)

تب روماً تزی ایک حموی مض ہے ، جس میں یا تومفاصل کا کیا قلب اور اُس کی جملیوں کا کیا ان دونوں قسم کے مقالات کا ایک ساتھ ما دالہّاب واقع ہوما تا ہلے۔ روما تزمی عوارض کو حاد اور سخت الحا دروما تزم اورزفن (chorea) پرشتمل ہیں کوم اُس تغرر کے جو اُن سے قلب کو پہنچ ما تا ہے کہ بچوں سے لئے


له درواتنم اوررو مینک که الفاظ ایک بینا نی لفظ آرسه انوزی میکمنی بهاؤی این الفظ آرسه انوزی میکمنی بهاؤی بین اورجایک دومرے بونانی لفظ کتف ر (نا زلت) سے تعلق رکمتا به دروینک فا مامن سے تیز کا جا میٹے جو کہ بعدی میان کا کئی ہیں۔ ماما وروما ترم کو ان مزمن رویک اراض سے تیز کرنا جا میٹے جو کہ بعدی میان کا گئی ہیں۔

نها بت شديد حطروكا باعث بوت أبي -

نعب نیز نہیں کہ یہ ملی قرمزلی (searlet fever) کے بعد عام ہے۔

امراضیات - اِس بیان کی بہت کچہ ائی۔ کی باستی ہے کردواز بی بہت کہ ائی۔ کی باستی ہے کہ دواز بی بہت کہ ائی۔ کی باستی ہے کہ اور بی بانتین سبب مامل ایک فول باش نبقہ سبب ہے ۔ یہ ایسی لانے ہے جسس کا نبی بانتین (Poynton) اور بین (Payne) کا کیا ہوا کام ہے کہی بہی نبقات سبعیہ تحت الجلای کی میک اصابوں میں دمانی نباعی سیال سے اور فول سے نون سے علیدہ کے گئے ہیں ۔ مال ہی میں فیر معمولی خصائص کے نبقات سبب کی بیات توجہ میڈول ہوئی ہوں ہے ، و ماد دوما تزم اور کوریا میں ملتی سے ملحدہ کو گئے ہیں۔ آبو قلبی مفصلی الی ای مقات سبعیہ (streptococcus cardioarthritidis) کا نام دیا گیا ہے ۔ اِن ا میا بوں کی نبایت فالب تعداد میں فیسلی سیال اور فون کا

کونے پعتیم بائے جاتے ہیں ، جنانچہ اِسی وجسے زمانہ اضی ہیں اِس مض کے جرثوریا ا مبداء کے تعلق ہے اعتمادی تھی۔ فون باش نبقہ سبعیہ اور حاد روما تزم کے درمیان قریبی رکشتہ ہونے کا ایک زیادہ اہم ثبوت ، ہسپتالوں اور اسکولوں برمتعدی سوزش حلق کے عواقب (sequelæ) کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آگر سب عالمی ایک فون باش نبقہ سبعیہ ہی ہو اور دور سے عنویا شکا نبقہ عبدیکہ حرد نبقہ نائر لنی ا وفیرہ نہوں تو مریفوں کو اسے لیکر ۲۱ دن کے کم مت کے بعد حاد روما تزم مہجا تا



شکل ۳۹ - مین لؤکول کے نقشہ کر بن کونون پاش بعد اسمید کی وہسے
سور شس طق تی -ب نقشہ ایک لؤکے کا ہے' اس کو بی بعد سمید کریت سے
سورش طق تی اور بعد میں نبتی سبی البتا بشعبی پدیا ہوگیا - ایک فاموش
وقفہ کے بعد پندر مویں دن ما دروا تزم نمودا رہوگیا (کم ہلیو - ایجے بدیل کے
وقفہ کے بعد پندر مویں دن ما دروا تزم نمودا رہوگیا (کم ہلیو - ایجے بدیل کے
سریف ول علی -

ابتدائی سوزش ملق کے وقت ابو کو نقشہ میں پہلے دن دکھائی گئی ہے انتہ میں جوئے ہوئا ہے جبید جمید میں اخلی میں اخل بہیں ہوا اور 19 ویں دن جب کہ حاور و انتزام نروع ہوتا ہے جبید مسجمید تر انتخاب ہوگیا ہے ، اگر جہ التهاب گرد قلبہ کی بہلک اصابتوں میں یہ ملحی ال اور گرد قلبہ کی بہلک اصابتوں میں یہ ملی الار گرد گلبہ منی خدو ہے کہ خوات کی بہتر ترب زافی اس نظریہ کہ مطابق ہے کہ ما دروا تزم ایک حا و صاسیتی منظر ہے جوکہ ابتدائی نبتی سبی مولے دو ان میں حال کا میں نبتی سبی مولے دو ان میں خانوں پائی نبتی سبی ہوئے دو اور ان ایک اور استدلال جوکیا حاسکتا ہے ہے کہ نون پائی نبتی سبی ہوڑہ و حا دروا تزم کا اولی سب نہیں ہے ، کمکہ یہ ایک خود بینی قشب کے ادخال کو مہل بنا آ ہے اور دی مرض کا برا دراست سب ہے ۔ حال ہی اس کی شہادت حاصل ہوئی ہے ۔

مرضی انترنیخ - روائز می تب کے خاص سانعی تغیات الہاب قلب (chorea) کیر مفصلی الہاب الباب قلب (polyarthritis) ورخت البلدی (carditis) کیر مفصلی الہاب روائل اللہ اللہ اللہ ہی جیسا ہوتا ہے ، سیعظ ایک الہابی من اول میں روعل وراصل ایک ہی جیسا ہوتا ہے ، سیعظ ایک البہابی مرہ بنجاتی ہے ، کو اس کے منظ کا انحصار مقام ما کو ف کی فوصیت پرمواہ ۔ اس روعل کا مطالعہ قلب میں نہایت آسانی سے کیا جا سکتا ہے ۔

واقع بوجا آب، بو مکن ہے کہ سمی الاصل بو ایا خریا کے کفف ہوجانے پر دموی الا کے انقطاع کے مبب سے ہوگیا ہو۔ یا گرہی نہایت عام طور پر اور طیٰ کی برا اور مان کی برا اور مان کی برا اور مان کی موار طاق موار (mitral ring)کے قریب با میں بطین میں عضل میں گہری مدفون نمووار ہوتی ہیں۔

دروں قلبین کا المتراب حاد (modal inflammation) کا نیخه یہ المتراب دروں فلبین کا کم آن المتراب (modal inflammation) کے اونی مانب یا اور کی شد نه ہوتا ہے کہ اس سے مطابی شرف (mtral cusp) کے المینی مانب پر مصابی کی کور کے قریب زیر درول قلبی با فت (aortic cusp) کے بلیت نفیت اورام پیا ہوجاتے ہیں جس سے (subendothelial tissue) کے نہایت نفیت اورام پیا ہوجاتے ہیں جس سے تعدد ارتفاعات بنجاتے ہی شخصیں عمواً دو مسل کیوں (vegetations) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ۔ اوریہ ابتدائر اس خطر ہو اقع ہوتی ہیں جہاں مصاع مدود ہونے پر اپنے رفیق کو جوتا ہے ، ندک مصاع کی آزاد کور پر بعد میں لمتہب رقبہ پر مصابول کا درملہ ڈوسلا پڑ مہا تا ہے ' اور بطینی نون کے کور پر بعد میں لمتہب رقبہ پر مصابول کا درملہ ڈوسلا پڑ مہا تا ہے ' اور بطینی نون کو کرنے این اور کثیرا لا شکال نواتی بعید خلتے تنشین ہوجاتے ہیں ۔ التباب کم ہونے کو نوب نوب سے داروں کا برا نشوہ بحر نوب ماری اس ماری کی مواج کی اس میں یا متوا ترحا دحلول کے بعب مصرابول کا بڑا نشوہ رسنے والے التباب میں یا متوا ترحا دحلول کے بعب مصرابول کا بڑا نشوہ رسنے والے التباب میں یا متوا ترحا دحلول کے بعب مصرابول کا بڑا نشوہ رسنے والے التباب میں یا متوا ترحا دحلول کے بعب التباسیت ادور (pericarditis) کے باب میں درج کی گئی سے۔ التباسیت ادور (pericarditis) کے باب میں درج کی گئی سے۔ التباسیت ادور

المتها ب مفاحل (arthritis) بهلک اصابتوں بی مفصلوں کے اند گدلا زلاب (synovia) اور فائبرین کی دسمیاں بائی گئی ہیں ۔ سپیدخلیات موبود ہوتے ہیں سکی ستیال بھی دیمی نہیں ہوتا ۔ نود ختائے زلابی عروتی اور لمف کی ایک تدسے دُمکی ہوئی ہوتی ہے ۔ جب ایسی مربع کمی ، جیسی کداکٹر دیجی جاتی ہے واقع ، بوجاتی ہے توزلابی تغیرات اِس کی نسبت اور بمی زیا وہ نعنیف ہوتے ہیں وتری فلافوں کے اندر فیر شفاف میصل اور مبزی ائل زود لمن با اگیا ہے۔

زرملدی روه انزمی گره به جوروه نزم کی ایسی ممتا زخعبوصبست سیعیم اس. پدائش انکل وسی ہی ہے مبی کہ پہلے قلب سے لئے بیان ہو مکی ہے ، لیکن اس ی یا ده برنسه پیاند بر موتی ہے۔ وہ مرکزی شرا نی التهاب سے شروع برقق ہے بعركة نواتي ليني البضي درريز (multi-nucleated fibroblastic infiltration) ہوتی ہے جوترتی کرتی ہوئی چند مفتول کے دوران میں آیب چوٹا تدب بنجاتی ہے۔ علا ما سنت - اکثر ایب یا زائد حلول کی اسبق سرگذشت یا فی جاتی ہے ۔ اورلوزنین برسع بوئ نظر آنے ہیں ، یا اُن میں عمیق طاقے (crypta) موجود و نے ہیں ا ربانے سے بیب خارج ہونی ہے کیا غدودہ (adenoids) موجود ہوتے ہی روهٔ تزم کی ابتدا نی علامات کشیمنعسلی البتاب (multiple arthritis) یا ذلابی انت (synovitis) کے اوتے ہیں کی ضرات نمایاں ہوتے ہیں کیونکہ ان محد سائد ورک ا ورئتب موجد د بوتی بیسه- دو سری اصا بنول مین ۲ اورخاصگر بچول مین میلا ضرر تطبی معلمات إمغلاً قلب إنار موركا التهاب مواليه مي (روما تزمي التهاب قلب) مومكن ہے بگار مننی (latent) ہوا محرب کے ساتھ مبہم سے دردوں [جنوشا یددرد ی الیدگ (growing pains) کہتے ہیں آ کی سرگذشت التی ہے اور بدوروا میسے ہونے ہیں ۔ بحيه إن كي وجن فريش نهيں ہوتا ليعن اوقات اكيب البيعه بجير ميں ، جس يرمفصا تيم کی روماً تزم کا حله بوا ہو، ایسا قلبی ضربایا جا باہے جوران ماضی کا ہو اسپے اور موجودہ زلابی البہا کے بمنعصنہ بن ہوتا ، گراس کے ساتھ کسی گذشتند زلابی البہا سب کی سرگذشت بمی نہیں ملتی کی مکن ہے کہ س فن (chorea) کی سرگذشت ہو (آ میے طاخطه مو) -

مفاصل بالل دفعته اون اوسكة الله المرحمة برما المراحمة براء بيلي المرحمة برما المواهد المرحمة المواهد المرحمة المواهد المرحمة المواهد المرحمة المواهد المراحمة المراح

معامل کک ماؤف ہوجاتے ہیں۔ مرض کی وسعت ہمایت تغیر نیدیر ہوتی ہے۔ ایک مریض میں صرف دویا ہین جور ملتب ہوسکتے ہیں اور دور سے میں بہت ہے۔ اولا روما ترجی تب کا ایک اہم ما صدیہ ہے کہ اس میں جب بعض متب مفاصل مدعت شفایاب ہوجاتے ہیں ، تو دور سے مفاصل ماؤف ہونے مباتے ہیں ۔ اور جب بہ ترالذکر مفاصل اچھے ہوجاتے ہیں تو ، زہ مفاصل جا تو نشرہ مفاصل کے مقاصل ایکھا تو نشرہ مفاصل معاصل کے مقاصل کے

خست فعلل بر روا تزی تب کا تولی بوا ہے وہ منوزم کم ، یمونے سے
ایم (tender) اور درد اک ہوتا ہے ۔ سب سے زیادہ نما یا س درم سخسنے بس
(جہاں انصباب آبانی پہانا ہا بسکاہے) ، اور شخسہ میں اور کلائی یں ہوتا ہے ۔
اس کا دیک تیز گلائی ہوسکتا ہے ، بو شا ذہی سارے ورم پر بھیلا ہوا ہوتا ہے اور مکن ہے کہ جکنیوں یا دمتوں کی صورت میں ہو ۔ الیمیت (tenderness) بعنوا قا انہا کی درج کی ہوتی ہے ، چنا نے اپنے ایک سے ، یا جو کو بیڈ منظے پن سے کا فروج کی ہوتی ہے ، چنا نے اپنے ایک سے ماری در دور بود ہو اور کہ کی انہا کی در دور دور بود ہو اور کہنی کے بات قدی کے بعد بھی جاری روسکتا ہے ۔ اس میں درد اور الیمیت ہی روما ترم کے خاص منظم ہیں ، کیو کہ خدیم سا ورم بور وی ہے ۔ الہتاب مفاصل منقرا بولی نے الیک شروع دوتی ہے ۔ الہتاب مفاصل منقرا بولی نے بولی کی نبست بالنوں میں زیا وہ درد ناک ہوتا ہے ۔ بوارح کے عفیلات کا جس کی وجہ فالبًا ومضلی الہتاب (myositis) ہے موارح کے عفیلات کا جس کی وجہ فالبًا ومضلی الہتاب (myositis) ہے ماری وہ فالبًا ومضلی الہتاب (myositis) ہوتا ہے ۔ بوارح کے عفیل ہوتا ہو جو اپنی نوعیت میں مفیلو تھب کے الہیاب (myocarditis) سے ماثل ہوتا ہے ۔ بوار می کے دیر گل نور کا کہ کی الہی الیمیت کی المفاصل کی کسی یا فریت کے دیر وہ تو کہ الہتاب (myosarditis) ہوتا ہے۔ بوار کے میں ، جو لا تم المحد کے دیر گل ان تما ، شدیر عفیلی الیمیت کی المارے کی دیر گل ان تما ، شدیر عفیلی الیمیت کی المنامسل کی کسی یا فریت کے دور آئی ۔

اصابول کی نہایت غالب تعدادی زلابی البتاب زائل ہونے پر اہم ق الہاب کی کوئی ا ارت نہیں مجوڑتا ۔ لیکن کبی کبی النصوص اسوقت جبکہ ایک ہی جوڑ پرستوا ترسطے ہو پچکے ہوں ، دائی نغیرات کا دیکھا ما نامی ہے بمن میں مضلات کی لاغری بھی پائی ماتی ہے ۔ مکن ہے کہ میر تغیرات روما تر می گر ہول کے ہمرا میا گئے مامیں اور وه حادروا نزم آسامنعسلی الهاب (علائن میسان الهاب کے ضروات مثابیت رکھتے ہیں نے جیاتی نقطۂ نظر سے روما نزم آسامنعیلی النهاب کے ضروات مادروما نزم کے ضرات سے نا قابل تمیز ہوتے ہیں ، جنا نچہ ہمکن ہے کہ یہ الآخواکی مادروما نزم کے ضرات سے نا قابل تمیز ہوتے ہیں ، جنا نچہ ہمکن ہے کہ یہ الآخواکی مرض کے منطقت مظام شرابت ہوں ۔ بیان کیا گیا ہے کہ روما نزمی نب میں بعض مفامت (synchondroses) بھی ما وُف ہوجاتے ہیں ۔ اس میں ناکہ میں مفاصل کے گردو پیش کے وزول کے خلاف اکثر کمتب ہوجاتے ہیں بالخوش بعض مفاصل کے گردو پیش کے وزول کے خلاف اکثر کمتب ہوجاتے ہیں بالخوش وہ جو کلائیوں اور شخول کے بوتے ہیں ۔ اور مکن ہے کہ گیشت یا اور لیشت وہ برجی کا کچھ معمد رمفیں کے النہا ب سے باعث ہو ۔ ایک لوا کے برجی منابی کے در فرم کرومنگی کرمیں بیارہ المون کے گرد نرم کرومنگی کرمیں ۔ (subperiosteal nodes) موجود تھیں ۔

اس کشرمنسلی البتاب کے ہمراہ کچہ تپ (pyrexia) ہی موجور ہوتی ہے ۔
جومفعل کا البتاب کہ ہونے کے ساتھ کم ہو ماتی اور البتاہ مفعل کے حود کے ساتھ ہم ہو ماتی اور البتاہ مفعل کے حود کے ساتھ ہم ہو ماتی ہو البیات کے دہنس او قات تپ مغرط (hyperpyrexia) ہوتی ہے۔ پسینلہ کئی کے ساتھ آنا بھی روما تزم کا میز خاصہ ہے ۔ اکثر عوقی سامت کے وہنوں پرمعاف کیسکوں کے اندر لیسینہ و کیما جاستی ہے جنبیں عن قرافے (sudamina) کہتے ہیں۔ بس ایک گل بالبزو ہے گیرے ہیں۔ بس تب کے ساتھ عموا میں بہوئے ہول تو اِنسین ہوتا کہ اور فیر پیمیدہ روما تزمی تب میں نہ یان کوئی نمایا ل ومانی انتظال زیادہ نہیں ہوتا کہ اور فیر پیمیدہ روما تزمی تب میں نہ یان کوئی نمایا ل مظرنہیں ہے۔ وادا موجود ہوا ور امعاد میں تبوال کوئی نمایا ل منظرنہیں ہے۔ وادا دور تب میں نہ اور فیر پیمیدہ روما تزمی تب میں نہ یان کوئی نمایا ل میں تعوار البیان کوئی اللہ میں تعوار البیان کی خفیف سی مقدار موجود ہوتی ہے۔

مروماً تزمی التماب قلب (rhoumatic carditis) منعملی التها کے ساتھ تروع ہوسنے والی روما تزی تب کی اصابتوں کے ایک بڑے تناسب (ہے اور لے کے درمیان) بین قلب التهاب وروں قلبہ (endocarditis) اور التهاب مغمله قلب (poricarditis) بین اور نسبت قلیل الوقوع اصابوں میں التها المیس اور نسبت قلیل الوقوع اصابوں میں التها الحیس (myocarditis)

یں بہلا یا یا جا کہ ہے۔ اگر و الہاب او مور کا بیان اِس کے بعد آئیکا ' یہال یہ بہادینا فروں ہوتی ہیں ووزیا ووڑ الہا ہے جا کہ کہ کی جا کھی ملامتیں موجود ہوتی ہیں ووزیا ووڑ الہا ہے جا کہ کہ سبب سے ہوتی ہیں نے الہاب ورون قلبہ کی وج سے ۔ وہ عمداً باکل خینف ' اور بعض اوقات بالکل فیرموجود ہوتی ہیں ۔ الہماب قلب کا آفاز ' تب کے بڑھ جا نے سعے ہوتا ہو سے سال مرصت قلب (tachycardia) عام ہے ۔ شدید اسسا بنوں ہیں ورزش کے بعد سانس میول کو سنگی (exhaustion) عام ہے ۔ شدید اسسا بنوں ہیں موس کے بعد استا کی مثالوں میں روا تری ملے کے بعد جند مہینوں کے ابتدا کی ترین طلبات ہول ۔ استا کی مثالوں میں روا تری ملے کے بعد جند مہینوں کے ابتدا کی ترین طلبات ہول ۔ استا کی مثالوں میں روا تری ملے کے بعد جند مہینوں کے ابتدا کی ترین طلبات ہول ۔ استا کی مثالوں میں روا تری ملے کے بعد جند مہینوں کے ابتدا کی ترین طلبات ہوں ۔ استان کی مثالوں میں روا تری ملے کے بعد جند مہینوں کے ابتدا کی ترین طلبات ہوں ۔ استان کی مثالوں میں روا تری ملے کے بعد جند مہینوں کے ابتدا کی ترین طلبات ہوں ۔ استان کی مثالوں ہیں روا تری میل کے دیوں ۔ استان کی مثالوں ہیں ہوجاتا ہے۔ مریفراکٹر

261

اس کی ابتدائی ترین مبسی ا مارت به سهد که استام کرنے پرمطرانی رفیمیں فلب كى بهلي آواز مين خفيف سي إطالت (prolongation) يَشْنُقُ (roughness) سَائی دیتی بید اواز قدرے ماف نہیں سنانی دیتی عمن ہے کہ چرسس ہی منت کے اندر یالمبی ہوکر ایک واضح خریر (murmur) یا میو کنے کی نرم اواز soft) (blowing sound بنجائے ، جومبلی واز کے ما تعد ساتھ ہوتی ہے اور مکن سے بکے بوصد سے بعد بکلہ اس کی مگر لیلے۔ یہ قلب کی حاد سرایت طا مرکزنی ہے اور یقیناً سطرانی با زروی سے بریا ہوتی ہے ۔ مکن سے کہ معیار مات پر البین کی توک میسی دقیق رومیدگیاں(pin-point vegetations) ہوں انیکن سیمعنا مشکل ہے کہ یه مدم کفانیت (incompetence)کبوں پیلاکردینی ہیں۔زیا رومکن توجیہ به ہو بهے كد بومبدالنها سب عفدائه قلب مطرا في حلقة (mitral ring) كا اتساع بوكوروم كفا پیدا ہوماتی ہے۔ ہوں جول مریض بہتر ہوتا جاتا ہے مکن ہے کہ بیفریرات فائلب موتے ماکیں ۔مطرانی بازروی (mitral regurgitation) عموماً دوسری مرایدی آواز کو معتم (accentuated) بنا دیتی ہے۔ ما دفلبی مسدوری بریدا ہومانی سبے ، آ وربعض اصابتون میں ایک متضاعف (reduplicated) پہلی یا دوسری آ واز یا لانسس سینا کی دبینے والا تلتی انکاشی خریر (presystolic murmur) اسرجست موتا سسینے کہ اِس مالست میں بطینوں سے پہلے اُ ذہین *مسمس طور دین*قبض ہونتے ہیں ^ملیکن اِنگام

عق دانون (sudamina) دو دندیات (miliaria) کے طا وہ عو پہلے بیا ہو کیکے ایس ' شری (urticaria) اور مختلف تسموں کا اِحمار (urticaria) می واقع ہوسکتا ہے ' الخصوص احدار کتار الشکال (E. multiforme) اور بریا [کلاحت می وما قد می (peliosis rheumatica) اے حمدار کی دار (E. nodosum) می وما قد می را دار الحفاد هو آگے) کی روماتزم کے ساتھ بایا جا تا ہے۔ و منبقی سمی ما مذکا ہوسکتا ہے (ملاحظ می هو آگے) کین زیادہ عام طور پر تدرنی ہوتا ہے۔

نیحت الجلدی کو آب (subcutaneous nodes) با ننول کی نسبت بچول بین زیاده عام بین اورمفاصل کے قریب وجوار بین اور عظمی عود اور آبمارول بر بائے جاتے ہیں ، جہاں جلدا ور اُبدی کے درمیان زیادہ چربی مائل نہیں ہوتی مثلاً کہنیں اور گھٹنول پر۔وہ ورد ناک نہیں ہوتے اور ننا ذہی الیم ہوتے ہیں ۔ اُنمیں جلد کے نیچے آزادانہ اور اُن کے نیچے والی لیفی مائحوں پر حنیف سی حرکت دیجا سکتی ہے۔ وہ دید ہی بہنتوں بی فائب ہوجاتے ہیں۔

فرر اگرملاج نہ کیا جائے تو مکن ہے کہ مغاصل کے ملا است دس سے بودہ دنوں کہ جاری رہیں ' اور میروواکٹر دفع ہوجائیں گیا گریلی سینس (salicylates) کے ذریع طلاج کیا جائے تو دروا ور بخار اکٹر ایک ہفت کے اندرفائب ہوجائے ہیں۔
کے ذریع طلاج کیا جائے تو دروا ور بخار اکٹر ایک ہفت کے اندرفائب ہوجائے ہیں۔
لیکن بہر مال روما ترزم منکس (relapse) کا بڑا رجمان فلا ہرکرتی ہے ' جس میں و دن سے لیکردو ہفتوں کے ایک فالی از تب اورخالی از درو وقف کے بعد مفاصل المکل اسی طریقہ سے اور خالی از درو وقف کے بعد مفاصل المکل اسی طریقہ سے اور فوق ہوجائے ہیں۔ مبھی ایک جو کرکا البتاب بمفتوں یا جمینولگام رسینے کی وج سے شفایا ہی میں تاخیر ہوجاتی ہے ۔ درو ' ورم ' اور کرفتگی (stiffness) میالی کالیف ہوتے ہیں ' اور جوڑکا ملاح با لاخرا آرام ' جریات (splints) اورخالی معالجہ سے کرنا بڑا ہو جائے ہو کہ ایک دوسر اسب مفالیہ سے کرنا بڑا ہے ۔ نفتیہ یہ ہوتی ہیں بتلا ہوجا اسے ' حس می ادر فی املانی اسی موت المتاب تا مور موجود ہوتا ہے۔
مرم کے فریات عضلہ قلب کا فشل (failure) بلکہ المتاب تا دمور موجود ہوتا ہے۔
مرم کے فریات عضلہ قلب کا فشل (failure) بلکہ المتاب تا دمور موجود ہوتا ہے۔

مغرط تب بہتے ہوسکتی ہے۔

الخيص - إس مي عواً كوئى دفت نهين يشس التي كيونكر در ومغامل ونعتة وقوع اورسائه بى مفاسل كى مرخى اور ورم ، بخارا وركترت بسيد برسب برى عد تكريه فيصلكن مونفي أي الخصوص أكريه نوع وأثلناس بي واقع جوا بن كي صحت پیلے اجبی تھی ' با جو اِس کے برمکس ' روا نزمی تب یا مرض قلب کی کسبق مرگذشت رخمنه ہوں۔ جیاں مرف ایب ہی نصل ماؤف ہو دہاں حادہ القیاب مغزاستفی كي منعلق غوركزا ما جهد -إس بي بيئ (constitutional) علامات زيا ره شديد موقية ہیں۔الیمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، فاسکرمبکہ ہری کودبایامائے۔حاد تعیم اللہم (acute pyzemia) بس كدرا ترتقيتي البّار بنام (acute pyzemia) ہو' غیرمام ہوتا ہے' ا وراس میں عمواً سرایت کا کوئی صریح مرکز موجو د ہوتا ہے جیسے کہ زها كم بعد عفونى رحم - بب مفاسل برحله بونا به توان ك شفاياب موسف ين مولی مرصد لگناہے۔ اسون اکی زلابی الفراب بمی روما تزمی تب کی نبست زیادہ دیر یا ہوتا ہے، اور اس سے ساتھ قلبی چید کیاں شاذبی ہوتی ہیں؛ اور التہا سب بالنصوص ردا ول (fascia) كوما وف كرف كا رجمان ركعتا هي اليكومكن سيب كه ابتدائی درجوں میں اُسے باسانی خلطی سے حا دروہ ترزم سمجھ لیا جائے ۔ ما دکھٹے منسلی التهاب(acute multiple arthritis) بهدست سلى نوعى مرايتون مُشَرَّات عوقه س حاير اورنبقي روي مراينون تب تاكسه وغيرمين بي واقع اوسكتاه -وه تعال جدمر بین سیل سلینس دینے پر طا بر کرتا ہے، مادرو اتزم کی مفید ولالت ہوتا مع - نقى سى سى الى مريض كه بيان من درج كى ماميكى .

ایک ایسے بیتے میں جسے کے مفصلی الہاآب نہ ہوچکا ہو، روا تزم کی شخیم کا انحصا رخواش ملتی الم انہا ہوں اور ایس فلم طرح الم فلم المحصا رخواش ملتی ہوگا ۔ ما دالہاب دروں قلبہ اور الہاب مفسلہ تعلیب کی شخیص کے لیے کسی قب و امتیا طرکی ضروبت ہے کیو کہ از و ما دالہاب دروں قلبہ اور الہاب مفیلہ قلب کا امتیا طرک ضروبت ہے کیو کہ تا اور الہاب مفیلہ تعلیہ فلم ملط برانے مصراعی مرض کے فریات کے ساتھ اور تناء مودی فرک کی وائد کے ساتھ اور تناء مودی فرک کی وائد کے ساتھ ہوسکتا ہے ۔ فوط کرنے کے قابل ما مس امرہ ہے کہ یہ زیر بحث فریا نی وہت

بربی گوانیم اوربه لها یو وقت انکاشی اور مطرانی رقبر برسمتی کے ساتھ محدود ہو اور و مری راوی گواز مکن ہے کہ رمیت ضربات قلب (tachy cardia) موجود ہو اور و و مری راوی گواز معنی (hæmic) یا دسی فریز (accentuated) یا دسی فریز (accentuated) یا دسی فریز (hæmic) معنی (functional) یا دسی فریز (harsh) معنی سے سے مراس کی صفت کر در ایس برائے برائے برائے برائے برائے میں مصابی مرض کا خریر اکثر بلند یا در شت ہوتا ہے ، جو ایک برائے رقبہ پرسنا ما آہے اور اس کے ساتھ قلب کی صامت یا شکل کا کھے تغیر بھی ہوتا ہو ۔ اسکا کا کھی تغیر بھی ہوتا ہو ۔ اسکا کا کھی تغیر بھی ہوتا ہو ۔ اسکا کا کھی تغیر بھی نا ور شرخ بھی اور تبدیلی خرات بہترین مربری رمہا ہیں ۔ صلیات احمر کی شفلی شرح سے مزید در اور تبدیلی ہوتی ہے ۔ وارٹ فرین مربری رمہا ہیں ۔ صلیات احمر کی شفلی شرح سے مزید در مرب ما ہی میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی اور می منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی اور کی منظ ہی میٹر سے زیاد و کی منظ ہیں ، می میٹر سے زیاد و کی اسٹر کی میٹر سے زیاد و کی منظ ہی میٹر سے نیاد و کی میٹر سے نیاد و کی میٹر سے کی میٹر سے زیاد و کیاد کی میٹر سے نیاد و کی میٹر سے نیاد و کیاد کی میٹر سے نیاد و کی میٹر سے نیاد و کی میٹر سے نیاد و کیاد کی میٹر سے کر کی میٹر سے کر کیاد کر کیاد کی میٹر سے کر کیاد کر کیاد کی میٹر سے کر کیاد کیاد کیاد کر کیاد کی میٹر سے کر کیاد کی میٹر سے کر کیاد کیاد کر کیاد کر کیاد کر کیاد کیاد کیاد کر کیاد کر کیاد کی میٹر کیاد کر کیاد کر کیاد کیاد کر کیا

سے متعلق بیرے کہ 22 فیصدی اصابتول من طس واقع نہ ہوا۔ چند اصابتول میں اوزمن کوکائل طورین کاللے کے لیے ایک دوسرے علیہ کی ضرورت واقع ہوتی ۔ اِس مع الما بول المراج المراج المراج (Great Ormond Street) من مرام الما بول كه الك لسنه أن كه من من رفن عي شال تما الوزد رآ ري كم منفعت بخش نتا مج بهت شکوک تعد (45) اور به دگرارباب سندکی رائے کے مطابق سیم (47)-مندرج بالاسع حسب زال تائخ مستنبط كئ جاسكت بن دروا تزمى بحل من جب لوزمین کی مرایت زوگی بحیه کی صحت کوخواب کردی بوت ا ور ار بارسوزش ملق بو ا ورمزس مدی کلانی موجود ہوتو اِنقاف (enucleation) کے فریعد لوز تین کوبکلہ كالديناً مناسب سے - إس عليه كوما درايت رفع بوجانے كدىبد على مرك اچاہئے-علاج رودا نزم كي منيف اصابتون كيموز علاج كمدائيمي بسستريس کلی آرام کرنا خدوری بیے بیانتک کرمفاصل کا درد اور ورم غائب ہوجائے اور فلٹ کا فاملی التهاب رفع ہوجائے بیکن اِس کا یقینی طور پر جاننا شکل ہےکہ برنتیجہ کب کہوم بیں آ ۔ ہے ، پنانچہ خطرہ کے منذباب کے لئے مریضوں کو (بالنعدم اگروہ نیچے ابول) بهبت ببغتول ك. بستر برلٹائية ركھنا ما يبئة - ببرحال جننك كەنبغىل وزىش م ہوکر ملبغی نه ہوجائیں اور کچے دلول کے ایسی نہ رہیں مریض کواُ نصفے کی ا جازست ند دنین حابیئے ۔ ایک دوسری مغیبد دلالت خریرات کی نوعیت ہے۔ جنبک کہ یہ روز رروزكوني تغرظا بركري إس كے يه معنى بس كه فاعلى التهاب موجود ہے ـ مرابت محم مكن مركز ول كو لأش كرك أن كا تدارك كرنا حاسبك (الاخطر موصى 276) لوزوراً ري براورغوركيا ما حكاسے .

تربید اصابق اس مفاصل اسقدر دردناک بونگه که دیف کوسوائے چپ چاپ لید رہنے کے کوئی چارہ ہیں ہوتا۔ مفاصل کو تفرر کے برفر وسعے مفوظ رکھنا چاہئے۔ بعض اوقات بستری کیٹروں کو جارح سے ایک نا لمبہ کے ذریعہ انماکر رکھنا چا بیئے۔ مفاصل کو زم روئی میں ، جس پر شدید ا معا بنوں میں تمول کی سسی مسکن دوا (anodyne) ، مثلاً نفاع ، یا افیون کا مروخ ، چھوک کی جائے، لیسیا ویت سے دردیں فدرے مفامی تخفیف حاصل ہوسکتی ہے، یا مفصل رہیمل سلیدی (methyl salicylate) (ونرگرین کامعنوعی تیل) بمیلاکراً سے کا بر مآبیم -gutta) (methyl salicylate) سے دھا کک سکتے ہیں ۔گذشتند زیانہ میں خالعی دورہ کی مذاستجویز کی جاتی تھی کیکن عام اصول کی بنا پر مختلف الاقسام غذا ول کی اجازت رینا نب تنہ بہت بہتر ہے ' جیسا کہ دورہ می حوی حالتوں میں کیا جا تا ہے -

بو دوا اب تقریباً عالمکیر طور برگام میں لائی جاتی ہے وہ سوؤ یئم سلی سلیٹ (sodium salicylate) سے -جب مربیس کا ل فور براس کے زیر اثر ہوجا تا ہے تودرد غائب بوماتے ہیں مفاصل کی سرمی اور ورم می تنفیف ہوماتی سبے اوار تیش دوماتین درجه کم ہوجاتی ہے، بلکہ مکن ہے کہ طبیعی درجہ برا امائے ۔ اگراب اس دواکی مقدار کرکر دی امائے یا اس کا استعمال جاری نه رکھا جائے نوہبت عمل خا درد و دکرآئیں ۔ اگر وی مقدار خواک قائم رکھی جائے نوروما تزم اُسیوفنٹ ۔۔<u>۔</u> علاشفاياب بومبائع كى يسكن علاج كودوا اور فدا مردوكي دربيد سعوس يا زباده دنون کے ماری رکمنا پڑے گا، اور اس مت کے اختیام مرکب بقدر دسیل دیجاعی ہے کے بیلی سلک ایٹ ا اُس کے سوڈیٹم والے نمک ، دونوں کی موزمقدار فوراکر ، گین ہے' اورسیلی میں کی مقدار وراک ، م گرین ہے' جو پیلے چیس یا صنبیر منہ یں ہر چوتھے گھنٹے دنی چاہئے۔لیکن کمرنٹ پدامها بنوّل میں اِس سے حجو بی مقدار کا بی بوستني بيد يعض لمبيب ابتدائي مارأيا يان محتشول من ايك نسينه جوني حراك مر كفينهٔ دينتے ہيں اور بيراس تواتر كو كمثاكر مردومرے كفيفه ديتے ہیں -اگر حل نهايت تديد ج توممن ہے كہ پہلے دن ٢٠ كرين كى خواك مردورے ياتيسرے كيني وين مناسب ہو۔اگر بہت زیادہ مقاردی مائے تو مریض دردمر' بہرے بن' کھنیول لاڈ (tunnitus aurium) اور خفیف ندیان میں منبلا ہوما تاہے ،کیکن روا کومو تون کردیے یر به علا ماسند موفو**نس بوماتے ہیں کھی تھے ، نسست** با غیرمتظم نبض السو*ک ہو* رُعا ف (epistaxis) كرم بوليت كا أمر البول (suppression of umne) اور تسمر بولی (uremia) واقع بوگرا ہے ۔ مام طور یہ ابتدائی سمی علامات ور دول کے اُرفع ہونے کے سانے ہمزال ہوتے ہی ایکن تخلیف در دماصل ہوجا نے کے بعد دواکی معنا دوں سے توا ترکو کم رہے روزان جاریا تین بارکردینا جا ہے اور

آئری درد یا آخری نیر طبتی شیس کے بعد پاننے یا جد دل گذرجا نے کے بعد کساسی مقدار کو جاری کے بعد کساسی مقدار کو جاری کے ا

روا ترم بران من ریخوردوا و سے اثرات میں کوئی بین فرق اس عمواً سوڈیم والانمک بیندکیا جا اوراکٹر اس کے ساتھ سوڈیم بائی کارپو عمواً سوڈیم والانمک بیندکیا جا آ جے اوراکٹر اس کے ساتھ سوڈیم بائی کارپو کی ساوی مقدارشال کردی جاتی ہے۔ بین اوقات یہ دوائیں جندال کا میاب نہیں ہوئیں۔ درد کم ہوکر جاری رہنتے ہیں ' یا کس (relapses) کٹر ہوجا یا کرتے ہیں مکن ہے کہ ایسی حالت بین سیلی سلیٹ آ ف کوئین (relapses) کٹر ہوجا یا کرتے ہیں۔ کم کارپوئیٹ کوئین مفید ہو ۔ یا قدیم قلوی علاج کیا جا سکتا ہے بینے پواسیم بائی کارپوئیٹ کوئین کے ساتے دینا۔ یا ایسٹریٹ کوئین کے ساتے دینا۔ یا ایسٹریٹ کوئین کے ساتے دینا۔ مادروہ ترم کے دردوں پرسیلی سکت ایسڈ شائل رکھنے والے مرکبات ' شائل نسال مادروہ ترم کے دردوں پرسیلی سکت ایسڈ شائل رکھنے والے مرکبات ' شائل نسال الرکھنے ہیں۔ آ فرالذکر والے ماکر ایسٹریٹ کی خواکوں ہیں برٹ مر (cachet) میں ہوئیا۔ انٹررکھنے ہیں۔ آ فرالذکر والے ماکریٹ کی خواکوں ہیں برٹ مر (cachet) میں ہوئیا۔ استعمال مد

ابعی بی معلوم نہیں کرسیلی سلطے علی کرتے ہیں۔ بہت سے اہرین کا
یقین ہے کہ یہ خود سرایت پرکوئی نوعی اثر نہیں رکھتے۔ فی المقیقت بردائے فل ہر
کی گئی سبے کہ تب اور در در مفاصل کو دور کونے ہیں ایک گونہ نقصان ہے آگیوں ا اس سے قلب میں ایک ایسی دلا لمت جو کہ سرایت کی رفتار نلا ہر کرتی ہے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے کا ورکسین فدر نتب کا موجود رہنا سرایت کے خلاف ایک مند

رانعت ہے۔ شدید ارتفاع مارت (hyperpyrexia) کا ملاح فری افکستوری کے ساتھ مونا چا بیک مبیاکہ ضربت امرات (Heat Stroke) کے بیان میں درج کیا گیا ہے۔

زفن (داءالرقض)

(chorea) (Sydenham's chorea, chorea minor)

دادارتس كى ميزخصوصيت جسم كم مختف حصول كى بيغامده فيرالان

بن ۔ إس كا متبول موادف موادف من سينت وأش كا رقص "وقعن انياكي أن وبا ول كي طرف إشاره كرتا ہے اور المند وسطى ميں واقع ہوتی تعين ، جبكہ مريض سينت وأمش كے مزاركى زيارت سيشفاياب ہوجائد تھے ۔ إسى بنا يراس مرض كانام سينت وأمش كو وأمش كا رقص (Chorea Sancti Viti) مرض كانام وبنت وأمش بواكرتى وه كسنة مرج شيرياكى سى بنديت ركھتى تمى اوراكرو دا واقع وائد القص كانام اب بى بعض اوقات فير طبيعي حركت كى بعض دو مرى فسمول كوظام كرنيك كئ استعال كيا جا آجے ہو اب استعال كيا جا آجے ہو اب النكما مائے كا ا

مرضی تشریح دراخ من بیش دمویت بانی جاتی جدایت تغیرت است را آن جدایت تغیرت است را آن می مانی جدایت تغیرت است را آن می مواجد قطنی کوک است برا آن می مواجد قطنی کوک (lumbar puncture) سے لمف ملیات میں کوئی زیادتی شاذ و الدری دریافت می قد مد

ا مراضیات - دادالقعی کے ابک رواتری سرایت ہونے کی نائید ان وا قعات سے ہوتی ہے ، ۔ الہماب درول قلبہ کا اکثر وفوع ، ادر مہلک میابتوں بس اس کی تقریبا ہمیشہ موجودگی - دوران میات میں اس کا تلازم رواتر می تپ اور اس کے مختلف مظل مرکے ساتھ ۔

26′

بإنفنى عضلات كاجفكرار فعل ديكهفيس تآبيد

ارا دی حرکات کے وقت یہ بیقا عدی اورزا دہ نمایا ل ہوتی ہے۔ اگر

التحداث ابر بعیلاوئے جامیں تو ہو انحیس مضبوط تعامے رکھنے کے باکل نا قابل ہوتا

ہے۔ زبان با ہر کا لیے پر وہ ایک جیسے کے ساتھ باہر کالی جاتی اورش یہ کیا یک

اندر کھینچ کی جاتی ہے 'اور ساتھ ہی جڑوں کے مضلات بیقا مدکی کے ساتھ متح کے

ہوتے ہیں ۔ چلف میں ٹانحیس اور اٹھا لیے جاتے ہیں ۔ اسبطرے یہ می دیجھنے یں آسکتا

دیا جاتا ہے 'اور کمندسے اور اٹھا لیے جاتے ہیں ۔ اسبطرے یہ می دیجھنے یں آسکتا

ہوت اٹھیاں جلد ڈھیلی ہوجاتی ہی اور مندی وہ ہاتھ یا بازو کرجائے کے بعد ایک بید ایک یا دور کو اس کے بعد ایک یا دور کو اس کے دور ہوتی کی مالت ہیں ہوجائے تو ہو کا ان کی اور مندی میں ہوجائے ہیں۔ ہیندیں حرکات موقوف ہوجائے ہیں۔

آس مرض مین می کے مزاج میں تغیر ہوجا نے کا اسکان ہوتا ہے۔ مریف د زودرنج ' چِرْ چِڑی' متلون المواج ' یا برانگیختہ ہو ماتی ہے' اور دماغی طور پر اس کا ما فنلہ کمزور ہوماتا ہے اوروہ اپنی توم کو قائم نہیں رکھ سکتی ۔

ا نيا كَي ا ور البخوليائي حالتين مبي واقع بوجاتي بين ا وربيهموة ما رضي بوني بي ي اششانی طوربه و کات نهایت تندیبوت می - کعرا رمنا! بینها آنا ممکر. ہومانا ہے' اورمربینیہ صاحب زاش ہوماتی ہے' اور خورکو نبیتریں نہایت تندونيز وبيج وناب كحساتمه إرصراً دصر مينكتي بنگتی ہے ' إتمه اور بازووُں كو پلنگ کی جا نبول یا سرمانے بر ارتی ہے اور کہنیوں اشانوں اسے ریون لولعول بمحمننون اورايز بول كوإمطرح ركزتي يبيح كرجس يتنيي جلدكي خطرناك خِ الشبيري ل بيدا بوماتي بين - أسي مذا بينها نامشكل يا نامكن بوما تأسير ليؤكر مرجيز جومريف كمصمنه كعواس ركمي جائب دهكا وكربنا بأكرادي جاني بين بلكه أكروه مريف يمسر بمامنه بين بهنيج تعبي جائية تومكن بيح كأبلع بين بهم أبناكي عضلات نه بو ف سے وہ میر کل مائے - بر اما تیں (زفن خطف ای chorea gravis) بعض ا وقات نهابیت تیزی کے ساتھ ترقی کرجاتی ہیں ' مربین رکا تارح کسندا ور كافى ندان بنيخ كى وجست حست معلوم بونا ب- مريع لاغرى واقع بوجاتى ہے' چرد سرخ ، وجا ناہیے' آنگمیں بیٹہ ماتی ہیں لیکن حکدار ہوتی ہیں ' لیب ا وِرز بان خنک ہو جائے ہیں ؟ نبض مِریع ہوتی ہے ؟ اور بالا فرموت واقع ہوسکتی ہے اور اس سے پہلے اکثر بش کسیقدر بلند اور مرکات موقوف مومات بيل وحقيقتاً مكن بي كه مريض موت سيريل من كفيف كك بانكل كون تصساقه يراربها وربه نوال بداكردك كانقيهيت تروع بوكئ بسبع يعف ا مها بتول مَبن دَبُن شديد قورير ما تُوف ہوجا تا ہے اور مرتيق نديا في بكر وحشايه فورير مانياني موجانا بعد - السيئ تندمالنين بندره اوريس سال ك درميان كى عمول من نسبت زيا ده كثيرالوقوع بيل اور إن كابرا تناسب ما مله عورتول میں ہوا کرتا ہیں۔

مُرِّدت - واوالرَّص كى مت نها يت نغير نديد ہوتى ہے - اصابوں كى غالب نعدا د چو منتول سے ليكرين او كس قائم رمنى ہے - اسابھى ارا بوا سے كه مرض ك شديد مظاہر رفع ہو نے كے بعد مغيف جھنگ بہت مغتواتا ہمينو كس ہوتے رہے ہيں اور علامات كچه عرصہ كے بعد يجرشدت كے مانخ ہومائيں - بالا فرزیا ده ترمریض شفایاب ہوجائے ہیں۔ تندو تیز مالتیں عمواً قلیل المحت ہوتی ہیں۔ اگر موت واقع ہوتی ہے تو وہ اکتر پہلی علامت سندیا ورکات کے تندم نے کے وقت سے دویاتین ہفتول کے اندر واقع ہوجاتی ہے۔ بعب شف ہوتی ہے کہ کامل ہے ' تو مرکات چندم فذ کے بعد سست تربر جانے ہیں ' اگر چومکن ہے کہ کامل شفایا بی میں کچہ عرصہ کی تا فیر ہوجائے ۔ دا وارقس کی طور پر رفع ہوجائے کے بعد بھی کمی کوا حال رکھتا ہے۔ دوس یا تیس کے طاکتہ ہوجایا کرتے ہیں۔ کمن ہے ہیں می کن ہے ہیں میں اس منظان سے میں اس منظان سے میں اس منظان دی میں اس منظان سے دوس میں اس منظان

عواقب مرض - اس من کے بعد تبین اوقات مریض کے کاکیہ چک اٹھنے(sudden starts) کی قابلیت باقی رو ماتی ہے، جو بہینوں کے عرصہ من رفع ہو ماتی ہے۔ مرع (epilepsy) بھی شاہدے بن آئی ہے اور

شفاياتي يج بعد ايك تعلم (tic) كا اقى ره جانامكن في -

تربی منابہت رکھنے والے حرکات هستيس يا کے جزو کے طور پر واقع ہوسكتے ہيں اور بر مرحت شغايا بوسكتے ہيں ۔ ماد تی شبخ (habit spasm) بحول ميں موجود ہوسكتا ہئے اور منذكر الاسك بين ۔ ماد تی شبخ (habit spasm) بحول ميں موجود ہوسكتا ہے اور منذكر اوا دی قریبی ما ملت رکھتا ہے ۔ اس کے حرکات کی نسبت زیا دہ قابی ضبط اور کم مستقل ہوتے ہيں اور دادالرقص کے حرکات کی نسبت زیا دہ قابی ضبط اور کم مستقل ہوتے ہيں ۔ فرید کر کے على م إتساق (Friedriech's ataxia) میں حرکات مور دار ہوتے ہیں ۔ مرکب اور مرکز شنت نہا بن طول ہوتی ہے ، اور دور ہوتے ہیں ۔ مرکب اور مرکز شنت نہا بن طول ہوتی ہے ، اور دور ہوتے ہیں ۔ مرحود ہوتے ہیں ۔ مرکب اور مرکز شنت نہا بن طول ہوتی ہے ، اور دور ہوتے ہیں ۔ مرحود ہوتے ہیں ۔ مرکب اور مرکز شنت نہا بن طول ہوتی ہے ، اور دور ہوتے ہیں ۔

ا فدار مه به بچون میں زیادہ امیدا فزا ہو ہاہے ، قطع نظر قلب کی حالت کے ۔ نوعمر بالغوں میں برنسینڈ زیادہ غیریفینی ہوتا ہے ۔

ھے۔ تو عمر بالنوں میں بر سبت ریا وہ محرز میں ہو اسپھے۔ علاج ۔ ما دروما تزم کا علاج دیجینا چاہئے۔ بجی کوبستہ ٹر سکون کے ساتھ رکھنا' اور اسے ربیشان یا نارا من کہنے والی ہر اِمکانی چیزسے دور رکھنا چاہئے۔

فلاسا دو مخدّی اور برافراط ہونی جاہئے کیلئے کا ایسپرین (یہ تا ۱۰ کرین) نور کا کوروٹون (ہگرین) دن میں تین بار نفع بخش ہوتے ہیں۔ آرسینک (سم الغار) عمو آدی جا تا ہے کہ تیکن اِس کا کوئی شبوت نہیں ہے کہ اُسے کوئی نفع ما مس ہوتا ہے ۔ نہایت تندا ما بتول بی مُن ہوا تھا رہوئ (parathormone) کی یہ سے فذا دینی بڑے ۔ مال ہی میں ہرا تھا رہوئ (parathormone) کے اثر ابات سے فذا دینی بڑے ۔ مال ہی میں ہرا تھا رہوئ (ورمیح دانے مامسل ہو کے ہیں۔ وس سال کے بچے کے لئے اس کے د فطرے شب کوا ورمیح دائے جا ساتے ہیں اور میں مال کے بچے کے لئے اس کے د فطرے شب کوا ورمیح دائے جا ساتے ہیں اور میں مال کے بچے کے لئے اس کے د فطرے شب کوا ورمیح دائے جا ساتے ہیں اور تین سال کے بچے کے لئے اس کے د فطرے شب کوا ورمیح دائے جا سے ہیں اور تین سال کے بچے کے لئے اس کے د فیل جاتے ہیں ۔

التهابيك فلبه

(ENDOCARDITIS)

اور إسطرح مرض كے تازه مركز بيداكردي - إس كو خبيث المتماب دروں قلب م (malignant endocarditis) كيتے ہيں -

حا دالتهاب درون قلبه

(acute endocarditis)

اسباب عادالہاب دروں قلبہ اسپاب دروں اللہ اس کے باعث ہوجاتی ہے ۔

تعدادیں ایک سرابیت ہے جوما درومات مرک قشب کے باعث ہوجاتی ہے ۔

سر بحث بجا بجل ہے ۔ عوا الهابِ عضار قلب اس کے ساتھ سلانم ہوا ہے ۔

می قرورہ ان من وجاتی ہو قوا ور دورے ساری مرفع ہی جاد الہالابولی می قرورہ الہالابولی می وہ مرض برا آبٹ انگل اور دورے مزمن امراض کی راقع ہوجاتا ہے ۔ میمی موہ مرض برا آبٹ انگل اور دورے مزمن امراض کی کے دوران میں واقع ہوسکتا ہے ۔ وہ مقامی تصرف کے یا احبال وتری کے انشقاق کے بعد اور فلب کے ایک حصد کی دوسرے موٹ یا احبال وتری کے انشقاق کے بعد اور فلب کے ایک حصد کی دوسرے موٹ کی گرزنا دروں قلب بھا تھا ہی المرسکت ہے ۔ فی صدف کی نظر ان کو انظر ان کی موٹ ہو کی مصراعوں اور فی مصراعوں اور فی مصراعوں کی نظر ان کی موٹ ہوتی ہے ۔

مریفوں کے مصراعوں الموٹ سے جوئے خون کی نتہائی مرابیت کیا ہر ہوتی ہے ۔

مریفوں کے دوالتہاب وروں قلبہ کے جواگا کہ بیان کی ضرورت نہیں اکی کو کھوا دروما اور دومرے ماری امراض کے تحت اس پر بحث ہوتی ہے ۔

وردومرے ماری امراض کے تحت اس پر بحث ہوتی ہے ۔

مزمن التهاج ول فلبه

(chronic endocarditis)

(قلب کا منمن مصراعی مرض)

مصاعی ضرات کا اضافی توانر۔ التهاب دروں قلب کا قلب کی دونوں مبائد کا قلب کی دونوں مبانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ امر بہت بڑی انہیت رکھتا ہے اگرالتہاب درون قلبہ مبنی زندگی کے دوان میں ہوتو یقین کیا جا تا ہے کہ وہ ریوی باشلنی صابح

يرحل آور بوكا ، ليكن برامر بهت نناذب كد دوران زندگي بي اكتبا بي طور مر بوسفه والا الرباب درول قلبه صرف قلب كدائي جانب كعمم اعول برحل أوريو يتمافأ كائي (Guy's Ilospital) كيه ٢٠٠٠٠ امتفانات بعدالممات مين الين مثال صرف اكيب تمى اس كے برعكس وأبيل مانب كے الباب ورون قلبه كا بأبيل جانب كے التهاب درول تلبہ کے ہمراہ واقع ہونا استعدر غیرعام نہیں ہے (18) عام ترین واقعہ یہ سبے کہ بائیں مانب مے مصاع تہا اوف ہوا کرنے ہیں۔مطرانی مصراع کا مرض اس سے زياده عام مواكرًا به كرجتنا اورطي مسراع كا مرض كيونكر روما تزمي ننب موكر مطراني مليع برخاص طرربد حله وربوتی ہے، مصراعی من کی عام ترین سیسی رو سے - ازروی (regurgitation) بزات نور ، جبیالکیاسی انکمالٹی خربرسے ملا سربوتا ہے ،مطافی دىبدىرنهايت اكر الوقوع واقعه بوتى ب اگرجداس ميك بسب كريد الروى وفي مام توانر کے لیا طسے إس کے بعد آتا ہے اور مالص سدوری سب سے فلیل الوقع ہوا کرتی ہے لیکن کسی بمی قسم <u>کے مط</u>را فی مرض کی اصابتیں جوامتحان بعدالما*ت کے لیم* آتى بن ان كى اكتربت مين مني يائى مانى ہے ۔ يه إس واقعه كى وم سے حكمين مطرانی مصاع کے طول المدت التهاب کا قدرتی متحہ ہوتی ہے ۔ اُ ورطی دسب بازروی اس سے بہت زیادہ عام ہوتی ہے کہ متنی میدودی رروما ترجی اصاب تیل میں ا ورطی مرض عمومًا مطرا نی مرض کے ساتھ منالازم ہوائے۔ حمیٰ قرمزید کے بعد مونیوائی اصابنول مي استَصَرْيا ده تعدا دمِن أورطي مرض بوتاسِيم كرَّ جَنْنا حا دروه الترزم سے بعد ہونے والی اصابتوں میں ۔خالص اور طی مرض آ تشک کے بار جیت ہو اسے ا ورشا ذ طور برما دروما تزم کی ومدسے ہو اے ۔ قلب کے دائیں مانب برشلتی بازروی جو بالکل عام طور پر لمنی ہے واہ مضلی حلقہ کے اُس اتساع کے باعث ہونی ہے جو میاہی فشل کے بعد تا نوی طوریہ ہوتی ہے اور اِسوجہ سے وہ فی الحقیفت ایک مصار عظم ا ہے بی ہیں۔

تولینی اِتساع ا وربش پروش ا دلا تلب سے اُس منعوم کہنے کو ما وف کرتے ہیں جس سے ماتھ ما وف شدہ مصاع تعلق رکھتے ہیں۔ تا ہم جسب

تعویس کا فشل واقع ہوتا ہے تو قلب کے دوسرے کھفے می اون ہو ماتے ہیں۔ مثلًا أكر بايل تبلين تتسع بوما تا ہے تو و مضلی ملقه منی مس مصر الی معراع معلق ہے۔ اِس اِتَّسَاع میں ندر کیب ہوما تا ہے۔ اِس عصمطرا فی ہا زروی میدا ہوماتی ہے۔ اِس کے متجہ کے طور پر انہیں اُ زین کا اور سیسیے مرول کا احتفال بیرا ہوماتا ہے اور ساتھ ہی ربوی خون کا ربا و بڑمہ مباتا ہے۔ اب اس مزاحمت کو دفع کونے کے لیے دایا ربطین بش پروردہ ہوما ناہے۔اگر اِس کہفہ کا اتساع دائع بوملت تغراس كمثلثي بازروى اورساته بم شكمي احتا ، كااحقان بيدا بوما تاجية مصاعی مرض کے ماتمہ اکثر عضائہ قلب کاشعمی اور تینی آسا انحطی طرمتلا زم مؤتا ہے۔ یہ انحطاط اسی سبب سے ہوسکتا ہے کہ جس نے ابتدائی مصاعی مرض پیدا کردیا ہو' مُثَلًا روما تزمی تب 'نه نشک و نیره ایا به مضلهٔ قلب کے تعذیه کی کمی کا راست نتیجہ ہوسکتا ہے ۔ ایج کل اس خیال کی طرف رجحان ہور ہا ہے کہ مصراعی مرمن مِنْ الله من الربين والا جوسب سے زيا ده اہم عالى ہے وہ عضار علب كى مالت ہے۔ اگرم ایسا معراعی مرض مس کے سانق عضالہ تعلب کے تفترات نہول وریشس کے بعد سانس بھو کنے اور سنگی کے علامات بیدا کرسکتا ہے ، جس سے تعویض کا اضا فی فشل طاہر ہو اہے اتا ہم فالبًا بہصحیح ہے کہ آگر منسلہ فلب تندر ہے تو تعویف کا کا ال فشل واقع ہونے کا المکان مشکل ہوگا۔ اس کے سب تعری به ضروری ہے کہ قلب پر سمینتیت مجموعی غور کیا جائے۔ فی الحقیقات یہ نامکن کیے ۔ مصراعی مرض کے اثر کو عضلہ تقلب کے تغیر ات کے اثر سے جدا کیا جائے اسو جبکه به رونوں ایک ساتھ موجود ہول ۔

أورطى مرض

مرضی شیریج ۔ اور طی مصراع کے مرض کے دوخاص اسباب ہیں! ولاً' ما دروما تزم ہے ۔ یہاں اُ ورطی مصراعوں کا مرض ۶۲ فیصدی اصابتوں پر مطانی مصراعوں کے مرض کے ساتھ متلازم تھا۔ ۳۸ فیصدی ہیں اور طی مصراع تنہا ما تھ نتھے ۔ ٹائیا ''آ تشک ہے ۔ یہ مرض عموماً اولا التہاب اور طی پیدکر تاہیے' اور اس على مي أورس معراع عبى اون بوجات بي اليكن مطرانى معراع عمداً غيرتنا الرحية مي - ۲۹۷ اصابتول كے ايك سلسله ميں حا دروما تزم ه ، ۱۰ فيصدي ميں وجه مرض تما ، عن ميں مرد اور عور ميں تقريباً مساوى تناسب ميں تسي آتشك (بين آدمى ايك عورت كے بيجھے) ۲ ، ۱۸ فيصدى ميں - اتھوما (تمام معمر مرد تھے) م د ۲ فيصدى مي - دگراسباب او ، فيصدي ميں -

مرضی کنٹرنجے ۔ اور کمی معرافوں ہیں یہ تغیرات ہونے ہیں کہ ان کے بیوں کے قاعدوں کی طرف کی اور کمی معرافوں ہیں یہ تغیرات ہونے ہیں کہ ان کی آزاد کورنسبنہ کم مذکک دہز ہوجا تھے ہیں جس کا مذکک دہز ہوجا تھے ہیں جس کا میتجہ یہ ہوتا ہے کہ تیک دہذہ کو کہ مانکے کے لئے باہم ل نہیں کہتے ۔ قلب کی بیش پروگ میں طاحظہ ہو۔

مه المتهاب سے زم پر کمیا ہوا گہانی انشقاق واقع ہومیا آ ہے۔ مرسط ضبعی اور کی کہا

(aortic stenosis)

امراضیات کونیم (Cohnheim) کونید بندگان تجربات میں جو ما نورو پرکھنے 'اور فی کے کو داکید بندش نگاکر اُسے بندری کس دیا گیا۔ اِس فررکی تونین بطین کے معلی انقباضات کی طاقت بڑھ مانے سے واقع ہوئی ، بالفاظ دیر قلب کی فی منٹ برآ مرا اور شریا فی اور وریدی دباؤ وہی ہے ' لیکن درول تبلینی دباؤ بہت نربادہ بڑھ گیا ، خرج قلب ہُست ہوگئی ، اور قلب کی اُس کوشش میں جو وہ ا بینے افیہا کو اِس معنوی طور پر بڑھی ہوئی مراحمت کے مقابلہ میں با مرکا لینے می مرف افیہا کو اِس معنوی طور پر بڑھی ہوئی مراحمت کے مقابلہ میں با مرکا لینے می مرف کرتا ہے ' بطین کے انقبا فن کی عقیقی مدت زیا دہ ہوگئی ۔ قلب کا ناگہا فی قشل فٹر اُسیوقت واقع ہوا جبکشیتی ایک خاص مدتک بہنچ گئی ۔

بالكل يم مالات من سع بدا شده أور طی میت بروق میت می موجود بوت بین به استفاء المستفر ا

ایک اشفاق دادی مینی ی دویان کرد در ای این ی در ای مینی ی دویات کی نا ایک اشفاق دادی مینی ی دویات کی نا این در ای مینی ی دویات کی در این مینی این در این مینی در این در در این در

نون کی رُومی ایک رکاوٹ مال ہونے کا نتج بہ ہوتا ہے کہ نظامی نرائین کے دموی عمود پر بطینی انقبان کا پورا اثر نہیں پڑسکا ، اور یہ مسکوس کیا ماسکا ہے کہ نبغی کی ناگہا نی مفغود ہوتئی ہے اور وہ بالکل آمنہ آہر ہت اٹھتی ہے ۔ ایسی الت بین ترسیم نبغی ہفتی ہے ۔ ایسی الت بین ترسیم نبغی ہفتی ہے ۔ ایسی الت بین ترسیم نبغی ہوتی ہے ۔ اس الله نبی ہوتی ہے ۔ اس سل کی انتہائی قسم میں یہ موج گول بناتی ہے یا بالکل نورو جود ہوتی ہے ۔ اور اس کی کی انتہائی قسم میں یہ موج گول بناتی ہے یا بالکل نورو جود ہوتی ہے ، اور اس کی ترسیم اس ترکسیم ہے مثابہ ہوتی ہے جا ورسست رفتار (بنفی بطی = pulsus کئی ہے ۔ جس کرنے پر بینفس فیرکٹر الوقوع اور سست رفتار (بنفی بطی = pulsus) ہوتی ہے ۔ جس کرنے پر بینفس فیرکٹر الوقوع اور سست رفتار (بنفی بطی = pulsus) ہوتی ہے ۔ جس اور کمی ضیت کا ل کور پر تعویف یا فئت ہوتی مکن سہے کہ مریفی میں کوئی علاست نہو۔ دو ہری ا میا بنول میں سبید ہیں در دا ورضیت کا اصال و میفی میں آئے ہیں۔ مناز میں سبید ہیں در دا ورضیت کا اصال و مناز ہوتی ہوتا ہے توسائس کا بچو لنا اور وریدی استانہ کے آفارات مثنا ہدے میں آئے ہیں۔

أورطى بازرّوي

(aortic regurgitation)

امراضیات - اگرکسی جافزین ایک اور طی مفراع کو بخر بنتا متفرد کما جائے قرجیا کہ آور طی بنتی میں مواکر آئے ' تعویف فی الغور واقع ہوجاتی ہے ۔ قلب کی آد فیر متاہ رمیتی ہے ' اور دریدی دبا کو بیر متنا ہے ۔ تا ہم انخماشی دبائو بہت زیادہ اور امباطی دبائو بہت کے ہوجا آ ہے ' اور اِن دونوں دباؤں کے درمیان کا اوسطانقریا اُتناہی رہتا ہے جتنا کہ پہلے تھا۔

خن سے دھا خون ہرانباط کے دوران میں أیس بطین کے اندروا بس چلا ما تا ہو۔ البي متورت مين چونگه نعويض يا فقه ضريون مي قلب كي تُمرح وي رمبتي سبع بهذا قلب کے 4 لیٹرفی منٹ نون کی رسدقائم رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جرضرب برا ورطی مصراعوں کی راہ سے ۱۶۰سی سی ایر بھیج مائیں ۔ اِس کے یہ معندین بأمين طبين كو بجائے ، بسي سي كے ١٦٠ سي بني كي گنجائش ستقلاً ركمني مانيئے ۔ إسى واسط اوسطی بازروی میں بائیں بطین کا اولی انتباع واقع ہوما تا ہے بیکن اسے ساتم مفهلی دنیوارکی ابک نانوی بیش پرورشس مبی واقع ہو مانیجی 'کیونکہ بأیر بطبین کا کام بڑھ گیا ہے اور اب اسسے

ترائمين مي كے دبا وكے مقابلہ ميں اور کی مصراع کی را ہ سے بجائے ۸۰

سی یسی کھے ۱۶۰سی۔سی خون با ہر

بميعينا پڙتا سيعير په

دوران وررمشن مين مذفتر قلب زیادہ رہنت کے مائتہ ضرب لگا تاہے بلکہ نون کا جم جومرضر کے

فرنس کیچیئے کہ ہرضرب کے ساتھ کی برآ پر دو کنی ہوجا تی ہے ، توالیں صورت میں

بازروی کی اصابتول میں قلب کو مرضر

كرماتم با مربطنة ١٧٠ سي ي كي وطبعي حالت بي المربطنة من اب ٢٠٠ سي سي كل يفير ينك - يه مارضى انساع إمراضيان مالتون مي فالباس سعبب زياده بك جتنا ایک قلب میں اس کی تنج انش ہے۔ اس کانتیج بہ ہوتا ہے کہ قلب خون کی يمطلوبمقداربهم بهنجاف كم اقابل موجانا به رأس سد ابيد ضرات مي قلب كى معفوظ قولت تحفياع كى شال لمى جد جر بالب سكون كا فى طرير

تعويض يافة بوسفيس .

1

ساته بابر تحلما ہے وہ می زیادہ موجا ماج تکل مے الف ۔ اور طی ازروی کی نبض ۔

دبائوس اونس . ب - اور لمي بازروي كي نبغ -دبائح إم اونس -

ا اورمددم ییج ن طرف اور فلاسے با ہر و مصل ہو جا استعال کو استان کو استحان کو نے استحان کو نے استحان کو نے استحان کو نے استحال کو نے استحان کو نے استحان کو نے استحان کو نے استحان کو نے استحال کو نے استحان کو نے استحال کی نے اس

پراکٹر بڑھا ہوا پا جا آہے، اس کے برکس انبا کی دباؤ نہا یت کر ہوتا ہے۔ واقعہ یہ کہ اسوقت جبکہ با نرویندمیں کوئی دباؤ نہو صفعدی تریان برا بک بلند از کمانتی خریکا سنائی دینا بائکل مام ہے، مسسے طاہر ہوتا ہے کہ انبا کی دباؤ کر کرمنگ آجا ناہے ۔ جب کہمی کسی مریش کے امتحال میں انبیا کی دباؤ ، ھ کی میرٹر سے نیچے آجا ناہے ۔ جب کہمی کسی مریش کے امتحال میں انبیا کی دباؤ ، ھ کی میرٹر سے نیچے پایا جائے تو یہ واقعہ اور کی با زروی کے امتحال کی بڑی دلا لت ہے اور کی بازی میں یہ میں پایا جا آہے کہ انجماشی دباؤ عفدی شریان کے نیو بازی کے نبیت فغذی شریان میں نرول کرنے اور ساویا کا کیا ہوتا ہے نہ موج نبیل کے کیا کے صعود کرنے اور ساویا کا کیا ہوتا ہوتا ہے نہ موج نبیل کے میا کہ ایک مامل ہوتی ہے، یو منتقب ناموں سے نزول کرنے سے انگلی کو ایک عمید جس مامیل ہوتی ہے، یو منتقب ناموں سے

نزول کرنے سے انظی کو ایک مجیب مِس مامسل ہوتی ہے ، بو منتلف اموں سے ظاہر کی ما تی ہے ، او منتلف اموں سے ظاہر کی ما تی ہے ، مواس قسم کی بن کو دئے گئے ہیں شاگا فیسی (kicking)

رشمی (splashing) مطرقی (water-hammer) اور طلقی (shotty) ۔ اِسے مهض مسريع(pulsus celer) بھي کہتے ہيں۔ تريا نول ميں انبساط اور انفہانس تھے ناكهانی اوروسیع در کات سارے جسم برنمایا س اثرات بدا كردينة بي - گردن كي رُكِينِ بِيمُوكَمَّىٰ ہونی دکھلائی دہتی ہیں اور اکٹر در دے ما تھ بیمُوکتی ہیں اصبعی تمریانیں (digital arteries) بیرمعمولی طور پرمساف محسوس کی مباسکتی ہیں' اور جشم بن کے ذرمعہ کے سکیتی تراین کا نبینان برآسانی نظراً سک ہے۔ اِس کی توجیہ حب اُزلِ ہے ،۔ شریانی انبیاطی دباؤ اونی درج کا ہوتا ہے ، اور اِس دباؤ کے مطافب شریورڈ ب نون کے ایک فیرمعمولی فور برزے حجم کو تیز نرح سے با برجمینا ہے ، جس سے ایک بغیر ممولی طور پر بلند ورجه کا اِنکمانٹی دبا وُ پلیال ہوجا تا ہے۔ یہ دبا وُ سرعت کے ما كركم مومانات كيونك قلب بس سرعت كرسانته ابيضا فيد كه آخرى حقه كوا ورطي ك اندر فالى كرتا ج خون أس كى نبيت زياده نيزى كے ساتھ ميط كا نرميلاما أ ہے۔ یہ ناکہا نی اور رہی مقوط ایک ٹیکنے والے مصراع کی را وسے فلب کے اندر نون وابس بطِلے جانے کی وجہ سے نہیں ،وتا (گوادنیٰ ابساطی دباؤ اسی وجہ سے بوتا ہے) كيونكه بيسقوط دوضرني كمَّا وُست يهل واقع موتاب (الاحظه بوسكل م الف) - ايساري ایک مظرمرکے کے دار جمشکوں پڑے تل ہوناہے، جنبض کے ساتھ ہمز لمان ہوتے ہیں (امارت مسيك: signe de Musset) - يا ورطى با زروى ك ما قد عصوص نبن بككها ورطى انورسما مي اوربط، بلورائي انصبا بات بي عبى واقع بوما سه .

اورطی عدم کفایت (aortic incompetence) شعری نبیضان بی پیدا کرسکتی ہے۔ یہ نامنوں کے نیج ام کول میں ، یا منسع عوق شعری کے اُس رقبہ میں دیکھا جاسکتا ہے جسلم پیشانی پرایک تیزنوک کمینچنے سے پیدا ہوجا آ ہے 'یا اُلائے ہوئے کے لَب کی غشائے مخاطی پر ایک فرد بین خدیث کا ٹر بحد دبا نے سے ۔ دونوں مولئوں میں نیرمشا ہدہ عوقی رقبہ ہرضرب قلب کے سانحہ تنبادلا زیادہ سیاہ اور ریادہ شاحب ہوجاتا ہے۔

علامات -اورلمی بازروی کے علامات مطرانی مرض کے علامات سے مال مایال موریرمنقف ہوتے ہیں۔ یہ اِس واقعہ کی وجسے ہے کہ قلب سے مال

مطرانی مرض

(mitral disease)

مرضی نتریج مطرانی من کا معمولی سبب مادروانزم یا دومری بی سبی رایت ہے ، کرات نشک م

التهابى تغیره مل الته به معال الفیرات الله می وجه اور فی من می التهابی تغیره می الته به می الته به الته به الله معال الله معال الله الته به الله معال الله الله معال الله معال

مطرافی ضیق کومزمن مرایت یا مصراع پر ما دسرانیت کے کرر ملوں کا نیج مجمنا میاجی بو بیول کا انفام مقتبض اور دبازت پیدا کردیتے ہیں۔ آس کی نمویا بی کے لئے چندمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے اِس واقعہ کی توضیح ہوتی ہے کہ وہ کول میں اکثر نہیں پائی جاتی اگر جو وہ بلوغ کے بعدسے پائی جاتی ہے۔ اِس کے بعد سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے معرانی الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی وجہ سے مطرانی بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کی کو بیتا ہے کہ بازروی مصرای الہاب کی کم نشدیش کا پی کو بیتا ہے کہ ب

علامات اوراً مارات ابعض مام علامات اوراً مارات ابسے ہونے ہیں جوبڑی مذکب وریدی اسلاکا نتیجہ ہونے ہیں اورمطرانی بازروی اور سیت رونوں میں مشترک ہونے ہیں اور بہال انسیس برخور کیا جائے گا۔ ابتدائی علامات

بُ لَحْعُومِ ورش کے بعد دیکھے جاتے ہیں ۔ وہ مانس کا پولنا ا ورضنگی کا اصار سے إن پرتلب كه مقام پر دَرد مُ اختلاج مُ اور پاؤں كه ورم كا اضا فدكيا ماسكتا ہيے ۔ اورمکن ہے کہ یہ ابتدائی درجہ کئی سال کے ماری رہے۔ کابعد درجہ سے پہلے ایک بزخی درجہ کا وقوع اکنز فعیل فلب کی بیتا عدگی کی بیان کردہ شکلوں میں کسی ایک شکل (مُثلًا قبل ا زوقت ضرابت ١٠ وربالغموص أ ذيني ريئكي انفنامض) كيرسانمه ممز ال طور يرواقع بونا بيد، اوراب نبض، جو بيليه نتظم اوركسية دركة الوقوع تمي انوازن ور قوتت دونوں میں بہت غرمنظم ہوجاتی ہے ۔جاب ما بعد درجہ آبہنچا ہے **تو ملا ما**ت بڑی مذکب دوران حون کے الحنلال کا ویسیلان حون سے ابطاء کا بنتجہ ہونے ہیں ا جس کے اثرات جہانی اعضاء یربیان کئے ماچکے ہیں (ملا حظہ ہوصغیہ **252) ۔ اِ**طمع کا يميد بيناول كرم إلى امتلاء كابينيج بوتا بهي كه مريض كمانشي م مخاطي نفست اورگاه بكاي نغت اندم من [جومتذكرهٔ بالاربيي افعالات (pulmonary infarcts) سيريدا موسكة بها الشابغ يامسلسل انتصابي منفس بين ا ورخنيف نزين زور لكافير بُهرين بتلا بوجا تاسبته - امتحال كرف يردايال أذين تسع يا يا جائيكا ، ا ورسائعه مي أسكي آ واز مِن كمي او مُنظمُ القص سندايب أنجه بإزائد داسينه طرف كونبضان بوكاء ربوي رخبه مين روسري آوا زمل تغنيم روجانبتي اور شرائي في نبضان عصداً ميں بطين كي بيش رور مشتر ُ ظاہر ہوگی۔ پیمینیم_ٹو وٰل کے قاعدوں پڑنکتکا *ت س*نا بی دینگے' اور ترقی یا فہت**ام**عا ہو مِن امتيت يا في مائے گي اور ساتھ ہي جو فيزي خرير ميں کمي اور کمسي ارتعاش بي گئو گي بوں اکا لوں اور المراف کے گہرے سرخ رابک یا حتیتی زراق سے مردن کی بڑی وریدوں کی بُری اورنبضان سے' اوراستسقائے کمی کے و**نوع سے مام ورب^{کی}** ركور مل ہر ہوتاہے منتلی مجر بڑا اور ميكنا ہوتا ہے اور شايد ناف كے ليول ك لينميتا ہے اور اگراسکا اِسلاد ماد طور پر ہوا ہے تو مکن ہے کہ یہ درو اک ہو اوراس بی نبغنانِ ہوتا ہے۔ مِلدُ سیقدر برقانی ہوتی ہے، پیشانی کی زرد جملکِ لبوں اور كا بول كى كهري مرخي كيرساته فكرمريض كى شكل ومورت كونها ببت مُميز بناديتي جهة سود بضم کے علا مات مبی مونگے ۔ گردوں کا افراز مجی متا اثر ہوما اسبے اور بول قليل المقلار شائد مسكر روزانه واي ه اونس أوجانا به اس كارتك مرابعة

ہے، وہ پوریش کی ہڑی مقداروں کو مطروع کرناہے اور اُس بی البیومن اور فائبرینی مباہد موقائبرینی مباہد موقائبرین معدار عموفا توٹری ہوتی ہے اور قلب کی کارکردگی کے ساتھ معکوس تناسب بیں متغیر ہوتی ہے ۔ غنودگی یا ہے مبینی ہے اور ترقی یا فت اصابتوں میں کھی بجری ہویان ہونے ہے ، دماغ کے دوران خون کا متا ، ٹر ہونا ظیا ہر ہوتا ہو ہو ہائی شش اور سنگی ہے ، یا فہیت الہائی واللہ یا دوری بیجید کی سے موت واقع ہو جاتی ہے (نیز طاحظہ موصفحہ 275) ۔

مطراني بازروي

(mitral regurgitation)

ببدید به میسی ا ما راست به بوته بین ، - مدم القلب کا با برکی طرف بسط مانا ، موکدار انتخاصی فررجوراس پر بلند ترین سنا ما تا سها و ربیط بیان بوجها جه -

مطافى فبيق

(mitral stenosis)

امراضىيات بناص مطراني مصراعي نيتي مين قلب برا ولي اثر بأبي أذين ئی بیش پرورش ہے' لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ اتساع تھبی پیدا کر دیتی ہے' بالخصوص جبکه ابتدأ نی فشل قلب بھی موجو د ہو د ایا ں بطیب سے ربیی نظام میں فشارِ نوان کا ارتفاع پیدا ہوجا آہے ۔ بوتنگ شدہ مصراع کی مزات كا مقابلًا كرتاب - جب تعويض كافشل شروع وقيا بهذا ونه صرف تيبيدوون من إمنلا دا قع ہوجانا ہے، بلکہ باس بطین کو می نون اُس کی طبعی مقدار سے کمتر پہنچیا ہے۔ یه کهفدنسبنته جبولا موجا تا ہے اور مکن ہے کہ بطینی دیوارکسی مذکب حقیقت مذہوا جہا ہ ا ور لوبل المدت اصابتوں میں اور طی معمول کی نسبت چھوٹا ہو ما تاہیں۔مطرانی شیق کی بنینز اصابتول کے ماتھ کسیقدر مطانی بازروی می موجود ہوتی ہے۔ طبیعی ا مارات مطانی ضیق کے خریات اور اُن کا طریق بپیائش بیا ہو بیا ہے (طاحظہ ہوصنعہ 221) - وہ اکثر راس کے مقام بر معدور ہونے ہیں اور عموماً ان كم ما تعداكي وندبه بوتايد (ملا حظه بوصغه 217) - تركيات كا تغير إلا فقدار ورج زیل ہے د۔ جب فلب سس*ن رفتا ری سے ضرب لگانا ہوا ورضیق حفیف ہوتو میش ہے ور* أذين كمصبب سيحابك اذبني انكماشي خرريسنا ئي ديتا ہے ۔ جب ريشكي انقبامن المارى موما البعد توية خرير بكله فائب موجاً البعد-اكر قلب كافعل سست ليكن في نسبتهٔ زیاده بوتوسارے انساط کے دوران مین خربات سنائی دبیتے ہیں 'ووسط انبسالمی اوراً ذینی انکماشی خررات بوتے ہیں یعض اوفات یہ وسط انبساطی اور اُ ذینی انکماشی خررایت ایک ہی مریض میں اکثر مرتبہ تبادل کرتے ہیں۔ اِن میں سے مراكيك كى بجائے ايك بظام منتفاعف دومرى آوازيدا موسكتى ہے جوراس پر سَائَى ديتي هي (طاحظ بوصفر 218) - أذيني ركيكي انتباض كي مالت مي ، بعب ضربات كدرميان كاوفغد طول موتا ب توخريات انساط كدا ولى معول مي اتع بوتے ہیں اورجب وقف مختر ہوا ہے تو خریات پورے انساطی فاصلی موجو

رہتے ہیں۔ طبعی کے اوراً ذینی رشکی انتباض ہرصورت میں جب فعل قلب تیز پڑوتو خریات پورے انبسا کمی فاصلی می واقع ہونے کا رجمان رکھتے ہیں، لیکن اکٹران کا سننا ہمی نہا بیت شکل ہوتا ہے ۔ یمکن ہے کامض پہلی آ واز شدت کے ساتھ مغتم ہو، اور دو مہری آ واز راس پرسنی ہی نہ جاسکے ۔

آبتدائی درجول می قلب کی کلانی موجد نہیں ہونی انیکن آخری درجوں میں ؛ جبکہ یا تومشلتی(tricuspid) یا مطرانی بازروی طاری ہوجاتی ہے ، عموی کلانی قلب واقع ہوجاتی ہے۔

علل فات - مطرانی فین آکٹر بالکل ابتداہی میں 'پیسپیٹروں کی اسلاء کی وہے نفٹ الدم پیدا کردینی ہے' اور دما فی عدم دمویت کے باعث دوران سراور فشی کے عطم بھی' اور مطرانی بازروی کی نسبت زیادہ آکٹہ فالج نصنی (hemiplegia) کا بب بواکرتی ہے ' اور یہ فالج دما فی شرائین کی سدا دیت کے باعث ہواکرتا ہے بہتا ہ دائیں اُذین ہیں عَلَقا من ہوجا نے کی وجہ سے پیدا ہوجا تی ہے ' بومرض کے آخری درجوں میں فون کے رکود کے سبب سے بنجاتے ہیں ۔ دوسرے مام علامات بیان درجوں میں فون کے رکود کے سبب سے بنجاتے ہیں ۔ دوسرے مام علامات بیان

يميني مصراعي مرض

مند آنی بازروی (tricuspid regurgitation) - آرم بشلتی در کنا ایک نهایت عام مالت ہے ، ورعموماً دائیں بطین کے اتباع کی وجہ سے ہوا کرتی ہے ، بومطرانی مرض کریوی ضیق (pulmonary stenosis) عضائہ قلب سے مرض اور میں میں ندر پیدا کردینے والی دوسری حالتوں (نفاث الہا شعبہ دَمه کیفی سے مرض اور میں ندر پیدا کردینے والی دوسری حالتوں (نفاث الہا شعبہ دَمه کیفی کے ساتھ متلازم با یا جا ہے ۔ اس سے بھی زیا در شاذگور پر وہ ویسے ہی عضوی مرض کیا عسن ہوا کرتی ہے مبیا کہ مطرانی معراع پر حوالہ ور مواجہ ہوا ہو کہ ایس کے ساتھ عموماً دائیں اذین کے اتباع کے لوا ہر اور ختلف درجہ ہوا دیم کیا آذمیا کا است می خطا ہر ہوتا ہے کہ ایک ایک بیان کو دوسری حالت کی موجود ہوتے ہیں جن سے مین طا ہر ہوتا ہو کہ ایک ایک بیان دولی میں قلب اور جبیعی مولول میں خون کی واپسی میں دقت موجود ہے ۔ اِس کا بیان

بہلے ہی مطرانی مض کے اواخری علامات کے تحت درج ہودیکا ہے مشلّی بازروی کا نریر بیلے بیان ہوجیکا ہے(ملاحظہ ہومنغ_ہ 222)- بعض *اوقات اُس سے کے س*اتھ عظم الغَفْل شك زيرين بري يراكب انكماشي ذبدبه موجود ملتاجي - اندروني وداجي وريدكا ومنبضات بحوان عالات مي جواكرتاسية ممكن سيحكه نهاسيت نما يال بوا ا ورگردن کی مانب برسیاتی تنریان کے مُرہے بیچے کو مکان اور ترقوی ہڑی ہے درمیان ' ارتفاع وانخفاض کی ایک تموّ جی حرکت بیدا کردے مکن ہے کہ برقی وز ورید سمی سانحه ساتحد نبصنان طا هرکه سه را میں بطبین کے انقباض کا زور کبدی میدو می می نتقل موکر کدبل ی وس سیدل ی نبض (hepatic venous pulse) یا كيار نابض (pulsating liver) يبدأ كرسكة بعد يعضو عمومًا بست برا موما تا بين اورايني سارى سلح بريميزكمة موا مسكس كيا ماسكتا بيد - اورين بفيان معن وقات تیکھے کورا میں کوکھ میں آخری کے لیے بھی تھی بھی مقتل ہوجا تاہے ، جس کا میتجہ یہ ہوتا ہے کے ما سے اور پینے رکھے ہوئے و تھول کے درمیا ن جگر پسلتا ہوا محسوس کیا ماسکتا ہے۔ مَثْلَثْی ضیبق (tricuspid stenosis) نبستهٔ کرمام بها اور موما ورسم كمي معراع كے مرض ' الخصوص مطرا في ضيق ' كے ساتھ مشا ہراہ ميں آ آ ہے۔ مثلثی

با زردی میں جوعلامتیں دنھیں ماتی ہیں اُن کے علا وہ علا مات کا اور کوئی نما مس گروہ ہ اس تحصب سے نہیں پیلا ہوتا۔

س یوی مصراعات کامرض اگرزیاده مدت کا موتومیتر پیدائش مولي ا ورأكرما و بوتونميث الهانك نظب (malignant endocarditis) كانبتجه بواب - اول الذكرصورت بس ريوى ضيق (pulmonary stenosis)

م لوی با زروی کا زروی کا (pulmonary regurgitation) بعض ادقات مطرانی مرض کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوتی ہے ، کیو کومصراعات شرلیان رمیں میں ك برك و الوكي من المركبين الموسكة منظم القعل كى الين مانب كرا الكياب الم *خروکسنا*ئی دتیاہیے۔

نبین التهاب درول قلب^۱ ربوی دمهٔ بریمی اور طی مف کے خریر مبیا آئیب دُ ہرا خریر (ایماشی اور انساطی) پیدا کرسکتا ہے اور بیملی الزیب خرات پہلے بیان کیا ہوا ممل وقوع رکھتے ہیں ۔ ایسی اصابتوں میں جو علا مات ظ ہر ہونے مِن أن كَيْنْفِيل بِيلِهِ درج بومكي بهد (الما خطم وخبيث التهاب ول قليه) -

فيص به مصراعی مرمن فلب کی شخیص من بهت میسوا لول ریخو کراایراً ہے۔ اِس امری تعین کرنی پڑتی ہے کہ:۔ زا ، آیا خریرا کی مصراعی ضرر کے باعث ہے نیا ورکسی دروں قلبی یا بروں قلبی سبب کی ومبرسے ۔ اول الذکرم عضلی دیوارو كاتغير محى شال ١٠٥- (٢) فريكس دمندير بيدا بونا ١٠٥٠ اوراگردو فرير بن توآيا ان میں سے ایک خریر کا انحصار دور سے برہے ۔ اور زما) یہ کہ قلب کی معلی قابلیت یعے ورزش کرنے پر قلب کی مجیبیت کمیسی ہے اور اس کے متعدد کہفول کی مالت کیا ہے۔ قلیب کے مملّ وقوع ' فعل ' اورمصرای کارکردگی کے تعلق نہا بیت اہم معلومات أنكمه اور ہاتھ كے ذریعیہ مال كئے جاسكتے ہیں اور انعیں مساع العبد كے سابقه بمیشه استعال کرا ما جههٔ را نجنی شعاعین می قلب کے کہفول کی جمامت ا ورشكل كيه تغيّرات كي خنين من ممد مونكي (ملا خطه موشكل ٢ اصغه 225) -

ا - معراعی مرض کے خریرات دورری حالتول سے بیدا ہوجانے والے نررات كرماته فلط مط مومان كاحمال ركية من - عدم دمويت ريوى 274 رقبہ پر ایک کرخت انکماشی فریر بیدا کردیتی ہے ۔عضوی ریوی سسرض organic) (pulmonary disease کے شا ذہونے کو محوظ رکھتے ہوئے بی خرر مشتر کا فی مميز ہوتا ہے اليكن نهايت زياده عدم دمويت كے ساتھ خريات سارے بيت قلبي رقبدیمیل ماته بی اور بلاست برایای دمند کے علاوہ دوسرے دمنوں مسامی بيد موملتے ميں ۔ جو كدائي اما بنول ميں مربضوں كى سانس محولى موتى موتى بعق ب اورساته بي أن من اختلاج اورورم بإكا رجمان موجود بوياسي لمبدا مكن ميكم يعل دقت طلب بو - مديم الدم مرينسول ك نمايال شحب روما تويم يا

من قلب کے کسی دو سرے پیش رَوم من کی روکداد کی عدم موجودگی اور فولادی مقیات کے استعال سے خریر می تحفیف ایسے امور ہیں جن سے تعفیص میں مدومال ہوگی اللہ مدم دموست بدات خود مجی مطانی بازروی کا ایک سبب بوسکتی ہے۔ نون کی ناقعی تومیت دیوار بطین کا نقعی تغذیہ پیاکردتی ہے۔ بیسے ہوجا آسہ مطرانی دمنہ وصلا بر جنا احب اور اسس کا نیجہ بازروی ہوتی ہے۔ یہ فی الواقع ایک مقینی ضرب اور نور کا فرری سب اگرخود معداع کے نہیں تو دمنہ کی ساخت کے مقینی ضرب اور کی سب اگرخود معداع کے نہیں تو دمنہ کی ساخت کے مقینی ضرب ایک بوتی ہے ، بدا اس خریر کو اکثر فعلی تغیرات ہوتے ہیں۔ بہر مال اس کے اور مرس معراعی مرض کے درمیان تعلی یا در موی کہنے ہیں۔ بہر مال اِس کے اور مرس معراعی مرض کے درمیان تعلی فروری ہوتی ہے ، بدا اس خریر کو اکثر فعلی فروری ہوتے ہیں۔ بہر مال اِس کے اور مرس معراعی مرض کے درمیان تعلیم فروری ہوت ہیں۔ بہر مال اِس کے اور مرس معراعی مرض کے درمیان تعلیم فروری ہوت ہیں۔ بہر مال اِس کے اور مرس معراعی مرض کے درمیان تعلیم فروری ہوت ہیں۔ بہر مال اِس کے اور مرس مالات ، بیعنے روماتر م کی فیرموجودگی اور مقینی عرص دورت ، برخور کرنے سے کی جائی عرب ۔

اور فی کا افریسا اکر ان قات قاعدہ قلب پر ایک خریر بلاکردیتا ہے اور فی نسدد کا خریر بلاکردیتا ہے اور فی نسدد کا خریر خیال کیا جاسکتا ہے۔ فی انحقیقت اور فی رقب کا ایک ما دہ انکاشی خریر جس کے ساتھ با زروی کے خریرات نہوں ، معرای ضیق کی نسبت زیادہ اکثر انور سما کے سبب ہی سے جواکرتا ہے۔ مزید تبویت کے لئے مقتل سے دائیں طرف کو نیر طبی نبضان کی اور اصمیت کے بڑھے ہوئے رقب کی جستجوکرنی جانہ نے ۔ اگر خریرا بہے مقام کا محدود ہوجومصرای مرض کے معمولی جستجوکرنی جانہ ہے۔ آگر خریرا بہے مقام کے معمولی ب

بوری پاہتے۔ ار دریہ اسے مناظر نہو تو افر سما کا اور مبی زیادہ احتال ہے رقبول کے ساتھ سختی سے متناظر نہو تو افر سما کا اور مبی زیادہ احتال ہے

المتداب تماء مود (pericarditis) اکثر آیک مین سی واز پیدا کردیتا به و دو برے اور لی مرض سے بہت منابہ ہوتی ہے۔ سیکن وہ عمو آزیاد دَمِیْن ہوتی ہے ۔ سیکن وہ عمو آزیاد دَمِیْن ہوتی ہے ، ایک برائے مرض سے بہت منابہ ہوتی ہے ، اور لی مرض کے معمولی رقبہ میں ختی کے ساتھ محدود نہیں ہوتی ، اور شاید جا بجا ضرب فلب سے دوروں کے ساتھ میران نہیں ہوتی ۔ ما دمرض کی قلیل المدت دوروں کے ساتھ میران نہیں ہوتی ۔ ما دمرض کی قلیل المدت روک دورا نہیں مردور دوران میں بیش قلبی مرد کی دوروں کے میں بیش قلبی مرد کا برماہ وار دیاتی نبیس کی عدم موجود کی پیب البتاب تا ہور بردلالت کرنے ہیں۔ اممیت کا برماہ وار دیاتی نبیس کی عدم موجود کی پیب البتاب تا ہور بردلالت کرنے ہیں۔

ا کیب رومری دقت خارج القلب خریات کی وجسے پیش آتی ہے جواسی آ وازی ہیں جونعل تلب کے ساتھ ہمزمان تو ہوتی ہن تین تعلب سے اِ ہر سیدا ہوتی ہں میکن یہ بیمان کینے کے ماتھ کہ خریر درول قلبی ہے اور کسی معداعی دہنہ ریمدا ہوا ہے عُمِينَ نَهِمَ بُوتَا كَهِ مِنْ معاعِ كاہے۔بلینی اتساع 'جو نه مرف عدم دنوبت سے' الم بَلْدُكِسى مَعَى سَبْبِ سِيحِ بُوكِكِ بِو الْبِكِ راسي انكما شَيْ مُرِيدِ بِيداً كُرْسَلْما جِيمَ إُورايها وا تعد مرض برانت · الكحليت ٬ اور تمديل في مسلابت (arteriosclerosis)ين ٬ اورما دملور يرا مرا من ساريه كي موارض عفيل قلب بين نها بيت عام بوتا جد -مزمن کلوی صرض(chronic rena! disease) قلب کی میش رو

بلکه اتباع اورخریت به پیدا کرسکتا ہے۔ اورایسی معورت بیں بیرمالت مطرافی مرض سے قریبی طور ریمشا بہ ہوگی مس کے ساتھ ٹانوی البیومن بولیت بھی ہونی ہے۔ اس وا قعه سے دقت اور بڑھ ما تی ہے کہ بعض اوقات وہ گردے جومرض فلب کی و صب ایک مزمن إمتلاد کی مالت میں ہول ' زرّانی (granular) بنجاتے ہیں۔ اور اِس سے مبی کدمرض گرده میں انتہائی نتہ اِنی تنا وکی وجہ سے تقیع شدہ تعلب ، نظام وریدی میں ایک انوی رکود پیدا کردیگا ، اسبطرح جسطرح که او فی مطافی مرض عص الوف شده علب يداكرونات -قلب كاولى من بي مي رواتزم ك روُيدا ديا الرتاب درول قلبه كيكسي دوير عسب كي بستجو كرني عاييه - قاروره بن وه خصائص موجود ہوئتے ہیں جوہیان ہو بیکے ہیں (طاحظہ ہومنغیر 271) اور مفن متغیر اور کم تنا 'و والی ہوتی ہے۔ سکین گردے کے مض میں اِس کا زیا دہ اسکان ہے کہ قاروره زمگ بین تمپیکا ، اورمقدارمینملبل ہو' اور اس میں البیومن کی مقیدارزیا دہ یحیاں ہو۔اورنبض بلند تناؤوالی ہوتی ہے۔میلا بت بسٹسر بانی اور انتحل (جو اکثر ایب ساتھ یائی ماتی ہیں) کے باعث پیلا شِدہ کلانیوں میں تنرانی تناؤنغیر ندیر جوا ہے' اورالبیومن اکثر فائب ہوتا ہے۔ مینا نجیم کمن ہے کیفنخیوں کا انحصہ رؤرا دمرض يامتلازم حالتول برركمنا يؤس

إس كي رمكار بعض أوقات جبكه كوئي فرينهين سنا ماسكتا أيب معاري 275 مرر موجود روناب، بي مآلت بينزاوقات مطراني منيق كه مخرى درج ل مي موتى

ے، جبکہ زین کی قیت فضل پریر ہوتی ہے۔

۲ - مصراعی موض کی مختلف نسکلول کی ایکب دومہی سیستخیعس کا انحعماد بری مدیک خررات کی نومبت، اوراس وسعت پر بوتا ہے جس میں وہیں طبی رفبہ بیرسنائی دئیکنے ہیں۔ مکن ہے کہ ایک فریر ایک مصاع کے رفیسے باہز کک دوس مصاع کے رقبکے اندر کمنتنل ہوتا ہو اسی صورت میں مختلف نقلول می كي آ وازكئ نُبدت كا احتباط كے سانحه مقابله كړنا ضروري ہوگا - ا ورطي بازروي اور مطراني بإزروى تغريبا بميشه الييغة مغصوص نوعيت والدخريرات سيهيجان للغ مِاتَے ہیں ۔ میساکا ویربان کباگیا ہے ، مطرانی تسدد باربا بلا اینے مخصوف میت کے خربراً ن کے موجود ہوتا ہے قبل انکاشی خربیات اور انساطی خربیات جب پر مُعَيِكَ مِعَامِ صَدِم بِرَسِنِهِ جائيس (اورقا عده پرينرسنا ئي دين) تُومِطراني نسارُ كانهابيت قرى تبوينا أي ليكن بعض اوفات راس فلب بران مصرمال فررات ا ورطی با زروی کے مانی (فریرات فلنٹ : Flint's murmurs) (الا منظمہ ہو متنجہ (269) المنفق المور (adherent pericardium) كي ما تحد الورومري مالتول كى وجهد من ملين كرساته سنائى دينة بير - ان فلاف فا مركبيل كەتوجىيات منتف بى ، - اڭلەملانى ئىڭ كەارتعاشات أس پر أورقى بازروی کی روکا نصا دم ہونے سے ' یا اس سے از بنی بطینی روپر دسکیلے جانے سے ۔مندرمہ بالا دوروول کا باہم دکر ملیانا ۔ ایک منجدمار کی بیدائش، جوبائيس بطين كاتساع كي وجها المراد جبكه مطراني دمنه طبعي جسامت كابو-به مالت بعض اوقات انسا فی ضبق (relative stenosis) کہلاتی ہے۔ آخری نوضيح زيا دو قرين قياس معلوم اوتي ہے۔

س - فالباً تقفیق می سب سے زیادہ اہم امر مجیب قلب کی خمین بید۔ ورزش یا محنت کے بعد دم بچو لنے یا حسنتگی کی مقدار کا مشاہدہ کیا جا تا ہے (ملاحظ ہوصنی 223) - قلب کی جماست سے مصرا عی نقص کی وسعت کے متعلق مفیدرہ نہائی حاصل ہوتی ہے ۔ یہ جس اور قرع سے معلوم کی ماسکتی ہے لاشما میں ہستعال کی ماسکتی ہیں اور بیاری میش پرورش کا تناسیب ظ برك في كا يرقى قلب بكارمي (طا خط بوصغ 249) -

قلب اور تعییمپرول کے امتحان کے بغیرکوئی تضخیص قائم نہیں کی ماسکتی کی ماسکتی کی ماسکتی کی ماسکتی کی ماسکتی کی ماسکتی سے خالی ہمیں کہ بچوں اور نوع اشخاص میں مطرانی مرض اور سل رہوی (phthisis) کے درمیان اکثر ایک سطی مشاہبت ہوتی ہے کیونکہ اول لذکر نمایاں شحوب لاغری اور نفنٹ الدم پدا کرسکتا ہے ۔
مایاں شحوب لاغری اور نفنٹ الدم پدا کرسکتا ہے ۔

اندار - اسی ایک ہزار اسا بعد دوارہ معالیہ کیا گیا کہ بن فاغ الخد ہے اور اسی ایک ہزار اسا بعد دوارہ معائند کیا گیا کہ بن فاغ الخد ہوں کو مرض قلب تعا اور ان کا ۱۰ سال بعد دوارہ معائند کیا گیا (20) ہے ہوا کہ ایک خواب اندار کے لئے اہم ترین عنا مرحل فرزش اور بڑا قلب ہیں۔ چنانچہ معتدل کلانی اور قلیل محل کی صورت میں تقریباً نصف مریض اسال کے اندرم واجع ہیں ۔ انتہائی کانی کی صورت میں اور فیصدی اور امتلائی فشل کی صورت میں ، و فیصدی اسال کے اندرم واجع ہیں ، اور اگران دونوں کرو ہوں کو کھیا کیا جائے تو زندہ درجنے کی تعرب ، میسد ہوتی ہے ۔

اس بورے سلد میں ۲۲ فیصدی مریض با تنظیف اور بلا تغیراسال زندہ
رہے 'اور یہ عدد فالآ امسل سے کمتر ہے۔ نصف مریض زیا دہ تراستلا فی فشل کی وجہ سے مرکعے 'اور ۲۹ فیصدی فشلی اصابتوں میں اس فشل کے ہمراہ ساری التہاب دروں قلبہ اور (۳۰ فیصدی میں) اذبئی رمیشکی انتہا فن تھا اوردو مری التہاب نتیجی اور درگر مرابیتیں دیکھی گئیں ۔ تا گھانی موت 'کل اموات میں اصابتوں میں دیکھی گئی۔
سے کا فیصدی میں دیکھی گئی۔

جب مریفول کواستماعی طلاات کے لیا ظاسے گروہ بندگیا گیا تو وہ مریف من کوری مریف میں میں اس کے اندر موسکئے۔
اور طی ضیق اور آتشکی اور طی بازروی کی تمرح اموات ۲۰ فیصدی ہے (یا اینوسم کوستنی کرنے کے بعد ۸ فیصدی) ۔ غیر پیچپیدہ غیر آتشکی اور طی بازروی کا تمرح اموات ۳۳ فیصدی 'اورمطرانی ضیق کی ۳۳ فیصدی 'اورمطرانی ضیق کی ۳۳ فیصدی 'اورمطرانی ضیق کی ۳۵ فیصدی 'اورمطرانی ضیق کی ۳۵ فیصدی 'اجدانی فیبت کی ۳۵ فیبت کی ۳۵ فیصدی 'اجدانی فیبت کی ۳۵ فیصدی 'اجدانی فیبت کی ۳۵ فیبت کی ۳۵ فیبت کی ۳۵ فیبت کی ۳۵ فیبت کی ۳۰ فیبت کی ۳۵ فیبت کی ۳۰ فیبت کی ۲۰ فیبت کی ۳۰ فیبت کی ۲۰ فیب

مطرانی خیق میں تمرح اموات ۱۰ فیصدی نمویا فیۃ فلیق میں ۳۹ فیصدی نمنیف اور کی بازروی میں ۱۹ فیصدی ہے۔ لہب نا مصری بازروی میں ۲۵ فیصدی ہے۔ لہب نا مصرای فیرری نوعیت اتنی اہم نہیں ہے کہ جتنا ترمیم من عوامل ہیں۔ اندار میں دو عالی جن پرسی دو سری مکر غور کریا گیا ہے ' خاص طور پر اہم ہیں' بعنی اذینی رشکی انقباض اور شخت الحاد براتی التہاب درون قلبہ (طاحظ ہو)۔

آگرچه اصابتو*ل کے اس سلس*لہ میں سے بچیے ا*ور بورتیں سنٹنیٰ ہیں ' ''یا ہم* بیماسیار خاص طور پرا ہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ بیر گوما ایک مرض زورہ آبادی م بورے مصدیعنی انقالی اور صاحب فراش دونول میشتل ہے۔ سابقہ ایمیشین میں ایسے مریفنوں کے بخزید پر اکتفا کی گئی کہ جو ہیتال نیں مرککئے تھے۔ اب اسس کی بمائے زیا دہ کمل اعداد وشمار درج کئے گئے ہیں ۔ تبعض تکات پرخاص طور پر زور دینے کی ضرورت بنے مثلاً ایک مطرانی انکما شی خربر کی عدم اہمیت ملائمیڈنج کی وجہ سے معذورالخدمت گردا نے ہوئے میا ہبوں کی مبورت میں مطرانی بازروی کے خریر کی موجودگی یہ طا ہر کرنے کے لئے بیکار ٔ ابت ہوئی کہ آیا وہ شخص بورے کام پروایس آنے تھے قابل ہوگا یا نہیں۔ مطرا نی ضیق اَب*ِب خطرناک ضربہے*' موکہ وہ رو ہاتر می مطرانی مرض کے مزمن یا کرتر کیا وحملوں کا اختیا تی متجہ ہے ۔ لیکن خفیف اصابتوں میں مکن ہے کہ اگر مرامیت رک مبائے تو وہ برسول عمری ہوئی مالت میں رہے ۔ اور طی بازروی اور مطرا فی ضین کا اجتماع اندار کوزیا دہ خراب نہیں بناتا نے بین میں حا دروہا تزم یا دیگر مراً بتوں کے مرر حلے خطرناک ہیں کیونکہ ومعفلة قلب أورمصراعول كومزيدنقلمان ببنجات بي -مطرا في منبق موني م ر من ا درمعرم بینوں میں اذینی رکشی کی انقباض ہونے کا اسکان - یہ امرکہ امتلائی فشل من اگریشگی نقیاض موجود ہوتو فوری اندار مہتر ہوجا ناہیے، لیکن آخری اندام خراب تر ہوا ہے۔ اور طی گروہ میں ناگہا نی موت کا امکان ' اور غیرآ کٹ کی اور ملی بازروی میں جِرتُومی التها ب درول عضاد قلب کا اسکان حِل ہونے سے مالت کا زماره تشویشناک ہومانا به

تتخر ميز _ پُوكه نوعر بچول ميں مرض قلب كى بنينزا صابتيں ما دروما ترم

کی وج سے ہوتی ہیں ' اندار اِسی بیٹ تل ہے کہ اُس مِسْ کا تدارک کی مائے مسلم ج کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

ریاده عروالے شخصوں بن انتوا کا امتحان کرنا جاہئے ' المفصوص ان کوکوں میں جو پہلے ہی مزمن مصاعی مضر من بنا ہوں ' کیوکر آگر انعیس کوئی ان کوگوں میں جو پہلے ہی مزمن مصاعی مض من بنا ہوں ' کیوکر آگر انعیس کوئی مرا بیت لگ جا ہے تو وہ ساری التہاب درول قبلہ (pyorrhæa alveolaris) 'اسوقت جبکہ ببیب پیدا کرسکتی ہے ۔ جیج جو فیزی (pyorrhæa alveolaris) 'اسوقت جبکہ ببیب آزادانہ خارج ہوتا ہو ' جنداں خطرناک نہیں ' سیکن آن بحوثروں کو خارج کرنے نہیں کی احتیاط علی میں لائی جا ہے جو دانتول کی جراوں میں دور خیصے ہوئے ہول اور جو یا تو التہاب درول قلبہ کا ایک ما دھلہ واقع کردیں یا ایک مزمن فیر مسوسس مرابی اور ایت اور آس کے ساتھ مصراعوں کا ترقی فیدی تشقوہ بیدا کردیں ۔

ت نوعی مرایتول مین آتشک مرض قلب کا عام ترین سب ہے ، جنانچ اگریہ مرض ہوگیا ہوتو بعلدی مشدد دافع آتشک علاج علی میں لانا چا جئے۔

تُركِ فِي مُرضُ كَا نَتِحِ عُومًا المُطاطِ عَفْلُ قَلْب بُوا كِرَاجِمِ ، جِنَا سُجِ إِس كَمَّ مُنْ كَا نَتِحِ عُومًا المُخلِم المُعَلِّم الْعَلَى الْمُعَلِّم الْمُعْلِم الْمُعَلِّم الْمُعْلِم الْمُعْلِم الْمُعْلِم اللّه اللّه المُعْلِم اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

. قلب کے مزمن مر*ض کاعلاج*

مندرجُ ذیل اشارات کا اطلاق نه مرف قلب کے مزمن مصراعی مرض کر اطلاق نه مرف قلب کے مزمن مصراعی مرض کر منتصبی تا دمور (adherent pericardium) ورانحطا طِ عضله قلب کی

اصابتوں رہمی ہوتا ہے۔

علاج برفورکرنے سے پہلے امور ذلی کا دریا فت کرلینا فروری ہے:۔(۱) آیا فشلِ قلب کے ابتدائی امارات ، یعنے علیف ، سانس کا بجون ، اورورزش کے بعد محت العقی یا پیش قلبی ورو ہونا موجود ہیں۔ (۲)۔ آیا بعد کے امارات کیف گردن اور مبرکی وریدوں کا احتقان زرا ق ، اور ہبتج موجود ہیں۔ (۳) آیا قلب برمعا ہوا ہے ، اور آیا مصراعی مرض کے ہاتفۃ اب عضام قلب کے امارات موجود ہیں۔ (سم) آیا قلب کی کوئی لینظمی اور خاصراً ذینی رشکی انعتباض موجود ہے یا نہیں ۔ (ھ) آیا قلب میں ما دمرایت ہونے کی کوئی شبا دت موجود ہے۔ یا نہیں ۔ (ھ) آیا قلب میں ما دمرایت ہونے کی کوئی شبا دت موجود ہے۔ امسول علاج بہدے کہ مریض کی زندگی کو باقا عدہ بنایا مبائے آل قلب میں فابلیت سے زائد نہو۔

کونی برای مرای استانی اما بول بی مریف کی علامتیں ہی جشر رمہا ئی اما بول بی مریف کی علامتیں ہی جشر رمہا ئی کرتی ہیں۔ کام کی اسس مقدار کا معلوم کرنیا خروری ہے جس سے فیر معولی کان اسکیف 'یا سانس بھولنے کا 'یا در وقلب کا حلہ ہوجا تا ہو ۔ کا مل طور پر ندرست شخص میں یہ علامات سرف نہا بیت تربیع ضلی ورزش کے بعد موسوس ہوتے ہیں۔ تازہ بخر بنے بتلایا ہے کہ ایسے بہت سے اشخاص ہیں جن میں بیش قلبدر بینائی دیسے والے انجاشی فریات کے با وجود روما تربی یا اور میں سرایت کی مرگذشت نہیں یا فی جاتی ہو اور و شدید تربی عفیل دیسے والے انجاشی فریات کے با وجود کو ایسے اشخاص میں المام کرتے ہوا سے فرور ہوں تو عقلمندی ہی ہوکہ مریف کو مستوں کرتا ہے ۔ ایسے اشخاص میں آن کے ورزش کے فرزش کے مستوں کرتا ہے ۔ ایسے اشخاص میں آن کے ورزش کے فرزش کے مستوں کو است موجود ہوں تو عقلمندی ہی ہے کہ مریف کو مستوں کو است موجود ہوں تو عقلمندی ہی ہے کہ مریف کو مستوں کو است کی لوری قوتِ معنوط کا م میں لانے کی اجازت نہ دی جا ہے۔ قطع نظراس امر کے کہ وہ تند و تدید ورزش می معرولی مقدار سے زائد تعلیف کے اخیرانجام دے سرائی اطلاق مطرانی بازروی اور اور طی ضیق کی ان امام توں وہی مقارب وی جا ہے۔ اس بیان کا اطلاق مطرانی بازروی اور اور طی ضیق کی ان امام توں وہی جا ہے۔ اس بیان کا اطلاق مطرانی بازروی اور اور طی ضیق کی ان اصام توں وہی ہو ہے۔ اس بیان کا اطلاق مطرانی بازروی اور اور طی ضیق کی ان اصام توں وہی ہو ہے۔ اس بیان کا اطلاق مطرانی بازروی اور اور طی ضیق کی ان اصام توں وہی ہو ہے۔

که من میں واضع کلانی قلب موج_ور ہو۔

جوم ریف مندل و زمنس ، مثلاً دور نے یا زیند پر یا بہاڑی پر نیزی سے چلنے ' یا مسطح نرین پر نیزی سے چلنے ' یا مسطح نرین پر نیز جلنے کے بعد علامات ظل ہر کرتے ہوں ' اُن میں اِن ملاما ' کو پیدا کرنے والی ورزش کی مما نعت کردینی چاہئے ۔ اِس کے ساتھ ہی جو ورزمش برداشت ہوسکے اُس کی امبازت دینی چاہئے ۔ اُس کے قلب کو مناسب سے کم ورزش دینا بھی بُرا دستور ہے ۔ لیکن مریض کو کہدینا چاہئے کہ اگر بالغرض سوقت ورزش دینا بھی بُرا دستور ہے ۔ لیکن مریض کو کہدینا چاہئے کہ اِنگل جائے ہوئے۔ با مہے کہ بائل جو میں ہوجائے ۔

ان تمام امها بتول مي جن مي منتقى مرابية موجود بو ان تمام اصابتون مي جن بي فشل تعلب نرفى إنمة هو، ان اصابنول بي جوور بدى امتلاد ظالمركرتي بيول، ا ُونِی رَشِیکی انتباض کی اصابتول ہیں جن میں قلب سریع ہو، اورڈیجیٹالس کا ایک بورا نصاب دبینه کی ضرورت ہو[،] ا ورسب سے زیا دہ ایم ان مریفیوں ہیں جو کم**ر** بونے یریا آسند است چلنے پرا الات تعلیف طاہر کیتے ہول است برآرام لینا مود ہے۔ مربق کوجیت لیٹار منا چاہئے الیکن جتبعن انتصابی ہوتوا کے بہتر پر سبارا دے کر بھادینا جا ہے۔ مریض کوسکون سے رہنا ماہئے اور اس کو تشویش اور مبجان بالكل مذ ہونے دینا میا ہے ۔ تمام بے منہ ورت حرکت سے احراز لازم ہے ا ور بالغصوم نبیندا جی آنے دبنا میاہئے، کیونکہ لی وہ حالت ہے مِس سیعے قلب کو كالل ترین قسم كا آرام حامل بو تاہدے ۔ ہر ریفِ قلب سے معالجہ میں رہی ایک نہا ہیں اہم امرہے حبل کا اہتمام ضروری ہے ' خواہ کچید ورزش کی امبازت ڈی گئی ہویا ندد گئی ہو نلمسب العین ہر ہونا جاہئے کہ سنتہ میں نوسسے دس <u>منط ک</u>کریں ہمو منتقی تمیند تعظمنطون کی تعداد اس کی نسبت کم ہو۔ ومسکی (Whisky)۱-۱ اونس بطور ایک خواب ور دوا کے دیجاسکتی ہے 'یا پیرالڈیما' کد (paraldehyde) ۲-۱ (رام كى خوراكول مي - فذاكافى ، ساده اورمريع الهفهم بونى ما بهف وه مغلوط موسس (solid) اور ما نع بوسكي به مقداري يكسى ايك وقت بي أنني نبوك معده كو مرانبار كردے اوراس كى نوميت اسى بوك بور تحييدا ور تدرن بيا كرسے سیالات کوزبادنی کے ساتھ نہیں دینا ہائے۔ اور اگر تہتیج ہو تو کھی در آمد کو کم کردینا جا ہے۔ فرہی (obesity) میں قلیل الحوارہ غذا دینی چاہئے کیونکہ فرہی تحول بڑھ جا سفے کا ایک عام سبب ہے ۔ مال میں مرض قلب کا علاج بندر نبعہ در قبیہ مرآری بھی کما گیا ہے کہ دس سے تحل کو کم کرز، اور قلب بربار کی شخفیف مقصود ہوتی ہے ۔ فی

ہے دجس سے محول او کم کرنا اور ملاب برباری محقیق مقصود ہوتی ہے ۔ بحب مریض کو کچہ عرصہ تک بستریس آ اِم کرنے کے بعد افا قد مال ہو توورز س

کاآ فاز صرف آسته آسته بونا جا بیئے۔ بستہ بی میں پڑسے بڑے ہاتھ پاؤں بلاف کی امازت دیر آست کا تھے پاؤں بلاف کی امازت دیر آست تدریجی ورزش کرائی جاسکتی ہے۔ دوسری ترکیب یہ سبے کہ جب مربیض المصف کے قابل ہوجائے تو روز بروز آس کے چلنے کی مقدار بردھائی جائے۔ یہاں تکسب کہ ورزشن کی حتربردا شن تک پہنچ جائے۔

رقی یا فته فشل قلب کی اصابتوں میں جن میں منتقب احشاء کی امثلاء کے ساتھ اُ ذیبا می امثلاء کے امثلاء کے ساتھ اُ ذیبا موجود ہو؛ علاج کے بین خاص اصول ہیں ؛ ۔ (۱) اُ ذیبا کی ستیال کا اخراج 'یا خون کی لدینا ۔ (۲) آگیجن کا ستعمال ۔ (۳) اوریہ 'بالحصور کی بیال کا استعمال ۔

مام شرطی نون کا دبا وگرا ہوا اوروریدی دباؤ تناظرا بڑھا ہوا ہے ، جس کا نیتر بیدیکہ قلب کی دائیں جانب استعدر متن ہوگئ ہے کہ استے اپنے ما فید پڑنتبن ہونے میں دقت ہوتی ہے ۔ ایسے حالات بیں اُ ذبنی رہے کی انتقاض اکثر موجود ہوتا ہے ۔ وسلی ورید باسلیق میں بُرکا لگاکر ۲۰ یا ۲۰ انس کی مقدار میں نون فارج کردیتے سے ورید باسلیق میں بُرکا لگاکر ۲۰ یا ۲۰ انس کی مقدار میں نون فارج کردیتے ہوجاتی ہے ۔ نون کا وہ بہاؤ جو قلب کی طرف ما آجے کہ ہوکر تکلیف میں تحفیف ہوجاتی ہے ۔ انتھائی اصا بتوں میں قاصرہ کردن میں بیرونی والی ورید کو کھولئے سے اور می زیادہ مرینی انتھائی اصا بتوں میں ایک مسل کیا جا اور قلب کی دائیں جا نب کوراست سکین بنجے گی ۔ ورید میں ایک ما دوری کا لگانے سے کا ٹی نون عاصل کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ۔ ایک میں ایک ما دوری کا کہ کو ایک جو ٹی چوٹی کوئی میں کہ استعال کی جا ہے ۔ ورید ربر کی نلی کے ذریعہ ایک بندشیشی سے الی ق رکمتی ہو ۔ بھر اس بوئل پر امتعال میں دیا ہو اس بوئل پر امتعال میں لایا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید کا می بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید کا می بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہیں بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا جا سکتا ہیں بی بالیا جا سکتا ہے ۔ ورید میں بالیا ہو اس بالیا ہو اس بالیا ہو سکتا ہے ۔ ورید کی میں بالیا ہو سکتا ہو کی بالیا ہو سکتا ہو کہ بیاں بالیا ہو سکتا ہو کی بالیا ہو کی ہو کی ہو کی بالیا ہو کی ہو کی بالیا ہو کی بالیا ہو کی بالیا ہو کی ہو کی بالیا ہو کی ہو کی کی ہوئی ہو کی ہو

(۳) ای دید ، بو قلب براست منیدا ترکیت بول نسبة چندی بی رسب سے زیا دہ منید فیمیشانس (digitalis) ہے ، جس کفول کا ملی ند سب سے زیا دہ کیا گیا ہے ۔ اُونی رشکی انقباض میں اُس کے استعال کا تذکرہ کیا گیا ہے (الما حظہ بومنی 244) ۔ إن اصابول میں بلیس تیزی اور برقاعد کی کے ساتہ ضرب لگا رہا ہوتا ہے اور فریحیٹانس ایک دوائے شافی کے طور پرمل کرتا ہے ۔ نبض فریمان کے ورد کیا جم برص جاتا ہے اور اُدیما فائب ہوما تا ہے ۔

الیکن دوسری اصا بتول میں می ، جبکہ اُ ذینی رسینی انتباض موجود نہو ، فی بھی نس کامیا بی کے ساتھ استعال کیا جاسکتا ہے ، با منعوص اُ س کے مدالبول اٹر کے لئے اُ س کے پسے ہوئے بیت ، جوامی اصابتوں کے لئے استعال کی جاتی ہے ۔ یہ نہسیں کیا جاسکا کہ اُس کا اُٹر اُسیقدر نیفینی ہے جسقدر کہ اُذینی رسیکی انتباض میں ہوتا ہوا ہو نعال بیفے دُریمیٹالین (digitalin) یا دُریمیٹاکسین (digitoxin) کے طور پر جوا ہر نیعال بیفے دُریمیٹالین (digitalin) یا دُریمیٹاکسین کی مقاد ہے ۔ وہ نوا کر بیت کہ وہ ایسالی کے استانہ کی استانہ کی اور بارہ یا چیس گھنٹوں کے بعد نبیتہ کہ او یا چوٹی معادول میں دے جاسکتے ہیں ۔ دُریمیٹالی ایٹ پورا اٹریدا کر فی تا ہا۔ یا چوٹی معادول میں دے جاسکتے ہیں ۔ دُریمیٹالی ایٹ پورا اٹریدا کر فی تا ہا۔ کرین ہے ۔ اِن مقداروں میں دے جانے پر دُریمیٹالی ایٹ پورا اٹریدا کر فی تا کہ اور بارہ یا جس گھنٹوں کے بعد نبیتہ کہ اور بارہ یا جس گھنٹوں کے بعد نبیتہ کہ اور بارہ یا جس گھنٹوں کے بعد است میں میں اور اور میں بیا ہوجانے والے سی طامات میں میں الایا جاسکتا ہو در اس کے علاج کے دوران ہیں پیدا ہوجانے والے سی طامات میں میں الایا جاسکتا ہو در بیوبیٹالی کے علاج کے دوران ہیں پیدا ہوجانے والے سی طامات معنور کھنٹے ہیں ۔ بیان کئے گئے ہیں ۔

کی حالت میں ' تعلب کی بائیں جانب کی منش بڑھانے کے لئے فرانس میں اُومِین (oubaine) کا استعمال کیا گیا ہے (لے ملی گرام دروں وریدی را و سسے ' با ا ملی گرام بڑا و دمِن ' دن بھریں ایک یا دو بار) ۔

ن ہے کہ دورے علامات اور بیمید کیوں کا علاج می کرنا پڑے أكرامتسفاء ديجيال سے رفع نه بوتو، تھيو برومين سوديم سيلى سليك (theobromine sodium salicylate) (ورايورشين: diuretin) آما . الأرايورشين دن میں میں بار' سلسیار' بہورمن (purin) کی بہترین دواہیے' جویا تو بصورتِ اقراق يا ايك آميزيه مِن تمربت رنجتيل سے نوب وستبودارَبنا كراستَعال كى ماسكتى ہے۔ يه إدور غانباً لوي عناد كي نفوذ يريري برماك ، يا شايد فاعلى كويكون كى تعداد من زياد تى بیدا کرسے اینا اِٹر طاہر کرنے ہیں ۔ گردوں میں آنسیجن سے صرفہ کی زیا دتی نہیں ہیدا ریتے یکن آگر کو بی عوق شعر معتقن ہوں اور شاید کم ہوا دمویت میں مبتلا ہوں، تو عمن ہے کہ یہ دوائیں ناکارگر ہوں ۔ یوس یا(urea) مجی متا ھاگرین کی مقداروں مين زمايا ماسك هـ بوريا كو يجول مي سه تقطير اوما ماهه اور أنيبيات میں سے می اس کا افراج ہوتا ہے ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کا بیبینی سال کا ولوجی دَا وَ لِمندر مِنا ہے اور اُنمبیات میں نسبتہ نیچے یانی دوبار مکم مذب ہوتا ۔۔۔۔ اوراسی واسط فارج او ما ما ہے ۔ آخر آسیل گان (salyrgan) ایک اما تی مِركب بيماب (٢ كعب سمرتك درون مفعلى طوري) اورنبيط ال (neptal) ے کمعب سمریک) ہفتہ میں ایک یا دومر نبرد کے جائے ہیں اور یہ قدیم لائج شدہ يمايي (Pil Hydrarg.) كانسبت زياده كارگر بوتے إلى - اگرانكے ساخسات ا يمونيم كلوراند ، چوبين گمنشون مين ١٠٠ كرين كي مغنا دون تك ، استعال كيامائهُ توبدا ورامى زياده كادر اوست إلى - آخرا لذكر فالبا ايك صنوى ترست وموست يداً كركماينا الربيداكراب، س كانتجريه بوتاب كرسونت كجوجبذكرده سيال آزاد كرديية بن - إس مقينت كواسوقت يا در كمنا ما بهيئه جمير كمجومتلازم النہائب گردہ بھی ہو ' جس میں ترمت دمویت پہلے ہی سے موجود ہوسکتی ہیں۔ قلب پر زرد اکٹر شدید ہوتا ہے' اور اِ س بی لغاع (belladonna) کے پلیترو

ہے ، مارفیا کی تعوزی مقداِ روں کے داخلی کستعمال سے اور ہے گرین مارفیا سکے تحت العلدي التراب سے تحفیف کی ماسکتی ہے ۔ کمانسی کا مرارک ممنی شات اور مسكّنات كى تحور ى مقدارول سے كيا ماسكما بيد (طاحظه مو التهاب شعبى كا علاج) ا ورقعے کا تدارک فوار مالحات سے ۔ اور لمی مرض میں 'جس کے ساتھ بیش مروش معی موجود مو ایک نهایت تکلیف ده علاست تاب کاتندفعل ا ورگرون کی اور عام لوريرسارے جسم ركى وريدوں كاترم يناہے - إس مس مبغي مجيناً كسارا ماس قطرا^نت)تمه ، برومانداز کیمه ورمار فیای ایک تموزی مقدار کے استعمال سے بہت کی تخدیف ہوسکتی ہے۔ ربیوی نزف شاذبی اتناکا فی ہوتا ہے کہ زندگی سے لعظ خطرے کا باعث ہو' اور اُس کے لئے ما بسات الدم کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ فعل قلب كيد الكها في طورير موقوف يا كمز ور بوجاف كي ما الول من بالخصوص وران مدم حسيت مين عبكه موت قريب الوقوع بول ١٠٠٠ مين احصه الميرسي لين (ad renalin) کے اتا ۳ سی ۔سی کا انتراب ایک بیکیاری کے ذریعہ سے وائیں بلین کے اندر کونے سے زندگی بحال کی جاسکتی ہے۔ سوئی ، جس کا طول ۳ انجیہ لمبا ہوتا ہے، یانچوں ضلعی کہ ی ہے اوپر ،عظم النص کے بائیں جانب کے قربیب ٔ است ینچے کو اور قدرے اندر کی طرف اگلاری جاتی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ا ان ۲ انچ کی گرائی ربطین کے اندرسوئی پہنچ میں ہے انتراب کے پہلے تعوال مل

بالمرکمینج لیا جا آئے۔

بور سے اشخاص کے مضا، قلب کے مرض میں مانس بجو لین کے دولت کا حظے بہت تحلیف بیدا کردیتے ہیں ۔ آئیجن کے استفاقات اکٹر نسکین کا باعث ہوتے ہیں ، اور مارفیا کے تحت المبلدی انٹرابات (ان سے می تسکین ہوجاتی ہے)

می نسبت بیندید و تر ہوتے ہیں (25) ۔ اس نظریہ کی بنا پر کرمانس کا مجول جانا افسا فی چپ جانی فٹل کے ذریعہ ابتدائی ریوی تہج بریا ہونے کا نیتجہ ہوتا ہے (طاخطہ ہوصنعہ 252) مصنف نے مجیم ول میں ہوا کا دباؤ زیادہ کرنے کے لیے بلیست ہوسنعہ کے میں اور کا دباؤ زیادہ کرنے کے لیے بلیست کے مانے ان کیا گیا ہے۔

امی کی تابی کی کریوں تہج کے میں اور کی دیا ہے ، بوکہ ریوی تہج کے میں ان کے مانے ایک کے مانے انجام دیا ہے ، بوکہ ریوی تہج کے میں ان کے ساتھ انجام دیا ہے ، بوکہ ریوی تہج کے میں ان کیا گیا ہے۔

آتشكى الهّاب عضلهٔ قلب كا ملاج دسيع مدت مك دا فع آتشك إ دوي سے کرنا میا ہے نسلف تورسینال (sulfarsenol) (سوء تا مهم دیگرام) سے مميق بخت الجلدي اثرا بات بنمنة واردئے ماسکتے ہیں۔ إس كا ايك 'نصاب ہ کرام پرشتل ہوتا ہے' ا ورمخی لنب نعبا بول کے درمیانِ y جفتے گذرما نے ہے ماتے ایں ۔ نصاب کے دوران س ایکن بوآ بودا کران کو ایران کیور (yellow iodide) (of mercury روزانة بين بار معمورت أقراص ديا جاسكة فيه بحربط معاكر دن مم میں ۸ یا ۱۲ دیئے جاسکتے ایں ۔ نصابول کے درمیان میں پوٹا مرض فلب الورخل -اكثرا وقات بيسوال اثمتا ١ كُنَّا أَن مُنْفِيق م حل ہونے دینا ماہئے یا نہیں' جن میں استماع کرنے پر مطرانی بازروی'مطرانی ضیق یا اور طی با زروی کے خررات توجود پائے گئے ہوں ۔ ذَیل کی صورتوں میں حل بوف دینا چاہئے ،۔(۱) اگراس کی شہا دنت موجود ہو کہ معراعی مرض کو الی عرصہ سے ہیں ا فرمال ہی میں مصرا عول کا کوئی الہّاب نہیں ہوا ہے۔ (۲) آگر جُدكى ممينيت المي بو- (٣) اكر قلب برا يا غيرمعولي طورير تحريك ندير ندبو-(۴) اگراس کی نے ملبی ہو۔ (۵) اگرا ور کمی با زروی میں ابکماشی آ وِانعبا کمی نشار دموی کے درمیان کوئی برا فرق نہو' اور ضربتہ الاس بہت زیادہ باہر کی طرف یا بهت زیاده زوردارنبو-(۴) آگرمطرانی ضین مین کمیانسنه یا گهری سانس لین ئے بعدشش میں متواتر ککھکات (جوا ذیما کا آفاز ظاہر کرتے ہیں) نہ موجود ہوں۔ د وران حل میں متر اد انکماشات کے وق*وع بر کو*نی توجنہیں کرنی جا ہے لیکن اذیبی رینکی انتباض کی موجودگی کوقطمی رکا وث تصور کرنا میا دینه (Mackenzie)-اگر مشوره كصفلاف حل تمروع هوكها جه تومريفيديرا متيا طرك سياحة نظريمني عليجة ا وراگرناموا فق علامات كل مربول توحل كوختم كرديناً ميا حصُّه - جب كبعي قلب نعلمُ ناكا دكردى ككوئى الرات فابركيب تومرلينه كوسترس سهالا ليكرآرام لينا اوردن کے وقت کیے وقعول کے بعد گہری سائش لینے رہنا جائیے تاکیمیلیڑو كي اندرسے دوران نون بون بونے ميں مدد پہنے - مل كة خرى جينول مي وضع على كا المالدكرنا أمك لولي على بيئ اوراسي والسطف اس مي قلب برأس سعة زياده بالعرقة

ہے کہ جتنا خود بخد وضع حمل ہونے کی معورت ہیں ہوتا ہے۔ ابیں اصا بتول میں اُسکا قید قید کے جتنا خود بخد وضع حمل ہونے ' الحضوص اِسوجہ کہ اس علی برفالوسانی انبوبول کے بعض حصول کے استیصال جزوی کے ذریعہ تعقیم کاعل بمی ساتھ ساتھ انبوبول کے بعض حصول کے استیصال جزوی کے ذریعہ تعقیم کاعل بمی ساتھ ساتھ انبوبول کے بعض حصول ہے۔ میکٹری بران کرتا ہے کہ شا دی شدہ عورت میں مرض تعلیم ہوتی ہوں کوئی درجہ میں مانع جماع نہیں ' بشر کھی کو جماع کی خو ہش معلوم ہوتی ہوں اور وہ اسے انجام ' بینے کی قالمیت رکھتی ہو۔

خبيث النهاكِ ول فلب

(malignant endocarditis)

سارئ عفونئ تقرحى ياجر تومى المتاهج ون قلبه

(infective, septic, ulcerative or bacterial endocarditis)

بحث اسباب - حادروات مبین الباب قلبکا بیش رو هے الکن ایس اسا بول کی تعداد [۱۹۰ میں سے ۱ ه - آسل (Osler) آس تعداد سے کہ ہے کہ جس میں روات رم سادہ البتاب درول قلبکا مبیب ہوتا ہے - ان بی سعفی اصابتوں میں ملایات کا نموروا تر بی تب کے دوران میں ہوجا تا ہے اور بعض میں یہ علایات مرمن مصاعی مرض کے دوران میں بیدا ہوجا تی ہیں ' جوقوع بوایت کی استعداد بیدا کردتا ہے - اِس کے برطس ' ضیف الباب درون لکا وقوع اسوقت بھی کمن ہے جبکہ مصراع تندرست ہوں ' بالخصوص کمشف اور وقوع اسوقت بھی کمن ہے جبکہ مصراع تندرست ہوں ' بالخصوص کمشف اور سخت عضلی کا م کے بعد زمانہ جنگ کے تنجوبہ سے اس کی تصدیق ہو مکی ہو مثاب منظ قرمید ' نفاسی اعمال اسب معتد ما د ذات الربیہ ' ثولانی حیات منظم نواز کی میاب وسکتے ہیں اغیر میاب فرموں کی مواز کرموں کی اخرا میا ہو سکتے ہیں اغیر مواز کرموں کی اخرا مات مواد (البتاب میں البتاب میں البتاب مواد (البتاب مواد (البتاب مواد (البتاب مواد (البتاب میں البتاب میں البتاب میں البتاب موقت نویا وہ مول پر مول پر البتاب میں البتاب میں البتاب میں البتاب موقت نویا وہ مول پر مول پر البتاب مول کی البتاب موقت نویا وہ مول پر مول پر البتاب موقت نویا وہ مول پر البتاب مول کی البتاب کی مول کی

ایسا بوف کا امکان بچول میں مزمن الہاب لوزمین یا بالغول کی مالت بن ندانی ایسا بوف کا مکان بچول میں مزمن الہاب لوزمین یا بالغول کی مالت بن ندانی ندانی نداخی مامن کوریہ ہو تاہدے ۔ ۱۰۰۰ فارخ الخدمت آدم بول میں کہ جن کو مرض قلب تھا ' سخت الحا دجر تومی المہاب درول قلبہ کا حلہ ۱۲ فی صدی میں بوست کا بوگریا ۔ اور کی بازروی کی نیز آتشکی اصا بول میں یہ ۲۲ فیصدی میں موست کا سبب ہوا ' دیکن مطرانی ضیق میں ۲ فیصدی میں (20) ۔

ساری التهاب درول قلبه (infective endocarditis) میں احتاء کے اندر منتف دقیق عضو ہے بائے جاتے ہیں۔ نبغات بعد ' بینے نبقہ سبحہ الخضر (S. viridans) نہایت عام ہیں ، جو دہن اور بڑی آنت کے اندر طبع والے نبغات سعی تیب نبغات سعی تیب ' نبغات ریوی فرید لین در کا عصی ذات الربیہ اور تدران ، خناق وبائی ، اور تنب موق کے فرید لین در کا عصی ذات الربیہ اور تدران ، خناق وبائی ، اور تنب موق کے مقتیہ ' اور نبقہ سوزاک اور نا ہوا باش (anærobic) محقیہ کمی طبع ہیں۔ یعضو ہے کسی مرکز مرابت سے کا خون کے اندر دا مل ہوجاتے ہیں اور وبال سے بحرمد اعول پر مرتب ہوجاتے ہیں۔ مرض کی زیادہ ما دقسموں میں نبغا سعیہ دوران میات میں اکثر خون کے اندر یائے جاتے ہیں۔ دوران حیات میں اکثر خون کے اندر یائے جاتے ہیں۔

نستة زیاده بدین ہو تے ہیں ۔ معراع میں کے ان اعال سے متعدد اہم تغیرات پیدا موجاتے ہیں ۔ مکن ہے کہ خود معراع متعوب ہوجائے ، یاسیج کی دھمیاں جزہ جدا ہوجائے ، یاسیج کی دھمیاں جزہ جدا ہوجائے کہ وہ نون کے دہا وہائیں ۔ بعضادقا سے معراع کا ایک حصد اللا فی عل سے اننا کم وریزجا آ ہے کہ وہ نون کے دہا وکرمقابل مصراع کا ایک تاب نہیں لاسکتا ، اور مصراع کا ایک تابی اتساع یا انوں سیا پیدا ہوکرمقابل جانب برا ہمرآ آ ہے ۔ دو المانی تھے نون کی روؤں میں آگے کی طرف اور پیچیم کی طف مینی انکناش و انبساط کے ساتھ نون کی روؤں میں آگے کی طرف اور پیچیم کی طف مینی ہے اور اپنے میں البہاب دروں قلم کی کہ نون کے اندرونی شرکا البہا (endarteritis) معمول میں البہاب دروں قلم کی گرف کے مقام پر مرابیت واقع ہوکا امتری مجلی کے البتا ب مرون قلم کی آب یا زہ کی ایک اندرونی شرکا البہا کی میں البہاب دروں قلم کی آب میں البہاب دروں قلم کی ایک مقام پر مرابیت واقع ہوکا امتری مجلی کے البتا ہو کہ آب یا زہ کہتی پیدا ہوجانی ہے۔

بیکن فرسی التهاب درول قلبه کا اہم ترین اترسارے نظام تمریا فی کی وہرایت ہے جوم دراموں کے مجالت دریزول سے پیدا ہوما تی ہے جوام خطابعیہ یہ فی تقل ہوجاتے ہیں۔ اس مرض کے مخصوص مظاہر اسی عمل کی وج سے ، اور ساتھ ہی جدا شدہ آکروں ہی عضویوں کی موجد کی کے سبب سے رونما ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی جدا شدہ آکروں ہی محصوص کی موجد کی کے سبب سے رونما ہوتے ہیں۔ سالہ رہت جسم کے تقریباً کسی بمی صفحہ میں واقع ہو کہی ہے ۔ وہ بائنموص کھال اور دونسی کروں کے عرف میں مام ہے ، لیکن دماغ ، ندانی کنال ، مبلد برشبکید (retina) اور جوارح کو رسد بہنجانے والی بڑی سنسریا نوبی اور جوارح کو رسد بہنجانے والی بڑی سنسریا نوبی مجملے کے دونسی می واقع ہو بال میں مجملی واقع ہو بال اور دوسری تر افران میں مجملی واقع ہو بال میں مجملی واقع ہو بال اور دوسری تر افران حون کا تسدد (۲) معدود ہوتی کو نوبی کے مغونی اخرسے اسی دونوں کا وقوع ، اور مغمل سے کی نوز ہے کے رقبہ کے اندر سنتی یا زند کی افران حون کا تصدد (۲) معدود کو کریں دونوں کا وقوع ، اور مغمل سے کو کی دورہ کی دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کو دونوں کون

مختلف مختلف اعضا پراثرات ، جیسے کہ وہ ضبیت الہماب درول قلب کی است المتاب درول قلب کی است (softening) اور عراج

اور التهاب سی ای (meningitis) - شکید کے نزفات اور مصب بصری کا التهاب المحال کا مستر ورم انفعام اور خواج - بین طریقے ہیں جنسے گردے ما وف ہوسکتے ہیں الله المباب گرده (acute toxic nephritis) ہوسکتا ہے - (۲) ما دسمی النهاب گرده (acute focal embolic nephritis) نمودار موکر کیا ہے گزیا گرد ہے (flea-bitten kidney) بیدا کرسکتا ہے ، جواکٹر برئے ، اور آ ایس سفیدز مین پرنز فی نقطوں کی وجہ سے دصتہ دار ہوتے ہیں ۔ خرد بین سے دسیمین پر نوات نظر آتے ہیں ، جو بندر بج نعضید یا فت معنی نوار آ ذیرا ہمی ، بلالیا ٹرک نظر آئے۔ بر معنی با فت کا ایک جیمی دار آ ذیرا ہمی ، بلالیا ٹرک نظر آئے۔ معنی با اور خراج ، نوات البحن اور دسلیمی موجود ہول کے نوفی معنی معنی اور خراج ، ذات البحن اور دسلیمی موجود ہول ۔

ساده التهابِ درول قلبه کی طرح تبییت التهاب درول قلبه می خامکر قلب کی بائیں جانب کو اوف کرتا ہے۔ لیکن ان اصابتوں کا تناسب نمجن میں دائمیں جانب ما وُف ہوتی ہے ' اس سے بہت زیا وہ ہوتاہے کہ جتناسا دہ قسم کے التہاب کی صورت میں ہوتاہے۔ اصابتوں کی غالب تعدا دمین خببت لہاب دروں قلبہ انعیں مصراعوں پر ہواکرتا ہے جو اسبق سادہ التہاب درول قلبہ کے انزات ناما ہرکرتے ہیں۔

سائی دیگا ، لیکن پرزیا دو تر بائیں جانب پر ہوتاہے۔ تا ہم بینس مولنا مہلے کوان اصابتی دی است کے اس مام فرر بر بر می ہوئی ہوتی اسابتوں میں مکن ہے کہ خرم ہوجود ہوں ۔ طمال مام فرر بر بر می ہوئی ہوتی ہے ، ۱ ورمکن ہے کہ البیومن بوئیت یا دم بولیت موجود ہو اور ان نوی مدم دیو ہی می ہوتی ہے ۔ جہال می ہوتی ہے کہ می ہوتی ہے ۔ جہال رومانزم کی مسبق مرکزشت موجود ہو ؟ یا من قلب معلوم ہو ، وہال مکن سے کہ قلب کی جامت اور اس کے فعل کی خرم میں مالتیں یائی جائیں ۔

کثیرالتعداد اصابتوں یں تب **عی ف له سے قریبی مثا بہت یا فی جاتی ہے**' بالغصوص إسوبه سي كرنب كا وقوع تقريباً خود بخود بوتا بيد ا وراس كعرسانة وردِمه اوربرُمی ہوئی طحال ہوتی ہے ' بور عمومی مرایت سے یا سدا دیت کی وہے ہوتی ہے سکین گلابی دھتے نہیں ہوتے ۔ چنا بخیر مکن ہے کدمین بالکل ا جماہو حتی کا اُسے ایسی علامئوں کی شکا بیت پریل ہوجائے ' جیسی که دورسے شدید ما فی ا مرا مل كى ابنداء من بواكرتى بين، دردِس، يا بشت وجوارح كا درد، يا اكيميرع قشريره یا قشعربیسے ۔ بھراس کے بعد شدید ارتفاع حرارت ا وراس کی عمولی مالتیں ، يَعَىٰ لِمِندِّمِينُ مريع نبض وتنعنس ، خشك زبان ، مدم المشتها ، تشكل وركسلندي بیدا بوماتی این - اکثر اوقات مریض چندی روز کے اندر مبلطح سبے بروا عفود، ہوتا ہے' اور رات کے وقت اُستے ندیان ہوما تا ہے یسکن اِس مُلامت کے نمودار ہونے کا وقت ، جو فالباً سم کی تشبیت کے لحا فاستے عین ہو لہے تغیرزیر ہوتا ہے۔ آنتوں کی مانت مختلف ہوتی ہے ایکن اکٹریتلی زرو ا جامِتیں موتی ہیں ا جونب محرقه کی اما بتول سے بہت مشابہ ہوتی ہیں۔ اور مکن ہے کہ مشکر متمار دیو۔ إن اصابتوں كي مستعمومًا دس دن سے نيكردويا ثمين جفظ تك بوتى سيا' يعين إس سعببت كم كم مبنى تحت الى وسارى التهاب ورون فلب azbacato) (infective endocarditis) کی اصابتول میں ہوتی ہے۔

اما بنول كه ايك دوسرت كروه من قشويرت ايك نمايان ملامت موسق اين الدوس كروه من المدوس كروه من المدار من الم

یه به کدانهاب کت العظام کی مالت میں اجونه قله عنبیه ف هبده کے آب ہونه مکن بنت کی مالت میں اجونه قله عنبیه ف هبده کے آب ہون مکن بنے کہ ساری الهماب درول قلبه کوئی منصوص میز طلاف نہ بدا کرسے اور یہ فرمین امتیان بعد الممات بیعن لاش کے معائد کے وقت مل ہر ہوئیل جا ایک دوسرے گرود میں عضو لیے د مانی سحایا پر حمل آور ہوتے ہیں اور الہماب سحایا

کی علامتیں ہی ایب نمایاں منطبر ہوتی ہیں۔

اس مرض کی کسی بی اصابت میں ' ان علامتوں پر جو کہ عفونیت الدمی تمرا برمنحصر بوتی ہیں اور علامتنیں بھی متنزاد ہوسکتی ہیں جو سالو بینہ سے شرائین یا شرایکو كاتبددواقع بون كرباعث بربا بوجاتي بي يبعض وقات د ماغ كي ايب بري عرق کی سدادیت ہوکر فالع نصبی (hemiplegia) بیدا کردیگ۔ آگر ما بک یا باز و كِي عرق مسدود بوكئ ب توكلاني يا شخف كم مقام يركى نبض فائب بوم النه كي و لیکن تا وقتیکه ایک بهت برنی عرق ما وُن بنه **بوجائے ، مُنگرین یا نمردین کا و** اقع ہونا فہوری نہیں ۔ احتا رکے حبو تھے عووق کی ساریتین یادہ اکٹر الوقوع ہیں ۔ اِسطرح اکشرطیال کی کلانی اور الیمیت پیل ہوماتی ہے، جوجز زمفعات کی وجہ سے ہوتی ہے ' اور طمال وزن میں ۲۰ تا ۳۰ اُونس ہوسکتی ہے۔مغعات مردے میں می واقع ہوتے ہیں ؛ اور مکن ہے کہ اُن کے ساتھ در دمی ہوا ور قارور سے می البیومن یا خون مودار ہوم کے بعض اصابتوں یں ملد کے نیچے مشی نز فات ظ ہر ہوماتے ہیں ، وعمواً جوئے ہوتے ہیں ، اور دسٹر پر ، جنگا سول اور بغلول ك كروو پیش واقع بوتے ہیں ۔ استفانی مالات میں مکن ہے كەلىك پر پیئوری ما جهینول کب موجودر ہے۔ بعض اوقات مِلدیر حیوٹے چوٹے دردناک اِ حمرارای اُم نمو دار بوماً من عُمهِ، بالخصوص لا تعدى التكليول كي خم بذير سطول بر، ا ور ديندروز ركر بمريه اوماغائب بوجاتے ہيں ۔ يا ايك زيا ده كهرا درد اوقاء، اورجهم ما جوارح كى عمیق تر با فتوں میں ایک نسبتہ مڑا ا ورالیم موموا مِلد کے نیچے محسوس کیا آباسکتا ہے ' اور چندروزیک قائم رہاہے۔ ان کو آسکی کے زقاط (Osler's spots) کہتے مي اوريتمت الحادم لفي ما المضوم تشغيم الميت ركمة مي - يه فالباسدادي واقعات ہیں یشبکیہ میں اکٹر نز فات دیجھے مانے ہیں ' اور مکن ہے کہ نفث الدّم

ایس خاص گروه ان کم وبیش مزمن اسا بتون کا بیضبی تحت الحاد جمانیمی المتراب درود : قلبه (bacterial endocarditis) بعلی المتراب درود : قلبه (endocarditis lenta) بیت بین (24° 23°) - بیم مزامسور در وی قلبه (endocarditis lenta) بیت بین (19° 23°) - بیم مزامسور طور بربیدا بوجا آب و و الکسی مین مبلا بوجا آب و آبر الشر خنیف ارتفاعات بوت ربیت این ، واکثر ۱۰ ده می من بین برا ترفیل موجا تی بین اور طمال فی رف با ترفیل بوجا تی بین اور طمال بوجا تی بین اور طمال بوجا تی بین اور طمال بوجا تی بین و اور می بین منال خنیف البیومن بولیت بوسکتی به اور مکن به که قاروره سک امنافس بین منال خنیف البیومن بولیت بوسکتی به اور مکن به که قاروره سک امنافس بین منال خنیف البیومن بولیت بوسکتی به اور مکن به که قاروره سک امنافس بین منال خنیف البیومن بولیت بوسکتی به اور مکن به که قاروره سک امنافس بین مین برسی می مین برسی بین برسی به بین برسی برسی بین برسی برسی برسی بین برسی بین برسی بین برسی بین برسی بین برسی بین برسی برسی برسی بین برسی بین برسی بین برسی بین برسی بین برسی بین برسی برسی بین بر

خبیت التهاب درول قلبه کی مت نهایت منتف بوتی ہے۔ اِسس کی بعض اصابتیں ، من بی ستم ارتفاع حرارت کے سوائے اور کی نہیں ہوتا ، چریاما افک ماری رمتی ہیں۔ تقیع الدموی یا شدید موتی قسم کی مالتیں ، یا و و مبنیل التهاب سیایا ہو ، چند ہی مفتول یا دنول میں بہلک ثابت ہوتی ہیں۔ موت عموماً فشل قلب کی ایوریا

دموست یا سدادست کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ وموست ایشین

کی موجودگی اور سرادیت کے متذکرہ بالا مظاہر پر اہوتا ہے حرارت اسماعی مرض کی موجودگی اور سرادیت کے متذکرہ بالا مظاہر پر اہوتا ہے۔ نیز نیایاں عدم دمویت اور الہّابِ عصب بعدی اجب یہ موجود ہول اقیمتی امارات دیں ۔ لیکن مکن ہے کہ ساری دیا ری بعرفی خریرموجود نہ ہو اور اگر موجود ہو تب بھی یہ معراجی مرض انظو اس معاویتوں کے وقرع بری رکھنا پڑے ۔ نبیث التهاب دروں قلب اکشر خللی سے

ہی قد سبح لیا جا آہے ، لہذا امتحانات التراقی (agglutinatosns tests)
عل میں لا نے جا ہیں ۔ بعض خمت الحادا معابتوں میں طمال بڑ می ہوئی اور عدم دمویت الحادا معابتوں میں طمال بڑ می ہوئی اور عدم دمویت اتنی زیادہ ہوتا ہے جبکہ مرخ فشاست یا ہوتا ہے ۔ اِس کا امکان اُسوقت اور می زیادہ ہوتا ہے جبکہ مرخ فشاست یا مخاطی جملیوں کے نزفات موجود ہوں اور جبکہ دریقینی طور پر نوعشوی ہو۔ عفونی التہاب دروں قلبہ سے ماہی میا کا گمان پیدا ہوسکتا ہے سیاسل ارتفاع حرارت بس کے ساتھ صربی امارات نہوں ، اُ غاز نبریر دخسنی متل سی نوجود ہوں اُ استان کے ساتھ صربی امارات نہوں ، اُ غاز نبریر دخسنی متل سی مجد سے ہوسکتا ہے ۔ بس کے ساتھ صربی امارات نہوں ، اُ غاز نبریر دخسنی متل کی وجہ سے ہوسکتا ہے ۔ بس کے ساتھ صربی امارات نہوں ، اُ غاز نبریر دخسنی مضاحی مقامی امارات دین مضاحی مقامی امارات دین میں آ جانے جا ہیں ۔ دروں قلبہ دونوں کی وجہ سے ہوسکتا ہے ۔ بیکن مجھ عوصہ کے بعد این میں سے کسی ایک نہ ایک مرض کے مضموص مقامی امارات مثالہ ہے ہیں آ جانے جا ہیں ۔

نون کا امتحان نبقات سبمیدا وردوس عضویوں کے لئے کرنا چاہئے۔ انڈار ۔ یہ نہایت بڑا ہوتا ہے' اور محرقی یا تقیع الدموی قسم کی ایک نمایاں اصابت سے شفایا بی شافہ ہوتی ہے۔ اس کے برمکس' شخت الحاد جراتمیمی البتاب دروں قلبہ کے حلول کے بعد شخفیف ہوگئی ہے 'لیکن مکن ہے کہ وہملف وقفے کے بعد بھرواقع ہوجائیں۔

علكج ميشة اما بتون ين مريخان سدرا ندنبين بوسكا كتخفيف من

علائمييجهد

(EFFORT SYNDROME)

(قلب كاغيرمنتظم فعل ـ سياهى كا قلب)

(disordered action of the heart, soldier's heart)

گذشت بنگ کے دوران میں جنگی مدوجہد کے وہ اثرات بوساہی کے فلب پرطاری ہوتے ہیں ہمیشہ زیرمشا ہدہ و مطالعدرہ و برارہا ہاہی مغلف اوقات میں ایسے علا اس کی بنا پرمعندورا لخدمت قرار دئے گئے میں سے ایک کر ور قلب یا مرضی قلب کا بتہ میا تھا ، اور امیی مثالول میں مربی کے قلبی یا دیگر فعرکی نوعیت پر ، اس فرکے بہترین طریقہ علاج پر ، نیزمریش کی مجلی طاومت کے فعرکی نوعیت پر ، اس فرکے بہترین طریقہ علاج پر ، نیزمریش کی مجلی طاومت کے فعرکی نوعیت کے دائے۔

معن اسباب وربعن دوری ایس مالتول می در مثلاً تدن مخطی اسموری در مثلاً تدن مخطی اسموری ایسی مالتول میں جن میں مسمرے اندرکوئی صیح فررموج دنہیں ہوا) ایک میں علاماتی معلوط موج دبوتا ہے 'جے ملائمیہ جبد کہتایں۔
مزالذر قسم کی اصابت کو (بینے مبکر مبسم میں کوئی دو سرا ضرموج دنہو) 'و قلب کا غیر تنظم فعل ' کہتے ہیں۔ اس نام پراعر افل کیا جاتا ہے 'کیو کہ یہ صرف قلب کی گیر اثنارہ کرتا ہے۔ لیوسی کامیلان فیال اثنارہ کرتا ہے۔ لیوسی کامیلان فیال یہ ہے کہ اس مرض میں خود قلب کا فعل ایک ذیلی کیفیت ہے۔

مطالعدا ورمعالجه سے پیپلے اُن دوسرے امراض کومکنورہ کردینا ضروری ہے مسلم کی سے میں اُن میں میں اُن کا میں اُن کا میں اُن کا میں ک

جوبهی علامات پیدا کرد بینته بین - بالحضوص مصاعی مرض قلب کشتعلق بینمجها جانا چه اس میں اور کمی یا مطرانی انساطی اور پیش انتکاشی خریایت ظاہر کرنے والی اصابیب خوالی مدند کی در ریند شاط نہدی جر میں انکاش خریارہ نزمارہ فارد کی اصابہ

شال بین یکن وه اصابتیں شال نبس کر جن میں اِنکماشی خریرات نوا د قا مدر فلب ما راس پزموجود ہوں 'کیونکہ اِس قسم کے خریر کی اہمبت غیر نینینی ہوتی ہے یسپا ہیول

یس اِنکماشی خریرات کی موجودگی شاد ہی مصرای مرض پردال ہوتی ہے' اور اِس

مالت میں معراع کو جونقعان پہنچا ہوتا ہے وہ اکٹر مِضَ نبیف سا ہوتا ہے۔ مزید برآل مرف اِنکماشی خریر کی بنا پرمعذ ورا لخدمت قرارِ دیدئے ہوسے مریض

امتمان كرفير تفريباً تمام منالول مين فاعلى مدوسة كالله إلى عالم التعبير

یہ مارفد فا مسکر لتعودی پیشیہ کے انتخاص میں پایا جاتا ہے اور ہالحقوم زیادہ ذہمین کارکنوں کی جاعت میں ہوتا ہے۔ فطرتا یہ لوگ زیادہ صاس ہوتے ہیں ۔ اِن میں منشات سے قطعی پر منر کارواج ہوتا ہے (۴ ۲۵ مثالول میں موقید)۔

زہراوی امراض کی روئدا د نہایت شا ذہوتی ہے ، بلکہ اِس سے برمکس آگٹز اِستنابامید پینے ملق زنی یائے مبانے کانتین ہوتا ہے۔

عُالْبَا عَصْبِ مَا مُبِهِ كَا تَعَلَ غِرْطِهِى ہُومَا ہے' بعیسا کہ دوراتِ نَعْسُ میں تُمہ ح نبغن کے تغیر بیصے ظاہر ہوما ہے ' اور بعض او قات نبغی نہایت آہستہ ہوماتی ہے جس کے ساتھ غشی کے دُورے ہوتے ہیں۔

نظام مشاری ا دُرینالین (adrenalin) ورا یوکودی (aprocodeine) نظام مشاری ا دُرینالین (adrenalin) ورا یوکودی دُرینالین ا دُرینالین (aprocodeine) و این بیدا معرفی مالا سے اس سے دیا دہ آسانی کے ساتھ متبیج ا ورخفض ہوجا ہے کہ مینا معرفی میان میک آھے۔

میں ہوتا ہے ۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی تیزی کا سبب مشارکی میجا ان میک آھے۔

اِس کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ میش در قی سے استعمال کی برداشہ یہ اِس کا سبب ہے۔ تجربات سے ظاہر ہوگیا ہے کہ در تی کے استعمال کی برداشہ یہ اِس کا سبب ہے۔ تجربات سے ظاہر ہوگیا ہے کہ در تی کے استعمال کی برداشہ یہ یہ در این کے استعمال کی برداشہ یہ یہ در این کے استعمال کی برداشہ سے ۔

ا من کا سبب ہے۔ مجر بات سے طاہر ہوگیا ہے کہ درق کے استعمال فی برواحسف یہ مریض باعل اسی کمرے کرسکتے ہیں جس طرح کا بھی اشخاص -

قلب میں طبیعی اوات موجود نہ ہونے کے اوجود مریضوں میں روما زمی و کالا کے ورود کی زبادتی اِس اسکان پردلالت کرتی ہے کہ بہت سی اصابتوں می مفالہ کا ابت دانی تغیر اِس کا سب ہوسکتا ہے ۔ تا ہم ورزش کے بعد فورآ میردی قلب (heart block) ہونے کے آتا رہیں بائے جائے ، جیا کہ برتی قلب محا رسے طاہر ہوتا ہے ، اور بیمواً ایک قابل قدر اوارت ہوتی ہے ۔

خون کی کاشتیں سنی ہوتی ہیں۔

یه اطلب نهی است مواد می اگر آباکونوشی اس ما است کا سبب ہے اگر چ یہ است ہوجکا ہے کہ تمبا کو اِن مریفیوں میں ترح نبض کو اِس سے زیا وہ کردتیا ہے کہ مہتی طبعی اشخاص میں ہوتی ہے ۔ اوالا تو بیر مالت مام طور رو روسری ہندوت افی فوجوں کی طرح ' سکوسپا ہیوں میں می پائی جاتی ہے جو کہ تمبا کو نہیں چینے ۔ ملاوہ اذی تمباکو کا مرفد عمر الخیر عمولی مقدار میں نہیں ہوتا ' اور کا فی حیرت انگیزا مربع ہے کہ نیا دہ نباکو چینے والے اس سے زیا دہ فیصدی تعداد میں کام پروابس آ ماتے ہیں بھی تعدادین کم چینے والے آتے ہیں 'گوکہ تمباکو مللق نہ چینے والے اشخاص زیادہ اچی حالت میں ہوتے ہیں۔ اِس کی صریح وج یہ ہے کہ کم چینے والے اشخاص تباکو کے اتنے مادی نبیں بنتے کر جتنے زیا در بینے والے بن جاتے ہیں ۔ اِس میں کوئی ریز ندی ہوں ۔ اِس میں کوئی

ے نبیں کر تمبا کو نوشی اس مالت میں زیاد ڈنی کردیتی ہے۔ مکن ہے کہ اِس مالت کا بنیا دی سبب سی فقیم کا تستم الدم ہو۔ اِس مالمت كاعلاما تى مخلوط أس سے بہت مثابہ ہو اہد جرا بتدائی تدان مل یا ماہا ہے ا وراکٹر اسبق مربیت کی روئرا دملتی ہے۔ • ۵ تا • • فیصدی اصابتوں نیں اِس عارضه كى يدائش مي سرايتول كے كارفوا بونے كاست، درست معلوم بواہے ـ عَلَّا مَاتِتُ ۔'' علائمیہ جہد' مب زیل علا مات بیشتل ہوتا ہے!۔ سالمس بعولنا - يه علامت بميشه يائي جاتى سبے اليف وم منت كينے كے بعد - براري ك ا مُقات مِن ٩٠ تا ٠ م كَي تُمْرِح تنعس كا يا يا ما ناكسي طرح مجي شا ذنهيں۔ دورا آن واب یں تمریح تنفس طبعی ہوتی ہے اور اگر مریش آرام سے بستہ برلیطارہے توریشرے عمد آ ایس بڑستی - ۵برد - میرمریشول کی تقریباً بین چھائی تعداد میں یا یا جاتا ہے ، اور اِس کی نوعیت چین قلبدیر بغراری سے کی ذبھی توزیع رکھنے والے در ذکر نظاف نرا ہوتی ہے - بین ما مسرورزش کے ساتھ متلازم ہوتا ہے - خستگی ایک تفریب ا مشقل ملامت ہوتی ہے سلیل جبد کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور اس ستگی سے بدرجها زائد موتى ہے جوائيك ندرست شخص ميں تمكان كے باعث پيدا ہو ماتى اى دوران مراورعشى - دوران سراكب تقريباً مستل علاست بين اورتبدل وضع اور جدك ما تدمتلازم اوتى ب عشى ك كانستة كم عام س اختلاج اكة بمواكرنا بنيك بالخصوص ورزك كس كرساته - يدعمواً مريع اورزاور وارضرابة فلب كي وجه بيد بواكر تلهد اور اكثر متزاد إنكما شاب كي وجه بيد ياكسي ديم واضح فلبی بینظمی کی وج سے نہیں ہوتا۔ تا ہم متزاد انکا نتات ہوتے ضرور ہیں 'اور تعنس كعما تمه جوفى عدم توازن (sinus arrhythmia) كا وقوع فيرعام نبيل-دردس تقريراً بميشه بواكراب - بسينه آنا إورب ودي بوارح المم -پوكارين (pilocarpine) كے لئے مجسيست معمول سے زائد ہوتی ہے۔ مزاج كا

چِرْ جِرْ این مبعنوابی متوم قائم رکھنے کی نا قابلیت متزازل کا متوں کا رمستہ

أورتمتا مسط عام إن يحسى بمبي عل بي انكل بيينة تحد ليئة بدر غبتي مونا (بونعفواه قا

تعویٰ کی بناپر ہوتی ہے ' لیکن اسیفار عام طور پر کسن کے سبب مصمی ایک الوقو اور حیز نناک ایتلاف مجمنا جاہئے۔

طبعی الات مسب زیل ہیں ،۔ قلب کی شرحہ کی نرمیا دتی [،] **ومذ**ہ وررسس المنبل وضع (مثلاً المنتجاعي وضع بريكر كمري وضع مي اوما نم) كي مجیبیت میں بالغصوص نمایاں ہوتی ہے۔ایک متاز اور وسیع طور پرسلمہ امار يهدي كه جدر كم بعد نندح نبض كي واليي سست الوتي ب عب مريض آرام بي بونوخون کا دباؤ عمواً طبعی مواجر بیمن جذاب اورجد کی مجیب سالد كعيما تقد بونى ب اوراكثر بلند مقروات مال موت بي منتشض يد الراس عام ہے، اور مکن ہے کہ اِس کے ساتھ صدم کی قوت کی زیا دتی ہویا نہو۔ یہ عمو ما إِتَمَاع قلب كَي طبيعي الم ريت مجمى عاتى جدائيك الصحيح درون مُحَار (orthodiagraph) کے ذریعیہ لاشعامی امتحال کرنے سے طاہر کرتا ہے کہ قلب کی کوئی کلانی نہیں ہے مینانج بہ اہارے نا فابل اعتبارہ ہے ۔ مقبینت میں قلب جھوٹا ہوتا ہے (56)۔عمیق معکن ا عمونًا زیا دہ ہوجائتے ایں ۔ فاس دیکا ۹۰ فیصدی اصابتوں میں میں نرشنی ہونا ہے۔' أس كى مقدار كم بوجاتى ہے، اور أمونيا اور أمينوا يبكزرنريا دہ بوجائے ہيں۔ ٢٠ فيصدي مي حجرهي كم بوجا تاسيه اورقاروروين فاسفينس حم جانف بن أمونيا مقداري طبعي بوياله بالين أمينوايسدُزريا ده بوجات بي - برحيتبين جموعي قاروره میکلیبئم آگزیلبٹ کی قلمیں اکثریا ٹی جاتی ہیں' اور ۱۵ فیصدی اسابوں میں مبیح کے قاروروں میں کٹر التعداد حوینات منوبہ یا نے گئے ہیں۔ حون میں مید نطبتوں کی کنزت طاہر ہوتی ہے' اُن کا اوسط ۱۰٫۱۰۰ فی کمعب ٹی میٹر ہوتا ہے' اور لمغى خليات زياده مومات أي مبديد خليول كى معول معازيا ده كزت ورزئش كوبعدم شابر عين آتى ہے، لغوماً مس زياده بولنے بن اور علا ات كى شدرت سبید ملیخل کی کنرت کے ماتحد متوازی ہوتی ہے۔ برقی قلب کارٹنس مونی فیرلبعل منبی

الهام ركتي -اندار - عيارات دل ك دربعه يه فيصل كيا جاسك بهدكة يا مريض آيده زمانه من مرف تعوى كام ك قابل موكا : - روما تزى تب كى سركذ شت معنت كرفير سانس کا مواظب شدت کے ساتھ بجوانا ، پیش قلبی در دجواتنا کافی شدید ہوکہ ورزش من مزاحم ہو ، ۱۲۰ یا زائد کی تغریم بیض متی کہ اضطباعی وضع میں بمی الیسے طلاست جو سالہا سال سے موجود رہے ہوں ، کو وہ مض معتدل شدت کے ہوں۔ مربغیوں کے امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انھیں سیر صیول (steps) کے ایک زیند پر جڑھنے دیا جائے ، اور اِن علامات کو دیجیا جائے :۔ چہرہ پرتشویش کے آثار ، تیرج نفس موالات کئے جاسوقت بھی قائم رہے جبکہ پیض لیٹ ہوا ہوا ور اِس سے وقا فوقت اُ سوالات کئے جارہے ہوں ، خرح نبیض ایسی ہوکہ دومنٹ تک لیفنے کے بعد بھی قبل ورزشی لیول اور اس میں ہے ضرابت سے زبا دوکا وقف ہو۔

بواشفاص اتبک فارج نہیں کئے گئے ہیں' اُن سب کا علاج ہر رہ کو ورزشوں سے کیا جا ہے۔ نتخب فوجی ورزشیں کام میں لائی جاتی ہیں' من سے لوگ بڑی مذکب واقف ہوتے ہیں' اور ان کی تھیل سے لئے کہ یا پورسے سامان کے ساتھ منزلیں ملے کرائی جاتی ہیں۔ یہ ورزشیں ترقی پدیر شدت کے ساتھ گروہ و میں مرتب کی جاتی ہیں' اور مرلین ہر تمییہ سے یا چرتھے دن بلند تر درجہ میں وافل کردیا جا ہے ۔ ورزشیں روزانہ پندرہ یا تمیس منط کے سامی کی جا تا ہیں۔ فرائنس مورو اور ان مندر انست کرسکتے ہول کئی ہے کہ انسان میں مرتب کی ورزشی جاتی ہیں۔ فرائنس موروہ بلا تعلق بردا شت کرسکتے ہول کئی ہے۔ آدمیول کی جابند ترین کی اس جا ہول کئی ہے۔ آدمیول کی جابند ترین کی ورزشی جاتی ہول کہ جابند ترین کی ورزشی ہوتا ہے۔ شفا خانہ سے خارج کردہ ۲۲۰ کی لیا ہیوں میں سے ۲۱ میں کا میں ہوتا ہے۔ شفا خانہ سے خارج کردہ ۲۲۰ سے پیرجی کا مرکب کا ایسے تھے جو بین ما م کے بعد کسی زکسی شیت سے پیرجی کا مرکب کا اللہ تھے۔

میرون است. می این درگرونوں کے لئے جن کا پیشہ قعودی رہا ہم ایک طویل اور در می تربیت کی ضرورت ہے (کیو کمہ بی مریضوں کا ایک نہایت کثر شاسب بناتے ہیں) ۔ اسپطرے حمائی عارضہ یا عوارض امعاد کے بعد آیک طویل ترنقیہ ہیت کروں میں تا ہو کی تا ہم ہی سات میں نااہ کرنے میں تا ہم

کی' اور آماتی ہی کور تربیت کے ایک تدریمی نظام کی ضورت ہے۔ علاج یہ بیر مرابیت کے مقامی مراکز کے خارج کردینے (بوسیدہ دانوں سے مرک و میں دیار میں نزیراں میز ، مغربیشتل میتا ہم سیمیشیں سیمیشیں

ك أكمار ويض وزمن ك كالدين وفرو إيشمل بوتا مهد- الميسين بسمت

آیو ڈاٹر (emetine hismuth iodide) کے ذریع منی زجی مرایت کے ماری کوبی اور سے اس مالت بی بار استین نے فرحی برقی اور مراش سے کچے وصد کے لئے آلم دینا مناسب ہے اگر علامات تا زہ بین تو فوجی برقی اور مررشس سے کچے وصد کے لئے آلم دینا مناسب ہے اگر علام کرنا مضہ ہوا ور اس سے بھینتہ احتراز کرنا چاہیے ' بہ استان کے اس صورت کے کہ جب شدید پین قلبی دو در در مرا یا دوران مرمو و در ہو شغل کی صریحی ضوریت ہے ' با منعوص کھلی ہوا میں کا مرا جیسے کہ با فیا جے کہ اُن کا مرافی میں نام بینے کہ اُن کا مرفی شغا نبریر ہے اور یہ کہ اسواح واضع طور پر معلوم ہو بی ہے ۔ قلب برخاص توجہ نہیں دینی چاہئے ۔ تمباکو' ما لت آلم کی ترم نبیش کو اور ورزش کے بعد کی نہرے نبط کو اور ورزشش کے بعد کی خوب علامتوں کو بڑھا دیتا ہے ۔ ابتدائی درجول میں بروماً گذرمفید ہوتے ہیں ۔ ا ہم ترین علامتوں کورزشوں کے دربیو سے ہے ۔ ڈیج بٹیالس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔ علاج ' نہریجی ورزشوں کے ذریع سے ہے ۔ ڈیج بٹیالس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔ علامت نہریجی ورزشوں کے ذریع سے ہے ۔ ڈیج بٹیالس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۔

بريائش تشوم

(CONGENITAL MALFORMATIONS)

قلب کے تشوہ ہے اس کے نوکے نقائم سے بیدا ہوتے ہیں ۔ یہ نمو طبعی طور پراس وقت کی اس کے نوب کہ قنات تنافی (ductus arteriosus) کی مسدوری واقع ہوتی ہے ، جو کہ بیدائش اور سوراخ بینوی (foramen ovale) کی مسدوری واقع ہوتی ہے ، جو کہ بیدائش کے چندر وزربعد واقع ہوتی ہے ۔ کسی درجہ میں بھی اس مسدودی کے عمل کا ایقاف ہوبائے ہوبائے سے ایک بیدائش تشوہ بیدا ہوجائے گا۔ بیش اوقات یہ ایقاف استعدر بعد واقع ہوجا ایک بیدائش تشوہ بیدا ہوجائے گا۔ بیش اوقات یہ ایقاف استعدر بعد واقع ہوجا ایک کے خود ایک بیدائش کے نفید ایک بیدائش کے نفید ایک بطین اور دوا ذین لیکن آئی مالین نہا بیت شا ذہوتی ہیں ، اور ان کو الم مرکز نے والے بیشر بھی بیدائش کے بعد مالین نہا بیت شا ذہوتی ہیں ، اور ان کو الم مرکز نے والے بیشر بھی بیدائش کے بعد میں نہا ہوتی ایک ایک میں دیوی ضیق (pulmonary stenosis) اور بیلین قائل (pulmonary stenosis) میں سوراخ کا اجماع ایک عمر تندیج بھی نہر ہے ۔ یفسی یا تو دیوی معدا عات کے جُرہ مانے سے ، یا اُن کے مین نیج بھی نہر ہے ۔ یفسی یا تو دیوی معدا عات کے جُرہ مانے سے ، یا اُن کے مین نیج بھی نہر ہے ۔ یفسی یا تو دیوی معدا عات کے جُرہ مانے سے ، یا اُن کے مین نیج بھی نہر ہے ۔ یفسی یا تو دیوی معدا عات کے جُرہ مانے سے ، یا اُن کے مین نیج بھی نہر ہے ۔ یفسی یا تو دیوی معدا عات کے جُرہ مانے سے ، یا اُن کے مین نیج بھی

ملة كة تغييق عند الأنووقيع (infundibulum) كة ننسيق كي وجرسي الم العرور بلین کے درسان آید اکمل فاصل ہونے کے سبب سے پیا ہوماتی سے کینتھ (Keith) کی دائے ہے کہ اسی مالتیں ہمیشہ نقائمیں موکی وجہ سے یا بعدا قلب (bulbus cordis) کے ندیمیلنے سے ہوا کرتی ہیں ؟ اور دروں رحی التہا نیے ول قلبہ (intrauterine endocarditis) کی وجست مرکز نہیں ہوتیں ۔ اگردائی اطبین کا مخرج جنبنی زندگی میں إسطرح مسدود ہوجائے تو اُس اہفہ کے اندر کا دباؤ اسوجہ سے كر موجائع كاك نون من لميني فاصل كم سواخ مي سع بركر إس بطين ك اندر عِلاْ جِانْتِكا - اورابيي مورست ميں يا فتح مستقلاً بافي ره جاتا ہے - نوك أس م حله کے لیا ظلمنصص میں یہ ایقاف واقع ہوا ہے، ممکن ہے کہ بیسوراخ نہا یت بڑاہو یا اس کے خلاف بالائی حصرین معن ابب انتفاب ہی ہو۔ اِس آخرا لذکر صالت ہیں يرورن جن وسنشا في (pars membranacea) من واقع بواليد جب سوراخ برًا بوتاسيعة و اورطی اكثر دأيس بطين سعه يا دأيي اورباً بي دونول بطينوب مسيعة تكلا بوتا ہے، اورسوراخ بيضوى يا شرياني قنائ يا يد دونون نفوذ بدير بوتے بي-ربيى منبيق ا ورسورا خدار بين طبيني فاصل دونول الك الك بمي واقع موسكفة بن یند نتا زامها بنول میں دونوں بطینوں کے درمیان کا راست داُ بین مقبی *معالی سے* نیجے نہیں بکد اکلے اُ ورکی مصراع (کہ جس کے اوردائیں اکلیلی تمران کلتی ہے) سے نیجے ایا گیا ہے۔ اسی معورت میں وہ جزوغشائی کے سامنے ہونا ہے اور دائیں طبین كيقيم كاندروا بوا (27)-

بعض إوقات اورلمي دمهنه ياابك أذبني بطيني دمهنه كاتضيق إانطمامسس واقع بوما تاسيد جوكه دوران نون كه مرا ورقلب كمبلى نموس مانملت واقع کرتا ہے۔ اور اور اور طی اور ریوی تنهاین کی ممل معکوس وضعیت (transposition) ا ورعوت كي دومري بيعيد ومعكوس وضعيتين مبي يا ني كني أي -

من بحكرة نات ترياني اورسوراخ بينوي غيرسدودره مائيس اوريالك مهریح سبب تحصیرو (ما لبأیه پیدائش کے وقت دوران خون میں ای*ک عارضی تسا*رد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) ۔ تا ہم سوراخ بینیوی کا کم و بیش انفتاح تقریباً ۳ فیصلا تندرست شخصوں میں بھی وائع ہوتا ہے اور میں صورت میں ایک شق محف یا تنگ معدان دارفتو ایک کہندیں ہیں ہیں ہوتا ہے اور میں صورت میں ایک شق محف یا تنگ معدان دارفتو ایک کہندیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گرتا ۔
مکن ہے کہ اور الی یا رہوی شریان میں میں سکی نما معداع ہو سے کے بجل مرف وفر ہی ہوں یا جا سکتا ہے اسکون ہوتو وہ اید زندگی کے مرف کا سکت بنیا در کھسا ہے اور بید اسٹ کے وقت مشکلات ید اکر دینے کا رجمان کم رکھتا ہے ۔

مسطلات بیداردیے قاربال کارتھا ہے۔ امراضیات نے فلٹ کا مومو توف یا ناقص ہونے کے سب کے متعباق

در تقیقت اس سے زارہ کے الموم نہیں بتنا کہ ہم کے دو سرے معنوں کے پیائی است متنوات کے متنوت میں سے متنوات کے متنوق معلوم ہے۔ بیدائشی مرض قلب کے ممیز ترین علامات میں سے ایک علامت میں ال معلامت میں ال معلامت میں ال معلامت میں ال معلامت میں ال معلوم کی بات ہے۔ عمومی رزق کے مبب بربیض تازہ مضا بوات سے روشنی بڑتی ہے۔ مومی رزق کے مبب بربیض تازہ مضا بوات سے روشنی بڑتی ہے۔ (14) دا) دران کا سب یہ بوسکتا ہے کہ محیطی شعریات میں نون کا سمت دوران ہوا ال اس کے نتیج کے طور بروائیں آئے والے خون میں اس سے کم آگریمن موجود ہوک

خلتے زیادہ ہو گئے ہیں تو زراق اور بھی شدید ہوجا آہے۔ ایک باریک سوئی کے ذریعہ کم میری یا عصدی شریا ن سے براور است کئے ہوئے نون کے اکسیمی ما فیہ oxygen)

(content كَانتين ظا مركرتى بيك بلاست بنايا اما بون ين كى قدرسترانى

بے سیری بھی موج و ، بوسکتی ہے ' تاہم اکسّا بی مِضِ قلب کے زراق کا قاص سبب محیقی رکور بری سب ۔ سنسر یا نی خوال بی آئیجن کی معمول ہے بسی کم مقاد کاموج دمونا

ان اسباب كانتيجه موسكان - (الف) بيسير ول سيكيول كم المي ما ولي في ال النام المي ما ولي في الما المي ما ولي الم

روارت بوسیای داویدا و این و اصابری مجمع یامزین ریوی مرض می واقع موسی ہے۔ (ب) کنرتِ ملیّات احمرانتها کی موا اور نون ریوی شوریات کے ایمرا بخد موسد کی در موران کرسے میں اور اور انتہا کی موا اور نون ریوی شوریات کے ایمرا بخد کرانتہا کی اور استفادہ میں اور استفادہ کا میں اور استفادہ کا میں اور انتہا کی انتہا

مک نا مہرا موکس سے تمام اسیات مولی طور پر سر شدہ ہومائیں۔ (ج) منم ان کی است میں میں میں ان کی ان کا است میں می مجمع میر اور نظانی در یروں سے آئے موے نون کا آمیزہ مو میں کوسورا فعال لین

فامل یا منتوع موراخ بعینوی اور متلازم پدائشی ریوی ضیق کی مالت میں واقع ہوسکت ہے۔ بھیمید وں کے اندرخون کی سمت (فقارئ جیسی کد اکتابی مرض قلب میں ہوائی ہے۔ بداتہ خوداس امرکا رجان رکھتی ہے کہ شرایی خون کی میری کی تکمیل کردے ، کیوکا بی مورت میں آکسیمی کے افذکہ جائے کے لئے بہت وقت ماصل ہوتا ہے۔ بیدائشی مرف قلب کی بعض اصابتوں میں جن میں زراق نمایاں ورج کا نمائی یہ یا گیا کہ شرایی خون اور معراعوں کے فردید سے نفست کی حد تک سیست و تعاب جب رمینی نے ایک چونوں اور معراعوں کے فردید سے نفست گئی ہوئی اس امری تعلیم نہیں کو اکورٹ کی نویس کی خون کی مدی سے فردا ہی زیا وہ ہوگئی۔ الیا مونا اس امری تعلیم نہیں کر اکورٹ کی نیون نویس کے اور معراعوں کے فردید سے نفست گئی ہوئی اس امری تعلیم نہیں کر اکورٹ کی ایک شرای کی میری کو دھی ایک مون قلب میں محیطی کو دھی ایک جزوعال کے طور پر موج ور کر زراق کوزیادہ کر دیتا ہے۔

عام مؤرد ریی ضیق کے ساتھ آیک سود آخ ارفاصل کاجی ہونا ہے بعض اوقا ضیق اتنی انتہائی موتی ہے کہ اس داستہ سے جیسی طرول کک نمایت تو النون بہنے سکتا ہے۔
تقریباً وہ سب کاسب اور طلی کے اند حلاما آئے اور بائیں بطین ہے آئے والے فون کے ساتھ شامل موجا آئے ہے اور بائیں شبی شرائین تس موجا آئی ہے کہ ساتھ شامل موجا آئی ہے ہوئی اسا بول میں شبی شرائین تس موجا آئی ہے جو سیسی شرائین اور رہی شریا سائی شرائین اور رہی کی ایک خاصی رسب ان نامات کے فدیعہ سے بہنے جاتی ہے جو اساست میں رہوی مصراع بالکل معدود یا گیا اور رہوی رقب برکوئی انحال کے درمیان بائے جائے ہیں۔ ایک ویتا تھا ۔ مریعن نہایت نیلا تھا۔ قالب معول کے نبیت ذرا ہی سائر انتھا کیول کہ تمام اگردوی معراع باوجود تنفیق موسے کے مفتوح موزو اور طی کے اندر کم خون جائے گا۔ وایا گیا اور دہوی رقب میں ایک اندر کم خون جائے گا۔ وایا گیا ور ایک سورا خدار فاصل کے ذریعی تبیں کہ ایک خدایا ایک فائن کی مفتوح مورائے بیون کی کہ دورائی سوران دروی مصراع طبی کالت ہے کہ ومفتوح مورائے بیونوی یا مفتوح مورائے ہے۔ اگر دیوی مصراع طبی کالت ہے کہ مفتوح مورائے بیونوی یا مفتوح مورائے جائے گا ہیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کی مفتوح مورائے بیونوی یا مفتوح مورائے بیونوی یا مفتوح مورائے بیونوی یا مفتوح مورائے کا محل کوئی فیلی انجیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کو مفتوح مورائے بیونوی یا مفتوح مورائے کا محل کوئی فیلی انجیت نہیں رکھتا کیونکہ اس

صورت بن البيى كوئى چرنه بوگى جونون كومعمولى طريقة پر بيسيمبر ول كاندرسيده بوا. گزرسة مين مافع برو-زياده سه زياده يه جوگاكه تقوال ون بائين بطين مين سهده اير مين جلامبات دورس طرح عيد پروون مين سه دوسرى بارسفريط كرسه- ايك مفتق تناة شريانی موريوی نيزی دوسور افدار فاصل كه مراه پائی باسئه انخوط شريانی خون كه موجود بوتواس كی كوئى فعلى الميت ندموكى -

ېري^{ارلى}ق **تىۋات**

علالم ت ۔ جب زراق موجود ہوتا ہے تو وہ چہرے کے اُبھرے ہوئے حسواتینی ر مسارول كيون عناك اوركا نول مي اور لا نهه اوريا وُن كَى انْكلبول مي ما يال موتاي خنیف اسا بتول میں وہ مرف اسس سے زیادہ نئوخ سرخی موتی ہے کہ منبیٰ ملبعی مرخی ہوئی ہے۔ شدیدترین اصابتول میں وہ تقریراً سیا ہی کی حدیک ارغوا نی ہوتی ہے اور اور كُونى زور لكا يا حائد توان سه عروق كالبيولنا في الغورزيا. وبوار وفوا في منك زياده مگر ، بوجا ناہے ۔ اِس مِن كے تتلق يه ايك حيرت ناك واقعہ ہے كه كو زرا**ق** انتہائي وربيه کا بوز تا ہم بحا ابنه مکوان مریض کی مانس نہیں بچپولتی ۔ مزمن رکو د ما وُ من مصوب کی وبا زنتد بداكر اینا ب اورناك اوراب موسط بوماند مين اور الته اور إن اول كى انگار ال کے فکر ف کنلامیات (ungual phalange) سے بہت زیادہ موسف بوجاتے ہیں کہ تحقید انظیول کے بقیہ عصے بوتے ہیں بعنی وہ گرزشکل موجاتے ہیں (ا کے طاحظہ مو) - خون میں سُرت سیات کی وہ حمیب اُک زیاوتی (ککتو میت خلیات احمر) یائی جاتی کے جزرات کی بہت سی سموں میں یائی جاتی ہے۔ چنانچران جبیات کی تفداد ، . . . ، ، ، ، مست ، . . ، و فی کمب می میشر یائی گئی۔ ، اور مكن سند كر بيمو كلو بين طعى كى ١١٠ فى صدى سے كر ١١٠ كك بينى ما ك ميق بعض او قات دور ان مرعشی تشخات اور بهوشی میں ستلا بوجاتا ہے۔ چوکک أسانى سے بېرطارى بوجانا كى لېدا دە زيا دەمىنت كى نا قابل بو ئاسى ـ نىز مەردى اور تکشف کی فاص مس پدیری رکھیاہے اور نازلتی التہاب شمات کے حلول کیا ان بتلا بوطآلب - آخری در جرن میل انگون کا اُذیا استفارت کی برها بوامگر آور البنيس بوليت إئى ماتى مدين عبى البتاب كاشكار بوما المدين الشكار

تدرنی من موت کا سبب موتابے۔

المبی الماری الماری ایک الماشی فریرسنائی و تیا ہے کین وہ سعلہ فقاؤل پیدائشی رہے گئی و تیا ہے ہو پیدائشی رہے گئی وہ سعلہ فقاؤل پر بھی سنائی و تیا ہے لیکن وہ سعلہ فقاؤل پر بھی سنائی و سے اللی و بیا ہے گئی ہے۔ کہ اس کے ماتھ ایک و بذہ بھی ہو۔ قلب کے دائیں جانب کے اتساع اور بہش پرورش کی وج سے اسمیت عظم القص کے وائی جانب کی بھیل سکتی ہے ۔ نا لفس رہو گئی جانب کی بھیل سکتی ہے ۔ نا لفس رہو گئی جانب کی بھیل سکتی ہے ۔ نا لفس رہو گئی ہی بہت نہایال ہوتا ہے ۔ اگر فرر مدف فاصل کا ایک انتماشی خریر ہوتا ہے ہو ایم کے طوف منتقل ہوتا ہے اور اکثر ایک غیر پیلا فرائی ہوتا ہے اور اکثر ایک فریر پیلا فرین ہوتا ہے اور اپنی اکثر ایک طویل خریر پیلا کردی ہے ہو ایک اور اپنی باندی میں مدفوج زرطام کردی ہے ۔ اور اپنی باندی میں مدفوج زرطام کردی ہے کہ ایک الاحظہ ہو صحفہ ۱۰ کہ صفحہ 200 ۔

بیدانشی مرض قلب کی مختلف شمیں لا شماعی امتحان کرنے پر خصوص و نمیز و ظائر بیش کرتی ہیں۔ مثلاً خالص ریوی نیق میں جونا درالو قوع ہے ' دائیں بطین کی بیش پرورش اور دائیں اُ ذہن کے اشاع کے باعث قلب کی کل نمیز ہوتی ہے ، طاخطہ موصفہ ۱۲ ب نیکن ہے کہ تسدد کے مقام ہے آگے ریوی شریان کا اتباع ہو۔ اس کا سب بالکل فیرواض ہے ' لیکن یہ امتحانا ہے بعدا لممات میں گئی بار دیکھا گیا ہے ۔ ریوی نیق کے ساتھ فاصل کے سور اخ کے معمولی اجتماع میں قلب کی بائیں اور دائیں دونوں جاہیں بڑی ہوئی ہوسکتی ہیں۔ لیکن اِس کے برعکس مکن ہے کہ جامتِ قلب میں کوئی قابل شات

اندار - بدائتی تشو الت بمیشد نا موافق بوت بی ۔ شدید نقائص والے مریض مرف چند گفتوں یا دوں کے درج کے مریض مرف چند گفتوں یا دوں کک زندہ دہتے ہیں ۔ دوسرے بوضیف تردرج کے بوت ہیں ' بانخ دس یا بیس مال کک زندہ دہتے ہیں ۔ کبی کبی نیا بت اتف المنزقاب والے اشخاص بھی اد معیر مرکو بہنج گئے ہیں ۔ کسی وی موئی حالت میں انداد کا انحساد مناوی فرمیت کے بجائے دیا دہ ترمی مرمی قلب کے علیج سے مانیل ہے ۔ معامی مرمی مرمی حلیج سے مانیل ہے ۔

امرانس نامور

(DISEASES OF THE PERICARDIUM)

النتهاب بامور

(pericarditis)

اسمسیاب نا مورکا البتاب ایک مام مَ موی سرا بین کا نتیجه بوسکتا ہے 'یا وہ مقامی خراش سے واقع بوسکتا ہے یا قرب وجوار سے براوراست پیسلنے والی ساریت سے واقع بوسکتا ہے ۔

رں ، و سہ - - بہای جاعت کی اصابنوں میں حا دروما تہزم نہا بیت اکتر الوقوع سبب ہے بیکن میں مذکور' مرض برائط تفیح سبب ہے بیکن مرض مذکور' مرض برائط تفیح الدم سبید دمویت (leukaemua) میرزن انغلونئرا اورعفونت الدّم اورسم الدّم کی دوسری حالمتوں ہیں بھی پہر ہوجا نا ہے ۔ اِس کے مقانی اسب یہ بریں : - کہفہ کے اندر سرطانی گر کوں کی بالیدگی اس کے اندر میوٹروں اورکیسینتی دُویروں کا انشقاق کی سی منبع مرایت مشلاً دبیا میں فرات الربرکا تو ۔ ۔

بوّاہے کہ ان سطحول کی علامہ کی سے ایک عجیب وغریب شہد کے جیتے میا مامال زاز مط

باقی رہ جاتا ہے ۔ عمد اُرسی کے ماتھ کسی قد رُسُل بن جاتا ہے جوزد ورنگ کا اوجی جاتی عثار کی وجہ سے گدلا ہوتا ہے ۔ عمن ہے کہ یہ بہت بڑی مقداری جمع موکر تا معد کی دو فرن ہوں کو ایک دورت اُرت ایک سے ایک مقداری جمع موکر تا معد کی دو فرن ہوں کو ایک دورت اور اس سے مکن ہے لمیت بیٹ میں اور دائد سے ایک سطح سے دوسری مطبح کے بعد یہ ستیال عمد آغا سب موجا آہے ۔ اور لمف یا تو خود بخو د جذب ہوجا آہے یا اس کا تعفی و ، تع ہوجا آہے اور دو تعینی کی جاری اور مثن کی جاری اور مثن کی مورکی بب اور مثن کا مورکی بب اور مثن کی مورکی با مورکی بیٹ ہوں کو کی و بیش کمل طور پر با در متن کی در تیا ہے اور اس طرح منفتی ان مورکی بب بوتا ہے۔

وو بری سرانون اور بالخصوص لنیخ الده اور عفونت الده مین تارمورکا سال افید
مسل کے بجائے روم ہوتا ہے اور اس طرح س بی یا تعلیمی البھا ب تا وه کو purulent
مسل کے بجائے روم ہوتا ہے اور اس طرح س بی یا تعلیمی البھا ب تا وه کو کو ایک کے خراج سے
مانوی طور پر ہواکر ہے ، جس کا اکثر کمی بٹر اور اس کے حاد نخر کے بعد بیدا ہونا معلوم ہے ۔
بعض او تات البہائی کو ین کے اندر کے نوساختہ عوق بیسٹ جانتے ہیں اور اس طرح نو فی المہاب
نرف کی اسب بٹری جگتیا س مجلی کی سطح کو دھا نک دیتی ہیں اور اس طرح نو فی المہاب
تاء مور (hæmorrhagic pericarditis) بید اکر دیتی ہیں ۔ اور کمی کمی اسس نی
ساخت میں اور قلب کی سطح کو دما کھنے والی اسلی جبی میں دو نوان میں کرنے بی جانوی

البهاب تا مورکے وقت عنویے کس کے مبدائے لھا طابے مختف موتے ،یں۔ علی الاکٹر نقات سبمیہ' نبقات عنبیہ' نبقات ریویۂ اور عصیات درنیہ پائے جائے ہیں۔ پائنٹن (Poynton) اور تین (Paine) نے روماتزم کے التہاب تا مور میں اپنے اپنے روماتزی دونبقیات یائے۔

ن کو مردان خون میرا شرد کو تنهیم کے دیوا نی نخر بات ظاہر کرتے ہیں کہ دوران و پر موسع اللہ کرتے ہیں کہ دوران و پر موسع والمحار کا انحصار تا ہا المرس کا اندر کے تتا و پر موتاہے ۔ جب سستیال کا اِنْراب اَمِنتہ میں مارک کے دواؤ ایک میں نقط تک پہننے پرنٹریان د باؤ کم اور وریدی دباور یادہ موجوبا کا ہے۔ برجینیت ایک میپ کے یہ ظلب کی تھی مولی کارکر دگی کی طامت یعنی یو کہ مرضرب کے ساتھ قلب کی برآ مدکم موگئی ہے ۔ تا مورکے اندر دباؤ میں قدر زیادہ موگا کید برآ مداسی قدر کے موکی ۔

طبیعی آ اورا گئے۔ چوکہ البتاب تا دموداکر اورا ترم میں اکسی ماری مرفی کے دران میں پیدا موجا کر البتاب تا دموداکر اورات میں بیدا موجا کر البت بنا موجا ہوں کے ملافات سے اور الن میں بیدا موجا میں کہ من کے دوران میں البت بنا دمور پیدا ہو گیا ہے اور السس کی موجو و بیدا موجو و گل موجو و بیدا کرد تیا ہے ۔ کیکن دیمو کی موجو و بیدا کرد تیا ہے ۔ کیکن دیمو کی درگئی موجو و بوقی کے حس کا بیان امتحال قلب کے تحت کیا گیا ہے ۔ کمکن ہے کہ یہ ابتدا از زم مو البیکن بین گل موجو یہ اور کیمو پیش فلن خوا میں کہ بیان امتحال قلب کے تحت کیا گیا ہے ۔ کمکن ہے کہ یہ ابتدا از زم مو البیکن بین گل مین موجو یہ بیک بین کے بعدا واز بند تر کو خوت تر او درشت تر ہوجا تی ہے اور بھر پیش فلن خوا یہ بین میں ہے کہ بیا تا میں کیا با سکا ہے ۔ کا تقد رکھنے سے یہ فرک اکثر محمول کیا با سکتا ہے ۔

جوں جو یہ یہ البر ہناجا آہے مکدم القلب منتشر ہوجا آہے۔ یہاں الہاب فائد اور وہ یہ ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ فرک کا ذکر کرنا صروری ہے اور وہ یہ ہے کہ فرک کا افر ان دونوں حالتوں یہ مختلف ہوتا ہے۔ فرک کی اواز کے وفرع برائع کے انصباب کا افر ان دونوں حالتوں یہ مختلف ہوتا ہے۔ ذات البحنی فرک کی اواز خائب ذات البحنی فرک کی اواز خائب ہوجاتی ہے۔ التہاب تا موری فرک کی اواز عمواً دورانِ مرض میں از انتدا تا انتہا تا انتہا تا امرائی ہے۔ التہاب تا موری فرک کی اواز عمواً دورانِ مرض میں از انتدا تا انتہا تا انتہا دوران یہ جائے۔ یہ خالبا اس وج سے ہونا ہے کہ میال النصوص قلب کے پیچے جمع ہوجا تا ہے۔ دوران یہ جی۔ یہ خالبا اس وج سے ہونا ہے کہ میال النصوص قلب کے پیچے جمع ہوجا تا ہے۔ دوران یہ جی۔ یہ خالبا اس وج سے ہونا ہے کہ میال النصوص قلب کے پیچے جمع ہوجا تا ہے۔ دوران یہ جی۔ یہ خالبا اس وج سے ہونا ہے کہ میال النصوص قلب کے پیچے جمع ہوجا تا ہے۔ دوران یہ جی۔ یہ خالبا اس وج سے ہونا ہے کہ میال النصوص قلب کے پیچے جمع ہوجا تا ہے۔ دوران یہ جی کے بال النا رہتا ہے) اور ساسے کی طرف تا و مور کی دو نوں کمتیب سلمیں دوران یہ کا تا میں دوران یہ کا تا ہو کہ کے بیال النصوص قلب کے پیچے جمع ہوجا تا ہے۔ دوران یہ کے بال گا دیا دیا ہے کہ اور ساسے کی طرف تا و مور کی دو نوں کمتیب سلمیں دوران یہ کے بال گا دیا دیا ہے کہ دوران یہ کے بال بالنصوص قلی دو نوں کمتیب سلمیں دوران یہ کے بالے کا دوران یہ کی بالیا دیا ہو کہ کا دوران یہ کی بالیا دیا ہو کہ کہ دوران یہ کی بالیا دیا ہو کیا دوران یہ کی بالیا دیا ہو کہ کیا گا کہ کا دوران یہ کی بالیا دیا ہو کہ کیا گا کہ کیا کہ کا دوران یہ کی بالیا دیا ہو کیا ہو کہ کا دوران کیا کیا گا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کیا گا کہ کیا کہ کیا گا کیا گا کہ کیا گا کہ

ایک دو سرے سے رگرمٹی رہتی ہیں۔

یے۔ رہاں ہوں انصباب اکثر یا ٹیمٹش کے قاعدہ کومضغو لا کردیتا ہے، مبسسے قرع کرنے پرایک اسم آ وازا ور استعاع کرنے پرشعبی نفس پایا جاتا ہے۔

علامات - مقامی طلامت جوالنها بارمور اور اور اوری افسایک افروقی بوکتے بین ، یہ بین ، یہ ورو ، بیش قلبہ کے مقام پر گجرا بہت یا تکلیف کس خط پر وافسے اکیمیت مانس کا بچول جانا موفیر بھی تناست اور مختصر دو کمی کھانسی کے ۔ مکن کو نمن ابتدار زیادہ متارش نہ ہو کیکن وہ جلدی تیز تر ہوجا سے کا رجمان رکمتی ہے ۔ مکن ہے کہ رو ما تزم جسیے حائی مرض کے دوران بی واقع بوسے والا التها ب ، مور سابق الوجود تب بیل کوئی معتد به اضافه نه کرے الیکن کمی کمی سس کے سریع حلا کے سابق الوجود تب بیل کوئی معتد به اضافه نه کرے الیکن کمی کمی سس کے سریع حلا کے ما تحد سند ید ارتفاع تبیش ہوجا ہے ، مثلاً ہو، ورجہ یا ۱۰ ورج کا ۔ اور ووسسری اصابتوں بی منس کے ما تحد تب کی معمولی حالتیں بول : جسیے کے عدم شہما خطک زبان تشنگی اور قلیل المقدار بول ۔

فراب ترین اصا بتون یکی ضعف زیاده موجا آسے، نبض فیر ختلا اور فرقی الله موجا تا ہے کا مکن ہے کہ وہ ببض متنا قض (pulsus paradoxus) (طالحظہ ہو معنی 226) کی شکل اختیاد کرلے کہ بیش قلبی ور دشدید ہوتا ہے اور چہروا ترا ہوا اور بحکا ہوا ہو جا بوجا ہے ، اور مریض اولی طور پرفضل قلب سے مرجا آ ہے ، جس کے ساتھ کسی کمبی تضغیات ہوتے ہیں اور کسی کمبی کو اللہ لیکن مث لول کی غالب تعدادیں علامات بعد رہے رفع ہوجا تی ہے لیکن رگر اکو آخری ورج ک مت کم بوجا تی ہے لیکن رگر اکو آخری ورج ک مت کم رہی ہے ۔ المتناب تا و مورکے تغیرات کر موحت واقع ہوتے ہیں مگن ہے کہ انصاب دول آئی ہے المتناب تا و مورکے تغیرات کر موحت واقع ہوتے ہیں مگن ہے کہ انصاب دول آئی خلیف کا دول آئی کھن ہے کہ اندر ورجہ کا می کوئی خلیف کا دول آئی کی دول آئی کھنے کا دول آئی کھنے کی دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کا دول آئی کھنے کی دول آئی کے اندر دول آئی کھنے کا دول آئی کھنے کا دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کا دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول آئی کھنے کو دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول آئی کھنے کی دول آئی کھنے کی دول آئی کی دول آئی کھنے کی دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول آئی کھنے کہ کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کھنے کے دول آئی کے دول

مل توب جارى بوبائے۔

نعینی تدرنی اورنز فی التها بات ار موراین علامات اورطبیعی آمارات برفیالاً ا

اوروک اوروک کی در این اور ایسان بی کوئی مشکلات ایس بیش آنے اوروک کی در بی اسکونی اوروک کی در بی اسکونی اور نیا بت سند رو تی ہے ۔ اور مری انصب کی تشخیص بیشا مان ایس موتی کی در بی ایک تئس قلب سے اس کی حالمت بیدا بوشتی ہے جو کہ اس کی تشخیص میں مبذی اس سے بیدا بولی ہے ۔ انصباب کی تشخیص میں مبذی اور سے بیدا بولی سے بیدا بولی سے بیدا کو یا ہے ۔ انصباب کی تشخیص میں مبذی اور امارات سے آئید مال موتی ہے ، ۔ اصمیت کا ایک میں طرف صرم اسلب سے باہرتک اور اور کے طف دور مری بیلی یا اس سے بیمی او بت کے بیدا ور ایس کے مالی کی اور ایس فی ماری بیلی مبلی دیا ہی مارات ۔ مکن ہے کہ را بخی شعاعی فلی اور تا رمور کے سایہ کی اور ایس کے متابع میں کے متابع میں کے متابع میں کا میں کا میں کا میں کا میں اور ایک براے انصباب کی حالت بی مبنی اوقا سے میں نیا ہے جو نیا میرو کے مور کی ماری کی میں کے متابع میں کے متابع میں کے متابع میں کے متابع میں کا ماری کا ماری ایک نمور کی دورے ہوئی میں اور ایک براے انصباب کی حالت بی میں کے متابع میں کے متابع میں کی متابع میں کے متابع میں کے متابع میں کے متابع میں کی متابع کا ماری کا ماری ایک نمور کی دورے ہو تاب کی دورے ہوئی میں کے متابع میں کے متابع میں کی میں کے متابع میں کی متابع کی کا ماری کی دورے ہوئی میں کی میں کے متابع میں کی کر اور دور کی دورے ہوئی میں کے متابع میں کی کر اور دور کی دورے ہوئی میں کی کر اور دور کی دورے ہوئی میں کی میں کی کر اور دور کی دورے ہوئی میں کی کر اور دور کی دورے ہوئی میں کو کر اور دور کی دورے ہوئی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کر دور کی دور کے دور کر دور کے دور کر دور کی دور کر کر دور کی دور کے دور کر دو

افذار۔ التباب ارمور برئیست بجموعی فوری طور پربلک دفر بہیں بھن کے وہ اتنا خدیف موکہ بنور العلی امتحال کے بریان بیں برموف معاع العار سے مصنا فت موا امراثیتی تب میں واقع ہوئے والی اصا بول کے برع بنا ہے۔ الب خطرہ بن سکتا ہے۔ اور شیتی تب میں واقع ہوئے والی اصا بول کے برع با ہے کہ اتبر ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے برکس ان المبنی نقطول "کے عام موج نے ہے جو امتحانات بعدا المات میں قلب کا سطح پر الیک برکس ان ان مبنی نقطول "کے عام موج نے ہے جو امتحانات بعدا المات میں قلب کا سطح پر الیک برکس ان اس امکان کا استارہ بوتا ہے کہ النها ہا تا وہ در کے خفیف سطح پر الیک واقعات موکر بورے طور پر رفع موجاتے ہیں۔ لبنی نقط ارم فعن قرک کا نمیں مصلے سے کہ اخوالد کر بلاکی درم الاتباب کے کمو بھر سے کہ اخوالد کر بلاکی درم الاتباب کے کمو بھر واقع ہوساتے ہیں۔ لیکن یہ بھرا موض نقاط کو فت تکی کر موضی مالیوں کے تلازم میں بوائی ہوں ہو موجاتے ہوں ہوست ما می کہ اختستام کے قریب اکتر التباب تارمور داقع ہو جا تا ہے اور بھریہ موت واقع کے اختستام کے قریب اکتر التباب تارمور داقع ہو جا تا ہے اور بھریہ موت واقع کے اختستام کے قریب اکتر التباب تارمور داقع ہو جا تا ہے اور بھریہ موت واقع کے اختستام کے قریب اکتر التباب تارمور داقع ہو جا تا ہے اور بھریہ موت واقع

291

کرین والا فررمعلوم بوتا ہے۔ لیکن السے مالات میں بجی اس کے طبیعی المدات موت سے
پہلے بالکل فائب ہو سکتے ہیں یا اگرہ باقی دہتے ہیں توجی اس سے مہلک نیتجہ کے ، توجا
ا مراع ہوتا ہنیں معلوم ہوتا۔ تعبی تا، موری البتاب ای خطرناک انداد تبا ناجا ہے 'اور
ز ات الریدیا و بیلہ کے وودان میں نبقی ریوی البتاب او مورکا، فوع عمر ما فیلک ہوتا ہے '
لیکن مرایف ۔ ٹیلر (Shr F. Taylor) کو ایک ایسے مریض کا مم تفاجس میں وہ ہرے
دبیلہ کے ساتھ النہاب تا مور خطاور وہ مریض شفایاب ہوگیا۔ ما ویزینہ میں البتاب تارمول
در وں قلیہ اور عضائہ قلب دو نوں کے کینقد دا لہتا ہے مہراہ پایا جا باہے اور ان کو پوشیدہ
در وں قلیہ اور عضائہ قلب دو نول کے کینقد دا لہتا ہے مہراہ پایا جا باہے اور ان کو پوشیدہ
کرتا ہے' اور ان دونوں کے خواب اثرات بعد میں نمو با ہے میں۔

علاج _التهاب تاءمور کا علاج زیا و ه ترشخفیف کن (palliative)م تواېح. دوررے ماد النتا ات کی طرح اس کا تدارک بھی مریعن کو بہتریں لٹا ، بوٹ یا آدمی لیٹی ہوئی وضع میں رکھ کر کا آت رام وسکون کے ذریعہ سے کرنا جا ہے ۔ نیز اسے مغلق زودہ صنم غذادی مبائے اور اسے بو لنے جا لئے ' اور بیش وٹروکسس سے محترز ر کھا مبائے۔ ر ثبتی تب کی حالت میں ابتدائی من کے ملاج میں غالبًا ان حالات کو بیلے بی لموظ رکھا کیا موكا - نها ببت منديدورد كي ما يمثن قليه برجيم إلى تقدونكي لكادى مايس - مين متله بر نرم روقي كى ايك ته اي كلى مونى السي كى كرم موليش ليانيشي فلاجنيين (antiphlogistine) یا تعربوم ن وول (thermogen wool) لگادی مائے۔ اگر مزودت موتو مارفیا دیا مائے۔ اگردودان خون نشل بذیر بو یا اگر قلب غبر متنظم بو جائے تو ڈیجیٹانس کے مبنیہ کی تھوڑی مغناً دین براندی یا اَیمونیا کے ساتھ باربار دینا لجا ہئیں ۔ روماتر می انعساب بہت سنا ذہو نادر بی امتعام کی مزورت لاحق کرتاہے کیکن اس وقت جبکہ ریم کی موجود گی کا اسکا ک اس برفور کر ناصروری ہے ۔ ڈ اکٹر ڈی سی ٹیلر (D. C. Taylor) سے بیوسس ام (Lewisham) شفافانه میرفی تجربه مال کبایه اس کی نبایروه سفارش کرتاسه که طداور زیرا فقا وہ با فتوں کو ۲ فی صدی نو ووکین کے ذریعہ عدیم انس کرنے کے میڈایک باریک سوئی کو پیچھے کی طرف اور نیچے کی طرف چھٹی بین منعمی فضا میں عظم انقص کے بائیں طرف (ساکم اندرونی پستانی تنریان کمی رہے) یہاں تک گھسانا چاہیے کہ ڈوایا فرام کے بہنچ جامین مرکع متعلق بنین عال کرا ہو تو مریض کو ایک گہر اسانس مینے کے لئے کہنا ما ایسے ہوئی کو ذرا

والیں کھینے کردوبارہ سیدمعا پیچے کوسطے سے ایک اٹنے کی گہرائی ٹک گھسا ن**ا چاہئے۔ پیرکونچاکو** ۱۰۲۰۰ فلیوائن کے ۲۰ کمعب سمر سنگئی مرتبہ ، صوبا جا نا ہے' اور امتصاص **کو ہرتیمسرے** روز باربارعل میں لا باط اسے'یا ایک مینی کا جزوی استیصال کردیا جا تا ہے۔

رنبتي مبداء كأمام وزصنم

(adherent pericardium of rheumatic origin)

علامات اورطبیعی اما رات به در دخلب اختلاج اور بهر نمایاں موتے ہیں۔ خود انتہام کی موجود گی طاہر کرنے کے لئے طبیعی آمارات پراغتماد نہیں کیا جاسکتا ۔ لیکن جب ویسع ببرونی انتہامات بھی موجود ہوئ تو مندر دئر ذیل بیں سے ایک یا زائد طبیعی آمارات مشناخت ہوسکتے ہیں : ۔ (۱) راس قلب سے تمناظ مقام برا کماشی بازکشیدگی۔ (۲) عظم الفقس کے زیرین سرے کی اکماشی بازکشیدگی ۔ (۳) عظم الفقس سے باتہ جاتی ہیں۔ تمیسری چرمتی اور بانچویں بین الاضلاح فضاؤں کی انجماشی بازکشیدگی ۔ (۲) جا بھی ہیں۔ بہر یا بیشت پرینیج کی مبلیوں کی اِ کماشی بازکشیدگی (ارت بالم بینیط کی بیلیوں کی اِ کماشی بازکشیدگی (ارت بالم بینیط کی انگیاشی بازکشیدگی توبیر دو sign)۔ بیب زیادہ افتحا و کے قال نہیں۔ مطرانی منیق مج کہ عام طور پراس کے ماتھ متلازم مج تی سختم اور وسیع اور وسیع اور میں ہے۔ ب با ختیاط ملاش کرنی جا بیئے۔ مون نشل قلب اور وسیع اور میں موسکتی ہیں۔ وہ یہ بین کہ لاشاعوں سے بھی منفر ای مورکی قیمتی ولالتیں حاصل موسکتی ہیں۔ وہ یہ بین کہ

کا مفاطول عے بی صفی بر فوری یہ می دو یک س چی بی بود میں اور کا اور کہ ہی بود ہیں بود ہیں اور کہ میں سانس لینے برقلب کی طبعی حرکت اور شکل میں تبدیلیاں اور مانس لینے برؤ الفرام کے مرکزی مصے کی حرکت میں تغیرات ہوجا تے ہیں جس کا سبب مردوا ہوتے ہیں ۔

تا وموری انعالی ت کے اندار اور علاج پر بانعفوس انعالی ملب کے ان فرات میں کے ان فرات میں کے ان فرات کے ان فرات کے ان فرات کی وج سے پیدا ہو جائے ہیں (الماضل موض خات کے ای طابعہ و کرنا جا ہے وہ کہ عام مرض قلب کے لیے کیا جاتا ہے ۔

مبرتضيقى التهاب نادمو

يك (Pick) كامون

تبحث اسماب به تدن وات الريدمد ذات البنب باالتهاب تأموداد عفونت اس كامبب موسكتة رس ليكن اس كامب اكثر ادفات غيرمعلوم رمبتا بين كمونكه اك آغاز غيرموس طور پرموتا ہے . ممكن ہے ما والتها ب تاءموركي سرگذشت موجود موكنيكن جاو

رواتزم کی مرکز شت نہیں اپنی ماتی ۔

مرضی تنشریکی عباری تارمور کی مزمن لینی و ازت واقع موتی ہے اور بااوقاً تکلس مال کی جیبیں "ماچر کا انطاس اند بیرونی تا دیوری انفلامات موجود ہوتے ہیں۔ چونکو تنفیق کی وجہ سے قلب دوران انبسا قامیں بعر نہیں سکتا لہذا ایک 'رکو دِ در آسک' ('inflow stasis'') بیرا ہو ما آہے' اور استسفائے مشکمی اور اس کے ما تقد ایک برزدہ

(frosted)"معری کی ڈلی جیما جُر اِ طمال اور لمپیوری انصاب پیدا موجا آ ہے ۔ قلب بحائے و تا ہے ۔ قلب بحائے و تندرست ہو آ ہے ۔

علانی یا فتہ لمکن غرالی اور غیزا بص عگر و و ای وریدوں کا اختفا ک سفر عاص کی ایک کلانی یا فتہ لمکن غرالی اور غیزا بص عگر و و ای وریدوں کا اختفا ک سفر عاص کا افتحا اور طیخوری انصاب (paradoxus) بیت فضار خون اور بعض اور قات اور کا افتحا اور طیخوری انصاب پائے جاتے ہیں ۔ قلب کی جاست طبعی یا کیقدر شرعی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ۔ برا فر بینسٹ وولٹا کیئت (Broadbent) کی اور تنم موجود نہیں ہوتی ۔ برقی قلب شکا شت بیت وولٹا کیئت ما ترکس یا نی اور گا ہے اور تنم بین نواہ اس کے ساتے منفی تا مور ہوتی ہیں۔ اور گا ہے اور نی انتباض موجود ہوتا ہے ۔ مصلی پروٹینس کی موتی ہیں۔ ماتی ہیں اور گا ہے او نی ارشیکی انتباض موجود ہوتا ہے ۔ مصلی پروٹینس کی موتی ہیں۔ مطالی ہوتی ہیں۔ اور گا ہے اور نی انتباض موجود ہوتا ہے ۔ مصلی پروٹینس کی موتی ہیں۔ کے لئے متماط استیان کرکے شخیص کی جاتی ہے ۔ التہا با ہو تا غیر میں اور تعن ندیتی او بیا کہ منتب کی ماتی سے ۔ التہا با ہو تا غیر میں اور تعن ندیتی او بیا کہ منتب کی منتب کی منتب کی ماتی ہوئی۔ اور تعن ندیتی او بیا کہ منتب کی اور تعن ندیتی او بیا کہ منتب کی کو کی منتب کی منتب کی کرنا جا ہے ۔ التہا با کرنا جا ہے ۔ التہا ہوگی کرنا جا ہیں۔ اور تعن ندیتی اور بیا کہ منتب کی کرنا جا ہے ۔ التہا ہوگی کرنا جا ہوگی کرنا جا ہے ۔ التہا ہوگی کرنا جا ہوگی کرنا جا ہے ۔ التہا ہوگی کرنا جا ہوگی کرنا ہوگ

اندار - بیمن مزمن بوتا ہے توکہ بعض اوقات ہیں کے ماند فترات پائے جاتے ہیں مکن ہے یہ ایک سربی ممر اختیار کرے پاکئی سال تک قائی رہے ۔ علیہ کے بعد ۱۰ مریفوں میں ۲ مریض شغایاب ہو بیکے ہیں ایک دوسرے مریفن کو افاقہ موگیا ۔ علاج ۔ تارموری مزوی انتہال کا علیہ جوکہ ڈیلارم (Delorme) کے نام سے موسوم ہے 'واج بشنانی علاج ہے ۔

منادمورى اجتماع آب

(hydropericardium)

یہ اصطلاح ارموری اج کے اندر معل کی زیاد تی کے لئے استمال کی جاتی ہے اور عمراً استفاد کے انداز کو آن التهابی انستا است تمیز کریے کے لئے کام میل کی جاتی ہے۔ انداز کو آن التهابی انتہا ہے انداز میں ہے۔ تدرتی طور رتار مدکے اندائش ہے جو پہلے التهاب تا ہمور کے تحت بیان کئے جاچے ہیں۔ قدرتی طور رتا و مدکے اندائش مصل کی تما بیت تموری مقدار موجود ہوتی ہے اور کسی مبب سے موت واقع موجانے

293

کے بعد اس کے اند بھیکے زرد رنگ کے سیال کے بند ڈرام ملنا عام ہے ۔ مصلی انصبابات کے اسپاب التہاب کے علاوہ وہی ہیں جو استقاے عموی کے ہوتے ہیں شلاً مون البی اور اور اور البی مقامی مداخلت جیسی کہ فود قلب کا معامی مون امن مضن کا مرمن مضن کا مرمن مرمن اور ان وریدوں پرج تا ہودی سلحوں سے فون واپس لیجاتی مرمن مضن کا مرمن مرمن اور ان وریدوں پرج تا ہودی سلحوں کے استقائی انعمباب کے ہیں سلعات کا وہاؤ ۔ تاجہ کے اندرکا مین دور درنگ کا یان دموی ما دہ کے استقائی انعمباب کے ماج سے میں اور وہ بھیکے زر درنگ کا یان دموی ما دہ کے ارتشاح کی وج سے کم وبیشس کلا بی رنگ کا مؤتا ہے اور وہ بھیکے اور ساتھ ہی اس میں فائبری فوج ن اور اناس فی صدی البیومین موجود موتا ہے۔

تاوموری اجتماع آب کے طبیعی اَ اوات دہی ہیں جو التہابِ اور میں انصبا کیے ہوتے ہیں۔ عرف التہابِ اور میں انصبا کی ہوتے ہیں۔ عرف التی عرف کا دور سے تعلق ہو اس وقت صرورت نہیں ہم تی جب کہ یہ حالت استعالی عموی کا ایک جز و ہو یا جہاں یہ و ورا اِن خون ہیں مقامی ما خلت کا نیٹجہ ہو۔ انتفاعات عمومی یا مصراعی مرض کا تدارک کرنا چا ہے۔ شاذ اصابتوں ہے انفا اس قدر مربع الوقوع یا وافر ہوتا ہے کہ تاومور کے بزل کی ضرودت لاحق موتی ہے۔

مناءمورى بوائى اجتلع آب

(pneumo-hydropericardium)

اس کے بیمنے ہیں "ادمور کے اندرگیں اور ایے دونوں کا موجود ہونا۔ مامے کے ماتھ گئیں ہونا مندرم زوال کا نتیجہ ہوسکتاہے (۱) گیس گنگرین (gas gangrene) او (۲) ہوسٹر کی استار کے دالے کہ نوں کے ساتھ تاہموری تاجہ کا ارتباط۔ یہ ارتباط حذیف ہوسکتاہے ، جیسا کہ ایک شعبہ ہوا کہ کسس نے ایک کنڈ کم ارکو شکھنے کی کوشش میں مری میں سے نا مود کو جیسد ویا 'اجسیا کہ فِلْنٹ (Flint) کی درج کردہ اما میں ہوا کہ جس ہوگیا 'اور تا دموری بڑل میں ہوا کہ جس ہوگیا 'اور تا دموری بڑل کے ملید کے معدید ہوگیا 'اور تا دموری بڑل کے معلید کے بعد ہوا ہے۔ یا مکن ہے کہ یہ ارتباط مرس کی وجہ سے قامے ہوجائے۔ اور اسی ماماری میں مندرج ہوئی ہیں بن میں مری کا مرطان متقریح ہوکر ادمود کے اندر ہونے گیا میل رہے کہ اور ایک میں دیا اور خراج بگر ایک ہی وقت میں تا امرائی کی مندرج ہوئی ہیں بن میں مری کا مرطان متقریح ہوکر ادمود کے اندر ہوئی کی میں مری کا مرطان متقریح ہوکر ایک ہی وقت میں تا امرائی کی دور جا گر ایک ہوئی تا دمور کے اندر کھی پڑا' اور خراج بگر ایک ہی وقت میں تا امرائی کی دور جا کہ کہنے تا دمور کے اندر کھی پڑا' اور خراج بھگر ایک ہی وقت میں تا دمور کے اندر کو کی میں دور کے جا دی کی کا دورائی کی دور جا کر کی کی تا دمور کے اندر کی کی کی کا کر کی کی کی دورائی جگر ایک ہی وقت میں تا دمور کے اندر کی کی کی دورائی جگر ایک ہی وقت میں تا دمور کے دیں کا دورائی کی دورائ

معدہ دو وں کے ماتھ ادتباط رکھتا تھا۔ تارمور کے اندر تنہاگیس کمبی نہیں دیکھی جاگئی ا کیونکہ اس کے باہرسے داخل ہونے کے تعریباً فی الفور بیدتا دمور کا التہاب معمایع بنعباً کے پیلا ہوجاتا ہے۔

تارموری موائی اجماع آب کے طبیعی الارات یہ ہوتے ہیں: ۔ قرح کرنے پر پیش منبی رقبہ پر گمک اور مرکات قلب کے ساتھ چھنگئے کبو میز کیا تعزیز کی ہم زمال کوازیں منا ہمور می جہائے الرّم

(hæmopericardium)

نام نہاوتادموری نز فی النہاب میں نوساختہ عروق کے بیٹنے سے تارمور کے اندر خلیف سے تارمور کے اندر خلیف ورجہ کا اندر خلیف ورجہ کا انساب خلیف ورجہ کا انساب خلیف ورجہ کا انساب خلیف ورجہ کا انساب کی وجہ سے نہوئو توعضا ہ فلب کے انشقاق کی ایک افرا فالی تاہید کے انشقاق کی میں الدیمیں کے عروق کے انشقاق سے پیدا ہوجا تاہے۔ اسکروی اور آئی سے ملتی ہوئی حالتیں نبی تا موری نزف بیدا کرسکتی رہیں۔

علافات ۔ جب آاد مور کے اندرخون کا انصاب دفعتہ واقع ہوجا آئے تو مریف پرسینہ ہیں کہ و بیش منتی 'شحوب' عضیا ن ' بے ہوشی اور موست کے بعب و گرے جلد طاری جو جانے ہیں ۔ یا مکن ہے کہ مہلک خاتمہ سے پہلے جو بسیل یا جبتیں گا جبتیں کہ کھنے کہ وہ شخوب' ضیف نبعل ' اور انتھا ہی نفس کی حالت ہیں رہے ۔ اور انقلب معلوم ہوتا ہے کہ توت کے وقوع میں اور بھی التو ہو معلوم ہوتا ہے کہ توت کے وقوع میں اور بھی التو ہو بوجا نہ کو تو مکن ہے کہ موت کے وقوع میں اور بھی التو ہو بوجا نے اور انتھا ہو گئی التو ہو ہو التی اصابتوں کا تد کرہ کرتا ہے جن میں شفا مال ہوگئی ، گر ہے ۔ والتی احتمال ہوگئی ، گر ہوتا ہے جن میں شفا مال ہوگئی ، گر ہے اللہ احرادی کی نو میت کی متیں یا بہر حال افر سا دُل کے یا خود قلب کے انتھا تی پر خود نتیس یہ خود نتیس یہ خود نتیس یہ خود نتیس یہ دیتیں یہ خود نتیس یہ دیتیں یہ میں دیتیں یہ خود نتیس یہ دیتیں یہ دیتیں یہ دور تیس یہ دیتیں یہ دیتیں یہ دور تیس یہ دور تو تیس یہ دور تو تیس یہ دور تیس یہ

طبیعی اُ ماراب و بی بوتی بی جرایک برست اوری انصباب کی بوتی بین اور ساتھ بی و تی بین اور قلب کی بوتی بین اور ساتھ بی و تی بوتی موجودگی موتی سے سنتی بیس انورساکی مابس موجودگی یا ذیک صدر برکے عموں کے علمت مده کی۔

علاج ـ ما لآدام وسكون اور بوشمندى كه ما تقد جتيجات كمد استعال سع بى كچه

و که صدربه

(AHAINA PECTORIS)

ابن نام سے عموماً عظ القص کے بنیج کے اس شدیدو۔ وکو یا دکیا جانا ہے جوقلب
یا اور الی بی بیدا ہوتا ہے، نہا بت دفعتہ نتر وع ہواکر اہے، اور کہمی کہمی مبلک تا بت ہوا ہے۔ اس شدید وروس میں اور قلب بی بیدا ہوئے والے اُن خیف تر درووں میں جنیس بعض اوقات و بری صنیرہ ("angina minor") یا اس سے بھی بہر محف " وروقلب" کے نام سے خطاب کرتے ہیں نا لباکوئی نبیادی فرق نہیں ہے۔

اسباب ۔ یہ طفلی بی موسکتا ہے ایکن میں سال کی عرصے پہلے عمواً انہیں ہوتا عمرے ہرسال کے ساتھ اس کا وقوع بڑستا جا آ ہے اور پہائی اور پھر برسال کے ساتھ اس کا وقوع ہے۔ یہ مودتوں کے نسبت مردوں بیں ایک اور جاری مزیا ہے ۔ یہ مودتوں کے نسبت مردوں بیں ایک اور جاری مزیل کے تناسب بین زیادہ کٹیر الوقوع ہے۔ اس پر توارث بی اثر دکھتا ہے۔ یہ اور ملی مزیل عام اور مطرانی ضیق میں سنا ذہ ہے۔ ابھی اوقات تمباکو بی اس کا سبب بوتا ہے۔ اسکی عفونت بالحقوص جومارہ بی یا وائتوں کے راموں پر بو ایک وور مراحال ہے۔ اسکی مخونت بالحقوص جومارہ بی یا وائتوں کے راموں پر بو ایک وور مراحال ہے۔ فوری میں ابراب یہ بین ہے۔ والی بین مردوش یا لحقوص بہاڑیوں پر جرحنایا ہوائی لین تناس بین خواج یہ نسبت بیں جینا اور زائ ہو ایک مختوب بین خواج یہ زیادہ اکثر یہ دو نول عاملات مجموعی طور پر کار فرما ہوتے ہیں۔ (۲) مذباتی بیجان خواج یہ زیادہ اکٹر یہ دو نول عاملات مجموعی طور پر کار فرما ہو اور داخی بار۔ اور رام) مزدی سے تماس میں مردی سے کہ دات کے وقت کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کی مرد کرے میں لباس آثار ہے ہے کہ دات کے وقت کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کو استریل کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کی مرد کرے میں لباس آثار ہے ہے کہ درات کے وقت کی مرد کرے میں لباس آثار ہے سے انتوان کو اس کا محد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بی دور ان خواب ۔ بعض اوقات اس کا حمد دور ان خواب ۔ بعض اور ان خ

ا مراضیات ۔ جب س کے علیمی موت واقع بوگئی و توقلب عمواً مرتیٰ اور اس کے کہفے خون سے پُر بائے گئے ہیں ۔ اصابتوں کی غالب تعدادیں قلب کا اُاور کیٰ

كوفى من بايكياب بوكربيتر اقعام ذيل كانتها وطائد تطلب كا التهاب مفله قلب كا التهاب مفله قلب كا في من خيمي ياليني الخطاط - التشكي التهاب وطائد وطائد وطائد والماتيم والمولكا تعيم والمي التماط - الوطي معرامولكا التي والمن التكون - الكيلي شرائين سريا في صلابت (arterio-sclerosis) التي مواث يا الكون التهاب يا ملقبت سه - الكيلي سداويت الكسي جاوئ يا الن كا انظماس ورول شرياني التهاب يا ملقبت سه - الكيلي سداويت واقع كركتي سه واقع موسة والى موت كي معن مثالول من عضلة قلب اور الكيل شرائين بالكل تدريمت يائه كي بين -

میکنزی (Mackenzie) کی رائے ہے کہ ذبحہ کا انحصار عضائہ قلب برموما (29) - استَمْنَ مِن يه نوت كزاميا سِنْ كەمطرا ئى خىتى كامعمولى درۇجو بأمي أورىغى پیدا موتاہے سینہ کے بائیں مانب واقع ہوتاہے ایک ایسے بندیں جربیٹنی سے لیکہ عفروف حنری سے نیچے تک بھیلائے بہس رقبہ کی جلد کے حق اعصاب نخاع کے جھے اور ساتویں ظہری علقان کے جاتبے ،یں ۔اس کے برعکس وہ ور د جوبطین اور اور طی یں بہیدا ہوٹائے اسینہ میں نسبتہ او برخونسس ہوتا ہے ، ایک ایسے رقبہ پرجو لنسسبتہ لبند ترظري ملقات سے تننا ظرمو اے کیو کم جنین قلبی نالی بی بطینی صدادینی مصفے سے نبیتہ مقدم واقع ہو تاہیے اور بعد میں آگے کو خمبید ہ ہوکر نیچے آجا تاہے (30) ۔ یہ نظر بركه ذبي دردبطين سے بيدا ہو اس اب عام طور پرتعليم كيا ما اے۔ تندرست عضار قلب سے بیض اوقات در وکا پیلا موجانا الس سے زایا و مشکل نہیں ہے کہ جتنا برا مینیق (pyloric stenosis) کی صورت بن تندرست مودی عفیلہ سے اکم وروکا پیدا ہوجا کا۔ در وظب آکیجن کی صعم موجودگی میں عضائے قلب کے سخت کام کرسے کی وجہ سے بیدا برا ب اور یہ انا قرین عقل موم بوتا ہے کہ ہشس کے عنبی دلیوں کو اتن كافى تندرست بوناچلېن كوه ور د كوپداكرسكين - انميس مخت كام كريخ كه قابل بونا مِامِعُ ـ تندرمت كرنا تربيت إفت اشخاص كوج تحت القص در وفك إلى كاسخت کمیل می محرسس مواب ، وه بھی موشل مبدا کا موتاہے ۔ لبغی قلب (fibroid heart) كى مائقة ذبحاس وجس واقع بوسكناب كعضلى ركيت مندرست موسى كه وجود تعدا دیں بہت گھٹ ماتے ہیں اور اُن کی جگر لینی اِ فت لے لیتی ہے بعض اوا

ذبحه واتم ہوتا ہے لیکن زور لگانے برسانس بالکل نہیں بھیولتی اسس کی وجہ یہ ہے کے حفل قلب ا وجود بحرامس يرمول من الدكام يركيا بيء اب مي دوران خون كوقا بر كمتاب، مكن بي كرجب دورا إن فون كافضل أبوجائ تو ذُبهم فائب بوجائ اورجب علاج ہے دورا بن خون میرقائم ہو حائے تو ذبحہ میر پیدا ہوجائے ۔ نا ہم عام ترین مالت بلات یہ مرتی ہے کہ زور لگانے کے بعد ورو اور سانس کا میولناد وزول بیک وقت بیدا ہوتے ہیں۔ کسس تجر ہاتی در د کی تمثیل کی بنا پر حوکہ دوران خون بند موتے تھے بعد عفلی وزمش کرمے برسی مارحدیں بدا ہوما آئے (ملاحظہ ہومتو تفسے عرمیان =intermittant claudication) بررائے میش کی گئی ہے کہ و بحسبہ مشر یا نی تشنم سے بیدا ہوتاہے جوکہ بافت میں ایک میں مادہ (P-substance) آزاد كرويتا هه ـ يد ب اوه اليامتمردر دج ضر إن قلب كه ما تعر ننير نهي موتا بيدا رّا ہے بسشاید ب مادہ کیست سالمی وزن والے فرمما طور پر آکنیمن یا فسط حاصلات سخول (metabolites) موتة مي جوكه ولوي ديا و بيد اكركي على كرقي مي اوراس وتنت جب كراكسيجني رسدوركرتي ہے كمل طور يراكيجن يا منت موكر فائب

ن اُسُرِّائِٹ (amyl nitrite) ہوتند بد ترمین تیمیکے دعمنے انعمام کی وجہسے ہوئے وائے) در دکے موالے باتی سب طرح کے در دکولچند ہی سیکنڈز میں ت كبر. دے ديتاہے' اكليلي شريا ون كا اتساع كركے مل كرتاہے' اور بعض معنوں میں برقی قلبی ترکسیم کو تبدیل کرد تیاہے' اور ن۔موج کو انتصابی کرد تیاہے (28) ۔وہ شرع نبض كو بھى بڑھا آ ہے' اور گو وہ محیطی عروق كا اتساع اورسا تھ، ی جرو كى نمايا تمتار ش(flushing) پيدا كرو تيائے اہم تشكين كاسب يہ نبس بوسكي كو كد اكتشار ا بِها ہنونا ہے کوخون کا دیا و کم پوسے سے پہلے ہی تسکین محرسس ہو سے لگتی ہے۔ اَوَالِ ِ النَّرِ انْتُ سِيرِ ايک ايسے مريض بِي تُحَيِّ تَكِينِ مُموس مُوكِي جِس كومطرا في منيق اور بازرو کے ماتھ مجٹنی کے پنچے در وبھی تھا۔

علامات مریض بربالکن اگیانی طور رسین کے سامنے ماو وروکا حلم موجا ا ہے اور بدور دعظم لقص کے بالائی یاز برئین حصتے کے بنیج ' یا بوں کہنا چاہئے کہ اس

ائیں جانب واقع ہوتا ہے کیکن خودقلب کے مقام پر در دنہیں موتا ۔ در داس مقام واور بيجيع بالآر بارعظم الكتف مك اوبيركو إين شامنة تنكب اورنيج بالمين بازوا وربا تحذيك تشع كرنا بيئه بالكبنة كمرارا بها أتفاق بمي بوتاب كريخ انقل كم والين طرف بوكرد ائيس نناسخ از وُابر لا نخسك تشنع كرنا ہے .مكن ہے كہ دروا ايك بي وتعنت میں وائمیں اور بائمیں دو نوں جا نب واقع ہو ۔ بد کردن کے دو نوں جا نسب **جلدا لراس بک او برمایا جاسکتا ہے جس کی توجیہ اس واقعہ سے بونی ہے کہ تواغمی ب** ب سے منکلنے والے درا ور ائیبی لسا فی لمعومی عصب کا حتی جراب (counterpart) بہرا مع الدرس لئے وہ مد بعید لسب درو الا کو فوع بن جاتا ہے (80) یو در ملق میں محسوس بوسكتاب سبيه كا وردر مفارق " يا " ناخر" با " الله كى طرح علما مواموزشي يا معنيق "باك كياجاتوب - بإزور يا الكليون بن ورد كي سائة صغيمنا م ك يا من بنا مجي محسوس موزا مكن سهد ممتلف مريفنول بي در دكا آغاز بهبت ممتلف طورير **ہوتا ہے رمثلاً مکن ہے کہ وہ ابب یا دونوں باز دون سنسر ع ہوکرا وسرکوسینہ نگ** ميسل مائ - يامكن ب كروه بالاني مشكمين شروع بو زنر انفي ذبحه = epigastric angina abdominis) يا نسبته ينجي شاكم بن تروع بو دانتكي ذبحت = angina abdominis)-الييم بى ايك مريض يه صور وركك في بالمخت كرفي يرسسر وع بومامًا ورا تيدار ناف كمه خطّ من محدود موتا جهان ونها بت شديد بوتاً ليكن به بتدريج شدت مي فروكم مینه اور نشت پرسیاری دور نمیس ما تا تھا۔ علہ کے دوران میں مریض کا بشرہ تنولیننا باسبنیده بوتاہے۔ اور اگروہ جل رہاہے تو تعبر جاسنے برمجبور ہر جا کا ہے اور وہ خا موسش ر نتماہے ۔ اسے تصندے بسینے آنے لگتے ہیں۔ مکن ہے کہ اس کاریتی زیادہ بیومائے اوراً سے قریب الموت ہونے کا احماس ہو۔ نبض عمواً غیر تنغیر ہوتی ہے کیکن کئن ہے كەدەسىت بومائىي ياسى بەنغلىيال ئىجىيە كەستىزادا تىماشات دىكيے مأيى _ ایک بہلک حمل کے خانمہ کے قریب نبض تیز ہوجاتی ہے ۔خون کے دہاؤمیں کوئی تمیز تبدلي نيس موتى يعبن مربينول مي وه بقدر بهلي ميثريا تقريباً ٢٠ لي ميثرزياده ریوما ای ہے ۔ دِرومِندمکینڈیا منٹ جاری رہنے کے بعد بدمرعت جا کار نبتا ہے لیکن ن ہے کد چند کمنٹول کے دوران میں بھر اور اور ہوئے گئے کا چند مہمیوں یا برون کا

بھر خومس ہو۔ ذبحہ میلے اور واحد حلیس مملک ہوسکتا ہے ۔ حلوں کے درمیا ن من ا درمث میملول کے یا کا فرموتو ف موجائے کے بعد مکن ہے کہ مینہ کی دیوار ا دریا زوول ر مخلف مقالات بر دبلے سے الیمیت محرب ہو اور مفتوں کک اس طرح محرس موتی رہے۔ بیمقا، ت آئے ون بدلتے رہتے ہیں ۔ مانغہ ی کمن ہے کہ مربیل کی توم سینہ کے اندر تری ایجا کو کے احمامات کے طرف مبدول مؤجنعیں اس امرکی تنبیا ہاتیں بمهنا جاسبت كدارً امتياط ندى مائے كى توست بدور د منود ار مبومانے كا امكان كو مرکے ماتھ اکثر معدے کی میری کا احاس موجود موتا ہے کا انحصوص جب کہ مل کھانے کے بعد ورزمشس کی وجہ سے نثر وع بوگیا ہو اور مکن ہے کہ اگرو کار کیے ذرید ہوا کا میابی کے مائھ فارح کر دی جائے تو اسس میں تخفیف ہومائے۔ اِسی علا كى كر ت وقوع سے يدرائ بدارم كئى ب (31) كدرموات معد إمرى كا بيمون بى ا شكايت كا اولى سبب بي كين اس رائ كويند اتفاص بي تعليم كرتي بي - ايك رثياره اردہ اصابت میں (32) و کاریں لینے کی کوشش سے وروسی مرمرتبہ تحفیف ہوگئی کین لا شعاعول سے بیتہ ملاکہ معدے میں ہواواخل موگئی تھی ۔ اہم متعام و بحداور با لائی غذائی خطے کے درمیان ایک نہا یت قریمی معکوس ملق موراکرا ہے کیولنکہ بیٹ بھرکر کھانا کھانے سے تلہ میں تعجیل ہوجائے گئ نیز و بحی ملوں کیے دوران میں محسوس ہونے والے معفی درو مرى كے اندر مدا جوتے بين اور مكن سبے كروہ تكلفے سے ايك لمحد كے ليے زيا وہ موماي یا کم ہو جائیں۔ اِس کی توجیہ اِس دودی حرکت کی موج سے ہوتی ہے جو تنگنے کے بعد مری ایرسے بینچے کو گزرتی ہے (32) ۔ جات ہنٹر سے ال موسّع برخودا بی حالت بی مری^ک شابره كيار شايد ايس ورود س كے لئے" فر بحد كا ذب ('pseudo-angina'')كى اطلاح استمال كى جامكتى ہے۔ مبض اوقات ذكر مض رينا دي ساتھ يا يا جا كا ہے۔

فری منی ایروی کے میں اور اس اس اس میں کی ہے کہ میں ورزش یا سردی کے کشف کے نتیج میں بیند میکن ہے کہ میں ورزش یا سردی کے کشف کے نتیج میں بیند میکن اور خاص کے میں میں دروموں کے پر مجود ہوجائے ۔ مبعض او قات یہ طلے غلط طور پر و برکوکا ذب کے ام سے موسوم کئے میں نیکن اس اصطلاح کا ابتقال اس میں نیس کرنا جا ہے ور اس مالت کی زاکت منی ہوجا ہے کا امکان ہوتا ہے ۔

296

فیص ₋ در د کی نوعیت ' زور لگامے کی دجہ سے مس*س کا و قوع '* اَمامُل کا شارمیں سے اس میں تخفیف ہونا "قلبی یا نثریا نی صریه (مصراعی مرن یا صلابت الشرامین) کے علامات بسب امورعموماً فيصله كن جوتے بيں۔ اِسے اسے اُسی و دسے تميز كرنا جاسيے جو بيش قلبه بريحسوس بوناب اورمصاعي مرض باعضله قلب كحد النحطاط كي ويربي فيضل يذير بوف والي قلب كي ما ته بواكرا مع التروج العصيي (neuralgic) وروول سے بھی تمیز کرنا جاہئے، بالخصوص عصبا بی مزاج کی عور توں میں ۔ ہس مالت میں درواکٹ آرام وسكون كى مالت من بواكراب، أبحد كے نسبت زياده طويل عرصة كب جارى بسّائے اور مکن بیے کہ قلب کے بیر شور فعل اور اختلاج کے ساتھ سلکازم ہو۔ ڈبجہ کی نستُه خنیف شمی اکثر او قات غلطی سے سورمضم یا التہاب معدہ سمجھ لی جاتی ہیں۔ اوراس کی توجید ایک مدیک اِس و اقد سے موتی لہے کداس کا حملہ اکثر اُس وقت بوتا ہے جب کد مریق کھانا کھا نے کے بعد جلتا بھر تاہے۔ تمیا کونے وَجد کوانا کھا اے کہ (angina کے خصائص ذب کہ صدریہ سے کمینفدر مانل موتے ہیں ۔ نہا بت مضدید درو ابك اكليلي شريان كى علقبت سے بھى بيدا بوسكتا ہے، جو بعد بي بيان كى كئے ہے۔ لكن يوروملسل بوتام إن يسمريض مبهوراوراكة بحين بوتام نبش منعیف ہوجاتی ہے تب موج د ہونی ہے اورخون کے سکید علیول کی کثرت اور مبض اوقات تا، مورى فرك بوتاب بوت خبص كا فيصله كردتيا ہے۔ ، لاحن، معده کے حاد اتنفاخ سے بھی ایسے بی علامات بیدا ہو گئے میں اور اس میں مدے كه اندرايك انبويه د اخل كرف سيرتخفيف بوگئي ہے۔

اندار - مکن ہے کہ موت و بجی حملہ کے دوران بن یا اس کے داور من یا سوتے بیں یا د فت واقع موجائے۔ وہ نشل قلب سے یا دو سرے الب سے اقر مومکتی ہے۔ اندار کا انحصار اس بر ہوتا ہے کہ مریف پرعلاج کا انز کس قدرا جوا ہے ہے۔ یہ بوسکتا ہے کہ مریف کو ایک حملہ ہوا وراسس کے باوجود اگر معتول احتی ، کی جائے تو وہ برموں بعد تک زندہ رہ سکے ۔ ناموافق الارات یہ ہیں : ۔ ورزش کی قلیل مجیبیت نبض تعبادل اور برنی قلبی ترسیموں یں مین تبدیلیاں (ملاحظہ موسنی قلیل مجیبیت البواد ہے۔

علاج _ دوران على مريض كويالكل خاموشس ا ورمير كت ربنا جاسيمة -زبحه کے حلاکے لئے نبایت کارگر دوانا نیزائیٹ آٹ اکال (nitrite of amyl) جاہے ما ا و تعدے شینہ کے ایک محیوفے کید می شمول موقے من میں پرکان ورصاموا ہوا ے۔ اس کمیدکو انگلی اور انگر مے کے ورمیان یا جمعے سے دباکر توڑ دیا جا اے اورووا ہے۔ اس کے سو تھے ہے جہرہ سُرخ بوما آہے، جمجی عروق <u> عوا کے لگتے ہیں</u> اور در د اکثر فوراً موقوف ہومآ ما ہے ۔مکن ہے کہ دہ اکی ہی متا د کو مکرر و بنا بڑے ۔ نا نشر و کلیسہ بن (nitro-glycerine) (بنا یا ہے گرین) کا ایک قرم منہ میں رکھنے اور میابے یرحب کس کا جذب واقع ہوتا ہے تو اس سے بھی اچھااٹر ہو اے۔ نائٹر و گلیے بین کی قلیل مقادوں کے استعالی کے معدیمی ابتدار سیک کے ماتھ در درسر (throbbing headache) ہوتا ہے الین ایجد عرصہ کے بعد اس کی برداشت بدا ہو ماتی ہے اور نسبتہ بری معنا موس کا تحل ہوسکتا ہے یو دی اُرائٹ sodium) (erythrol (المراكث بمورت قرم) اور إير تقرال ميرتا مراكث (erythrol) (tetranitrite) اگرین ایک ورام الکمل مطلق کے اندر مناسب طور پرمرق کرکے) بحي عمره موس العروق (vaso-dilators) مِن - اگرية تدبيرس اكا مياب مول توافيا كالخمط المجلدي إشراب كام من لا يا ماسكة بيء اورزيادتي مبوط موته براندي يا تقيم كى فرورت يرك كى مر فيا برقت فالم ريمنيد بوتا ہے جب كه جرك و ميان يا د ماغي تولیش کے اصف ملوں میں مجیل موجائے ۔جب رُمعدے کی وجدسے یاد بحیت کے بمراه على بوجائي توسال دو لامائل (sal volatile) بان كي مساوي مقدار كيرما تق مرتق کیا موامفیر موسکتا ہے ۔ السیمی فید کے ذریعہ کرر ملے روکے جا میکے ہیں۔ جب نسی مریعنی می ذبحہ ایک مرتبہ ظاہر ہومائے قومہ ورتی ہے کہ مریف چند بفتول مک بسترین کی آرام لے اور تنویش و بیجان سے محة زر ہے۔عندا ایک وقت میں تعودی مقداریں وی مائے ۔جب ریش بر ملنے بعرائے قواس کو باست كراني طرز دري كوس طرح بدل دے كدان اسباب عالم روا فرمسلى النا وفيرو كمس محرزر بي من سامل بوكي تنا- ابنى: ندكي كومنظم بنا عزي أس ما اورسینے کے بچکا وکے اُن منیبی احاتات مدد طے گی جواکش کے بھر

صدسے زیا دہ کام مشروع کرنے برظا ہر ہوجائیں گئے۔ملوں کی ردک تھام اولا توا دو بہت كرنى جابية لبكن كجرع بعد كم مبدعا دباً تاكثرانس كا استعال حفظ ما تقدم كي غوض عه مرته بهنرين كيونك الرّوه ريض كي تنبيبي أمارات كود وركردين تو أس يحرابي قلب ست زياد وكام ليد كى جرائت بوجانى ب أوركس سے دوران فون كافضل بيداً بوجا في كا امكان بيد الأل الرائث إلا أشرا كليرين كروّس فروت كروقت كام آف كد لئے اکسس رکھنے میا ہٹیں ۔ تمباکو نوشی کی زیادتی کومو تو ٹ کردیدا بیا ہے ۔ بعض مربیش تما کو کے لئے اس قدرحاس ہوتے ہیں کہ ون ہیں ایک اوو منگر مٹ بھی اِن کے علول کو **جاری رکھ سکتے ہیں ۔ شدیدا صانبول میں جہاں قلب کی محفوظ قوت کم ہومکن ہے ایسا** علاج ملوں کوروکنے میں اکا میاب ہے اور جب تہمی مریس ذراہی جلنے بیسرے کا تو یہ مبتور واقع بوجاً میں گے۔ ایسی اصابتول میں نائٹروگلیر من مفید ہوگی . اس کی مغناد !! قطره روزانه تمين ما جار إر روسنتي هيء حب بتدريج بأم يا باسك برها بكني مي . عمل اصاتبوں میں آ یوڈ اُنڈ آف یوٹا پیٹم حتا سرکرین) بھی نفع بخش ہوتا ہے۔ آنٹک ا اللاج مي كرا الله ميك مياك يل بان كياكيا ب و إبطر سنكر ي diabetes (msuln) میں کاربر إئترریٹ کی کشت رکھنے والی غذا اور انٹوین (msuln) ر بنی چاہئے۔ بیف اوقات برقی قوس (electric arc) میں جہانی تسلیم کا کمنٹ کرنے ے مطے رک گئے ہیں۔ اُمونیکم بروہ کٹر ۱۳۰۶ گرین کی نور اکو ل میں 'بیٹیت ایک نیک مُكِن كے مِندے ۔ ہا ہے معلوا نے كى موجو دوحالت ہيں متراعی علاج مينی مصب فاض و مُفَام کروینے کی سفارسش نہیں کی ماسکنی ۔

سارى تنرياني التهاب

(INFECTIVE ARTERITIS)

واد تریا فی البتهاب و استان تریان که بابرس آسکی به (ابتلافی دین کی البرس آسکی به (ابتلافی دین کی در شریا فی البتهاب و (initial peri-arteritis) و البتالی دی و استانی دی و شریا فی البتها به البتها فی دی و استانی در استانی البتها و البته در البتها فی در است تیبی و البتها به البته به البتها به و البته به البته به البتها به و البتها به البتها به و البتها به البتها به و البتها به و

حاد گرهکی کمٹیوشریانی النہا ب(polyarteritis acuta nodosa)-

اکثر اد قات بیٹ کرنون کو با ہر بکلنے ویتی ہے ۔

مرفى تثريط في التماب (tuberculous arteritis) مزمن سارى تتراني المتهاب كے واوعام ترین سبب عصبیہ ورنبہ اور و بیج سلكر شاحب ہیں - ایک و ربی مركز سنگے قربِ وجِ ارسِ ایک شریان کی دیوار مجمّبنی اکریکی علی کے راست میسیلا و کی وجه سے اُوف بوسكتى بى ما دف، يوارُ ايك تدر في غريك معرولي خصائص ظامر كرتى بي اوركلن وكم بِطانی یا درو ا طمی طبیات کے مکا ترسے خواہ سس کے ساتھ ایک علقہ ہو یا ندموہ مشراین کا

درونه معمول بوطائے۔ ب ب (syphilitic arteritis) آمشکی شریا فی البتا است کی شریا فی البتا است کی شریا فی البتا ا کے صورت بیں دو تمیر سنستناخت کی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو اور طیٰ بیں یا یا جاتا ہے اور دومِرا وہ جو هیوٹی شریا نوک یں ہوا کرا ہے الیکن دونوں کا بنیادی تعامل ماثل ہوتا ہے اول لذکر م التهابي عل موييج سلكيد كى توكك سے شروع بوتا ہے، بيرونى لمبقه مي عواق العروق ئے تعلق میں افازید بر ہو اے اوران کا درونہ اینے استری دروں طبی طبیول کے بکاٹر ہے تنگ یامطموسس ہوجا ہے۔ گول ملیوں کی گردعوہ تی درریش عروق العروق کے ممر کے ساتھ سائنہ واقع ہوتی ہے اور اسی واسطے اُور طیٰ کے درمیانی طبقہ میں سیبل جاتی ہوت عضلى خليول اور ليك واربافت كے عيوث جيوائے رقبول مي تنخرواتع بوجا كا ہے، اور یدر تھے کمف اسا اور ملاز مائی طبیوں کے ماسکوں کے ساتھ مل کر خرد مینی تعمیم نیا وہتے ہیں۔ اليه رقبه كابطانه بطاني ظيول كے نكائرے دبنر موجاً ہے اور ان نوخير عروق شعریه کی کلیاں مجوث بنگنے کی وج سے بوک اس دبزر قب کے اندر بالید کی مکال كرتے ہيں عروتی بوجا اسے - بعدیں كھ أو تنخرى المبدكے مذب كى وج سے اور كھا ال نوخیزلینی با فت کے انتباض کی وجہ سے جوغائب تُکد وعصلی اور نیکد ار بافت کے بہائے بیدا ہوجاتی ہے 'اور طبی کی اندرونی سطح پر إنداب و بچھاجا تا ہے۔ کس طریقہ سے نا لیکدار المیتی افت در میانی طبقه کی اس عضلی اور تعیدار بافت کی عبگر لے لیتی ہے کیس پرسشرایی د بوار کی کارکر دگی کا انحصار ہو تا ہے اور آ خرا لذکر جہاں کہیں متلیف ہو ماتی ہے ا بتدریج تبیل کرتن جاتی ہے۔ اورساکی بیدائش کا یہی طریقہ ہے۔ ج کہ اس فررکی ا بميت كالتحسار ومياني طبقه كوييوني بيوني مفرت كي مقدار برموا بي لبذا أورطالم

آ تشکی من کواکٹر التہابِ سیاں اور ملی (mesaortitis) کہتے ہیں اگر میہ رہ اوّلاً عوق العروق کا ایک مزر ہوتا ہے۔

مَاوُف آورطیٰ وبازت کی حکمتیال نیز ایک نهایت تنین انداب ظاهر کرسدگا اور آخرالذ کرخالی آنکه سے ایک آتشکی مزرکو اُن صررات سے متفرق کرنے میں کام آ آ جے جواتھے روماکی وجہ سے جونے ہیں اور یقیناً انتھے روماکا ساتھ موجود ہونا بھی مکنا سے

سنبہ محوف شرائین کی مالت میں برونی طبقہ بھی مجوف گول فلیوں کی در برا ظاہر کر ناہے۔ در میانی طبقہ بہت کی اوف ہوتا ہے کی نکین بطانہ نہا یت مین تغیات فیات ظاہر کر ناہے۔ بلانہ کی اتصالی افت کے فلیوں کے تکاثر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بہت د بیز ہوجا ہے۔ لینی وَرقے اور نئی لیکوار بافست پدا ہوکرد ونہ بہت نگ بکہ طریس ہوجا ہے۔ مکن ہے کہ یہ عل افطاس علقیت کے وقع سے تیز تر ہوجائے۔ آتکی مرف کی اس قرم کا ایک عام می وقع والی عودق بی بالخصوص اُن کی قشری شاخیں۔ مرف کی اس قرم کا ایک عام می وقع والی عودق بی بالخصوص اُن کی قشری شاخیں۔ مرف کی اس میں واقع ہوئے والے تنو کے قطق میں آتھ کی التھابِ بطائہ سندیان میں رابت بھیلاؤ کے ذریعہ بے برمدکر قرب وجوار کی ایک جمونی شریان کو اوف ف کا رابت بھیلاؤ کے ذریعہ بے برمدکر قرب وجوار کی ایک جمونی شریان کو اوف ف

اس طح برتدرن اور آتضی التهابات بطائه شریان دونون درون کا انطاسی پیدا کردین کارمی ان رکھتے ہیں البنداوہ ا نظماسی التهاب بطاحت شریان در کھتے ہیں البنداوہ ا نظماسی التهاب بطاحت شریان در کھتے ہیں البنداوہ التهاب بطاخه شریان کئے ہوئے طریق (endarteritis obliterans) کے علاقہ اور دو مرے طریقوں سے مجی واقع جو مکت ہے ۔ مثلاً اسس اصطلاح کا اطلاق اور دو مرے طریقوں سے مجی واقع جو مکت ہے ۔ مثلاً اسس اصطلاح کا اطلاق ان شرائین کے فعلیاتی انطاس پر کیا جا مکتاب کہ جن کی ضورت ندری ہو۔ یا نظائل متری سندائین کے فعلیاتی انطاس پر کیا جا مکتاب کہ جن کی ضورت ندری ہو۔ یا نظائل متری سندائین (ductus arteriosus) وضع می کے بعد بہت سے رحی ہوت کو سن یاس کے زمانہ میں جوت وغیرہ میا تھی ہوت کے وغیرہ بات

عفنلی خکیتے زبول ہوجاتے ہیں۔

المتاب المازش الم الله المتاب المنافرة الماسك المنافرة الماسك المتاب المائد الماسك المتاب المائد المائد المائد المائد المائد المائد المنافرة المسلم المنافرة المسلم المنافرة المسلم المنافرة ال

سیمی این المهاب گرهکی - ایک شاؤها تست ہے جس ورمیانی طبقه کا انتخاط کا اور ارکی تروشریانی طبقه کا انتخاط کا اور ارکی تروشریانی التباب کے ساتھ مثالین موتاہے - وریدین مجی شاخر ہوجاتی ہیں اوریہ حالت جب میں وسع طور پر پھلی بنوتی ہے ۔

مرمن تسرياني انخطاطا

(CHRONIC ARTERIAL DEGENERATIONS)

انخطاط بری (semile degeneration) روسطانی الخطاط : استطاط : الخطاط الم الخطاط الم الخطاط الم المخطاط كا المناسبة المخطاط كا المناسبة المخطاط كا المهالي ورجم كوصلا بست معونات بوك (Monokeberg's sclerosis)

کتے ہیں۔ یہ زیادہ تربی کو اوف کرتی ہے اور کھن ہے ضیخ کی اور فیدی عون کو اور کمی کمی کئی اور کی کی کا اور کمی کمی کی اور کی کے حصہ زیریں کو اوف کرتی ہے اور کمن ہے ضیخ فی گنگرین کی موجب مربیع می ہوتا ہے کہ اتبدائی تغییر در میانی طبقہ کی اقتصالی با فت کے طبیوں اور عضالہ کا زجا ہی اتحا کی ہے کہ سس استحالا طرکے بعد موسلی با فت کے استحالا طرح اور میں بی ہے کہ وہیں کمل ہوتا ہے جنا کچہ کچھ عوصہ گزرہے کے بعد در میانی طبقہ کی بگر کسی اقتیر می اور می کہ وہیں ہے تو اور جا بی سے اور می میں ہوجا ہے ۔ بطانہ میں اقتیر وا موجود موسل کیا ہے کہ اور میں اقتیر وا موجود موسل کیا ہے کہ اور میں اقتیر وا موجود موسل کیا ہے کہ کہ در ہے گئے ہیں۔ اور می اور می تو اور میں اور میں اقتیر وا موجود موسل کیا ہے کہ کہ ہے اور می در کو کہ کی البتا ہی تعالی نہیں واقع ہوتا ہے۔ بطانہ میں اقتیر وا موجود موسل کیا ہے کہ کہ کہ ہوتا ہے کہ کہ در کو کہ کی البتا ہی تعالی نہیں واقع ہوتا ہے۔

مه در است المسلم المسل

اً تَوْرُولُ (التعلير وماً في صلاب = athero sclerosis) (كريبي صلابت = (nodular sclerosis =) من عالت كواك ز مازس تشوري التهاب بطارة شرايت

(nodular scierosis) کیتے نے کہ ابتدائی تعباولاً اور معن وقات

ری اصلاً انتخاطی ہوتا ہے لہذا اب النہاب بطائہ شریان کی اصطلاح اس قدر عام طور پر نهاں منی جاتی ۔ یہ انتخطاط اپنی تو زیع میں در اس مکتی دار ہوتا ہے اگر حیاستہ جیوٹی

کہیں صنی جاتی ۔ یہ انحفاظ انبی کوریع میں در اس طبیتی دار ہو اسے اگر جی صبہ چا تنریا نوں میں وہ دیا دہ منتشر ہو سکتاہے ۔

اس کے طریفہ پر ایش کے متعلق منوز بہت ہے۔ کین خالبا ابتلائی انتیز ایک مقامی انحف کے میان میں کو لمید اللہ انتیز ایک مقامی انحف کے میان میں کو لمید اللہ میں کو لمید اللہ مقامی اور لیا کڈی اور دیا گئے میں دورار ہو جانے ہیں۔ اس کے ساتھ کا او تنخری طبہ کی بدا کردہ خرات کی ایک خرات کی ایک خرات واقع بھوجاتی ہو جی کا بتیجہ پیر ہوتا ہے کہ بہ مرکز بطانہ کی ایک دبازت واقع بھوجاتی طبقہ سے مناسس ہوجا ہے۔ مکن ہے کہ بطانی سکاٹرا ورصلا بت موقو ن ہوجائے اور انحفا طی مل درونہ کے طرف بھیل جا ہے۔ اس حالت میں بطانہ مرکز فرٹ کر ایک فرحین جا انتخا کی مل درونہ کے طرف بھیل جا گئے۔ اس حالت میں بطانہ اس خوالی خرص کا بیٹے ہیں۔ بہت بادور میانی طبقہ میں بھی اس جگہ جہاں وہ انحفاظ یا فتہ بطانہ کے قریب کا میانہ کے قریب کا میانہ کے خریب کا میانہ کے قریب کا میانہ کے قریب

مونا ہے شمی انحطاط واقع موجان ہے لیکن بیال آل امر برزور و بنا ضروری ہے کہ داکیہ محض اتفاقی اور خالصا ما نوی واقعہ موتا ہے۔ جیساکہ بیان کیا گیا ہے بطانہ کھانچہ و یافتہ رقبہ میں کولبیٹرال شح اور لیا ٹڈز کو غیرہ موجو د ہوتئے ہیں۔ مکن ہے کہ ان میں کیومتنے برواصابی بن جائم کی جنگلس واقع ہوجانا ہے کہ لیڈاکہی کمبئی بالحقوں مرکز ورفل میں ٹری بری طرح کے جنگلس واقع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اور طلی کے اقدار م

ي مبن مقلف الا تواع ضررات نظراً سكتے ہيں۔ من مبن مقلف الا تواع ضررات نظراً سكتے ہيں۔ مینانچه اُن زر د حکیتوں کے بمراہ خربطانہ میں نتی کے جاؤ کے مقاہات رنیا ا ہوتی ہیں' غیر شفاّ ف سپیدی اُ تُل کُدّ یا ل بھی موجُ و ہونکتی ہیں' جو بطانہ کی لینی وہازت کو نتی ہوتی اور اپنے بیچے کے تنجمی کلیہ کو جیساتی ہیں ایمنیں کے ساتھ ماتھ کئن ہے کہ عَ طِورْبِرِانحطاط في فنة بطا زُكِمَا ويرِي أَا رَكَلات (اَمْفيرو اللَّي قروح) ويجين فاليه ا می بنجے ہے۔ وصحنے دنچیں ہواکٹراو قائٹ سٹنگتہ وریخہۃ سُرخ خلیوں کے ہا تمیانٹ سے کمون اور بعن ت ایک جداری عُلْقَد سے وہ سے موٹے ہوئے ہیں ۔ کمبی مجی جب کہ درمیا بی طبقہ بھی انطاطی الے سے او ف ہو میکا ہو کمز ورستدہ دایوارسی مدیک تن ماتیہ کہی میں يرتبي موتاب كيراكي للمحت معفد عرصاً ولوط حا أبء حس كانتجربيبونا م زون شريان كم طبقات میں ماکھ تاہیے (تقطیع کور ا = dissecting aneurism) لیکن ما و متنبکہ اً تشکی مبار اور لمی التهاب (syphilitic mesaortius) بھی موج و نہ ہو، مجھڑی وار ندبات ہنیں ہوتے ۔ مزرات کے اُن خصائص کا اختلاف جوکہ برمینہ ہی تھے۔ نظر آتے ہیں کیائٹری انحفاظ اوربطانی صلابت کے اضافی تناسبات برمنحمر متا ہو۔ اُ ورطلی کے اندرانسی مکیتی وار کریئی وباز تمین مکن ہے کہ نسبتہ کم نقصال کریں گیسکن سنبنَّهُ جِيوتُي شريا مذك كي مالت مِن معالمه بالكل دوسرا موما الما. يرحيو في مشرانين مي بهبت کیچه مانل طَرَز کا صرر نظا ہر کرتی ہیں۔ وہ در مہل مرکزی موتا ہے لیکن مکن ہے کہ في وه منتشر بهي بهو- بطانه كي ياكر بهي والتمي ورونه كه اندر أعمراتي اود المسلالي تشوّه بداكردين، ين اورطفتيت وافع بوجا ين كي د مرسد درون باماني مطرس موجات ے اور اس طرح انعمام برا برما اب - جہال درمیان طبغة انوى طوريرا وف بوتا ب، با قاعده اتباع واتع بوجانا ب اور كر ب كرع ق بعب ما ي بالخعوس

300

ا بیے مقاات میں جیسے کہ و ماغ ' جہاں عرق کو سہت متعور اسہارا مال ہوتا ہے۔ ا وُف شدہ نشر یا نی دقبہ کی وسعت مختلف اصابتوں بی مختلف ہوتی ہے یعض او قات عرف اور طی او ف ہوتا ہے 'اور مبض او قات صرف محیو ٹی نثر یا میں یا اسبی شریا نوں کا ایک خاص گروہ' مثلاً اکلیلی' د ماغی یا کلوی ۔

شریانی انتظاطی بیقت زیادہ بوڑمی عمر کے زیالوں بیہ بیتن دکمی ماتی ہوئ اوراکٹر موت کاسب ہوتی ہے کیکن تمن ہے کہ بینسنڈ ابتدائی عمریں واقع ہویا شریع ہو۔ یہاں ان سمی جا وؤں کا تذکرہ کردینا ضروری ہے 'جواکٹ غلافوں کی سال بیج نے ہیں اور ماد عمیات کے بیتجہ کے طور پر بطانہ کے نیچے کی اتصالی بافت کے اندروافع مو میں ۔" عاجل انتھرو فار"early atheroma") کے نام سے اُن کو فالباً غلط طور پر مورم

منتشر بیش مگوینی صلابت (diffuse hyperplastic sclerosis)

(شریانی شعری لیفیت: arterio-capillary fibrosis) - به تغیر بوشریائی خون
کے داوکی زیادتی کے ساتھ متلازم ہوتا ہے، عمواً اس اشخاص بی پایا با اسے جو
زندگی کے سبرے عاشورہ سے لیکر اپانچویں عاشورہ تک میں ہوتے ہیں۔ او فوعوق بالخصوص تھوئی شریانی طریقہ کا احدا بتدائی تغیرا اِن تھوٹی شرایو کے درمیانی طبقہ کا عضا یا ور تحکد ارعبا صر
کے درمیانی طبقہ کا مشی انقباض معلوم ہوتا ہے۔ درمیانی طبقہ کا عضا یا ور تحکد ارعبا صر
دو نول بیش بروردہ بوجاتے دیں کی ساتھ ساتھ بطانہ میں طوی عنا مرکان کی مگر لیمی اور خوام کے ورمیانی طبقہ بی میک اردشیول کے ورمیانی طبقہ بی میک اور نیمی سرحانی کی مبدید کی مبدید کرون میں میک اور نیمی سرحانی کی مبدید کرون ہو ہو ایک عرف کا درون مبت شک جوجا نا ہے اور مکن ہے کہ کلی طور مجلوس موسائے میں ایک درون مبری سرحانی میں جے اور می موجا کے درون میں واقع ہو جا کہ درون میں واقع ہو تا ہے اور مکن ہے کہ میں موجا کے درون میں واقع ہو تا ہے اور مکن ہے کہ میں معلور میں واقع ہو تا ہے اور مکن ہو جا کہ درون میں واقع ہو تو کی ہو اور کی ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تی ہو اور کی ہو کہ درون میں واقع ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تا ہو کہ درون ہو کہ درون میں واقع ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تی ہو کہ درون ہو کہ درون میں واقع ہو تی ہو کہ درون میں واقع ہو تی ہو تا ہو کہ درون میں واقع ہو تو کہ دورون میں واقع ہو تو کہ درون میں واقع ہو تی ہو کہ درون میں واقع ہو تی ہو کہ درون میں واقع ہو تی ہو کہ درون میں واقع ہو تا کہ درون میں واقع ہوتی ہوتا کا درون میں واقع ہوتی ہوتا کا درون میں واقع ہوتی ہوتا کا درون میں واقع ہوتی ہوتا کہ دورون میں واقع ہوتی کی دورون میں واقع ہوتی ہوتا کی دورون میں واقع ہوتی ہوتا کا درون میں واقع ہوتی کی دورون میں واقع ہوتی ہوتا کی درون میں واقع ہوتا کی دورون میں واقع ہوتی ہوتا کی درون میں واقع ہوتا کی دورون میں واقع ہوتا کی دورون میں واقع ہوتا کی دورون میں دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون

تشريا في صلابت

(arteriosclerosis)

شریانی صلابت کے معنے شرائین کی سختی ہے۔ یہ لفظ اکثر محدود مغروم میں منتشر بیش کو نی صلابت کے مراد ف کے طور پرانتھال کیا جاتا ہے کی سہولست

ہے کہ ہم کواپسی اصطلاح حال ہو کہ اسمی بیا ن کئے ہوئے تمام مختلف خرین انخطا کات پربستر مریف کے پاس اس کا انتحال کیا جاسکے کیو کوورا ب زاہر کی مران کی ٹھیک تغریق کرنا اُکٹر 'احکن ہوگا' اور حکن ہے بہتب ایک ہی مرضی علی کی سیس ہوں۔ اس كتاب ميں يه اصطلاح اس وسيع مفهوم كوا واكر نے كے لئے انتمال كى گئى ہے ۔ مفیت رمال عوامل کی وجہ سے نہ موں کہ مننا ان منگف زینوں کی وجہ سے ہوں ایس جن م*یں جر تومیموم* یا دگرعوال ماگزیں ہوتے ہیں ۔ شلاً نوعمروں میں الہمائی تغیراً كانتيحة وا فراندروني منكاثر (منتنز بين كو ښوملا بت) ہوتا ہے كيك بوزمول مانتي (cachectic) انتخاص من الياشد كد تعامل ما مكن بوتا بي اوراك كے فون كا و با م يست دستاب (انحطا ط سيخ في = senile degeneration) (32)-. البث من تبلا پاہے کہ اولی تمریٰ نی تغیرات مسے کہ انتصرو کا اور انحطاط پیری بیں خون کا و پا مُ بڑھا نے کا رجمان نہیں ہوتا ۔ ہس کے مکس منتشہ بیش کو بنی صلابت کے سے خون كا ببند دما و يا يا جا تا ہے۔ چيا سنچه اگر سخت شراً مين والي تمام اصابتيں شهاني صلابت (arteriosclerosis) کی اسطلاح کے تحت ایک ہی زم وس مجمم کود کائن تو بعض اصابتوں میں خون کا دبا وُطبعی مِوَگاُ اور بعض ہیں وَہ بڑمعا ہوا مَوَّگا ۔ تستُمر این ملابت اورِ بالخصوص التجروم ان لوگول كى نشر يا نول كا ايك عام انحطاط-من كابيشه ان كوسخت عفلي إركا مورد بنا ماسي لهذا مكن ب نشارخون كي متوقف گئے ہیں یہ ہیں ہے۔ بسار**توری الخصوص** پروٹینی اور تنجی غذا وُں کی بینانچہ رودھ کی زما دنی کوسیب قرار دما گیا ہے (57) اور گوشت خوروں کی سبت نبات خوروں کی لم فشارخون يا يا كياب (58) - نقرس الكهائ سيسه كاتسم فيريا اور درسري حسا و یے جراثیمی سموم کے بالخصوص سی محرفہ تا مفرقب (hypothyroidism) (طا خطه مومنتیشر بیلن کموینی ملا بت = diffuse hyperplastic (sclerosis) اور تنايرمعاني تتم - رشرياني صلابت بواسع أو يول مي ديابيل ك رمراه موجود مومکتی ہے کیو کان می بروٹین اورشم نہا یت کرت سے کھانی جا آئای۔

لیکن دوسری اصابتون بین مکن ہے کہ یہ ذیا بیطس تا ندی ہو کیونکہ عوق کی صلا سعہ کی وجہسے لبلیہ کی دموی رسد کا فضل واقع ہوجا تاہے۔

امراصر باین و بیرائے دی گئی ہے کہ نٹریانی رادوں کے عضلی ورلیکہ اس ہردوعناصراولی طور برکم ور ہوجائے ہیں ۔ اس لئے وہ تن جانے اور تس ہوجائے بی اور تکلس اور تشریحی تبدیلیال و بواروں کو قوی ترکز بے کا کام دیتی ہی اور فال طور بران نظوں برو آفع ہوتی ہیں کہ جہاں ہوئے نون کے جیر کھائے کے باء ہے فاص بارٹی ا بیو بعنی غموں اور ان جگہوں برکہ جہاں نثریا نیس شاخ کی صورت میں مجولتی ہی بیلس اند مال کے معنی رکھتا ہے اور ان مقامات برکم بھی انتقاق واقع نہیں ہوتا۔ نثریا فی دیوا میں دو رہی جگہ بیمل منتشر ہوتا ہے۔ خون کا دبا و ایک نا فوی امرے (59)۔

علامات - ابتدائی درجول میں شریا ن جن بذیر موتی ہے اور جب اسے
انگلیوں سے دبا کر سال خون خارج کر دیا جائے تو انگلیوں کے نیجے گھمائی جاسکتی ۔۔۔

نریان موٹی محسوس موتی ہے ۔ ایو درجول میں مکن ہے کہ خلس کی وجہ ہے
اس کی دیوار سخت محسوس ہو عرضی قطر زیا دہ ہوسکتا ہے اور مکن ہے کہ شریا ن کی
طوالت بڑھ جانے کی وجہ سے عرق بیج والہ ہوجائے ۔ نبطان اکثر کی بوجاتا ہے اور
کمی کمیں بالکل غائب موتاہے مکن ہے کہ علقیت واقع ہوبائے ۔ نیوار کی خیس کی رفنار شریا ن کی استواری کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے لہذا "کرم اد" و الے نیون نیون کی دیار کی تعیین نمون کی دیون طالت میں شریا نی صلابت کی مقدار ظاہر ہونی جائے ہے۔
سے ایک دی موتی حالت میں شریا نی صلابت کی مقدار ظاہر ہونی جائے۔

تشریا فی صلابت میں اکلیکی مشرائین نہا بیت عام طوَریراً تقیروہ کی ہوجاتے ہیں لہذاعضاۂ قلب کے تعذیہ میں خلل واقع ہوکر اس کا انحطاط واقع ہوجاتا۔ اسی وجہسے ابتدائی فضل لقلب کے علامات موجر د ہوسکتے ہیں 'میسے خستگی' رہے گا محیولنا' اور زور لگانے پر دَرو۔

متریا نی ملائب کبین احتاریں اپنی موجودگی کے باعث مقامی علامات پیدا کرنگتی ہے۔ دماغ میں وہ علقیت یا نزف پیدا کرکے اِن کے ممیز ومخصوص علامات پیدا کرنگتی ہے۔ شریل نی شنج ایک البی مالت پیدا کرونیا ہے جوالبیوس بولبیت کی رم ورقي مي بورياد مويت (uræmia) سے متاب ہونی ہے اور کا ذب يوريا دمتو (pseudo-uræmia) كے نام سے موروم ہے (الماضط بوصنی 303)-

سنى بزوعلاج - ضغطاتقدم المريضتل المات كااباب كا علاج كباطئ - ببادخورى ساحة ازلازم - اصلاح ال قت بجى جب كدمن قام ب دوران خون المحدد المريض برادام كرن كى بالبت كرونى طبينه كونك افتى وض ودران خون برسه باركودوركرد تى ب - عراً الودارد (الموجود موقومكن دي جات بي اورجياك اكثر او تاب، اكراقص درقيت كاكونى عندموج دموقومكن ب كه بيمنيد بول - فلامد درفية (thy rold extract) بعى آزالي ماب (مضريان ملابتى گرد كا علاج جمي ملاحظه هو) -

بلندفن ارشركيني

(high arterial pressure)

(hyperpiesia = الفغط = المنقاع الفغط

نسبت مردوں کوزیادہ متاوٹر کرتی ہے میکن ہے تریا فی صلا بت کے عنوان کے تحسفہ تائے ہوئے تبینی عوائل کسس کے ذمہ دار ہوں۔

امراضیات - شریا فی فضارطبی صدود کے اندرایک سے زاکد اطلات سے متاہ شریو اہے ۔ مثلاً فلب کے زاکدانی معمول فعل سے بڑھی ہوئی محیطی مزاحمت سے اورخون کی از دجت (69) یا عجم کی زیادتی سے دبا و بڑھ جا گئا اگر جرحم کی زیادتی فالبًا ہمشہ ایک علاق میں مب محیطی فراحمت کی زیادتی فالبًا ہمشہ ایک علاق میں مب محیطی فراحمت کی زیادتی کی زیادتی کے مشیخی انتباض کے باعث بدیا ہوجاتی سے ۔ لیکن مبد میں انبی کمل طور پر قائے سندہ شکل میں یہ شرینات کی دیواد در اس ایک التہا بی فوجواد در اس ایک التہا بی فوجوات کے درم کی وجہ سے ہواتی ہے جو انجی منتشر بلیش تکو بنی صلاحت ہوں ۔ مبنی اما بتوں میں خون کے شرخ فلیات اور ہمروگلو بین بہت زیادہ ہوجاتے ہیں (کشرے تعلیات دمویہ سے موالی کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے (جوالاظ رکش نے تعلیات دمویہ سے موالی کی برسی کو برسی ہوں اور میں گئا نوی انٹر ہو۔ (کشر ت خلیات دمویہ سے مون کی برسی ہوئی از وجت کا ثمانوی انٹر ہو۔

علامات - اس مرض کے ایتدائی درجوں میں کرانکہ بعض اصابتوں یا در انفاع اللہ مستر نہیں ہوتا بلکہ کہی کہی جواکر اے - ازاں بعد یہ مائٹ ستھلا فاجم ہوجاتی ہے مربین کو مستر نہیں ہوتا بلکہ کہی کہی جواکر اے - ازاں بعد یہ مائٹ ستھلا فاجم ہوجاتی ہے ۔ گردن کی شن مرکے وَروول بیخوابی طنین الاون اور دوران ہر کی شکا بت ہوسکتی ہے ۔ گردن کی شن میں قذال (occiput) کے قریب در دکا ہوتا نہا بت می طلامت ہے ۔ بلند مناوئ کے خصوصبات میں وزیل ہیں : ۔۔ (1) انتعال کردہ آلات پر کے اندراجا ہ (الماضل ہو کہ سخت اور خوب بُرشر یان کا اس اس کو میں ماتھ وزیدہ و ریک قائم رہنے والا انکی کو ایک سخت اور خوب بُرشر یان کا اس اس کو کہا ہوتا ہے: انبیا طرح دور، ن یہ شریان کی ہی ماتھ وزیدہ و ریک قائم رہنے والا انکی کے نیچ کھائی جاسکتی ہے کیلن جب آسے انتحا کہ کی ست ماتھ وزیدہ اللہ کی دور دوران انبیا طرح ہو دوران کی تابی ہو اس بر ہیلی آواز کی انتخا کی دورو داروز بندار اس کا جو ت دی دوری ہوائی جو کا دوران کی تابی دوروز دورد داروز بندار اس کا جو ت دی دورس کی دوروز کی تابی کی دوروز کی تابی کا دوران نوعیت ۔ اطالت اور خطاع اور اوران و بلی رقعہ بی دوسری ہواز کی تابی ہو کا میں یہ بی دوروز کی تابی کی دوروز کی تو کی دوروز کی تابی کی دوروز کی کار کی تابی کی دوروز کی تابی کی دوروز کی تو کی دوروز کی تو کی کار کار کار کی تابی کی دوروز کی کار کار کی تابی کی دوروز کی کار کی تابی کی دوروز کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کی دوروز کی کار کار کی کار کار کی


ده چیم بن کے دریوا متا اکر شریا نی تغیرات کی تغیرا کا ایک قیمتی در بید ہوتا ہے ا کیونکہ مضبکرتی شرائین کے منطرے یہ دریا فٹ کرنا مکن ہے کہ دماغی شرائین کی کیب مالیت ہے۔ ابتدائی درجے میں جیشم بینی تغیرات شرائین تک محدود ہوتے ہیں ۔ وریدوں کے ساتھ مقا بلہ کیا جائے تو عام طور پرسشر یا وٰں کا دروہ جساست بس کم برم جوکہ شریان کے وسط کے طول میں ایک جیکداد وصادی کی طرح د کھلائی دیاہی ۔ بیم جوکہ شریان کے وسط کے طول میں ایک جیکداد وصادی کی طرح د کھلائی دیاہی ۔

477

شریانی صلابت میں دلی_زروں کی دہازت کے ماعث بیا تفکا*سس ز*ماوہ ہو**وا آسے'** او*ا* تنبتًا مجو ٹی نفر اینیں تانے کے ماری طرح سیقل شدہ نظرہ تی ہی اورازاں ہا جران جوار دیرار کی عمیت برستی جانی ہے وہ جانان ی کے قاس کی طرح میدارد کھلائی د نبی بس . به جمکه دار د صاری اکتر به قاعده مروتی به اور ایک نقطه و ارمنظر ببیش رنی ہے۔ شراین بیجدار ہوتی ہیں لیکن چو کم طبی شریان سے صعوم میں نہایت خَنْكُ ٱلكَيْغِيتَ بُوتَيْ يَهِ لِهِذَا بِهِ فَأَصِهُ كُونِي تَنْجِيصِي الجميتُ نَبِيلِ رَكْصًا - أن كا درويه یے قاعدہ ہوتا ہے ۔ وہ اکثر صافرت ہیں بہت کھٹی مو ٹی موتی ہیں اور بعض اقتات لینی د م*هاگون ببین نظرا* تی مِس بعض ا وقات و ه طبعی *غرص کی مو*نی می*ر لیکن کہین ہی* ن برمبید حکیتی نما ماوُول کما غلاف جراها مؤتاہے' اور وہ ایک یانب (pipe) کی نلی کے گڑوں کی طرح نظراً تے ہیں ومکن ہے کہ یہ کچھ عرصہ کے بعد غائب ہو حیا میں۔ شریانی وربدی تقاطعات کے تقالات بر محفوض وئمیز مناط نظر آنے ہیں۔ اگرورید شریان پرسے ترجیعے آخ میں عبور کرنی ہے تو ورید کاخط اپنی جگہ سے میٹ ما اسے اور وہ تعور کے فاصلے بک شریان کے ساتھ ساتھ جلاحا آئے۔ بب شریان ورید کے ماصنے سے عبور کرنی ہے تو درید متعام تعاطع برعائب سلوم موتی ہے کیونکہ دہ کیا کی دبیر د نواروں کے تیجیے حبیب حاتی ہے'۔ وربیہ وں بر دباؤ بڑا اے حس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ تعاطع کے بعد ی جانب پرور پدھیولی ہوئی ہو تی ہے ، لیکن یہ منفر سفیے

مُوي " (banking ") كتيرين مُركز عام نبين (طاخط موسحفه ۱۷) - معدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد الم

= sclerotic retinitis) و ليد بوت بي جيب كه مزمن من برا على من ملح بي عصب رائي ته بي وفي نزفات كي وجه بي جيوف شعل شعل رقب وظر الكيمة بي وجه بي محب بزفات كي وجه بي موجود بوت بي تو و مرزي بور بر مه ورجي مب أن الت كي مرجود بوت بي تو و مرزي بور بر مه ورجي بي مي مركز والت مين بي كمن بي كه ايك بعدك درجه بي خوب واضح كو رول و الم مجود عيم ما دار وهيف او مرزيا دو اكثر نظمي خطه (macular region) مي موجود بول جس كر د و ايك نظم نما شكل بنا دي الم عكن بي وه ايك نظم نما شكل مي نطق ود يد اور بحري قرص (optic disc) كي درمهان واقع بول جمل بي وريدا





يتصوير كلوى النهاش بكيمي روني كرميي قطعات طامركرتي بيانجون النهاب كليدي ركيه جاتي بير و ولميون باميز سبيانسر، مقال معد 303 کے اصلیّات کے گرد مجتمع ہول کیکن زیادہ اکثر وہ بے قاعدہ طور پرا دھراُدھ منتز ہوتے ہیں۔ اکثران کی ایک بڑی تعدا داس قدرت بیب فریب مجتمع ہوتی ہے کہ ایک بچی کاری کے کار کرے ایک بیدا ہوجاتی ہے کیا طاقت یہ جکہتیاں مضبکیہ کی بین نواتی تہ میں زجاجی ارتشاح کے گول یا بیضوی تو دول پرشتی ہوتی ہیں۔ تمایدان کے شکق یہ میم مناکن ہوکدان کی املی نوعیت ان سیب مفعات کی نوعیت سے مائل ہے ہوئیکیتی شرائین کی جمیو ٹی سشاخول کی معدودی سے پیدا ہوجاتے ہیں۔

دوسری مالتی جوان اصابتوں میں پائی جاتی ہیں اتنا لمند تناؤ کا نبوت ہیں ا جتنا کہ وہ دوران خوان کی آن د قنوں کے قنائج ہیں جو بالآخر فراب ترین اصابتوں ہیں ہیں ہو بالآخر فراب ترین اصابتوں ہیں یہ البیوسین بولیّت جڑا نوی طوی ما وفییت کے باعث ہوتی ہے (ملاحظ معوشریان سلانتی گردہ صفحہ 532) اگر جیہ پشتر اسا بنوں میں وموی اوریا یا تو بطرحا ہوتا ہی نہیں یا محض فیف سابڑ حاموا ہوتا ہے ، اور گردے کے فعل میں ممواً خنیف سی خرابی موتی ہے یاکوئی خرابی موتی ہی نہیں جیسم محفظنہ حصول میں نزوات مثلاً کر ماف (cpistaxis) نفٹ الدم (hæmoptysis) مثلید اور زجاجیہ میں کے مزقات اور مثاید مجموعے والے واغی نزفات بوالیہ سے خون کا بہنا وبحد صدریہ (angina pectoris) خارش میڈ لیول میں اندیمن مونا۔

از ارتفاع النفاط کی بهت سی اصا بتون بی عوق دمو به کا امتلات به در در کا بوتا ہے ۔ مکن ہے کہ اسے استخاص برستی ہوئی عرکے ما تقد تنو مند و باصحت نظر آئیں کیونک ان کے چورے کا رنگ سرخ بوتا ہے اوروہ محسن اس مرخ رنگ ت کی مثالیں سعلوم موں جو سب سے تندارست بولا صول میں نظر آئا ہے ۔ و کیولیفائی سردی کی برسی مولی جو استبت ہوا صول میں نظر آئا ہے ۔ و کیولیفائی سردی کی برسی مولی ہوئی ہے ۔ مکن ہے مردہ انگلیاں بول یا برود ن بالحصوص کی برسی مولی ہے ۔ مکن ہے مردہ انگلیاں بول یا برود ن بالحصوص جو ای زیرس مین مول مولی ہے ۔ ما اور مریض کو موٹا لابس سینے برمجبور کردنتی ہے ، ان مواج تر برب میں کنگوری کے ایک مریض میں ادتفاع الضغط ہے دونول جو ایج زیر برب میں کنگوری کے دائی مریض میں ادتفاع الضغط ہے دونول بواج زیر برب میں کنگوری کی نو بت برنج گئی ۔ ان اصا بتوں کا خاتمہ آخرکا داکھ بیلی علقیت اور کہنے اگر بیا ہے کہن کی اصابتیں) ۔ اکلیلی علقیت اور و افی نوف میں مون ناگها فی موسکتی ہے ۔ ان ما تبین) ۔ اکلیلی علقیت اور و افی نوف میں مون ناگها فی موسکتی ہے۔

، من برسی ہے۔ کل ج۔ اگر خون کے داؤ کی زیادتی کا سب سنناخت پر پیکے تواسے رفع یا کم

رے کی کوششیں کرنی جاسیں جہاں میتین کرہے کے لیے معتول و مرموجو دجو کہ طرز نہ کی بھی اس مالت کے بیدا کرنے میں حصہ لے رہائے تو گوشت اور زیادہ نائٹرومن ٹال کی کھنے والی نذاؤل اور بئوربین اجام مشامل رکھنے والی غذا مُرل سے محتر رِّرہ کُرْ نیز امکول جائے ' تمب کُو اورت دیدد اغی اورجهانی محنت سے پر مهر کرکے مدومال کی جاسکتی ہے ۔ کمیدومیل ۲ ما ۳ گرین) یا بلیویل (۳ ا ۵ کرین) تنبی کتبی مطورسیل دے کرائس کے بعد ایک مبلی ای ممین دینا مناسب ہے ۔جب مربض کو سترین کا اس آرام لینے کے لئے مجبور کردیا جا آ ہے نو کھڑنون کا دبا و برسرعت کم ہو جاتاہے . سروتی موسوعات ا بجیرے کہ نامہ بھیر بین اول نانت رَاث (amyl nitrite) ياسوة بنيم نائة انت (sodium nitrite) : أبحد كمو فوع کی صورت میں مفید موسکتے ہیں ۔ یوٹا سیم آمیو ڈ اکٹرعام طور پر دیاجا ناہے اور بعضا و قات وَ لَكُ عَ**عَلَى وَرَضِينَ لِمِنْدِ تَوَاتِرَى رَوْمِيلَ ١ ورعَلاجِ إِنْهُ أَفِع**َ بَنْشِ مِن يَكِي . تَوْ كَذُنُو کے دباؤ کی زبادتی عالباً متریانات کے کسی سزریا مزمن سمی التهاب کروہ کی متوبیض میں جوئی ب ليدا كا عد كم الله كا كونى كوستن نبي كرنى ياسي . ويجيل اس ا تدائى در يول کے لئے مور وں بنیں گرائس وقت حقد ہوسکتا ہے جب کہ قلب ایک ترقی یا فقہ در جُ اِتَّاع میں بہنچ گیا مواور تہنج موجود ہو۔ اسی اصابتوں ہی تکیجنی خیمہ مفید موتاب ارتفاع لفظ كى ان اصابتول ميں كه جن ميں لمبندم، يو كلوبن موجود مو اور بالحضون سس و قت جب كه ور و مرجميد علامات موجود مول ففدك منله برعور كرنا جاسي وكمن ب كداك إست نمون فعال کردیے سے مکین موجائے اور مجیر افورات محورات و فغول سے آسے مکرد على لأسكت بي مشل قلب مون كى مالت من بهي فسد ك سكت بين (نه جلا حطمه هویتریان صلایتی گرُوه) -

عرجان متوقف

(intermittent claudication)

و تعذوار لنگردائے یا مُتَو قعن عرحان کی اِس عالت میں مریض کچیفاساتیک علنے کے مبد محوسس کرتا ہے کہ اس کی ایک یا دوسری کا نگ میں کم وری ہے اوراس کے ساتھ حکوم بھاری پن سن بنا کچیمن کے حساسلت درد اور اینطن می موق ہے ، جس كانيخه يه مؤتا ہے كه وه لازاً لنگراكر طبعائے - جن جن وه الحكے برمقائے دَر د كے بدا صامات زياده موتے جائے ہيں اور بالآخر وه مجبور ہوكر مهر جاتا ہے - ما وف باول يا لما نگ بين دوران نه ن كے اختلال كے أمارات ظاہر بوقت ہيں - وه سرخ مو ما بق بيئوں كار ايك زراقى بملك كے سائمو اور دسيے داراور متورم ہوتى ہے -اور كان ہے له باوں كى انگليان بيد اور مرده " موں - كچه دير آرام كے بعد يه علامات بتدريج رفع بوجاتے ہيں -

آن علامات می وجربیب که ما کون نتر بین خون کی اسس بر می مولی مقدالو می جامند که است بر می مولی مقدالو می جامند که اتحالی مرد این بی صرورت موقی ہے ۔ تقریباً تمام اسا بنوں بی ما کوف جارہ کی عضلی ورزستس کے دوران بی صرورت موقی ہے ۔ تقریباً تمام اسا بنوں بی ما کوف جارہ کی تعبیق موز (posterior tibial) نتریا بی تی بی عنوس اوقات نه یا وہ بوتا ہے ۔ بعض اصابول عیرہ جو دہوتی ہے (39) - خون کا دبا کو بعض اوقات نه یا دہ موتی موز (peripheral میں ایس میں اور میں اسلامی است کا میتے جوارہ کی موس میں ایا ہے ۔ بہت سی مثالول بی ہی سے جوارہ کی خوشک گنگرین کی صورت بی ظامر ہوا ہے 'اور جندا دما بنوں بی یہ شکا یت جوارہ بالا خوشک گنگرین کی صورت بی ظامر ہوا ہے 'اور جندا دما بنوں بی یہ شکا یت جوارہ بالا کے موس رہنا و کے سانقہ مثالا زم یا کی گئی ہے ۔ بعض اوقات د ماغی عوق ما کوف موجات میں اور اسی کے سانقہ مثالا زم یا کی گئی ہے ۔ بعض اوقات د ماغی عوق ما کوف موجات خوشک گیا ہے موس د بی اور دانس کے موس د بی کا ہر ہوتے ہیں ۔

بحث إسباب مربضول كى قالب تعداد من شريا فون يا دريدون كى ملابت انظاسى سفى التهاب يا أخفيروا كا انظاسى علقى التهاب عسروق ملابت انظاسى سفى التهاب يا أخفيروا كا انظاسى علقى التهاب عبرا صابول (thrombo angntis obliterans) كا (جر المعظ من تبوت المتاب على أن من يأون مين من المتاب كاكو كى تبوت البيل التهاب كاكو كى تبوت البيل التهاب كاكو كى تبوت البيل التهاب كاكو كى تبوت الميل التهاب كاكو كى تبوت الميل التهاب كالمون به الميل بالغ زندگى كا مرف به الدن تعرف الدن التهاب كالونشى يا شراب نوارى اكثر اس كا ببشرو الدن تعرف المرت مرود ل مين زياده عام بوتا به در المين التهاب كالمون به مرود كالمين المرت المين المراب عرود كالمرت مرود كامين زياده عام بوتا به در المين المرت المين المين

امراصیات - بیناب کیا با جا ہے کہ جب ایک معنبوط پی کے ذرمید ایک

جاره کا دوران خون بند کرویا جائے اور کسی جارہ کے چند مضلات کو ورز کشس کرائی جیکے توان عضلات میں در دبیدا موتا ہے۔ یہ در داکِ ادو مینی ب عالی کا نیتجہ ہوتا ہے جو کہ ضال عضلہ سے آزا د ہو کر گردومیش کی بافتی ضفائوں میں خارج ہو جانا ہے اور دوکیسی بسد کو دیا دہ کرنے برغائب موجاتا ہے۔

آندار ۔ گنگرین کے آغاز اور صلابت شریان کے دیگر تمائج سے تعلیم نظر ہون خفرناک نہیں ہے ۔ علامات کی تعکین کثریان کی ہس قالمیت بر ہے کہ آیا وہت ہوگئی ہے یا نہیں ہے ہی استحال کرنا ہو توجمہ کے کسی دو مرے مصے کو گرم کرنا جا ہے ہمشلاً وصر پر گرم موائی عمل کا استنعال کرکے یا دو نواں باز ووں کو سارے کا سالا ایک گرم مفسل میں و کو کر جب کہ ملبی تعامل یہ ہوتا ہے کہ انگوں کی بلدتی میش شرعہ مبائی ہے

(72) - الوقیکی یہ تعالی کال نہ ہوکوئی علیتی ما المت انجام نہ دینی چا جئے۔
علاج ۔ مریس کو اپنی ور رسٹس محدور کردینی چا جئے اور دورا ان نون کو اس لقطم
سکت بیز نہ کرنا چا جئے کہ جس برعوق کے اندر کا تعدد اپنا علی شروع کردے ۔ ببتریس اکثر
ارام لیتے رہنا قرین معلمت موسکتا ہے ۔ آت کی اما بتوں بی آلی ہ اگر آف بوٹا میلئی مراسات موسکتے ہیں اور دہ مقامی دو المبرع مراسات رینا و بی مستولی (aulfarsenol) و فیرو آز دائے جاسکتے ہیں اور دہ مقامی دو المبرع مراسات رینا و بی مستولی ہوئے مفید آب بہر اور العبف و لک این و دو میں ہوئی مراست رسانی جو دھ پر دکتائی جائے مفید آب بہر الله اس میں ہوئی مراست موراس سے بیندہ منسلے کے میں تعالی کرانا مفید تا بت ہواہے۔
اور اس طرح بنوند میں کئی مرتبہ بہددہ منسلے کے میں تنفس کرنا مفید تا بت ہواہے۔
اور اس طرح بنوند میں کئی مرتبہ بہددہ منسلے کے میں تنفس کرنا مفید تا بت ہواہے۔
موقع براؤ کو صفہ کو مبتور کرو بنا جا ہے ۔ شراین کی ما لت کیلی موجودہ تعلمس کی مقدالاً موقع براؤ کو صفہ کو مبتور کرو بنا جا سکتے ۔ شراین کی ما لت کیلی موجودہ تعلمس کی مقدالاً موقع براؤ کو فی حصہ کو مبتور کرو بنا جا سکتے ۔ شراین کی ما لت کیلی موجودہ تعلمس کی مقدالاً موقع براؤ کو فیصہ کو مبتور کرو بنا جا سکتے ۔ شراین کی ما لت کیلی موجودہ تعلمس کی مقدالاً موجودہ تعلم کی کہ دولی مقدال کرانا موجودہ تعلم کی مقدالاً موجودہ تعلم کی کو میں معلم کے دولیو متعین کی جانس میں یہ بی میں موجودہ تعلم کی کو منسلے کیا میں موجودہ تعلم کی کو موجودہ تعلم کی کوران کی موجودہ تعلم کی دولید مقدمین کی جانس کی موجودہ تعلم کی کوران کی موجودہ تعلم کی کوران کی موجودہ کی کوران کی موجودہ کی کوران کی موجودہ کی کوران کی کوران

الما بتر بہت اوپر یاز یا دہ نیج کرنا جا ہے ۔ گنگہ بن اور مخطور گنگرین کا علاج اس طرح تجا کی بتر بہت اوپر یاز یا دہ نیج کرنا جا ہے ۔ گنگہ بن اور مخطور گنگرین کا علاج اس طرح تجا کہ شریا ہے کہ مشریان کے گروالکمل کا انتراب کیا گیا ہے (40)۔ شریا بی سنتے موقو ف جو جائے نیز شریان کے گروالکمل کا انتراب کیا گیا ہے (40)۔ انطابی علقی عرفی التہا ہے من قطنی مضارک توری (lumbar sympathectomy)

کرینے سے سولہ ریفنوں ہیں سے نومریفنوں میں عدہ تمائج خال ہوئے ہیں (65). حمر تی وجع الجواج

(erythromelalgia)

میتی کے مریفوں ہیں سے داوس ال خر نخاعی ملامات نمویا بہ ہوکئے۔اولہ دوسری اصابیں ایسی دیکھی گئی ہیں جو اللہ اللہ خاع (tabes) ہنجا عی جو فیت دوسری اصابیں ایسی دیکھی گئی ہیں جو اللہ اللہ فاع (disseminated sclerosis) کے ساتھ متلازم ہوتی ہیں۔ جمرتی وجع البواج کی بخاص بناتے مارکٹ (ergotism) اور انطاعی متلازم ہوتی ہیں۔ آ خرالذکر مض ہیں جمرتی وج البواج متو قف موجان کے ساتھ متلازم یا یا گیا ہے 'اور خیال طامر کیا گیا ہے کہ وہ ایک متو قف مرجان کے ساتھ متلازم یا یا گیا ہے 'اور خیال طامر کیا گیا ہے کہ وہ ایک تعویفی میکا نید کے طور پر عل کرتا ہے 'میں سے عروق شوید کا اتباع ہو کر حصلہ ماؤف کی دموی درسے میں کرتا ہے 'میں سے عروق شوید کا اتباع ہو کر حصلہ ماؤوں کی مرتبی میں جمرتی وجم المجارح مثن برے میں آبا ہے۔

ملاح بیشر علامات کے لحاظ سے کمیاجاً ہے: برودت مناسب وضع اور المعانی کے المعانی منی منی اللہ مناسب وضع اور المعانی کے استعمال سے ۔ فرادیت (faradism) اور دُ لک بھی منی ثابت مؤے ہی

جوارجی حسا سیت (acroparsesthesia) - کسی ا تون اور اور این اور این الله این الواری اور این الواری اور این الواری الاین الواری الوین الواری الاین الواری الوین الواری الواری الاین الواری الاین الواری الو

أنورسسكا

(ANEURYSM)

یہ نام (بس کے سنی چڑا ہوجائے کے بیں) شریان کے کس اتباع پراطلا پذیر ہے جو کس کے مکر کی کہ و بیش محدود وست میں ہو۔ انور سے اپی شکل کے کہا ظ سئے تکلا نما (fusiform) اور ناجات ۱۵ (sacculated) میں منتسر میں تکلیما وہ ہے جس میں عرق کے سالے محیط کا کم و بیش کیاں اِ تساع ہوجا تا ہے۔ اور تاجک دار وہ ہے جو عرق کی ایک جانب پر ایک گلو بچہ نما انجار بنادے اور جرتی بافتہ ا معا بتول میں ایک نکی یا گردن کے ذریعہ عرق سے برط ابو ابو۔ بعض او کا سے ا

[&]quot;pins & needles"= اشتكاك - هـ

العفوس وارج المنتكم من الكتاجك داراً نورسا الك أبهر عبوئ مقام برميث ما المحد بين الكتاجك دور بنا المحد بين الكتابك أور بنا وجه بنا المحد بين المحد المحد بين المحد المحد و المحد المحد و المحد المحد و المحد المحد و المحد ال

ر کمنی ہے اور غالبات یا وہ بار بھی جو دوران خون کے ذریعہ سے اثر کرتا ہے ۔

مرضی تشریع ۔ نتائج کے متعلق مندر جر ذیل بیان کا اطلاق بالحفوق کو دار سے مورک بیٹ ہے ۔ چوندالیا نون دار سے مورک بیٹ ہے ۔ چوندالیا نون دار سے ماہر ہوتا ہے ، لہذا یہ زیادہ ہم ہمسکی سے مورکست کرتا ہے ، نیزا نورسائی تاج کی نامجواری اس کی ترویب ہی مبر ہوتی ہے ۔ کسس کا نیتے یہ موتا ہے کہ شاحب نزروی یا مل رنگ کی فائبرینی فراہمبول کی متوالی تہیں ناچ میں استر بنادیتی یا اسے تفریباً برکردیتی ہوجائے سے تفریباً برکردیتی ہیں ۔ اور انہی فائبرینی تبول سے تاج کی کا ل بری موجائے سے مکن ہے کہ انور سے مطموس یا شغایاب موجائیں عرفی خاص سے را بیطو جس قدل

م زادا ندر به کا و انبرین بننه کا امکان اُسی قدر کم بوگا بینا نجه نکله نما اندسامی انسی کو کی و ایمیا رئیس و انفر بوسس -

ا نور ما کا ایک بیمرا اثر مزف ہے ، جواکٹر موت کا سبب ہومآیا ہے ۔ کھو کھلے احتا واقع میں کا سبب ہومآیا ہے ۔ کھو کھلے احتا و افرائی کی کہنوں کے اندرا نشقا قات کا وقع اکثر سرین کم لاکت بیدا کردتیا ہو۔ اتصالی بافت یا جن عضلی ضا وُل میں افشقا قات کا ترفیہ تدریجی اثر بیدا کرتے ہیں اور مکن ہے کہ جب وہ جواج میں بوں تو کا میاب ملاج کا موقع دیں ۔

وہ علامات جرمم کے ہرعفے کے لئے شترک ہوئے ہیں یہ ہیں:۔ (۱) سلمہ۔ 307 (۲) نبضان ۔ (۳) خریر ۔ (س) در د ۔ (۵) دباؤکے دو رہے اثرات ۔

صدرى أورطئى كاأنورها

انورما صدری اور طی می سیگانگریسے سینی مصاعوں سے لے کرڈ انفرام کک کسی مجی صدیمی واقع ہوسکتا ہے۔ آئین بہلا اور دو سراحد بیشتر اوقات ماؤف ہوتا ہے واران صعوں میں سارے قطریہ کے بے قاعدہ اتساعات سے لے کرحیتی تاجی انورسما مک تمام اقدام واقع ہوتے ہیں۔ دو فول منعول میں اوسط عرصی حملہ ہوتا ہے۔ مک تمام اقدام واقع ہوتے ہیں۔ دو فول منعول میں نوسط عرصی حملہ ہوتا ہے۔ مردوں میں ننبٹہ بہت زیادہ عام طور پرواقع مواہر (عور تول کی مردوں کی دوس مثالیں) (65)۔

علاه ت - بربخیال سبولت بین زُمروسی بیان کے جاتے ہیں جن کا انحصار افرسا کے حل وقع اورسمت بالیدگی پر ہوتا ہے ۔ لیکن یہ نہیں خال کر لینا چاہیے کہ ایک خاص علامت بیدا کرینا کے لئے افرسا کو ہمیشہ ایک خاص مقام بہا

بونا بیائیے ۔ اُور طلی صاعد کا انورسا' جواکٹر اینے خطا سب' '' ایا رات طبیعیہ و الا انواج ("aneurysm of physical signs") كوص بجا نب ثا بت كرو تياسيم اسيد ممر میں بیلیوں اور عظم القس کو متنائل کرتا جواتا کے کی طرف بڑمد ما قاہے اور خود کو بطام ا مک وروتاک اور آنیم کا بفرسلد کے دور مری یا تمیسری دائمیں بین منلمی فضا ویں ا نسبته شاذ طور پردور کی ایمبری انین فینا، بن طام کرتا ہے میس برایک نرم ا نکماشی خریرسننا کی دیماً ہے۔ اس خطّہ کا ایک سلعہ دا ہے طرف بڑھ عاتا ہے اور وَمَا ذٰ وريدا جوف بروباؤ وال كربازوون كاأذيما بداكر بياسي إوه واسط سينه ك بالا فى حصدمي بره جاتاب اوروائي صفى كم بالائى لفت كو ياكس كم اندرجاند والمصشعبه كومضغوط كرويتا ورتننا ظررتمه برة وازتنفس كي كمياور بعبر كمي درجرم فبمينة بدا كرونيائ . ايس طون ايك الورسارشيان ريوي كود بالكفا، وايس قلب كا انتاع بدر كرسكا اور بالأخرشريان روى كه اندروا موسكيا بدر أورلى الورت منا و موقول برایک با دوسری فاص ربوی شاخ کے اندر دائیں بطین کے اندر دس أذبن كے اندر بائيں اون كے اندر اور فرقانى وريدا جرف (د قوالى عَما ا نوبسما (varicose aneurysm) کے اندر وا بوکئے ہیں۔اس طرح کے ارتباطات کی تقریباً تمام اما بتوںیں جب مریض کا فی طویل عرصہ تک زندگی گز ا دیجا ہو' تو ایک خرر مائی دبتالیے ۔ اور بعض اما بتول میں کئش کے ناورصفات یہ موتے ہیں کہ وہ ایک مسل إ موج دارخر برموتا مديم جوبطا مريهلي اوردوسري دونون ودنو و كو دُها نك ديا ہے' اور بالخفوص كرخت مغنى يا گرج وار بھو كاسىرے وورى اصابتوں ہى يہ خرايہ ووسرا ' يا صرف إنكاشى مو كاسىرے اكثر ايك ذبذ به موجود مو كاسىر ـ اور كمي مايد ك الورسساك ل كالكه غيرا ورالوقوع المستام أن كاما موركاندانها

ا نورسا اور لمی د ہندیں متداخل ہوجائے اور اس طرح اور طی یا زروی anrtic) (regurgitation بیداکردے میں کے ساتھ دو سری آواز خائب موجاتی ہے۔

مكن ہے كەنچواب أورملي كا افرسلاج اكثر سينے خطاب ممالامات وا نا انورسا" "aneurysm of symptoms") كوسيحة ما بت كراب اويرك طوف قاعده كردن تک شرصه ایسے جمال وہ ایک ما بیض سلعہ نیار تناہے اورسسیاتی یا لا سمی ہٹر ہاں کے انور تما *معية بشكل مشن*اخت كميام**ا ما مه و و اوكه ا** زات جب وه موجو ديول الحفو**ق الله** کے تعلق میں پیدا ہوتتے ہیں'اور صَرِصرہ اور بُہرِ پیدا کر دینتے ہیں۔ اور خو دسلعہ کی موجود گی عظم القص کے اِلائی مرے براممیت سے اور ایک خربہت ظام برونی ہے۔ اِس تفام بر ا يُها برًا الورساقصينة الريه بردياهُ وال كرمنوه كويني احديا بُن طرف كمينيوُ سكتا-بھریہ بھی مکن ہے کہ یہ الورسا نیجے کے طرف بڑھ جائے اور بائیں شعبت بیدہ اوطالکہ و وطبیعی امارات بیداکردے جو بیان کئے جاچکے ہیں (ملاخطہ ہوصغیہ 145) - شعبت ب ، با و یا فصبنهٔ المریه ی*که ما تھو*انضام ایک طبیعی المار**ت** پیدا کر دتیا ہے ^{ہمسے قصبی کشاکہ} (tracheal tugging) کیتے ہیں اور یہ اس وقت ظامر ہوتی ہے بب کہ مریف سیک هر ی وصع میں مؤر اسٹس کا مند بندو اور ٹھٹری انتہائی درجہ تک او براغی ہوئی ہو جلتے ہ غضروً ن کواُ نگلی اور انگو تھے ہے کمر کرآ ہنہ سے او پر اُ ٹھا یا جا آ ہے' حبکہ طلقیٰ کو کمرائے والی آنکلیوں کو افورساکا نبیغان محنوس ہوتا ہے۔ خطیف کشاکش بعض تندرس اشخاص میں میں معلوم بوتی ہے لیکن نمایاں حرکت بوتووہ انورسا کی ایک قابل قدر علامت ہے۔ اگر افرساکا وباؤبازگرومنجری عصب بریٹ (جوبائیں شعبت کے گردلیٹتی ہے) تو یا میں عبل الصوت کے عضلانتِ مبتدہ کا تنکل (abductor paralysis) پیدا مِوكِرازا لَ مبد*عضلُهُ م*تقربَه كا" شلى تقبَّضَ" واقع بوجا ماسيخ مهس كانتيجه يه ب**يو** ناسيم كم وہ حل مزارکے وسط میں آجاتی سے احد مکن ہے کہ کسیقد مرمزہ اور ایک ووری رقتی یا شخاسی کھانٹی (clanging or "brassy" cough) پیدا ہوجائے۔ ن بها أورطي نا زل كما نورسه مرى بروبا ودالبل دع البلع ياغذاكي ازروى بيدا كردين يا وه معدري قناة بر ديا و طالس - أكريه انورسا ييمي كي طرف برهد الإين تووه ريره كي عظمي با فت كو كها ليّنا هي بين صلى عصاب كودبا كر شديددرو ببيدا

لروت ہے اور ازاں بعد شخاع کو مبلا کرکے یا فانچ (paraplegia) بیدا کر دیتاہے ، اگرية فقرات متابل بوتے بيئ تا ہم بين فقرى غفرون مقمر ستة بي . ايسالا مِي أَكْرُ عِيْكِي رَيْرُمه كَي بِرُق بِرِاكِ فرير رسناً في ديتاً ب المنسبة الورسامانبأ برص جائے ایسی صورت میں وہ سنشن کود باکر پیچکا دیا ہے اور محدود القام ہمیں پیدا کردتیا اور نفسی خربر کو نائب کرد نیاب به به

کعبری منطوں کی علام مساوات - اگرا ندرسا لاسسی شريان يابائي زيرتر في شرون لو وائ ياان من ساسي ايك كيميلا كيمتعام برايك رودبباكر عرق كومسدو وكروك توتمنا لانبض

نعیشهٔ که د با گور کمنتی سبے اور اس کی بفن تکاری ترسیم کے اندرایک ومعوال صرب صاعديا بيجاتي

ب (شکل ام وَ و ب د). علىم وساوات حار قادحار في لاتساوى = anisocoria)

لؤ عمواً عسب مثاري كرريثون مي داخلت بوماين كي طرف

نو ركياكيا ب كسي مي جات

واقع بوجاتى ب يكفش بروبا وبرك اورس سي التهايي اورعوني اعالى وجري

٣

شكل ام نبغن نگادئ تساعد ١- ايد ميغن تيمي الرطى افرسالا اسى شريان كودبار في تعاد أمين في كريد ب، مسىريىن مي ايم نين كوي ع يرير توقي ا كے بكا كوش غن كورى - ى - اتعيروا كى شرايان ، جو


طبی تربیم ظاہر کرتی ہے۔ وا وجد اوس ۔

كما افد المك ما تم لا غري كمانسي زور لكاف پر يا دورون كي شكل سي ببر اور در وكاپدا منا عام متلازات بي موت اكر عفله ظب كمتلازم تغرات سے (جراكليكي عروق كي ملات كانا نوى نتيج بيس) واقع موجاً تى ہے۔ ليكن مبض اوقات وه ايسے اعضا جيسے كه مرى تصبته الريد ياشر تديروبا ويرع اوران كحصرورى افعال مي مزاحمت موسي كوج





ان اورطی کا ناچی اینورسل



مرص بإحكن بس بيره اسط جو را توكيب - (شعاع تكاشين سطر الندسة لاك نه لي) الندسة لاك نه لي) یا الآفرتا بیکے انتقاق اور نزف کا وقوع یا تو خارجاً مبلک راوسے ' یا مری یا ما رمور یا یکورائی تاجیکے اندر موجائے کی وجہ سے ۔

الزميا

میریستان در تشخیص ۔ علامات اولیسی آمارات پرغور دفکر کرنے سے مکن ہے کہ اُور طی الفرسل کی تشخیص کا کچھ ایما ہو ۔ لیکن آخری تشخیص ہمیشہ لا شعاعوں کے ذریعیہ سے کرنی جا ہے۔ دیارتی میں میں میں دور ہے۔

ایک افراسا اور وائی قلب الریان ریوی یا ور بدا جوف کے درمیان ارتباً
کی موجوگ کی تشخیص اکثر شکل موتی ہے۔ حتی کہ انشقاق کے وقوع کا وقت بھی جمیشہ سخنا خت میں نہبر آ لاق اور استفائے سئی ہیں وفوت تا رہ استفائے سئی ہیں وفوت تا رہ منہ آ اگر ت وہ مہ و بزری خریر ہے ہو افکاش و انباط دو نول کو حاوی مو آ ہے اور استفائے سئی ہو افکاش و انباط دو نول کو حاوی مو آ ہے اور اسس خویر سے مثابہ ہو تا ہے جو مفتوح ما قائر کی شالول بی سنا جا آ ہے۔ لیکن ید نصف نے کم اصابتوں میں موجود ہو تا ہے۔

انباط دو نول کو حاوی مو تا ہے۔ لیکن ید نصف نے کم اصابتوں میں موجود ہو تا ہے۔

اند ار معنا تا قلب کی حالت کا لحاظ کو نا ندوری ہے۔ تمام صدری افور ساؤل میں کر بر سافل اور دو سال کے درمیان ہے۔ لیکن و سطی (median) مت اس سے بہت کی ہوتی ہے تین کا اطلاق مردول اور عور تول پر ہوتا ہے۔ وابدانور سمول کی صورت میں ذنہ ور بہت ایک مول الماق مردول اور عور تول پر ہوتا ہے۔ وابدانور سمول کی صورت میں ذنہ ور بہت کی مول ہوتا ہے۔ وابدانور سمول کی صورت میں ذنہ ور بہت کی مول ہوتا ہے۔ وابدانور سمول کی صورت میں ذنہ ور بہت کی مول ہوتا ہے۔ وابدانور سمول کی صورت میں ذنہ ور بہت کی مول ہوتا ہے۔ وابدانور سمے عدید ہول تو معالم اس کے مول سے مدید ہول تو مول کی ۔

علاج سینه کے افرساکا علاج عمد اَ مندرج وَبل برشتل مو تاہے ،۔ (۱)
آرام دسکون ۔ دم) ستی یدغذ ا ۔ (۳) وا فعات وردا ورسکنات کا اشغال ۔ (۴)
آیودا پڑا گیا آف پوٹا لیئم ۔ بعضول کی دائے ہے کہ مریض کو بستریں لیٹے ہوئے رہ کر
کلی طور پر آرام لینا چاہئے اور اُسے کسی وجسے بھی اُ کھ کر بیٹھنے یا کھڑے سونے کی
ا جازت ہرگزنہ وی جائے ۔ کبکن اس طریقہ علی کی خوبی نہا میت مضتبہے ' الخصوص
ا جازت ہرگزنہ وی جائے ۔ کبکن اس طریقہ علی کی خوبی نہا میت مضتبہے ' الخصوص
ا میں سلے کہ بہت سی اصا بتول میں با لا فرعضا کہ طلب کے تغیر ات موت کا باعسہ

پوما تے ہیں۔ تا ہم نہا بیت زیا دہ ورزمشں سے محترزر ہنا بہت اہم ہے۔ ^ا (Tufnell) من بوکلی آلام ومکون کا بڑا طامی تھا' ایسی غذا دسینے کی اسفارش کی جرمی روز انہ ۔ ا اوتس جاملات، (لمعدم اونس گوشت) اور ہر اونئر ہسپال تمین وقت کے كمانون ي تعتبر كرك ويد عانے متے البكن ياغذانها يت صبراً زا موتى بداور حيد ہى مریض اسے لیلنے برزامنی ہول گے۔ اِ نبیون یا وار فیاعموا شخنیف درو ' نبینر لانے' یا بيحيني رفع كرف كحصر ويا مأتاب كبكن دوترك مكنات بعي كارآ مد موسكته بي مثلاً بروماً لدا في بولاسيم كلورل ببرالله ي الله يا لمنول - بلاد وناكوالساقات مارردی یا فصد کے در بعد اعقوار اسانون کا لئے سے بھی در د میں تخفیف موسکتی ہے۔ معلوم بوتا ہے كہ أيو و اُنڈ أف يونا سِيم الورسايل ترويب خون برخاص انزر كمت درد میں کمی ہو کرمریش کی حالت میں بہت اصلاح و اقع ہوجاتی ہے۔ اُسے مرمعتی ہوگا معادوں میں روز اند . او ' . و ' یا . اگرین مک ، نیاجا سئے ۔ کولٹ (Colt) مخالفرسا میں سارہ اتھا کرنے "کا ایک سادہ طریقہ ایجا و کیا ہیں۔ بلد کو عاریم الحس کرنے کے بعد . تأجيري ايك فنوليدا ورا بك مبزل داخل كرديا عاتات - اگرخون كانازا دانه بها **و بو تو** ایک ظرف (container) میت مارون کا ایک الا جواسلیه تمنو لید کی را و سے واحل کیا جا ما ہے' اور تاجیس داخل ہونے کے بعدیہ تار ایک جیمتری کی صورت میں کھل جاتے ہیں اُور نون کی جمیدواقع کرتے بی عقیر دور امس (Theodore Thompson) نے نها يت بهي حيرتِ الكيركاميا بي كي اطلاع دي إن نيكن روتين اصانبوس بي واتم المحوف نے یہ یا یا ہے کہ نہا بیت ہی نمایاں طور برتمد ویذیر نبضان کے با وجو و تاجیہ سے بالکل خون ىنىس ئى*كتا* ـ

ری سایہ مشکم انورسما امراضیات۔ اِس کامعمولی مل وقوع ڈ انفرام اور فوقانی اساریقی شریا کے مباء کے درمیان ہے اوروہ اکثر محرر شکمی (cæliae axis) کے مباوکو اوُف کرتاہے۔ دوران بالبدگی ہم مکن ہے کہ دومتصله اعضاء سے مانطت کرے اور وریدا جون کو دہائے کیا فقرات کو مناکل کرے۔ فرقانی اساریتی کے کیا حرتنی شریانات کے افداسا تعبیہ کم عامر ہوتے ہیں اور بہاں ان برخاص طور برغور نہیں کیا جائے گا۔

عام ہو تنے ہیں اور یہاں اُن برخاص طور پرغور نہیں کی جائے گا۔ علامات مب ذیل ہیں: ۔ دُروم ایک ٹابض سلعہ کی موجود گی میں برخریر بوم اور معض او فات و ما و کی الحرات - د س د منظم کے اندر ہوتا ہے اکثر مت دیکہ اور نوعیت میں دوری یا وجع العصبی (neuralgie) ہوتاہے اور تن ران یا پشت کے اندر سرطرف تصمح كركمة كب سلعه فدرتي طوربر مقام صرركي لحافات منكف بوامجه وہ سنٹ رامیغی خطت ہیں ' خط وسطی میں با فدر نے دائمیں طرف کو ہوتا ہے۔ وہ گلو برنیا یابینسوی و نابین اور تندوید بر مونای اور دایفرام کے حرکات سے بالکل متا ترنیبی ہوتا یا شا ذہی متاء ٹر ہوتا ہے ۔ عمواً اس پرایک اِنکماشی خربر مسنا ماسکتاہے۔ سوائے دَرُد کے دوسرے المارات عام نہیں کیو کر مختلف اعضا اس کے تقام پر آسانی سے جاتے ہیں۔ اوسطاعہ کہجس من من کاآغاز ہوتا ہے مردوں ہیں 4س سال کہے اور انورسا کی مدت مراجبینتے ہیۓ اور وسطی مدت ۱۲ مہینے بے موٹ کا وقوع عمواً پس باربطونی *با*فت کے اندر با بار مطون من با محمو محلے احتیاء میں ہے کسی ایک مشاء کے اندر تاجہ کے انتقاق سے ہوتا کے تنصور عورتون برست کم کاحق کرنے برطبعی آور ہلی کا نبطان نہا ہیت عام طور برمحرس بواکر ناہیے' بالمنعوس اگران کی دیوارسٹ کی حصلات کمز ور موں نامجور إمت اكثر غطى سي شكمي ا نورساسجم لينت أبي فشكمي ا نورساكو أورطلي كمصرات وأقع موت والمصلماً ت سيمي مميز كرنا جاسية على التعموم سيطان معلى (carcinoma of (the stomach أورنسبت كم عام طورير مواس لا كے سرطان سے جن مي تندرست أورطلي كانبضان نتقل ہو جا ہا کہا ۔ اُور طلی برکے سلعات جانیا رہنیں ہمیلتے ، اور اکسشر خىل مىن ئا ہموار باگر بک دار ہوتے ہیں ۔ بعض امها نبو*ل میں جب مر*یق*ن کو* آوندھا یا ومسس کے ا تخوں اور کھٹنوں کے بل اس طرح رکھا ما تا ہے کہ ساجہ اُور طی سے دور کرما تا ہے تو آیہ نبعنان موقوف ہو مآما ہے۔ گہراساتس لینے پرسرطان معدہ اپنی مجکہ۔ سے زُيا وه سَبِث عانا ہے اور انورسو اتنا ہنیں ہٹتا۔

علاج _ یہ انہی امول بر ہونا چا ہے جو مدری الفرسا کے عنوان کے تحت

بنائے گئے میں لیکن بعض اوقات مشکی افرسا ایک ضافط (tourniquet) کے ذید قربی یا بعدی انضعاط سے یا دوسرے جرامی ذرائع سے علاج پذیر ہوتا ہے شکم منگانی کے دوران میں واقف (Colt) کے عارد اول کئے جاسکتے ہیں۔

اورطى كإبدا يشى تضايق

(congenital coarctation of the aorta)

یہ مالت کسس لیے ثنا ذہے کہ ا*س کو ثنا* ذ ل*ور ٹرشنیص کیا جا آ ہے ۔ کسس* میں تناة شرياني كم ما نداتمال كم مقام ير اور باليس زيرتر من شريان كممبداريد فدا آگے اور کلی کی ضیق یا کال انطاب موجاتا ہے۔ اگر ایسا بچیدز دہ رہے تو اس وصرا ادر حوالتے زیرین کے دوبان خون کو اس طرح مدولمتی ہے کہ ایک طرف نوزر تر ذک اورا بکی شرائین کی شاخوں کے درمیان اور دو سری طرف مدری تراین thoracic (arteries) اور شرامینی شرائین کے درمیان تغمر ، موجاً ناہے . تغمر کرنے والی شرائین مون کی مطلوب مقدار سے جانے کے لئے بہت زیادہ ٹری کوجاتی ہم اور الی بڑی بیجب ا نابض ووق ناديتي بن جو بالخصوص عظم الكتف كے ظری كنا دے تم ساتھ اوالياء زاويه برنېزونگرمغا، ت برمموس کی جانگتلی میں فضار خوک مبندا ورقلب بیش پروروه ہو آب اور یہ تون کوسس نگ مخہ کی راہ سے دھکیلتے ہیں۔ اتساع نہیں ہوتا۔ لاتیواک ملی کناروں برمسع شرط فی تغمات کے رہاؤسے بڑے ہوئے انخفا میان کا ہرکر فی میں بکر ہے مع بستمانی شروانول کی دج سے منظرالقص کے جوانب میں اکماشی خر رات ہو ل ن ہے کہ مشکمی اور طی اور حرتمنی اور خوذی عروق نبضان سے مقرابوں یا آن میں د ما نبعنان بوتا بورجي كي وجهيه اله كم مُنك أور الى كيراه سه أن مي وان يتغف كنون كاروكاز وركمت ما آاسه مصندى ادر فيذى نشريا نات مي شارول كالمناف بونا أيك مفيد تنفيمي كلترب - يه نامكن نبي مهدكس طالت يرب موے سخت معنلی تحسنت کی زیر کی جائے۔ ناکہا نی فشل قلب ہونے کا اختال ہے محققهم المنام توجوان مومنومول مي كدمن مي مواللب لمند تنشار نون بوالمندي شرياتات كومس كرك اور خلام الكتف كرد تغمات كوتلاش كيد رمضرم (61)-

مرمن رسيناد

(RAYNAUD'S DISEASE)

یہ عاد مند جے پہلے ہول رتیا ڈینے طاق کے میں جواج کے مقای انتہاق اور تشاکل گنگرین کے نام سے بیات کیا گنبیت بیوٹ شرائین عموہ اصبی شرائین کے ایک شخی مقامی آفنامن کے باعث ہوتا ہے مس کی دجے سے ا و ف مصول کے دوران کی تعويق إلى تفات واتع بوطائه وابتك ريا وكممن كاسبب وطاحرك مشنجاى سمحاً گیا نما اور مشارکی زنجر کے بعض مصول کے انتیصال سے اس مون می متلف درم کی تخفیف مال موئی تھی۔ تیا ماً ایا استنج معائی رکودے ٹا نوی طور بریب ا ہوتاہے' جوتفریاً ہمیشہ موجود ہوتاہے' اور آین اِکِن کے اٹنا عسشری آئیو ہو (Finhorn's duodenal tube) سے انتوں کی تعبیل کرنے سے علالات دور کھے مِا سکتے، میں ۔ مزید برآ ں بیر کہ مزمن تعبش کی شکایت رکھنے والے اشخاص اکثر **ا** تعداد^ل کے مخترے پڑمانے کی شکا بیت کرتے ہیں ۔ لیکن اب ازہ مثیا برات کی بایر دموی کیا جآنا ہے کہ خترا ئین بلا واسلہ ما وُف ہوجائتے ہیں اور ہیر کہ دِعاحر کی نظام محض ایک ٹانوی حیثیت سے معد لیتا ہے (16) اگر چہاں کے متعلق پیشبہ کیا دا جکا کہے (70) ۔ امساب ۔ بدمردوں کی سنبت مورتوں میں نبہت زیا دہ اکثر الوقوع موما ہی اور ا نبنداڑ عام طور پر میدرہ اور میس سال کی عمر کے درمیان کمتی کہ بھین میں بھی و کھیا جاتا ہے۔ مردی ورجد اتی اختلال مسس کے اساب مہمی ہیں۔ بہت سے مریش ازک یا مدیم الدم عصبی ایمشر یائی مزاج رکھنے والے موتے ہیں کیکن مفن ایسے معلوم ہوتے میں گویا وہ و لوع مرض سے بہلے تک اعبی صحت میں متے۔ مرض ریبا ڈکے ساتھ میمو گلومین بوليت (hæmoglobinuria) التهاب معمل (hæmoglobinuria) التهاب اور مُلَمْ عِلدى تُورا الت إلى المنصور ملابت علد (sclerodermia) باملابت المحتت (sclerodactylia) مائے گئے ہیں۔ آخر الذكر مالت ميں التكيول كى ملدموني كي اور جكدار بوط تى اور بالا فرقد بول بوجاتى سے .

سخت ترین ورجہ وہ حالت ہے جب متشاکل گنگوین gangrene کیتے ہیں۔ ایک الیے حلہ کے دوران یں جیسا کہ او بر بدان کیا گیا و gangrene کیتے ہیں۔ ایک الیے حلہ کے دوران یں جیسا کہ او بر بان کیا گیا ہے کہ ایک جرے ہوئے آیلے بن کر مجوٹ جانے کی اوران کے مجوٹ کے بعد حجوف قرص وہ جاتے ہیں ہوگی ہودی کے رم موجاتے ہیں ہوگا۔ کے معد مندل ہوجاتے ہیں ۔ اس عل کے کرر ہونے بریمن ہے کہا وف صف یہ بہت سے حجوف فرید کے حجالے اوران کی اس ایک جمتری داری کیا جا اور انگلیاں ایک جمتری داری کیا جا اور انگلیاں ایک جمتری داری کیا جا کہا جا کہا ہوں یا تفیق کی خواج کی انگلیاں ہے جو مدی دارا ورگئگرینی ہوجاتی ہیں اور جند ہوتا ہے وہ مری دارا ورگئگرینی ہوجاتی ہیں اور جند ہوتا ہے وہ مری دارا ورگئگرینی ہوجاتی ہیں اور جند ہندوں کے عصد میں جلدی ایک اور پی انگلیاں کے خوصہ میں جلدی ایک اور پی انگلیاں کے خوصہ میں جلدی ایک اور پی انہوں کا کھو حد میں جلدی ایک اور پی انہوں کا کھو حد خواجاتی ہوجاتی ہیں کو خاتم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں کے دور ہیں کا خاتم ہوجاتی ہیں کو خاتم ہوجاتی ہیں کا خاتم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے دور ہا گھوری کی انگلیاں کو خاتم ہوجاتی ہے جاتھ ہوجاتی ہیں کی دور ہوجاتی ہیں کہ دور ہیں کا خاتم ہوجاتی ہوجاتی ہیں کی دور ہوجاتی ہیں کو خاتم ہوجاتی ہیں کی دور ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں کی دور ہوجاتی ہیں کی دور ہوجاتی ہے دور ہوجاتی ہوجاتی

اس کے علمے مُغتول اُمہینوں کے دفعوں سے ہوتے ہیں اور بعض صابموں مین خیف کمرر عموں کے بعد اُنجلیاں ایک شعلاً سُن اور مجمری دار حالت میں ایت میں

ں ہے۔ متعنی سے بین کی شنانت ان امور سے موتی ہے: مرتیل متعنیص کے سینونی گنگرین کی شنانت ان امور سے موتی ہے: مرتیل

کی از براس میں من کی بنی ایک بی جارہ اور مرباً جارہ کرتے ہے کہ اور کہ زبریں کو اوک کرتی ہے کہ اس کا مرتر تی پذیر ہوتا ہے اور جارہ کی شریا ن کی حالت مرض زوہ ہوتی ہو۔ حصرة (chilblains) مقامی اختنا ق سے تسیقد دہشا بہت ظام کرتی ہے اور مکن ہے کہ اس کی امراضیات بھی کا ال ہو۔ اس کا وقوع سردی کے واضح کمن ہے کہ اس کی امراضیات بھی کا ال ہو۔ اس کا وقوع سردی کے واضح کمن سے ہوتا ہے۔

اِندار _ يرمض مهلك نبي مِوالله عله عصبت فائده طاس الموسكة المراد على المراد ال

مرض ریناؤکاکارگرعلاج یہ ہے کہ انوں کو مقررہ و قنوں پڑ جہانی بن والے مقیم المح کے حدد نی صدی محلول کے ہم تا ہ پائنٹ سے اوک اثناعشری نبو بہ کے ذریعہ سے و معارا جائے میں سے و نس بہ ہے کہ غذا کی قنال کے افیماکو دموکر فارج کر دیا جائے ۔ تمبا ولا مرسبے کو اسی محلول کے آتا م یا سن پی لئے جائیں۔ فارچ کر دیا جائے گئے کہ اندر دیڈ بیٹم کے وردول دردی درول دردی درول دردی انترایات کی منعارستس کی ہے ۔ مقامی تدا بیریہ ہیں : ۔ ای تعدلی ول کو کرم درکھا طب کے ۔ فرک جو اگرا تی فرل کو کرم درکھا طب کے ۔ فرک جو اگیا تی طریقوں (hydrological methods) میسے کہ تعاول

گرم اور رونطولات کے ساتھ ممزوج کی جاسکتی ہے۔ لبند توانزرو (high frequency) اور برقی حوارت رسانی (diathermy)۔مغید ترین ادوید آیو ڈین اور در قبیہ ہیں۔ موسم سرامیں مریض کو گرم ہاب و ہوامین مقل کردینا مناسب ہوسکتا ہے۔

التهاب لوريد

(PHLEBITIS)

وربدوں کے التماب یا البتاب الورید کانیتجہ بیوتا ہے کہ دیواریں دہینز ہوجاتی ہیں اور آن میں نون کے سیند خلیوں کی در ریز سٹ واقع ہوتی ہے، جومکن ہے کہ اس کُڑنت کے ساتھ ہو کہ طبقوں کا حقیقی تقیے پیدا ہوجائے۔ ورید کے بفانہ اور ظاره كاالتباك ظامركرسك كصفط الترتيب حراوب ومهاي التمايب (endophlebitis) اور گرد ور مل ی التهاب (periphlebitis) مطلای استال کی گئی ہیں۔ گردوریدی التباب ورید کے بامرسی البہا بی مرکز کے تماس سے با تضرر کی وجسے بیدا بوجا اے۔وروں وریدی التماب زیادہ اکٹر خودور پدیکھاندر خون کی علقیت یا تر و یب کے نتیج کے طور ریسٹسر وع ہوجا آ ہے۔ یعلقیت یا ترویب تخلف اسباب سے واقع ربوماتی ہے (للاخط ہو ملقیت) مکن ہے کہ تعلّا ور بگا د لوارسے میکار ہے اور ساتھ ہی اس کا تعضیہ واقع ہو گرورید بالکل مغموس موجائے ما اس کے ترقیس مکن ہے کہ تھے کے اندرات بن کرائس کے اندرے دورا اِن فون میرقائم بوجائے۔ دوسری اصابتول میں ووزم بوکراکے رمے نما ایم بن ما کا ہے۔ گردوریای التباب اندر تیبل کرخو وعلقیت بدا کرسکانے - اسس کے برعکس مکن ہے لدوريد كم كُرُوكُ بانت بي تجودت بن جائي - مهاجر علقي وريلى التهاب (thrombophlebitis migrans) ايك مالت بع جوكه ماليمالون في زيا دمكر سے تشخیص کی گئی ہے۔ اس بے جم کے متلف مصوں کی اور احشار کی دریہ وں برجلہ بونام و نالباً مزرات كسى عفرى مركز سے بيدا بوتے بين - (أدب كے لئے فاخلہ -(64 %

علا مات - المتاب اوریدمی اون عرق کے مرس صواط الیمیت موق ہے اور اگر کسی اوری وریدا کے مرس صواط الیمیت موق ہے اور اگر کسی اوری وریدا کا انتہاب ہو توسلع پر بی کرد سے نبی ہوا ہو باتی ہے دریدا کے ساتھ المری ہوئی سخت رہی کی طرح موسس کی جاسکتی ہے اور اس مقط می موج و ہو تاہے ۔ گردو پیش کی افت کے سخت ہو جائے نبلہ کی مرفی اور او کیا اور بالا فر تمرج سے مجوڑوں کی کو بن ٹا بت جوتی ہے ، طلقہ کے مرفی اور اس کے ذرات کے مقل ہو مے کے شافری تمائی جدمیں بسیال کے کے ہیں۔

علاج ۔ التماب الوريكا علاج يہ ہے كہ او ف صدكوكلي آرام ديا جائے ورو ميں كى كرين كے لئے كرم كليدات استمال كرين يا كليدين اور بلا دُونا لگائي اوراگر فرور ہو تو اسى غرض كے لئے افيون كے مركبات مجى استمال كريں علقہ كے نوٹ كرمب دا ہو جائے كا خطرہ بميشہ بيش نظر د كھنا جا ہے (كل خطر بوطلقيت اور سدا ديت) ۔ اگر مجو اُئے بن جائيں توشكاف كے فريدسے بيپ كو بكالنے كى فرورت بوگى ۔

علقيت ورسلادتيت

(THROMBOSIS AND EMBOLISM)

علقبت کی امطلاح کا اطلاق نون کی اُس تردیب پر کیا جا تاہے جوز ندو ہو کے اندر (خواہ شرامین میں نواہ ورید و ں میں) یا قلب کے کہغوں میں واقع ہوتی ہے ۔ اور خود تھکے کو علقہ کہتے ہیں ۔

سدلا دیب سے مراو تھے کے کی مصے کا یاسی دو رہی شئے رسلوات کے فرا کے فرا کے فرا کا فرا کے فرا کا دوران فون کے ایک صفے سے دو سرے صفے میں مثالاً کو ایک صفے سے دو سرے صفے میں بونا او پھر ایسے مرق میں بہنجنا ہواس کے آگے بڑھنے کے لئے بہت زیا دہ تنگ ہوا در والی مرز در ہوجانا ہے ۔ سدا دیت کا وقوع نظامی دوران فون کے معیط کوجائے والی شران میں نظامی دریدول اور بھیم ول کو جائے والی رائی شریان میں نیز مگر کوجانے والی مرز میں ہوسکتا ہے ۔ متعل متعدہ فرت کو سدن او کہتے ہیں ۔ بالی درمدیں ہوسکتا ہے ۔ متعل متعدہ فرت کو سدن او کہتے ہیں ۔

فائبرین کی گوین کی اُن طالتوں کے علاوہ جوعمواً ترویب بیداکردتی ہیں.
طفیست کی پیدایش میں دواوا ہم عوال کار فوا ہوتے ہیں جویہ ہیں: ۔۔ (۱) خوان کی روکی
طفیست کی پیدایش میں دواوا ہم عوالی کار فوا ہوتے ہیں جویہ ہیں: ۔۔ (۱) خوان کی روکی
طفیست کیا خون کی لزوجیت کی زیادتی کی وجہسے 'اور (۲) متعلقہ عرف یا کہفیہ کی لئری
معلی کاکوئی مزریا اسس برکوئی ہے قاعدگی میکن اِس کا اعتراف ضرودی ہے کہ اگر اوتوات
ساری عوارض (جن میں خروعصفویات یا سمیات کا حصہ بوسکتا ہے 'اورصحت کی وہ مائیں
جو نفترس کی اورنفاسی سالت (puerperal state) میں موجود ہوتی ہیں علقیت کے
سانی نہایت قریری تعلق رکھتی ہیں۔

مِنَا يَخِهِ بِهِم وَ يَحْصَدُ مِن كَا فلب مِن عُون كى ترو بب أس كے البتب مصرعوں يرمونى ہے کا اس کے کمیول کے اندر ہوتی ہے جب کہ یہ تمع ہوں یا انتہائی کمزوری کے ساتھ منقبض ہوتے ہوں عوق میں اس کی ترویب اس وقت ہوجاتی ہے جب کہ آن کی و **ی**اریں متضرر موں' یا جب و وعفو نی یا گنگرینی اعال *ے متا ثر ہوں ۔* شرائین میں ترويب بالخصوص اس وقت ہوتی ہے جب کہ اُن کی دیواروں میں اُنٹکی یا اتحدیرا کی مررات بول الم وه ا فررسائي اتساعات بي مبلا بو ب وريه ون مي ترويب موقت ہوتی ہے جب کروبا وکی وجسے اُن کے خون کی روسست برجائے ایجب کر مختلف سارئ منعنی اور عدم دمویتی عوارض کے موضوعوں بین خیف ترین مقامی انتقلال موجود بوكسس على من بهلا قدم اكتريه ملوم بوزاب كر مقام منين برضحيفات ومويه كا اجلاع موجاً بيك أورادال بدرسيد ظية ممتع بوم تعين إفائين بني بعد اي عق كم الدرفون کی ترویب کا انرقدرتی طوریریه موتای که اس میں ایک تسدد بیدا بوجاتا ہے اور اس کاظ سے کہ یہ ترویب شریا ن کے اندرہے یا ورید میں ہی تسدد کے آثران کیداگا نہ موں گے۔ جب روبرایک باربن مانابے تواسس کے اور اور نیے دوران کرنے والے فون سے فائبرين كم مزيد جاؤ كال بونے رہنے ہيں جس كانتيجہ يہ ہوتا ہے كہ پيطلة لنسسبينة بلے اور زیادہ بڑے عروق میں بھیلتا جاتا ہے۔ جب روبہ بیلے بیل بنا ہے تو وہ نرم موتا ہادد وریدول کو بمرد تاہے لیکن مکن ہے کہ کچر مسک بعد وہ سکرا یا تعاول سلع دوران خون کو از سرنو ماری ہوسانے وے ملکن رُو برکا استقام معشدامیا موافق نہیں ہوا۔


فزني إسنج مفعل = hamorrhagic or red infaret) سيدمعم موحمرا گردے اور قلب بیں یا یا جاتا ہے کہ س بی جرتغبر واقع بوتا ہے وہ ترویسی تغیر ہے۔ إفت ابني وموى رسد معرا بوكر كرووبيش كى زنده بافت كالمف اس مي نغوذ كرماما ہے اور اِسی میں ترویبی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ اس کے گرداگر دبیش ومویت اور نزف كَا اكِيةَ مُكُ مُنطقة لِي لَا حِلْمَا سَبِي . الْكُرْتِرو بب يُديرِها دّه كِافي بوتومنعمة سخت بوتا سبع، جیں کہ گروے اور طمال میں و کھھا جآتا ہے۔ اگروہ ننبتاً کم وافر ہؤتومنعمہ ننبتاً زم موتا ی جیسے کہ د اغ میں۔ نزنی مفعمہ میں بھی ابتدائی عمل ترویق نُخر کا ہونا ہے کیکن اسل میں ا فرو بیش کامل نزف کا اضافہ بوط آ ہے جو سرخ جیات کے پار جست (diapedesis) كے فدیدے ہوتا ہے إتوال وج سے كه (١) فاص شرایی شاخ كى مدودى كے بعد شرانى فِهات تَخْرِي رقب كے إندر دور ان خون بوت دينے كے لئے كافي موق ميں يا اس وح سے کہ () بیسا کرنشش اور آنت ہی ہوتا ہے جہاں مفعات ہمیشہ نزفی ہوتے ہیں ا رہوا کی موجو د گی کے باعث شعری و اواریں بے سہارا ہوتی ہیں اور جب قلب تغذیہ کی وجه سے اُن کی اُستری مبلی کے خلیات مردہ ہو جاتے ہیں توخون اُن میں سے رس بھلیا ہے ۔ امتداوز ا نے ماعق جب وموی لون فدب ہوماتے ہیں توسرخ معمان عیب مومان نے ہمیں ۔ گردہ قلب اور سنم کی عفعات عمداً سپید فتم کے موت ہیں ۔ طمال اور د ماغ كم مغلات إ توسيد إسرخ موسكة بين - اكر ج مغمات ابتدا ي ورون ي اکثر کستغدر متورم اور با نتول کی سطح پرا مجرے ہوئے ہوئے بی تاہم بالآخر اگروہ عفولی نبوں تو وہ سکرا کر منتبض ہو ماتے ہیں، میباکہ بالحصوص گردوں یں دیکھا جاتا ہے . مناصر میں شمی انحطا ط و آخ ہوکران کی مِکّہ اتصالی بافت لے لیتی ہے۔ اگر سداد کئی تنقیح علقه سيري خبث التهاب ورو تقليه (malignant endocarditis) سيمال بوتو حکن ہے کہ اس کے مشمولہ عفنو بیے مغمات میں عنونی اعمال بیدا کردیں۔ یہ مرزی ربی موکر تعبورے بنا دیتے میں جیسے کہ تنتیج الدم میں شس کے آندا یا کبی کمبی جبیث التهاب درون قلبه میں دماغ اور گروے میں مواکرتے ہیں۔ عفویی سداو و تشامشریا بی ديدار مي سرايت بيداكر كخ بعض اوقات إنغرانك مقام برشريان كى كمزورى اور إتماع بداكردية اورال طرح سلادى ا نورسا (embolic anourysm) بدا



کردیتے ہیں۔ اگر کسی محیطی مصنے (پاؤل ٹانگ یا اجتماعی کرفاص عرق مدود موجائے اور آسے کا دور میں کے کوئی زندہ یا فت ترویب ندیرا قدے کی رسدنہ پہنچا سکتے تو اس کا نتیجہ ترویب منخ نہیں ہوتا کہ گارین ہوتا ہے۔
ترویبی منخ نہیں ہوتا کہ گاگہ بن ہوتا ہے۔

و بین منظر از بیت کی مندر مراز لاشکیس وه میں جر عمواً سنشناخت کی جاتی علقیت اور مداریت کی مندر مراز لاشکیس وه میں جر عمواً سنشناخت کی جاتی


ا کلیلی علقیت (coronary thrombosis) ، بوقلب کا وقف الآمی تغف پداکردے ۔ مکن ب کہ یہ ایک اولی علقیت ہویا سادیت کے باعث ہو۔ مریض عمواً



شکل ۲۴ . برتی طبی ترمیسی تغیرات اِکلیلی طفیت کے (الف) ایک دن اوب التین دن اور کر جستی تغیرات اِکلیلی طفیت کے (الف) ایک دن اور کسیفدر کی کے مات وں مد بحن سے بہلی تقوید میں (اور کسیفدر کی کے مات وورسی تقوید میں ان مربی تا اور (الف) میں ہم برتی فاصل (الف) میں اور ن موج ل کے در میان کے مسمولی افتی خط کی غیر توج و گی ظاہر ہوتی ہے ۔

ا دمیر عرسے زیا دو کا ہوتا ہے۔ بلاکسی ظاہری سبب کے وہ ایکا یک سینہ یا شرامیف میں تہا شدید در و محرس کرتا ہے 'جو ذبحہ صدریہ (angina pectoria) کی طرح محیط کے طرف تشعع کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ میسلسل میند گھنٹوں تک جاری رہے اور اُسے بیمین کردے۔ اس کو تشویش ہوتی ہے ' اس کا رنگ ثما حی اور کسی قدر از رق ہو جا اہے اور ساتھ ج منندا بسینه آن ہے۔ نبغی کمزور اور معفی اوقات غیر منظم ہوتی ہے اور خون کا واؤکم ہوجا ہے۔ بہر فروری التوجہ ہوتا ہے اور معد ہیں مکن ہے کہ جین اسٹوکس کا تنفس ہموجائے کہ لیکار تب اور سبیہ خلبوں کی کٹر ت اور اکثر متلی اور قئے ہوتی ہے ۔ نا د موری فرک گویہ ہمیشہ موجو و نہیں ہوتا ہے تاہم شخیص کی قطبی طور پر تعمد بین کر دینا ہے۔ برتی قلبی ترسیم رش نہا بیت ستم تغیرات یہ ہوتے ہیں کہ ایک مزیحس ن موج ہوتی ہے اور مرت ناصلہ میں تغیرات واقع ہوتے ہیں (طاحظ ہوشکل ام)۔ اس در د میں نہ تو اکا کل اکٹرائٹ میں تغیرات واقع ہوتے ہیں (طاحظ ہوشکل ام)۔ اس در د میں نہ تو اکا کل اکٹرائٹ

315



شكل ٢٣ مرين قلى بريسيى تغيّرات أسى مريض سے الليل طبيت كے وقوع كے دوئيار آت اور باده مغيّق كے بعد من سے فلا برہے كة تقويدا ور ٢ ميں ن موج مزكس مور كرا ميں اصابتوں مالت كے طرف عود كرد بى ہے ۔ (دوسرى اصابتوں ميل يہ بى تغيرات مرف تقويد ٢ اور ٣ ميں بوں گے) (جے ۔ ايم ۔ ايم ۔ كيا ميل) ۔

کو اس وج سے نہیں وینا جا ہے کہ وہ قلب پر ہتیج اثر دکھتاہے میکن ہے کہ محد میں سیمبر او کے اُو کیا کے ماتھ املائی فشلِ قلب واقع ہوجائے۔ اگر جدید ایک تمثیلی سرگذشت ہے ا سا ہم سس امر برزور دینا مزوری ہے کہ اسس مرض کا سلساؤعلامات ستمر نہیں ۔ مکن ہے کہ علی غشی کے ساتھ فٹر وع ہوجائے ۔ حکن ہے در دنہو۔ مکن ہے کہ ناگہانی موت واقع موجائے ۔ عمو آ وروں قلبہ برا نفعا م یا فئہ رقبہ سے اندرکی جا نب ترویب خون واقع ہوتی ہے 'جومکن ہے کہ ٹوٹ کر موا ہوجائے اورکسی دوسری مگر سدا و بت بیڈکر آ (35)۔ مکن ہے کہ مریف اس و فت ذبحہ صدر یہ میں مبلا ہو اسے یا زمیں ہوا اور اگروہ شغایاب ہوجائے تو مکن ہے کہ بعد میں ذبحہ میں مبلا ہو اشروع کردے میں کی وجہ قیات یہ ہے کہ قلب کے جوریشے تندرست باتی دہ جانے ہیں ان پرزائدا زمعمول کام کابار پڑھ ہے ۔ مکن ہے کہ ریف گفتول و نول عمل مالہا مال تک زندہ دہ اور فاعلی کام کرفے کے قابل دہتے ۔ فال بنتالیس مال کی حمری اللیلی علمیت کے قابل بنتالیس مال کی حمی اللیلی علمیت کے قابل بنتالیس مال کی حمی اللیلی علمیت کا میا ب ہے اور کی آدام و سکون اور آئیسیمن موسکی ہے۔ اس کے عالی بنتالیس میں تفریق میں برخت کی میا میں ہو کہ کے اور اس سے در و کونسکین موسکی ہے۔ اس کا علاج ہے ۔ اس کی میں تفریق میں یہ کا میا ہے۔ اس کی میں تفریق میں یہ کا میا ہے۔ اس کے اور اس سے در و کونسکین موسکی ہے۔ ذری و اور اس سے در و کونسکین موسکی ہے۔ ذری و اور اس میں تفریق میں یہ کا میا ہے۔

فین ی علقیت (femoral thrombosis) فخذی ورید کی طعیب سن راوی کے آخری ورج ل سرطان اور و و سرے خستہ کن امراض میں تب مو قد اور انعلی سنزاکے بعد کی نعیب میں اور زعی کے بعد (تب یہائی۔ "white leg") بدا ہوجاتی ہے اور ورید کا مدود ہونا محس کیاجا سکتا ہے بدا ہوجاتی ہے ۔ اول انتہا ہا الورید کا مدود ہونا محس کیاجا سکتا ہے اس کے ساتھ موجو ور سنے والے التہا بالورید کی وج سے عمر آگری می متر الی کی اس کے ساتھ موجو در سنے والے التہا بالورید کی وج سے عمر آگری می شریان کی طب کی ایک معمد لو کے کرر یوی شریان کی کی بھی ہوتا ہے کہ تھکے کا ایک معمد لو کے کرر یوی شریان کی کی طب کی طب کی میں موت و فقتہ واقع موجاتی ہے ۔ تبول کے بس کی واج تنہ کے دوران میں جو ایج عمل وقوع علیب کو رد کئے کے لئے مریض کی تعل و حراث کی بر احتیا ط منظم کرنا چاہم ہے ۔ اس کو اس طبح سے لیفنے کی اجازت نہ وی خواہ کے بر احتیا ط منظم کرنا چاہم ہے ۔ اس کو اس طبح سے لیفنے کی اجازت نہ وی خواہ کے بس وریدیں دُب جاتی موں ۔ زم کمیوں سے بھارا مال کیاجا سکت حالے کر جس میں وریدیں دُب جاتی موں ۔ زم کمیوں سے بھارا مال کیاجا سکت

سے ۔
ودا جی علقیت اور جا نبی جوف (lateral sinus) کی علقیت اندون گوسش یا کم بر است المحلقیت اندون گوسش یا کم بر است المحلیوں کے موض سے بدا ہوجاتی ہے۔ برونی گوسش کے تماس کی وجہ سے عفونی عضو ہے اکثر موج و موتے ہیں شدیالتها بالودید شروع موجا کہے ، اور تمکا عفو تی ہوجا کہے ۔ بھر فدات قلب کے دائیں بانب کے داشت موجو الم بی جن میں تقییج الدمی خواجات بن جاتے ہیں جن میں تقییج الدمی خواجات بن جاتے ہیں جن میں تقییج الدمی خواجات بن جاتے ہیں جن میں تقییج الدمی خواجات بن جاتے ہیں۔ بعض او قات زیادہ عام حالتوں مملاً شیر خواد وں کے ضمور (marasmus) اور

بالنول كى اخضريت (chlorosis) ديدم دمو بت كى وجست دوسرے واغى جونول (طباقى اوركم فلى علقيت واقع بوجاتى ہے ۔ اوركم فكى اس عى علقيت واقع بوجاتى ہے ۔

حوضی (pelvic) وریلوں کی طبیت عورتوں یں حوضی احثامکے میں کی وجہ سے اور وونوں منفول نی سوزاک کی وجہ سے پیدا موجاتی سے ۔

(نيز للاحظه مومها جرعلقي وريدي التهاب) -

تقافی ور بدا جون کی علقیت بن ید لازی نہیں کد زندگی ضائع ہوجائے۔
ایک مریض میں جو بھیس برس کک زندہ رہا کہدی وریدوں کے دخل کے نیجے سے
وریدیں سنیر بوکو ایک غیر نفو ذید بر فیتہ بن گئی تیس ۔ گردوں سے خون کی والبی کیے
کے داستے سے اور تعلیٰ اور مجرو (azygos) وریدوں کے داستہ سے ہوتی تمی ۔ بیشہ باول اور دیوارٹ کی وریدوں میں بڑی دوالی نا اور دیوارٹ کی وریدوں میں بڑی دوالی نا التہاب الورید (hæmorrhoids) ، بواسیر (hæmorrhoids) ، اور دوالی نا قروح کا دجی ن موجود ہوتا ہے ۔ مرابیت ضربہ اور مرض خبیث الباب ہیں (87)۔
وری کا دجی ن موجود ہوتا ہے ۔ مرابیت ، ضربہ اور مرض خبیث الباب ہیں (87)۔
مضل واقع مور ہا ہوا اور انباع کی مالتوں میں ملب کی دیواروں کے گوشوں میں بڑب نظامی دورانِ خون کی مدورانِ خون میں کردیتے ہیں ۔ یہ اس عضو کے فعل میں مداخلت کر کے مرحت سے موت فیق کردیتے ہیں ۔ یہ اس عضو کے فعل میں مداخلت کر کے مرحت سے موت فیق کردیتے ہیں ۔ یا مکن ہے کہ یہ رہوی یا نظامی دورانِ خون کو سدا دات ہم ہنجا دیں۔
دھاغی شہ انہیں کی مداویت اور علیتیت کا بیان امراض داغ کے محت

کسی جار حد کی بڑی ش بان کی سدادیت زیادہ عام واقونہیں۔ وہ ناگہانی ماد درد پیداردیتی بڑی ش بان کی سدادیت زیادہ عام واقونہیں۔ وہ ناگہانی ماد درد پیداردیتی ہے جس کے بعد ما وُ ف جار سرسس مرو' اور بھا تت بوجا تا ہے۔ سدادیت کے مقام سے نیچ نبض غیر مموس ہوتی ہے اور مبیا کہ پہلے میان کہا گیا ہے نیتجہ یہ بوسکتا ہے کہ گنگرین ہوجائے۔ طحال اور گودوں میں میدادیت کا وقوع جنداں عام طور پیٹ ناخت نہیں ہوتا۔ معن اوقات طمال کی تدا

ی و جرمنے ہیں ہمو یہ میر در در ہو اسے۔ روعے می صدر دمیت سے وم ہو سیا اور اگر اوقات البیم من بولیت بھی پرا ہو جاتی ہے اور جبیث التهاب وروں البیم اکد مرکزی مدادی التهاب الکلیه (focal embolic nephritis) کی مالت موجود مدتی ہے۔ ما ساس یعنی (mesenteric) شریان کی مدادیت کی اصابتی اقع مہائی میں جن میں مریفی شدید در دشکر اور تمدومیں سبلا ہوگیا اور اس کے مبدایک یا دو دون میں بہو طاور موت واقع ہوگئی۔ اور آنت اور بار بطونی کہف کے اندر نون بالیا ہوگیا ہے ۔ کس ورید کی طفیت کے نتائج می بہت حائل ہوسکتے ہیں کی کی کی سات مائل ہوسکتے ہیں کی کی سات کے طاقات فرادہ ندر کی گاری ہوسکتے ہیں۔

جگرکے عوق کی سدا دیت اور علقیت کے انزات التہاب وریالیاب العلی کے انزات التہاب وریالیاب (pylephlebitis) کے بیں۔ ریوی سدا دیت اور علقیت اور انعام اور شمی سدا دیت اور علقیت اور انعام اور شمی سدا دیت (fat embolism) کا بیان صفی 177 پرورج کیا گیا ہے۔ افوالمد کے ذرات کی سدا دیت صفی بعید و میں تا زہ یا لیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ علاج یدا دیت کے ورد میں متعامی دافع ور دا دویہ لگانے ہے آنام موسکما ہے۔ اگر کسی جارہ کی بڑی شریان مد و د بوگئی فوتو اس جارہ کو زم روئی کے کالے میں یا مرعن نیا لے اور کی اور کی اور کی کے کالے میں یا مرعن نیا لے کہ کو دست ورزی کے ذریعہ ایک فرد تر بیلے چند گھنٹوں میں انجام دی جا کیا تھکے کو دست ورزی کے ذریعہ ایک فرد تر بیا نی مشاخ ہیں د معکیلا عاملی ہے۔

عرقى عصبانى أذبما

(ANGEIO-NEUROTIC ORDEMA)

یہ مارمنہ باظام وعامر کی آلہ سے معلق ہے اور شری (urticaria) ہے
ہمت منا جات ہے ۔ نیکن ہیں کے فیردات نبت بڑے ہوتے ہیں جم کے مختلف معول
مثلاً جرو ، پیوٹوں کا تقدیا باؤل ملت یاز بان کی معدود المقام اور ام منودار موجات
میں ۔ یہ البتا بینیس ہوتے اور نہ ان کا اختصار جا ذبہ (gravity) پر ہوتا ہے۔ ان میں
وَدُونِسِ ہُوتا اُ کین مکن ہے کہ جان جبن اور فارض ہو۔ یہ وفعتہ نووار ہو کردو ہے پیادائد
گفتوں کی قائم دہتے ہیں اور بار بار کمکہ روزانہ پیلا ہوجاتے ہیں۔ مید کے اور ہول

ہوتا ہے، حب کا منبع نامعلوم ہے۔

REFERENCES

- 1 Y. Henderson and Johnson 1912 Heart, 4, p. 69. 1920 Schweiz. Med. Wochens-2 H. Sahli chr. . 1923 Wien, Arch. f. inn. Med., 6, p. 515. 1923 Ergeb. d. inn. Med. u. Kındhkde., 24, p. 73. 1923 Brit. Med. Journ. ii., p. 4 MacIlwain and 456. Campbell 5 E. P. Poulton and
- H. M. Stewart 1918 Lancet, ii., p. 738. 6 Parkinson and Bain

7 Poulton and Dowling

- 1924 Lancet, in., p. 311.
 - 1921 Guy's Hosp. Rep., 71, p. 253.

74	. جات	119	على فسيد - جلدووم
	('Dukes	1921	Brit. Med. Journ., ii.,
8	}		p. 987.
	Corney .		Lancet, u., p. 863.
9 .	J. Parkinson and M.	1930	Quart. Journ. Med., 24,
	Campbell		p. 67.
10	J. M. H. Campbell and	1928	Quoted in Lancet, ii.,
	E. P. Poulton	4 (V - X	p. 1281.
	Emanuel	1925	Lancet, i., p. 591.
12	Lewis, Ryffel, Wolf,	1019	Hoad 5 m 45
10	Cotton & Barcroft		Heart, 5. p. 45.
13	J. A. Calhoun and	1954	Arch. Int. Med., 53,
1.4	W. G. Harrison	1099	p. 911. Journ. Path. & Bact., 26.
14	Campbell Hunt and Poulton	1020	
15	T. Wardrop Griffith	1001	p. 234. Brit. Med. Journ.,
10	1. waidiop driimii	1.7(/1	Feb. 2.
16	T. Lewis	1929	Heart. 15, p. 7.
	W E. Dixon		Communication to As-
	22. 22. 2.7.		soc. Phys., Cambridge.
317 18	T. Wardrop Griffith .	1903	Edin. Med. Journ.,
			p. 105.
19	Carey Coombs .	1923	Quart. Journ. Med., 16,
	•		р. 309.
20	R. T. Grant .	1931	-3 Heart, 16, p. 275.
	Newburgh		Amer. Journ. Med. Sci.,
			May.
22	C. G. Lambie	1926	Brit. Med. Journ., 1.,
			p. 80.
23	Su W. Osler	1908	-9 Quart. Journ. Med., 2,
			p. 219.
24	Sir T. J. Horder	1908	-9 Quart. Journ. Med. 2,
			p. 289.
25	Sir Clifford Allbut	1923	Lancet, ii., p. 1422.
2 6	T. Wardrop Griffith		Lancet, Jan. 9.
	W Evans & C. Hoyle	1933	Lancet, i., p. 1109.
28	Sir James Mackenzie		
.50			London.
		1922	Brit. Med. Journ., 1., p. 1.
30	W. Verdon (Angma	1004	7 . 1 .
91	Pectoris)		London.
91	Poulton	. 1923	Quart. Journ. Med., 17,
	д оцион		p. 53.

. 1932 Lancet, i., p. 277.

55 H. A. Treadgold and

H. L. Burton

, 1

56 M. Campbell and J. W.	1933	Guy's	Hosp.	Rep.,	83,
Shackle		p. 168			
57 J Holmes	1929	Brit 730		ourn.,	1i.,
58 F Saile		p. 739 Med. K	lvn., Ju		3.
59 J. Piesch	193 2	Lancet	, i., p. 3	85.	
60 E. J. Wayne		Clin. S			
61 T Lewis .		3 Heart			
62 D W Bennett and			, , ,		
W. J. Kerr	1931-	3 Heart	. 16. p.	109.	
63 H. A. Treadgold and) = ·· , <u>1</u> - ·		
	1932	Lancet,	1., p. 2	77.	
64 S. J. Hartfull and	1932	Guy's	Hosp.	Ren.	82 .
G Armitage		p. 424		1	,
	1927	Quart.		20, p. 3	31.
66 E. D. Telford and		Brit.			
J. S. B. Stopford .		p 173.		,	- 1
67 H. A. Treadgold		Lancet		733.	
68 C. Hoyle		Lancet,			
69 1 Harris and G. Mc-	1930	Quart.	Journ.	Med.	23.
Loughlin		p. 451		,	,
70 G Spurling, F. Jelsma	1932			d Obst	et
and J B Rogers .		Marc	h.		
71 R C Waller		Brit. M		ırn C	et.
		.11th.			, 000
72 T. Lewis	1931	Heart,	16. n. 1	_	
73 Paul D. White		Lancet,			97.
	-00,		, 1/1/·	010,0	

318

امران عضائيهنم

امتحان کم امتحان کم

= ascites) الما نول مرسي من المسلم في المسلم المسل

اور در و المجمى ملعه (intracranial tumour) كى دجه سے واقع بموئى مو -معالمة سے مخلف مقامى كلانبال يا آ بعار ديجھے جاسكتے ہي ، جركم مخلف اعضاً

کے سلمات یا کلا نیوں سے بیدا ہوجائے ہیں مٹلاً سلمات جا محدہ تسدو کی مثالوں میں متمد وامعا کا در ریختہ شرب اور مضم امعا د ہوتدر فی البتاب بار بطون میں پیدا ہوجاتے ہیں متمد وامعا کا در ریختہ شرب اور مضم امعا د ہوتدر فی البتاب بار بطون میں پیدا ہوجاتے ہیں کلانی کا فی طاق استفاد الکلی و مصلے کی مقامی کلانیاں جب نیجے کی پیلیوں کو او پر اور اجر اور مترد د مثنا فر سیکھی کے الائی مصلے کی مقامی کلانیاں جب نیجے کی پیلیوں کو او پر اور اس طرح صلی ماشیہ اور خطوسطی کے در میان کے داور یہ کو ڈراکر د بی ہیں نوصدر کا عدم شاکل بیدا ہوجا ہے۔ ایسا المضوس مگر کے کمیسب

(hydatid) مرطان اور مجوڑے کی امانتوں میں دکھیاجا آہے۔

میں کو سنہ کے تعلق میں ہلے تذکرہ کیا گیاہے شکہ اور اس کے تعلق پرفورکر اللہ اس میں ہم ہے۔ زیادہ تعدد سے والغرام کے نزول ہیں رکا و طی پرلیس آئی ہے اور ارسیون کے طا دالتہا ہے سے نزول ہیں کا نیخہ یہ ہونا ہے کہ اِن شالول ہی نعس تقریباً ایکل صدری ہوتا ہے۔ دومری شالول ہی وہ اعضاج ڈایا فرام ہے ہوں واسطہ تال ہی وہ اعضاج ڈایا فرام ہے ہوں واسطہ تال ہی وہ عنا بین میں سے تقیقی طور پرما تر ہوتی ہے اسیکن وہ احضا یا سلطات جو نعبتہ نیچے واقع ہوں یا جو شکم کی مجیلی دیوا رہے می ہول اس مفلیک نزول سے نسبتہ بہت کم متاہ تر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اور طی کا یا دائیں جبن کا ایکٹی بازروی میں برسے ہوئے مگر کا یا نہا ہے ہی میں فرار فرار افر ساکا نبینان اور تم معدے یا امواہ کے حرکات دود یہ نظر آسکنا سے مرہ خصر ہے۔ امواہ کے حرکات دود یہ نظر آسکنا سے مرہ خصر ہے۔ اور دود کے حرکات دود یہ نظر آسکنا سے مرہ خصر ہے۔

خِس ۔ مالت مِشکم کے امتحان کے اس طریق کے لئے شکم کی دیواری مِن قدر

رو المرائع المتحان بایت نری کے ساتھ کرنا جائے۔ الم تھ گرم ہوں اوروہ سلم بر چیٹے رکھد نے جائیں اور س امری اضیا طری جائے گا گیوں کے برے و فعتہ سنگم کے اندر دگر و دیے جائیں گیو کہ ایسا کو بات سے عضلات منعبی ہوجاتے ہیں اور قالب اعتبار تمائع کا حال ہوتا فی کئی کا ایسا ہے۔ گہر تیفس کے دوران ہیں اختاکی کلانیاں یا فوالید یک بالمعنوص وہ جو سنگ کے بالا کی مصیب ہوں سنداخت ہو کئی ہیں مالاتکہ ودر بے وقت منا بدنظراند از ہو بائیں بیشکم کی جانبوں کا امتحان کرتے وقت منا ہوکو و د دستی طریقہ کے استعال کو ہرگرز وامونس دکرنا جا ہے اور وہ یہے کہ ایک یا تھ کو با بصوبی سلی کے بیے اور دو سرے کو سامنے شکم برر کھا جائے۔ اگر بہلے یا تھ کو و دو سرے کے طرف دبا یا جائے جو کہ ایر دو سرے کو مامنے شکم برر کھا جائے۔ اگر بہلے یا تھ کو دو سرے کے طرف دبا یا جائے ہوکہ برحوکمت بنے توضیف ترین کلانی یا مزاحمت بمی عمراً محوس کی جائلتی ہے مضمول اسا تول میں مریض کو رکبی مرفق وضع ہیں دکھ کر امتحان کرنے کی ضود ست موتی ہے۔ مضمول اساتول میں مریض کو رکبی مرفق وضع ہیں دکھ کر امتحان کرنے کی ضود ست موتی ہے۔

لفت معرضاً شرابیف میں واقع ہے کچھوٹے مرکا ببلا اور زم ہو اے . کھو کھلے احتا القست آسانی وَب مانے ہیں اور اکٹر کوئی جیز سننا خت میں نہیں آئی سوائے کسس کے کہ وسیلے انتخاص میں اُدر کملی یا حرتفی عوت کا نبغان محوس ہوتاہے۔

جُس کے فر میسے ہم من کی حالت ہیں اعفائی شکی ایا ہت کے تغیرات کو اور سلفان کی موجودگی کوسٹنا خص کر سکتے ہیں ہے۔ دیوائشکم کی تغیید کی کا استفاد کی موجودگی کی استفاد کی موجودگی ۔ مقامی یا عموی البیست کی موجودگی۔ اس کا اظہار مکن ہے کہ سٹ کو ہاتھ ہے جبوتے ہی ہوجائے کی امرف ہی قت ہو جب کہ گراو یا جا جا ہے ہے شکہ کی حرکات موس ہو سکتے ہیں کہ سنے طبی عروق کا جب کہ گراو یا جا جا ہے ہیں مگر کا نبضان ۔ آنوں کی حرکت دودیہ ۔ آنتوں میں موائی موسکتے ہوئی اس کی حرکت دودیہ ۔ آنتوں میں موائی کو کت و ایک الفور ساکا یا مرض قلب میں مگر کا نبضان ۔ آنتوں کی حرکت دودیہ ۔ آنتوں میں موائی موسکتے دباؤ والا اللہ الفور ساکا یا مرض قلب میں مگر کا نبضان ۔ آنتوں کی حرکت دودیہ ۔ آنتوں میں موسکتی ہو گئے دباؤ والا اللہ کا میں موسکتی موسکتی موسکتی میں اس وقت جب کہ اس پرکسی قلد و فعیہ دباؤ والا اللہ کا ساتھ کی میں موسکتی موسکتی موسکتی موسکتی موسکتی میں موسکتی موسکتی

اوپرکوبسٹ مبت بیں۔ مزیر بران معدے اور معاد کے منتف معول کی قری آوان کی قیت میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔

ملی بر مراور طیال کی جامت کی تبدیلیوں کا عنوس رسولیول اور دوروں کی وجودگی سے اسمیت کے نے رقع بدار ہو جائیں گئے اور بالعموم اسمیت کے ساتھ مز احمت بمی موجو ہوتی ہے جرش کرنے برخوس بوسکتی ہے۔ چرکہ ان تبدیل سند و مالنوں کا حوال مختلف احضاء کے امران کے سخت بہشہ دیا جائے گا الہذا یہاں بن کی تفصیل لازی بنیں قرع سے بھیں ہمیں ہمیں ہمیں استفاد سکے اروان کے سخت بہشہ دیا جائے گا الہذا یہاں بن کی تفصیل لازی بنیں قرع سے بھیں ہمیں ہمیں ہمیں استفاد سکی (جلا خط ہو) کی سنناخت کا ایک دو سراقیتی طریقہ وائم آتا ہے۔

است اع و التهاب البطون مي كمي كمي كمي اورومر عنا الته يرفرك كم الموري المستائي وتي بي والتهاب البطون مي كمي كمي كمي الموري عنا الكورك في الورك التي الكورك في الموري مصراع كى راه سيمها في الفيهد كر رائ كى وبد سنت متولد في الموري مصراع كى راه سيمها في الفيهد كر كر من كى وبد سنت متولد في والت من يروك التاب كى والتاب كى والتاب كى والتاب كى والتاب كا شبه موقوف بو والتهاب زائد و (acute appendicitis) كا شبه جوتو التاع مفيد بوسك المداد التهاب زائد و التهاب كالمتاب عروك التاب عروك التاب كالتاب كالتاب كو التاب كالتاب كال

لا تنعاعول کے ذریعہ امتحان ۔ مری مدے اور قال عند ائی کے امتحال کیا مریعن کو ایک کھانا دیاجا آہے اور اس بن کوئی ایسا نمک کا ہوا ہو آہے جولا تعامول کیئے غرشقات ہوتا ہے مشلا ہریئی سلفیٹ (barium sulphate) یا آئی کلوراً کہ (oxychloride) یا آئی کلوراً کہ (oxychloride) یا آئی کلوراً کہ (oxychloride) کے امتحال کے لئے ایک فیرشفات امتحال کے بیان کے تحت درج کئے گئی ہیں ۔ قولون کے امتحان کے لئے ایک فیرشفات حقت کا استحال بی کیا جا سکتا ہے ۔ دوسرے اعضاکا استحال کونا ہو قولمینات دسے فذائی قنال کونتی الا مکان فالی کیا جا تا ہے اور شکم کے تصفے لئے جاتے ہیں ، موافق مالات میں سرارہ کونظا ہر کرنیکا میں مرادہ کونظا ہر کرنیکا ہو کہ خوالے مرادہ کونظا ہر کرنیکا میں مرادہ کونظا ہر کرنیکا ہو کہ خوالے مرادہ کونظا ہر کرنیکا مرادہ بعد میں بیان کیا گیا ہے ۔

مشنی بینی (cælioscopy)-ال طریقة می فروکین کے ذریعہ معممیت
بیداکر کے دوروشکر می آک شکاف دیا جاتا ہے۔ کہفہ باز لطونی کے اندر جواون بل کہ انہا ہے۔
اور کیس کے افید کو ایک شکم مین (laparoscope) کے ذریعہ سے دیجیا جاتا ہے۔ پیلریقہ

نالمه تنخيسي افران كه ك أس وتمت جب كه ايك انتقعها في مشكر منكافئ المائز بوانتهال كيا الماسي (١) -

(acuté abdomen

من سی ما بشکمی مالتو ک میں جرامی دست اندازی ہے جو موافق ننائج مال ہو ب*ی ان کے پیشیں نظر تنفیق کی اہمیت متنی بی بیان کی جائے کہ ہے۔ اگر میخلف ما د* حالتوں كے ممز نشانات بعد مي منتف امراض كے تحت بان كئے جائيں گے،" اہم مناب نیال کما جاتا ہے کہ بہا ں مریف کے امتحان کے متعلق میڈنکاٹ درج کئے جائیں اور اُ ن حالتوں کی ایک فہرست دی مبائے جرت کرمادیا اُس سے شام علامات بید اکر *سکی تاب* ما بقدر كذفت سے زهرف يرظا بر بولوائے كاكد آيا ہے بي علم يك بوك بل الله يه يمي كه أيكوني استباره كن علامات مويكي بن شلاً سور معنم كي سركِّه شت جوكه أيك منقوب معدی فرحه(peptic ulcer) یا جا والنها ب زائده کا بیشرو بوتای جیفن کی سرگذشت اور برقان شفے الدم دم بولیت کے سابقہ وفرع کے متعلق دریا فت کرنا چا ہیں نیزید کہ وزن میں کوئی تا زہ کمی تو نہیں ہوئی ہے۔ موجودہ مالن کی سرگذ شنت میں برنسوالات نتامل مول کے کہ حملہ کا آغاز حاد طور پر مواہد یا تدریمی طور پر۔ دروکا مفام اور اس کی نوعیت کیاہے ؛ آما وہ حرکت کر گیاہے پاکسی خاص سمت میں دوار آہے ؟ آیا در معاسم فی کاکوئی ملازم به ؟ می کس نوعیت ی ب ؟ آیا متلی موج و سب ؟ اً نُتُول کی حالت کبیسی ہے ؟ ا متیان غذائی نظام کے متعلق ہی نہیں بلکہ کمل ہونا چاہئے '' ساكة سس درون معدري منروات مثلاً لمورى وانتال يد التهاب تا رمور اورضاد ا متلائی قصل قلب معداکلیلی ملتیت کئے ہزائی نخاع کے معدی تجرا نا ت اور گردوں ا درِ بولی خط کے مزرات مینی التہاب گروہ وحرض گروہ (pyelonephritis) التہاب گردگو (peri-nephritis) كما والتهاب مغز إكستوال (osteomyelitis) اور نثوكه كه مرف بإشار pott) كور تمي ما لتول معنى لوريا وموبيت (uramia) ويا بطيسي قولا اور وَوري ع (cyclical vomiting) كى تشغيص موجاك. توليخ بنايت حادثتكى علاات

بداكريكة بين يمنى معائى قولنج رمعاصى نولنج (lead colic) صفراوى قولنج بيداكريكة بين الركة بين المينة و المعالى المنظم الم

ر دوری کمن حالتیں یہ ہیں: مشکی نفلومنز ائتدّن بالحضوص لفائعی اعوری غدد کا ممیات مومنه غذائی سنم تقیمی النتهاب وریدالباب (pylephlebilis) اور هارینی مالک میں امیمیائی زجیرُ التهاب مرکز اور ملیریا۔

النباب الغم (STOMATITIS)


بعض طِدی امراض کے صررات خدی نشاد خاطی کو بھی ا و ف کردیتے ہیں مشطاً سلم (herpes) و ارتشاری (urticaria) کے نیملی اتفاع (pemphigus) اور مشیری (urticaria) کے نیملی اتفاع (herpes) ایک حالت سے ہیں ہیں بے شار تعیونے تھیو کے فوج تام مسور معوں برا ورگالوں کے اندر بائے جاتے ہیں۔ یہ قروح اس قدرائیم ہوتے میں کرند اسپیل یا آدمد مشوس ہونی جاسے ، کیو کہ تمضن نامکن بوج آجے۔ علیٰ یہ ہی کی کھی ہیں بورہ س (glyc. boracis) کا بار با رائیات کیا جائے۔

عفونت وی التهاب الفاجله عام خوابی صحت کی حالتول می بی خاص دور و بنا مزوری به مون التهاب الفاجله عام خوابی صحت کی حالتول می بی خاص دور و بنا مزوری به ما و جوفیزی مجبور سے کے علاوہ مین حالمتیں ایسی بی بوطبی نقط نظر سے ایم ہیں : — (۱) ما و جوفیزی مجبور الیا جا ہے جوفری میں مردہ و انتاب کی جرفوں کے گرد بنا ہے جوفری شدول مردہ و انتاب کی جرفوں اورا سے و انتول کی جرفوں کے گرد بنا ہے جو حوبیت ربودہ ہوگئے ہیں ۔ یہ بنین بنا سی جید سے سرایت زوہ بوتے ہیں جو العموم غیزوں بیش و انتاب کی جوفی ایک میں ۔ یو تکہ ارکی سلعہ کی ویوار مونی بوتی ہیں اور دوران تخریج میں وہ و انتاب کی جوفی ایک انتاد کا انتا خطر نہیں ہے کہ فینا موجود بول ۔ یہ جبی افلی ہے کہ بیت خوابی صحت کے علامات اور کا ان اور عدم دمو بت موجود بول ۔ یہ جبی افلی ہے کہ بیت خوابی صحت کے علامات اور کا ان اور عدم دمو بت موجود بول ۔ یہ جبی افلی ہے کہ بیت صحت کے علامات اور کا انتاب موجود بول ۔ یہ جبی افلی سے کہ بیت صحت کے علامات اور کا انتاب موجود بول ۔ یہ جبی افلی سے کہ بیت صحت کے علامات اور کا انتاب موجود بول المبدا اور حن کا انتاب موجود بول المبدا اور حن کا نواز میں اور انتاب کی انتازی قروح المباری البتاب ور بیت موجود بول المبدا و انتاب التباب مفصل (infective endocarditis) البتاب و نیج البتاب و نوب البتاب فرنید (keratitis) البتاب فرنید (نیتاب فرنید (keratitis) البتاب سے سینید

(choroiditis) آتن راسي اريجي سلحه كانتيجه بوسكتے ہيں - بيظ مبرے كه مروه وانتول كو نكال ديناط بيئے ليكن ببي كافى نېسى كيونكه مكن بيكه اس وقت بجي جب كدوانت تندرست نظراتا بواور أسي مقب تقبل في سه زكوني در داور مذكوني اليميت محمول موتي بوايك اركي ملعه موجود بو ـ واحد ضيم طريفه بهي بيه كه دندا ني شعلع نگارش لي حاكيس اي م جن میں برطوں کے مقام پرصاف فضائی موجونی سے اربی سلدی سشناخت بآسانی بوجاتی اللہ ہے۔ مکن ہے جڑ بجائے خو دمذب ہوجائے۔ سرابت سے پیداشدہ ان فضاؤں کو بعض تشریمی صوصیتوں سے تمریر کو ایا جائے اسلا اوالی جرے میں صنی حفرہ جوکہ مركزى تنايا كير رامول كررميان من الدمس سداد يرانفي حفرات فكي مغارموكم لواس اورمنوامک کی جراول کے قریب ہے ۔ زیری جراف بی جمانی سی قنال کاخط جرکہ طوامن کے راموں کے نیچے ہے اور ذقنی موراخ جرکہ منوامک کے نیچے ۔۔۔۔۔۔۔ (۷) جو فینہی سر ہمی مسیلان من میں مزمن النباب ہوتاہے اور منس کے ساتھ د انتوں کی جراوں کے گردی بڑی جذب ہو جاتی ہے۔ یہ گردستی غشا کی دبازت کی عیثیت سے تغروع ہوتا ہے (جراوں کے مین گرداگرد کا شفا ف رقبہ) اور حکن ہے مسوڑ سے کے ماثنہ 322 كى محدود المقام رب يا تمام مرك كرديس كر كور المقام رب المقام المراح (dura (جرکه گردستی غشا کے گرد ایک غیر شفاف خطر ہے) معدوم ہوجا تاہے۔ دانتوں کے درمیان جیبیں بن جاتی ہیں۔جیب کا فرش دا نول کی جڑوں کے درمیان لنسبتہ زباده چرا بو آئے اور اس كا فتر تنگ بو ما بے جس كانتني يه بو ماہے كدوه غذا كي لمي اور میں سے بھر جاتی ہے (لاحظ۔ ہوصحنہ ۱۱) میلیت میں متعدر رکا وٹ ہوگی جوئے خون کی سرایت کا وقوع اسی تناسب سے ہونے کا امکان ہو گاہے جب بیب کا اخراج آ زا دا نه بوتاً بِنْ توخر دعفنو بِي بُكِلِے حاسكتے ہیں اور بھیروہ مختلف غذائی انتملا لا^{نت} بہل^ا كردية بير. ليكن مفنويوں كوشكلنے كي نسبت جوئے نون كى سرايت غالباً زيادہ خطاک ہوتی ہے۔ کو ڈرکش (Goodrich) اور موزلی (Moseley) کی راکتے ہے کہ جوفیزی رنمی سیلان اولاً دہن کے تخیف شعریہ (leptothrix) کی وج سے ہوتا ہے اسکن اس کے ساتھ دوررے عصوبے نبقات سبھی وغیرہ بھی ہمیشہ پائے جاتے ہیں، اوریہ اس مختف امرامن کا بتب موتے ہیں جوجو فیزی رئی مسیلات سسے نا نوی طور بریب ا













شکل م ۔ ۵ ۔ ۹ ۔ جبڑے کی شعاع نیا شتیر من برعاجل جوفیزی بجی سیلان نظر آنا ہے ۔ و انتوں کے درمیان اور گرد مسی فدر دوفیز و نف ہوگیا ہے ۔ 'مارز کا اکثر حصّہ دور کرویا گیا ہے۔ (ایچ - ایم ورتھ کی لی ہوتی فلوں سے) ·

عفونت دمین کی خور بینی دوک تفام کا پیطریقہ کہ دانتوں کو انکلما ان اور ٹارٹار سے باک د کھا جائے کے ساتھ ہی اس امر کی انتہائی اختیا طرحتی جائے کہ برش سے زیا دہ سختی کے ماتھ رگر نے سے مسوڈ تعاما د ٹا زخمی نہ ہو تارہے ۔ غذا میں کا فی حیا تیمنیں مونی چا بستیں ۔ ست براسی اس بی سلحہ کا علاجے یہ ہے کہ دانت کا لویا جائے اور زیادہ برجے ہوئے جوفیزی ربی سیلان کے لئے بھی بہی بیان ورست ہے کہ وائت کا کوئی تنافی علاج نہیں ہے ۔ دا نت کو نکا لئے سے چندروز پہلے وو ملا گا موفعوں پروانت کو کھرجے (عدمان) کراور دوسرے طور پرصاف کر لینا مناسب ہے کیو گائی موفعوں پروانت کو کھرجے (عدمان) کراور دوسرے طور پرصاف کر لینا مناسب ہے کیو گائی سے عفونی جنہ ہوگا کو مینا مراب انتہا کو گائی ہوئی ہے کہ انتہا کہ بی مزنبہ کیا لینا بہنر میں ہے (4) ۔ شفیفی علاج بیعنی جیبوں کو و قتاً فرقات اً دموکر صاف کرنے رہنا بھی اختیار کیا جا آ ہے ۔

تعائمال (thymol) کا آبی معلول ایک مغید عنول دون ہے کیونکہ یہ ایک خاص طور برقوی وافع عفونت دواہے۔ تعائمال پانی محاندر بہت ہی حفیف مل پذیر موناہے، چنا نچید صرف آنئی صرورت ہے کہ پانی کی ایک بوئل میں اس کی دویا تین قبیس ڈالگر اسے کچھ عصہ تک رکھار ہنے دیا جائے۔ اگر بیرونی تیش لمت ہوتو یہ محلول دیا وہ قوی ہوجا ہے اور منو میں ایک جان کا اصاب پیدا کو تیا ہے کہ این ایسال سے پہلے بلکا کرلینا علیہ ہے۔

ازلتى التهاب الفم (catarrhal stomatitis)

اسباب - نازلتی التهاب الغماولاً توکیمیائی یامیکان خراص سے بیدا













ہوسکت ہے جیسے کہ ترشوں اور قلو یات کے نماس کٹر ت شراب نوشی یا ٹوٹے ہوئے یالوبیدہ رائنوں کی موج دگی سے دورے وہ اسپیے التہاب سے رہا ہوسکتا ہے ' ہو ہم پہلو حصوں سے پیسل آئے ' جیسے کہ ناک یا انفی ملبعوم سے سوئی بھن مموم کے عل سے ' بیسے یائے جست اور سنگر اور چہارم بعض عمومی اور پشتر ساری حالیوں کی وج سے جیسے کہ کھسرا جیک ' آتنک وادا اعظر سفید نونی عدم ومویت وغیرہ سے۔

علامات بہ ہیں: _موڑھول کبول اور گالوں کی اعضیٰ عفاطیہ کا ورم اور زائد مرخی زبان کا ورم کثرت رہیں اور خدی مخاط کے افراز کا بڑھ جاما کہ جسطے برایک مناد کی برت چیک جاتا ہے اور ہم بہلو لمغائی غدد کا ورم ۔ چیاہے اور نگلنے میں ورد ہوتا ہے کا اور کمن ہے کہ درج ل میں خرامت یا گی اور او بری تقیمیٰ اور او بری تقیمیٰ واقع موریا باہے۔

عنون عند المع عنی الامکان خراش کے تمام اسباب دور کئے جائیں' اور داخع عفون نفید الن کام بن لائے جائیں' جیسے کہ بورک آبیٹ (۲) ہ فیصدی) پوٹائیئم کلوریٹ (۳ فیصدی) ۔ اور ما بعد درجوں بی نسبت زیادہ قابض کلولاست جیسے کہ محیث کری (alum) (درگرین فی اونس ' یا گلیدین آف ٹیانین و delycerine of

فلاع البهاب الفم

(aphthous stomatitis)

یہ بجوب برواکر آہے الم نعوش پہلے انغاد کے زانہ کے قرب بہا اور بالنوں

323 میں کمنز ہوقائے ۔ اس بی بہ ہوناہے کہ موڑھوں اور زبان پر اور لموں اور کا لوں کی

اندروی علی بہکول رمادی حکینیا ن با فلاعات بن جاتے ہیں ۔ یہ قطر بیس تا دہ کی ہیا۔

اور معلی سے قدر سے او مراع نے ہوئے ہیں اور اگر جہ آ لموں کی طرح نظراتے ہیں

اور معلی سے قدر سے او مرائے ہے ایک فائس بنی ارتباح ہوئے کی وج سے پیواجوجانے الکن ورحت بیا ہو جائے ہیں

کی عزد کے معدم مرام محمط کر گر مانا ہے اور مجوعے کر رماوی دیا کے قرنے رو طاخہ بیں

بن سے مانینے منگ اور مسموم ہوتے ہیں۔ سبلامندہ سے بدی ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔

بن سے مانینے منگ اور مسموم ہوتے ہیں۔ سبلامندہ سے بدی بوتے ہیں۔

اُخبیں کینقدر تب ہوتی ہے' راپی کی خنیف می زیادتی ہوتی ہے' اور دو وہ چینے یں یا چہاہئے ہیں در د ہونا ہے۔ یہ قروح چندروز میں مندل ہو مائتے ہیں' لیکن مبعض مربینوں میں مکن ہے کہ بیر منودار ہو جا ہیں۔ اِلغوں میں قلاعات اتنے بے شارنہیں ہوتے جتنے کہ بچوں میں۔

كنگريني النهاب الفم (gangrenous stomatitis)

عُسلاخ - بچيكو بجائے كا واصطريقة يہ ہے كہ ما وُف مصر كوفى الغوزاُ مارك اكب لله مسے كف كرديا جائے ايا جوسے اس كا استيصال كرديا جائے . علاوہ از ہي بچيكو غذا اور مہتمات سے سرمارا و نا جاہئے ۔

> فلاغ (thrush)

تلاع كمزور اور نافص تغذيه ركلنے والے شيرخواروں مب اور بالخدوص أن ب

(glycerine of borax) مندكراند باقار بن دنا ما بيت -

مرى كانسدو

(OBSTRUCTION OF THE ESOPHAGUS)

به غذائی نالی کے بس حقے کی ہم زین اوا نمیانی مالت ہے۔ اس کے اسب بہ بیاد اسما غریبہ کا تعبیس حقے کی ہم زین اوا نمیانی مالت ہے۔ اس کے اسب بہ بیاد اسما غریبہ کا تعبیس جائی ہوئے کہ صفری وائنوں کا ۔ واسلی بالب رو سے دباؤ والن ۔ خود نالی کی وائن میں مرطانی یا دوسر سے مسلمات کی بالبید کی ۔ اکال سموم سے متضر رم وجائے کے بعد اس میں جو قرور ح بیدا موجائی ان کے القیاض سے نمین بیدا ہو جائی ۔ اول اول کا فعلی اس میں جو قرور میدا موجائی ان کے القیاد (cardio-spasm) عطفے ۔ آخری جا رمالتوں بیلی وائن کے الفواد (cardio-spasm) عطفے ۔ آخری جا رمالتوں بیلی وائن و خورکما جائے گا۔

مرئ كاسسطاني سلعه

(carcinoma of the esophagus)

ریمو گاری عرس مواکر تا ہے اور ورتوں کے نبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ
الید مَری کے بالائی گف کے نبت زیاد وکٹرت کے ساتھ اسکے در مبائی اور زبر بن لٹ میں
واقع ہوتی ہے الیکن فصبت الربہ کی دوشاطی کے مقابل اور مَری کی فرادی انتہا ہر وہ الحفول کنٹرالوقوع ہوتی ہے۔ مَری کا سسرطان ہمیشہ اولی ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ الدون مری بس نا ہمواد منظ بیداکر و بنائے۔ رسولی مری کو جزئی بالحی طور بر گھیرلیتی ہے اور انتفال با با ہم انج تک عبلتی ہے۔ مزید برآل باکشت قصبته الربہ یا بھیر ہوئے۔ کی جڑکو اوف کردی ایا بازگر د منجی اعماب بردا کو ڈ التی ہے۔ و اسطی لمنی غدد بڑے ہوجاتے ہیں اور عام طور پر

علامات میلی اور نمایا ل علامت عمرالبلی ب مریعن عموس جیزون علیه اور نمایا ل علامت عمرالبلی ب مریعن عموس جیزون علیه اور ترقیق مرسی الات به ادام الاستان به دوست بندریج زیاده مونی

جاتی ہے، اور بالآخر ملوں غذا حبور وینی نیرتی ہے۔ صرف العات لئے جاسکنے ہیں اور اگر ایک وقت میں ایک منصر عصریت زاید ما نع لینے کی کوشش کی جائے ، تووہ واپس مکل آ مان ا ورمکن ہے کہ مربض کو انھے لگ جائے ۔ در دعمو اً ہنیں موجو دمو یا۔ چند ہفتوں کے بعد میں ا ڈ بلا ہونا شروع ہو تاہیے اول_{یا}ٹس کی طاقت و تو انا ئی کمر ہو تی جاتی ہے ۔ یہ علامات عمواً ترقی ید پر ہوتتے ہیں کیکن کم کھی رسولی کی سلح برے بعض صوب کے ریزہ ریزہ موکر على و بوجائے كا بنتيجہ جو ماہے كرمرى كا قطريد عجر برا بوجا ماہے اور مريض كى مالت مِي خارصني اصلاح بروجا تي ہے ۔ اڳر کو ئي تدارک نه موسکا مواتو عن حسمتگي سے بابيجيد گيوك کے باعث مون واقع ہوماتی ہے ۔ اس طرح بریعض مربینوں ہب رسولی ہے بھیلنے است قصبنة الريك بساتة ارتباط وأنع بوجانات فنداك ريزي سائس بب اندر عليه طت مِن اورعفونی تنعبی ذات الریه (septic broncho-pneumonia) شروح مومآ، د بیں دور پر ہے مریفنہ ں میں نوبالید کا حملہ برا ہِ راست سے شش سر بزنا ہے اور گنگرین! شعی ذات اَلریٰص کے مانخو مکن ہے کہ ذات الجنب یا نقیج الصدر بھی موجود ہو' مریض کو مو*ت کے گھا*ٹ اُ رو تیا ہے۔ اور بھی دو سروں میں اس وقت جب کہ اِلید یا لائی^ے بربو بازگرد خری اعصاب برد باویر نے سے مزار کے عضلات مجتبدہ مشاول ہو ات، ... نبس سے مکن ہے کہ انتفاق پیدا موصائے ۔ نتاذ اصا نبول میں ایسا بھی ہواہے کہ رسو یا نے اُور طی کو کھا کر طاکت جیز نزف بیدا کردیا۔ بالآخر عرطان کے جاؤدورے انفد عبى ميبيدا بوماتے بين بالخصوص مگراور ميسميروں بي كتبى كمبى عاموت كاسب بونے ہیں ورانجالیک مری کے اندر کی بالید اس قدرخنیف ہوتی ہے کہ منتلے ہیں کوئی وثبت

سیخیص بی سال سا او پری عوالے تخصی بدری برطن بوا مدائد اصا بتول کی خالب نعداد مین مری کے سرطانی سلوکے اعث متواہ و ابعض او فات میں ہے کہ عمد البلغ کی حالت نظر انداز ہوجائے و مشلاً غذا مری کے اندرسنگی کے متعام سے اوپری اور اسنے عرصہ نک ٹہری رہے کہ اسس کی بازروی کومریض یا کوئی غیر خیا طامنتی میں اور اسن طبح ایک معدی ضررکی خطرت خیص ہوجائے ورکس طبح ایک معدی ضررکی خطرت خیص ہوجائے ورکس طبح ایک معدی ضررکی خطرت خیص ہوجائے۔ مریض اکسندہ مختیک لیک تا تارک ہے جہال تسد دواتع موتا ہے۔



اِنداد - یہ کمیاں طور برخراب موتا ہے ۔ اگر تسدہ دور بی کردیا جائے تو تھی یہ دیا ہے۔ اگر تسدہ دور بی کردیا جائے تو تھی یہ درسولی تھوڑے ہی کرمہاک نا بت ہوگی۔ مدے حیات عمر ما جو سے بارہ مہمنوں کک کی بوتی ہے ۔

عملاج - اگراید حمیونی جامت والی شمدگذاری جاسک تو به زوسری این برت و در این اس کے انتقال سے راست کو کیے عوص کک کھلاد کھاجا سکتا ہے ۔ لیکن غذا کے داستہ کو کھلاد کھاجا سکتا ہے ۔ لیکن غذا کے داستہ کو کھلاد کھنے کا بہتر بن طریقہ یہ ہے کدا دخال انبوب اس طریقہ میں جو لیہ کرنس ایم راستہ کو کھلاد کھنے کا بہتر بن طریقہ یہ اور مریض کو انکی کرنس ایم رائد ادکرا سے آئی زن تک یا متعلا علی نا ارد ہے والی بات ہوں کو انکی وریع معلی و ما طت سے سیال غذا وی جاتی ہے ۔ اگریہ تدا بہزا قابل علی بون تو نفو دید معلی و ما طت سے سیال غذا وی جاتی ہے دریع معد سے کو کھول سکتے ہیں ۔ بعض او فات می کی بالید بر دیڈ میم کے مقامی اسل می جاتی ہے دریع معد سے کو کھول سکتے ہیں ۔ بعض او فات می کی بالید بر دیڈ میم کے مقامی اسل می جاتی ہے ماسل ہونے ہیں۔ بالید بر دیڈ میم کے مقامی اسل می سینی میں شخصی کی استعمال سے ایمی ماسل ہونے ہیں ۔

ندبي نبغ

(cicatricial stricture)

اس میں عی فاص علامت عمر البلع ہے۔ ایمن یہ سرطان سے ہس امریم مختلف ہوا ا ہے کہ یہ ایک فاص درجہ سے ترقی نہیں کرتا اور اس کے سواکہ اس کے اوپر کی انہو بہا اتباع کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ غذا ہنیتی کے مقام سے اوپر اکثر مجتمع ہوجاتی ہے اور مجھ عرصہ کے بعد والیں بحل آتی ہے۔ مقام سے اوپر اکثر مجتمع ہوجاتی ہے وز بینہ تعین کی جاتی ہے۔

تضخیص می بینی کے ذریع متعین کی جاتی ہے۔
عبد اللہ میں کا میابی کا کا فی موقع ہوتا ہے بشر طبیم مبس بابات کی بلی
تفیق کی اہ سے معدے کے اندرواخل کی جاسکے ۔اُسے با قاعد کی کے ساتھ ون میں ایک
یادوبار استعمال کرنا چاہئے اور رفتہ رفتہ زیادہ بڑے بڑے آلات گذار سے کی کوشش کرنی چاہئے ۔مکن ہے کہ ما بین غذا کی ہویشنہ صرورت بڑے الات گذار سے کی ما تھو کی معدہ کا علیہ مناسب بوتا ہے۔

شنجى غنيق

(spasmodic stricture)

ورحتیقت برایک بالک عام حالت ب اگر جدع و اُ اس بات کالیمی انداز آبی کی جا نداز آبی کی جا نداز آبی کی جا تا در خال کی جا تا یہ کی خال کے در ذاک اور ساتھ ہی کا جا کہ در ذاک اور ساتھ ہی کا جا کہ در ذاک اور ساتھ ہی کا جا کہ اور ساتھ ہی کا ایک در ذاک معلم می معلم میں ہو کہ میں ہو کہ میں ہو کہ معلم کی ایک خطر ہیں ہو دالم حظہ ہو معلم ہو کا ایک معلم کی ہو جا ہم کے ماتھ موجود ہو تا ہے جدا کہ لا شعاعی ترکیم ہے۔ اتساع کی وجہ سے ہو تا ہے جوائل کے ماتھ موجود ہو تا ہے جدیا کہ لا شعاعی ترکیم ہے۔ قالم برہے کہ شخیم مطلق نہیں ہو تا بکر غیر شفاف کھا مے کا کچھ حصہ تغیری کے ہا زمیل ہی با ا

علائري كم وروشن (Plummer-Vinson syndrome)-يرايك فعل



اله م يوى عطف بريم كمان كيعد وشوع كاشت لندت لاك ني كاب



ب. سوزش سیندی ترجیح طور پر دیکھنے بر مری کی شعاع سگاشت ۔ مری مواسے متورد ہے اور بالا لی اورزین د و نوں سروں پرشنج موجود ہے ۔ (ولمبیو ۔ ولمبیو بین : W. W. Payne اور ای ۔ پی لیٹن . E. P

بلقائص 825

(-(2) Poulton:

المعرب البلع من بواليس مريفون من بوآج بن كونانوى عدم دموست اور بعض اوقات من المعرب بوقي المعرب المن اكثر اوقات مجويم الموت بي مي تقريباً فالعند عورتول من بوقائ الارتخار بيض الميثر الموقات بيلا بالمواجي بوقي بالمواكثر مريض المجين بوقي بالمعرب دانت بملواجي بوقي بالمواكثر مريض المجين بيلا بالمريش (Paterson) اور برون ملي (Brown Kelly) لا مواكد من دريافت كي متى (5) - تسدد لمعوم اورم كي متام انهال برداخ بوقائ اورم من باكر مكل سينعلق بلعوم عضلات كي كروري كوري كوري مواكد من مواكد في مقام انهال برداخ بلومي عضلاك مرتني نرويك كي وجرس بورياطتي لمومي عضلاك كي دري دموسي بورياطتي لمومي عضلاك كي دريان المناح كا متناه المناح كا مقصد على دموسية كورا والمراكز عدا المناح كوشفاد يناب (6) -

فوادكا عدم انشخاء

(achalasia of the cardia)

م بدر ملدون

منفیره جوطولی اور مرقرعضلوں کے درمیان واقع ہے 'طہندب ہوجانا ہے' اور زیادہ عرصہ کی ' اصابنوں میں کلف ہوجانا ہے (9) ۔ انبدائی درجوں ہی مُری کے شکول جھے سے او پیضلی طبقہ 'ڈ میش بپرور وہ ہوجا نامیے جس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ غذا کا میابی کے ساتھ فواد کے آریارگذر میں مان میں درک دُرولا مونوں نہیں میں تقدید میں میں انداز میں تازیہ میں آن

مانی بن اور کو دی علامات خلام زمیس بونتے۔ بعد بس اِنساع مخلف، درب کی بیش برورش می کی کی میں برورش می کے ماتھ م کے ساتھ واقع بوتا ہے اور مکن ہے کہ مَری کے مخاطئ طبی طبیقہ بیں بھی کیجے مزمن التہب ب

فوادگاعدم انتخاآ تشک کے سب سے بوسکتا ہے اور مطافی فیق mitral)
(mitral میں بھی جواہے جہاں قباس ہوتا ہے کہ تسع بایاں او بن عصب تائید کودبا
دیتا ہے۔ وہ معدی قرصہ اور سرطانی سلعہ کی حالت میں بھی و اقع جواہے عمواً اسس کا
کوئی ظا مراسب بنیں یا یاجاتا۔


علامات منعن افغات سے میں اونات اس کے مریضوں یں برسوں تک یہ شکا بیت المواکق ہے کہ نگلے کے بعد النجیس علق بی غذا کے جبکہ جائے کا احماس ہوتا ہے کہ شراسیف کے مفام برختیقی در درہوتا ہے غذا بازر ورہو ابی ہے کہ ابندا ڈسٹنجی ہو'ا در دفیاً فرقت کے بوالت اکٹر بتدریج بیدا بوتی ہے 'اور حکن ہے کہ ابندا ڈسٹنجی ہو'ا در دفیاً فرقت کے عودکر آتی ہو کہ سمتھ (bismuth) کی غذا لینے کے بعد لا شعاعی امتحان کیا جائے تو فلا ہر ہوتا ہے کہ مری تسم ہو کرا کی تکلہ نماجم من گئی ہے 'جس کا زیریں سرائنج تراد و جاڑا ہوتا ہے کہ مری بین سے می نظر آجا ہو۔ جہ اور ۲۰) مکن ہے کہ یہ انساع مری بین سے می نظر آجا ہو جہ کہ اور بین اس میں مری کے عریض ترین جستے کا اندرونی ممیط ، آگا اسٹیٹی میٹر د ہو تا ہو ایک بہنچ گیا ہے ۔



تر چھے مور پرد کھنے پر مری کی شعاع بگانتیں جن میں مری کے اساعات اور فواد کا عدم ارتخا، تبایا گباہے بمندکے اساعات اور فواد کا عدم ارتخا، تبایا گباہے بمندکے اساعات اور فواد کے مرفل کے مقام پر ہے ۔ فقری عمو د کے سانے کاسا یہ دایا ڈایا زام ہو۔ (مسرو کہ برو لنڈے کا لئے کا کہ کے لئے موٹے صحف ہے)

المفال کے لئے موٹے صحف ہے)





صحفہ واسے امتیاز کرنے کے لیے ایک طبی مری کی شعاع بھاست لی گئی ہے۔ ایک سریع کشف مذہر بیریم کھانے ' کے روتین سیکنڈ بعد کیا گیا اس وقت جبکہ ابھی فواد آنا حرق نہیں ہواتھا کہ بیریم کومعد و میں گرمانے دے فواد کا دو ہراسایعنی بیندے بر بیریم کی تنگ مصاری اس لئے ہے کہ دوران کشف میں فواد کامقام بیریم عمود کے وزن سے بدل گماتھا۔ (دُبلو۔ زبلورین اور ای۔ یی ۔ یولئن) علاج ۔ بعض اصابتیں ہملک ثابت ہوئی ہیں۔ و سری اصابتوں ہی مریفیوں کے اس وقت کاالفاع الله غدا سے یا موس غذاکو نبابت احتیاط کے ساتھ جائے تو وہ سیال کے اس وقت کاالفاع الله غذا ہوئی ہوں کے طول کے برابر بہنچ جائے تو وہ سیال سکونی واؤکے زور ہے عفلہ عادرہ کے آریاد اپنی جائی استان کی دیا ہم جس کے اس کے اس کا سیال کمی دور ہے عفلہ عادرہ کی بھوئی آب ہوئی جائی ہے ۔ بعض اصابتوں کا تدارک ایک نیادہ منعدی کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک بارے سے ہمری موٹی زبرکی بلی زیادہ منعدی کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک بارے سے ہمری موٹی زبرکی بلی ہر کھانے سے پہلے معاربے میں و اصل کروی گئی ہے 'یا ایک انہوئہ مری کو معد عین العلاج مرکم اور اس معدے کو کھول کر عفائه عالم رکھ کرمہ یفنی کو جاروں کی گئی ہے عمی العلاج اس انہوں میں الایا جاتا ہے۔

عطف

(diverticula)

مَى كى د بوارون مِي جيسِي (pouches) باق مِن مِي مَد بوران كَيْسَيم (1) فت رئ طنوں (pressure diverticula) اور (۲) حبستری عطفوں diverticula) من كى جاتى ہے۔

ا. فنفام ی عطف اجام غریبہ کے مغروز ہوجائے ہے یا دورے مقامی تصرر کی وجہ سے پیدا ہوجائے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بطا ہرعضلی طبقہ کمزور موجا ہے اور مخاطی اور سخت المخاطی طبقات عضلی دیشوں کے در میان سے با ہر المعرجائے ہیں کہ بین جینا بی عفلی ریشے عطف کی پیششش میں صدیبیں لیتے ۔ جب ایک بارا بیا ہوجائے تو ہس تاجہ کے اند دغذ اجمع جوجاتی ہے ، اور یہ تھیلی مت در بج بڑی بوجاتی ہے بیہاں کہ بیس پیدا کرنے کے قطر مک پہنچ جاتی ہے ۔ ۲ - جس ی عطف جوعموا کوئی علامیں نہیں پیدا کرنے ، باس کے صوب سے مری کے جبک جانے کی وجہ سے ممؤو دار ہوجائے ہی فہنس پیدا کرنے ، باس کے حصوب سے مری کے جبک جانے کی وجہ سے ممؤو دار ہوجائے ہی فہنس پیدا کرنے ، باس کے حصوب سے مری کے جبک جانے کی وجہ سے ممؤو دار ہوجائے ہی فہنس بیدا کرنے ، باس کے حصوب سے مری کے جبک جانے کی وجہ ہے ممؤو دار ہوجائے ہی فہنس بیدا کرنے ، بی عطفوں کی نمال عمر اللہ مرا نمی کروی ہوتی ہے وہ بیجے ، بموم اور وری کے مقام النہ بین عام جو تے ہیں ، جب کہ وہ گرون کے دو بول طرف یا مبھل وقات النمال برنہا بہت عام جو تے ہیں ، جب کہ وہ گرون کے دو بول طرف یا مبھل وقات النمال برنہا بہت عام جو تے ہیں ، جب کہ وہ گرون کے دو بول طرف یا مبھل وقات النمال برنہا بہت عام جو تے ہیں ، جب کہ وہ گرون کے دو بول طرف یا مبھل وقات

.

رفِ ائی طرف ہی بروز کر آتے ہیں کہ س کے بعد دومری عام ترین جد مری کے ذیریہ برے کے قریب ہے (1) (صفحہ ۲۷ الف)۔

علامات بدین عرابی فادری بادری بادری می دری می کے ساتھ اکثر المجبولک ما به باکستان بولگ میا بی با دری میں باکستان بولگ میا بی باکستان بولگ میا بی باکستان بولگ میان بی جمع بولگی بی بی باکل میدود بوجائے عطفوں کی شخیص بیریم بی کاند کے بعد الا شعاعوں کے فدیو سے کی مباتی ہے (کا خطر بوسعفد ۱۸ الف اور ۱۳ الف) اور مری بین سے بی بولگی ہے ۔

رین سے بی بولگی ہے ۔

ریں ۔۔ بی در بی ہو ۔ علاج ۔علیہ کر کے جیب کا ہتیصال کر بیکتے ہیں نیفیف اصابتوں بی ہمند تھر کر یا نی اندر لے کراور از اں بعد ہمشس یا بی کو بندر بعد بازروی با ہر نکال کر جیب کو **باقاعی** کے ساتھ دھونا مکن ہیںے۔

معشد کاامتحا

معد کی وضع مریض کی و عنع کے ساتھ برلتی رہتی ہے۔ انتھابی وضع مرج ہوگا وادی ہر اعلمی صدر کے اندر واقع ہوتا ہے احداس کا جہم اور بواب شکم کے اندر ہوتا ہیں۔ افغنی و صنع میں معدہ اور بی چھے گر کر بیار لی نے جلا جا ایک اکور ترابیت میں۔ افغنی و صنع میں معدہ اور بی چھے گر کر بیار لی نے بیار ہوت کی معدد ہوا موجود دہی ہو اور اس کی سنناخت کا ذر بعد وہ کا ال تطبی آ واز ہے جو سامنے بائیں صدر کے زیری صحد کا قرع کر لئے سے حال ہوتی ہے۔ یدر قبدا و پر پیش قلبی اسمیت سے کا قرع کے دیا ہے اور پیچے طل کی مسیت اور رہی گی سے محدود ہوتا ہے۔ معدے کے قرع سے جو آ واز حاصل ہوتی ہے۔ اس آ واز سے تمیز نہیں کیا جا سکت اور وی گی اند کی ہوا کے اند کی ہوا کے سیاست اور وی ہے اند کی ہوا کے اند کی ہوا کے سیاست اور وی ہوتا ہے۔ اندا مور سے کا خاکہ دریا فت کر ہے کے یہ طریقہ کی ہوا کہ اندا کی خرا میں۔ معدہ کے متعلق حریت انگیزا مرید ہے کہ اس کی جہامت اور وصلے ہیں کہ جن سے عذا کی تغیر پذیر متعلا وال کے لئی بہت بڑے افغال فات واقع ہو سکتے ہیں کہ جن سے غذا کی تغیر پذیر متعلا وال کے لئی کرنے ایک ایک سے معدہ کی معدے میں طوی اور کم والے معدے میں طوی اور کہ والے معدے میں طوی اور کہ وصلے میں کئی کے دور سے احتاء کی طرح معدے میں طوی اور کہ والے معدی میں طوی اور کہ والے معدی میں طوی اور کہ والے معدی میں طوی اور کر میں کو کی اور کہ والے معدی میں طوی اور کی معدی میں طوی اور کے معدی میں طوی اور کی معدی میں معدی میں معدی میں میں معدی میں میں معدی معدی میں م

علطب مبددوم

ایک نظام موج دہوتا ہے کیکن اس کے ملاوہ آل ہی ترجیے راشوں کا ایک اندرونی نظام می پرتا ہے جو مری کے مروّر رائشوں سے نکل کرنیچ کے طرف معدے کے اِنحنائے سنیہ کے برابر جیے جانے ہیں اور کھی سلحوں بر آیک نیکھے کی طرع میں جاتے ہیں۔ یکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کا تعلق انتخا کے کرئے نئے کے طرف ہونے والی اس جرکت سے ہے جو معدے کی بُری کے ساتھ ما تھ ہوئے لگتی ہے۔

معدكالانتعاعيل امتظ

میں کی وساطت سے معدے کی شکل برامت اور رکت پذیری کے متعلق قبمتی معلوا عال ہوتی ہے مریض کو دَلیے یا دودھ رونی کی عدا دیجاتی ہے حس میں سیمتھ کے ایک عار الح كے م اونس جو ہنتر ہے كہ أكسى كلوراً برائا بور با بدر تيم سلفيٹ كے م اونس سال ہوتے ہیں۔ بھرشمامیں استعال کی جاتی ہن اور اس کی بیا سے جوکہ یروہ مرضمولفاری ہ لیج کی وجہ سے گرتا ہے .معدے کی وضع اور حیا مت ظامبر ب**موجاتی ہ**ے ۔ لانشعاع ک ظامر ، بنواب كه معده ايك انتصابي مصداور ايك أفتى حصة يرشتمل بوناب من كوائخا صغیر برایک نها و متی تله جلارات من فتر فوادیه کے لیول برایک خیالی افتی خط انتصابی حصہ کو دو میں تقتیم کر اہے۔ اوپر کے حصے کو جس بی عمونا ہوا م جو د ہوتی ہے ؟ قعر اور نیچ کے جصے کو جسلم کہنے ہیں۔ اُ مَنِي صد بقابي د همليزاور بقابي قنال مِتْ مَن بِوَا ہے۔ آناعتری کا بہلا حصد معدے کے نعل کے اثنا می کیموس (chyme) كوومول كرمًا اور كي من كار بن ركفات عن بيا تجد لا شعاعول كے تحت وہ مبى معدے كاطئ ايك سباية سابية فلاسر كرزا ہے، حس كي شكل اكثر مثلثي موتی ہے اور ص كا قاعدہ بواپ كی طرف بوتا بعدال حصة كو اثناعشى كالرو (duodenal cap) كيته بن اوراس اور میدے میں علیحد کی واقع کرنے والی براب کی شفاف مکرے اس شفاف لگر کے وسط مِنْ مَا فِر قَتْ الروالي قنال د كلها في ديني به عن حوكهيوس كي أس مقدار كه لحاظ يت حواسك اندرے گزررہی ہوسنبہ حواری اینگ نظر آتی ہے۔ عضلی انتباض کی دودی الحرکت موجیں عوجبم معدہ سے بواب تک واقع ہونی ہیں اوران کے ہمراہ وہ تغیرات بھی بیوکہ جهم معده اور ابوابی دبلیز کی شکل میں واقع ہوتے ہیں لاشعاعوں سے بھنا تعت ہوتے ہیں

انتمانی وصنول میں طبی معدے کی اوسط وضع ایسی ہوتی ہے کہ اسخناک کبر حرقفی عرفوں (یا ناف)سے بالکل پنے ہوآ ہے اور انخائے صغیر اس سے اوپر کوتا ہم تنزیستی کی مالی سے ستجاوز ہوئے بنیر معدے کی دمنع میں رسیع اختلافات ہوسکنے کمی معدہ لمیا ہوکر نع ببت دوریک بینیم سکتاب، اور اِست بعض افغات کراهو! معلی dropped) " (stomach کیتے ہیں جوعمواً زہر تمنیشی (hypotonic) بھی ہوتاہے (ملاحظہ مو صعفداً النيز صغيه 340 بيكل مرمى . يا حكن ب كدوه حر تفي عرفول سع بالكل اوبر مؤاور اس صورت میں ایسے ملیش ملیشی (hypertonic) کہتے ہیں (ملافظ بوصحفہ ۲۲)-افتی دمنع میں جب کہ مریض بیٹھ کے لب لیٹا ہوا ہو صعدہ پیچھے گرکرڈ اکفرام کے پنجے ملاحاتاب، اور بسس طرح انتصابی و ضع کے تنبت وہ اس وضع میں زاوہ ملندوہ فغ ہُوّنا ہے۔ عمودالعُقران اَکْتُر معدہ کو دوس تقت پیم کردنتا ہے۔ یہ مشاہرہ میں آیاہے کہ حذبہ کی وجہ سے میں بہوشی کئے زورہ سے ذرا پہلے ایا مثلی بیب داکرنے والی رمثلا م رمینگ کی) بُوکے بعدا نتصابی و منع ہیں دیکھنے میکن ہے معدہ کئی ایج گرا جوانظرآئے۔ اس کے برعکس جب موصنوع کی محبوک تیز ہو جاتی ہے تو معدہ بیش تنشی ہونے کا رحالت ر کمناہے (11) - معدے کی اوسط ومنع مرشخص کی حبمانی ساخت پرمنحصر ہوتی ہے ۔ جب سهر حورًا اورهمولًا بؤيين جب سينه كالكيرجها بي طول كے تنبت مؤمنی ميٹرزيا وہ موتومعة کی و صنع او نیجی ہوتی ہے (ملاحظہ موصفحہ محمد) اور اس کے برعکس جب سینہ کا مگھ دھٹر کے لول کے نشبت ، سنٹی میٹر کم ہو تومورے کی وضع نبی ہوتی ہے۔ بلندمعد ہ کیسا تھ عومًا مدى رس كى برمى بوئى ترك كى كاللازم يا ياجاتا في (12) - ايك بى فاندان كے افراً وُ معده كَيْ تَحْلَىٰ كَى من أورامتَحانیٰ غذائِی مُحَیٰ كی قسم مِس با ہم ماثلت ظامِ مِرکِیقے ہیں۔ حدب كاكوتى لاستعاعى امتحان كمل نهيس براسا أوتلت بكرمعد سي كتخته تى كى مثرح دربافت بذكى جائے - غذا كھائے كے دو عيارً اور آئد كھنٹے كے بعدم ريف كا امتمان كما ما الله يد د كليف ك الله الله على معد عي كونى سايد إنى رو كلياب يعمولى طور پر معده جار ممنوں میں خالی ہو اے مجبوا منز تمنی معدہ اکثر و و مکفنٹوں نے لی بوماتنا ہے۔ اگر آتھ سیکھنے کے بعد عبی معدے کے بیٹیز افیہ موجود لمیں تو یہ واب خبیتی (pyloric stenosis) کی د لالت ہے۔ دیکیا حائے گاکہ یہ اوقات اُن او فات سح

کیتدرزیاره زیر جوکسری استانی غذائی طریقه کے دربید مال جوتے ہیں۔ معارے کے مافید کا امتحال

ت قیے کے امتحان سے اور دوران ہفتم میں میدے کے اندید سے صنوعی طور پڑگائے ہوئے اسکات کے امتحان سے ہم بہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مون کی ممتف قام کے اور خاص کر ہمند کے مزمن فیا وات میں ترشول مبیبین (pepsine) یا معدے کی حرکی قوتوں کی قلت کیا حصد لعتی ہے۔


قفے۔ اگر میس کی ہوئی چزیں (شلا طراف پذیر روغن یا اکعل) کویں ترمیم کوئی کرا چاہئے۔ حال ہی میں کی ہوئی چزیں (شلا طراف پذیر روغن یا اکعل) کویں ترمیم کردی ہیں۔ مالع بدرنگ کی یا صفرا کے لون سے زر دیا سنز یا فون سے گلا بی یا سرخ رنگ کا ہوسکتا ہے ینون معدی رس کے تماس سے اکثر تبدیل یا خون سے گلا بی یا سرخ رنگ کا ہوسکتا ہے ینون معدی رس کے تماس سے اکثر تبدیل ہوجاتا ہے اور اس کے نتیجہ کے طور برسیاہ بھورا اور غیر شفاف ہوجاتا ہے اور دہش نے در میں شفے یا نی جیسی یا مفاطی وجہ سے کم دہش نج ہوتی ہوتی ہے کہ دہش نے میں شف یا نی جیسی یا مفاطی وجہ سے کم دہش نے ہوتی ہے۔ سے میں مضم سندہ کیا ناہضم سندہ غذاکی موجود کی کو د کھینا میا ہے۔

امتخانی غذا۔ معدے تمے انعال ایک امتحانی غذا دینے سے اس سے زبادہ جم طور پیلوم کئے جاسکتے ہیں کہ جننے فئے کا امتحان کرنے سے اس کے دوطریعے سعل ہیں:۔ (۱) آیوالل کا امتحانی نا شدی پہلے معدے کو دصور التے ہیں کا غذا جوی یا جا انس روٹی یا ٹوسٹ (toast) اور ۲۰ اونس ملکی جائے بیٹ سی ہوتی ہے صبح کے وقت خالی ہیں۔

329

دیجاتی ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقعہ کے بعدمعدے کے ما فیہ کو نکا ل کران کی تفظیر کرلی ماتی ہو مقطّرت وحدكے دونمونے لئے جاتے ہیں اور اُنٹیں بذریعہ بنجرخشک کریما وروُڈیم كاربونسي طاكراور بغرطلا أن كى ترميد كياتى ب- اس معموعى كلوري كاامسا کلورین کا جوفلزی کلوراً مرکے طور بریمزوج ہے ارتکا زخال ہوجا اسے یھیسر و NO کا (سلورنا نشریٹ) استعال کریکے وَوَلَ إِردِی معارض (Volhard titrations)علی میں لائی ماتی ہیں۔ مجموعی کلو رہین اور فلزی کلورین کے درمیان جو فرق یا یا جا آہے ہیں " فاعلى إلى ركلورك السلم" كى مقدار معلوم بوجاتى ب يعنى أس لاكرو كلورك ابية کی جوآ زا دہے اور کس ایکٹروکلورک ایسڈ کی جو بر ڈمین کے ساتھ منروج ہے۔ ۲) کسری امتیانی غل (Fractional test meal) مسیم کے وقت ناشة سے پہلے ایک محیو مط سوراخ والی رَبر کی لئی جس کے برے میں مجید ہوں معدیے کے اندر داخل کی جاتی ہے ' اور ایک پر پکاری کے فریعیہ سے معدے کے ما فیہ '(مکونی رُ ="resting juice") نكال كي جاتے ہيں - بيمر حب ذيل غذا لي جاتى ہے: - اشت کی چئے کا آنا وٹیل اِسپون (مینی بقدرا اونس) ایک کوارٹ (لے گیاکن) یا نی کے ساتھ سان تک الا ہواکہ اس کا حمر ایک بینٹ رہ گیا ہواور بھراسے کمل میں سے جیان لیا گیا ہو۔ میریا کو او گھنٹے کے بعد معدلی افید کے تفتریب وس دس سی سی کے منوسے باہر نِكَالَ لِلْهُ عَاشِيْنِ بِهِال مُك كدمعده خالى بوجائد مفاط صغراد خون نشاستياور و کیسٹروز کی موج دگی نوٹ کی جاتی ہے عشر الطبعی سوڈ بم لیڈریٹ کے ذریعہ ان مونول کی معائرت اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے لئے وائی متحل (dimethyl) کوبطور نمائندہ ائتمال کیاجا آہے۔ یہ معائرت ماری رکھی جاتی ہے بیان تک کہسس موز کوفینال تعلین بھی قلوی ظاہر کرے پہلی معائر ن سے آزاد کا نیٹر روکلورک ایٹ مر" (free HCl '') معلوم ہوتا ہے۔ اور قلی کی وہ مفدار حوفینال تمالین کومتغیر کریے کے لئے درکار ہوتی ہے مجموعی تَرْسُنگی" (''total acidity'') فی ہرکرتی ہے۔ مجموعی تُرسُنگی اور آزاد ہاٹار وکلو ا ببڈ کے درمیان جوفرق کال ہوتاہے وہ خاصہ ستم ہوتا ہے۔ اگر دو سرے نرشے رہیے لدلیکٹک ابیٹر) موجو درموں نومکن ہے کہ وہ بہت زیاوہ ہوجائے۔مجموعی کلورین کی تغیبن بول کیجانی ہے : ۔ ۵ ربا ایک سی سی ما فسید میں مشرابطبی بورنا مگریہ

(0.1N AgNO₃) اورایک ی مرکز اکثرک ایدند (conc.HNO₃) طاوی اس به میزوکوگرم کویت اک اگر برومین موجود بوتو و و مرقب بوجائے۔ اب ایک سی یہ الکحل به میزوکوگرم کویت الطبعی و آبیئی سلفور اینٹ (0.1N KSCN) کے ذریعہ زائیلو المرکز میں۔ الکی عشرالطبعی و آبیئی سلفور اینٹ (iron alum) کا ایک قطرہ نمانیڈ کی معائرت کریس اور اس کے لئے آئرن اکمی (iron alum) کا ایک قطرہ نمانیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ (ید ایک ترمیم سندہ وول یا رقری معائرت ہے)۔



شکل ۱۷۴- بینائیں دار تعبد ، منی صدی طبعی طلبامی آزاد کا کثر روکلورک ایسٹه (HCl) اور مجموعی کلورین (Cl) کی صدو وکا نشان ظام کرتیم میں (14) -سی میس کیکونی رس "

کوئی کھانا نے بنیرہ وہ گرام کی بین (histamine) کا انتراب کرنا اور اس کے ابعد معدی ما فیما کا امتحان کرنا کال بی میں رائج ہوا ہے۔ ایک الکمی امتحانی غذا (۵۰ می تک عنی معدی الکمارے) بھی استعمال کی جاتی ہے۔ الکما میں ایک سی بی فینال تعالین ملائی حاتی ہے اکت تملی کی دت نابی جائے۔ استاد وہ کہ دروکلورک آیٹ اور مجموعی کلورین دونوں کھانے کے شروع بی سے


0.4 المنت لكنته بن كيكن إزال لبديل للروكلورك البيثة توكم بوكر گزانشر وع بوماي اور مجموعي کلورین برابر برصتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ ایک انتہائی نقطہ پر پینچنے کارجمان رکھتی بح (18)-معدى رس كى ترث كى برا ترف النه واليه دورر عاملات بربني و العاب بن ی مقداد انناعتری کے افیدئی مازروی اورمعدی رس میں مخاطری مقدار (براس کا ایک تعدل کردس کے)۔ اوروہ سرعت کیس کے ساتھ میدہ خالی ہوتاہے (یا کسے برصا ویکی ۔ جب وا زاد فی شروکاورک آیٹ موجود نہ ہوتواس حالت کو مے تو شکی (achlorhydria) كيت من ليكن إس سد بيطلب كدكو أي من فاعلى إكثر روكلورك إيالي موجود بى نبين معين HCl كاكونى افراد بالكل بيدا بى نبيس كيا برگر نبيس بوسكتا أو اس لحاظ سے یہ اصطلاح کینفدرمغالطہ پراکرینے والی ہے میں فاطی فائڈرو کلورک آیاتی در ال موی ترت کی قیمت کے ماتھ کیقدر قریبی طور پر مننا ظریو ماہے (13) - مشکل در آل مجبوی ترت کی کا تھے کی تھا۔ مرام من . من صدى طبي طلباس أزاو HCl او مجوعي كلور أندما بيدار رقبول كها ندواقع عقے عوماً محری ترسی آزاد HCl کے تنبت تقریباً . افی صدی زائد ہوتی ہے -نفسى اثرات HCl كم معنى كوبهت كيمه بدل سكتے ہيں۔ مثلاً عب ايك الم كوتنويم كي تحت متلي كالصاب بيعاكراديا كياتواس اماس معد كي خالى مويخ من اخبر بوكى اسى طرح بحوك كے احاس سے معدہ برسرعت خالى بوگريا مجر باشب تركى فا عكيت برص ما سنة كى وجرس واقع بوا-يدان لاشعاعي مشا برات سعم اور بان کئے گئے تھے مطالقت رکھناہے بہت رعضلی درزش اور گرم خسل HCl كا فراز كرك والے اور معدے كے خالى بولغ ميں تاخير كريے والے مائے كي بي-المی ورز سال موجوب دوستول کی معیت میں کی جائے اس کے بولس اثر بیماکرتی ہے (20) -سب سے زیارہ طاقبور معدی رائ جوتر شداور بہین مردولجا ظ سے طاقتور ہو استہاکے بعد اور گوشت کھلانے کے معدمفرز ہوتا ہے (18) شیم کھلانے ا فراذ اور سخ ك دونول كا امتناع بوط ماسي الخصوص الرسيم السيث وأجو (19)-جسم مده کے قرص کے ممراه کوئی مميز منحی نہیں پا ياجاتا - تيكن اثنا عشري اور اوا الاقوص كى مالت بى (شكل دم) كالرمد، بى نهايت ترك كى سكونى رس موتاب، اور ازدد HCt مي جركى غذاك سافة ترقيق بوسن كى دجه سے بوجاتى بهاكس كوبد

HCl کا فیہ بعرفت بڑمتارہ اے بہاں کہ کرماری غذامعدے سے جلی فاتی ہے ' جس کی تعیین نش سے کے غائب ہوجائے سے ہوتی ہے کہ ہس نقطہ کے بعد معدی وں سے کا افراز بھر بھی ہوتارہ تاہد (بیش افراز) مکن ہے کہ معدہ نودکو نہا بیت سرمت کے ساتھ فالی کردے (' اُنناعشری محبلت' = ''duodenal hurry') ۔ بوابی منین کی خالتوں میں دشکل ہم) غذا معدے کے اندر طویل عرصہ تک رہتی ہے ' بعیا کہ نشا سند کی

تنكل هم اتناحتري و (duodenal ulcer) مى اكيا ما بنجس سے يامورظا مربوت بين : -نوامية تنشي كوئى بل غذاكم بعد برموت بلند موجائى والامنى اورمعد كى كاجلد فالى موتاء بالآخر ترسشكى كاكر ركم موجانا ايك مدكك باس بازدوى كے باعث موتا ہے جو اتناعشرى سے وافع بموتى ہے - ملل موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے۔
جون جون معدی رس کا افراز یا دہ
جوتا با آہے کہ HCl کا درکھا زعی برنا
جاتا ہے ۔ متلف عدم ومویت
جاتا ہے ۔ متلف عدم ومویت
میں امتحانی غذا شکل سم بین بلائ گئی
کی را ٹدکی کمی مزمن التھا ہے معدہ
دجی ۔ معدی سرطانی سلعہ (جوملاحظم ہو)
کی بین اصابتوں یں بی الیابی تیجہ طال
مورت بی کیو کمہ اس مورت بی بی درا التھا ہے۔
موری التھا ہے موجود ہوسکت ہے۔

فون کے کئے کا نتفات ۔ بب نئے 'یا معدی افیدین خون کا اظا شوخ مرخ رنگ کے خون یا در دِقہوہ کی حیثیت سے نہ ہو' تو ایسی صورت بن جی وہ آنی کا فی منعدار میں موجود ہوسکتا ہے کہ


کیمیائی کا شفات سے شناخت ہوجائے ۔لیکن ہس سے بھی زیادہ یہ اہم ہے کہ براز کے اندر معنفی ختون کے لئے امتحال کیاجائے کیو کہ معدی ما فیدی خون کا ایک شائر توخرج کی وجسے ہی ہوسکتا ہے۔ گوایا کم کے ذریعہ امتخان (Guaiacum test)- برازگولیٹ کی آیے۔ آبیڈاور اپنی کی مساوی مقدار میں کلاکر ایتھ کے ساتھ بلایا جائے۔ ایک امتحانی کی کے اندر اس ایتھری خلاصہ میں نیخ آف گوایا کہ کے ایک یا دوقطرے اور بھراوزویک الکحل (ozoni) (alcohol) ریسے الکی کے اندر الم ٹاروئن پر آک بڑی کے سی سی آمیز کروئے جاتھ ہیں



شکل ۲۷ مر من بوابی قرص کے باعث بوابی تسدد کی حالت، جر معدے بی خوا کارکود (Stasis) فل مرکزتی ہے، نیزید کہ ائٹروکلورک آیٹ اور مجموعی کلورین کے منحنی ٹرمدکرایم ستمرلیول تک بینج گئے ہیں (13)۔

جس سے ایک شوخ نیلارنگ بریدا ہوجاتا ہے۔ بریخفی نزف کا ثبوت اسی وقت سمیا جاسکنا ہے جب کہ مریف سے کم از کم الر الیس گھنٹے پیٹیز سے کلوروفل (سبزی) اور خون سٹامل رکھنے والی غذاؤں مینی گوشت اور سنرتر کا ربوں سے پر پرمیز کسی مو 332

نفدیقی کاشف کے طور پر یہ یمی مناسب ہے کہ انتھری طاحہ کا امتحان آئی۔
طیف نما کے ذراید آیٹ ہما ٹن (acid hamatin) کی موج دگی کے لئے کہا ما سے۔
ازاں بن انتھری خلاصہ ، سوفی صدی HCl کے ساختہ بلا لیا جا اہتے اور آبی خلاصہ کا
طیف نمائی امتحان آبیڈ ہما ٹو بور فائرین (acid hæmatoporphyrin) کے لئے
کی موجود گی کے بیا متی ہی کون جسم نے اندر شغیر ہمو گیا ہے اور



ننکل یرم میلف عدم و مویت (pernicious anemia) کی حالت جم آزاد HCl کی غیرموجودگی کترشگی کی (اور خالباً فاطی HCl کی کی) ور مجموعی کلورین کی کی ظاہر کرتی ہے (31) -

یه کدوہ غذا می قنال میں بہت او بیسے ' سیعنے معدے' عیسوٹی آنٹ ' یا قولون کے بالائ سے آیا ہے (Ryffel) -

خوربل برمعل باین (thexible gastroscope) تشخیص کے لئے طال ہی ہر رائج ہوئی ہے (93)-

سويبضم ورمعلى اختلالات

(DYS PEPSIA AND FUNCTIONAL DISORDERS)

سوبهضم حاد

(acute dyspepsia)

حادسودہ منم ناکافی طور پرجب ائی ہوئی غذا کیا خاص طور پرخوا س آورنوعیت کی غذا کیا حدید دائد مقدار میں غذا کے لینے سے پیدا ہوسکتا ہے۔ کامل صحب کی عدا کی عدات میں برخفس یغطی کرسکتا ہے کہ وہ غذا کی اسس سے زیادہ مقدار کھانے کہ مقبی

اس کا معدہ برہ است کرسکتا ہو۔ یا فذاکی عمولی مقدار کے ماتھ کوئی ایسی چیز جبسی کربرف یا قدرہ کا است کرسکتا ہو۔ یا فذاکی عمولی مقدار کے ماتھ کوئی ایسی چیز جبسی کربرف یا قدرہ کی مشروب ذیا وہ مقدار جب کہ معدے ہی جن کی گئے۔ یا فیرمتوقع طور بہنے مماز ہو کنا مندہ کری متابع کردیا ہو۔ مثلاً الما ناشتہ کئے کہ کا گئے ناڈ تک کی گھندہ تک چیئے یا مبندی برجر بھنے کی شدید ورزش کے بعد مکن ہے کہ معدا کی معدا کی معدا کے کئے گئے ناڈ کل ہفتا کی معدا کے سے کہ معدا کی معدا کے سے کہ معدا کے معدا کے سے کہ معدا کے معدا کر سکے۔

علامات المفالية كم فرراً معديا من بي كمنشول كم معدمعدى فطيمي ترة داورب أرامي كا احاس بوسط لكن بي ياحقيقي دروبوتاب - اكروه كمانا كرمب شکا بیت پیدا ہوئی ہے ران کے وفت بہت دیر کرکے لیاگیا ہے ' تومکن ہے کہ تحور ی ہے ارای کے بعد مربین کونیزر آ جائے الیکن جند مکنٹوں کے بعدوہ معدے کی تحلیف سے جاگ اُٹھتا ہے 'اس کی زیان خشک ہو تی ہے اور شاید اس کے سرش قرد ہوتا ے اور مکن ہے کہ وہ کئی گفت ول تک جاگا ہوا ٹرار ہے . معض اوقات قلب کے متنزاد انكاثنات كى وجه سة پيشت قلبي خط بن ايك تيز نميز ميٹرا به طلم موس بونى ہے'يامنفرد مترزا دانكماشات منعبته طوبل تروقفول سے تحوس ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت غذا کی مخبت نہیں بوتی زبان حنک اور فردار اور طبه بیجی ہونی ہے ۔ تیکن جید کھنٹوں کے عرصہ یں يه طلامات و فع بوط ته بي - دوسرى أصانبون من شف بوكرشكا بيت سبة جلد حباتى ربتی ہے اور عمواً معدہ اینے سارے افیہ سے مالی ہوجا آ ہے جو اگر ہفتم ہوئے ہی تو نا کمل طور پر ہوتے ہیں اور اُن میں معدی مخاط کمی ہو ہے ہوتی ہے: اِس ہے دَرومِل کشیر فی الغور تخنیف ہوجانی ہے۔ دوسرے موقعول برتے کرر ہوتی ہے اورصفراء جواننا مشر سے معدے کے اندر بذریع ازروی آگیاہے بعد کی قیرول کے ساتھ بمل جا آ اے۔ بعض اوقات مد مح باره مكنسول محدومه بن أنتول كاندر فيريضم تندويا فراش أ مرا وه أجلت كي وجهد المان كافعل تيزي كيراته بوكرا ما تبي بوماتي ايب-

علاج مجال وروست يديو اوراس كاسب ظاهر بو ايك في آورودا مشلاً مال دوليناكل (Bal volatile) يا عق الذهب (ipecacuanah) سع فور ارام على بوسكما بي -اكريه ابين على مي قاصرر بعد تومعد يركم ا فيه ايك نلى كے ذريعة

333

خارج کئے جاسکتے ہیں۔نبٹہ خنیف تراصا بتوں میں استقدر کافی ہو گاہے کہ نہا یت نقوڑ اسابرف بیاس تجمالنے کے لئے دے دیں اور معدے میں اور کوئی چیز صرف اس وفت د اخل کریں جب کہ بہ تکیف دہ علامات رفع ہوجا ئیں ۔

مزمن سوريضم

(chronic dyspepsia)

اوبر بوبحن کی گئی ہے وہ یہ نگا مرکرنے کے پئے کا فی ہے کہ مزمن سورہ مکم کی من نہیں ملکہ ایک سلسلہ علامات ہے 'جو ہالا ئی غذا ئی خطے کے فعل کے اختلال سے بیب ا ہوجا آہے ۔

امراضیات - اِس سُر پر غور کرنے وقت دوسوا لات کوالگ الگ رکھنا حیا ہے و۔ (1) وہ کو ننا عصنو ہے جس کے افعال کا اختلال سور ہضم کا باعث ہوتا ہے اور کس طرح یہ اختلال علامات پیدا کردیتا ہے ؟ (۲) وہ کو ننا ضربے جو لیر اختلال پیدا کر اے ؟

موجوده زانیس به دریافت کرناکه علاها مت کسی عضوه این بداله وی های ایک نیز آسان امرے و دو کی علامت کے متعلق نها بت کا مل طور پر تحقیقات بو حکی ہے (7) ۔ جب وہ شرابیف میں خوب او پر قش خوبی کے قریب یا عظم العقع کے بیجے کوسس بو تو وہ مری سے پیدا ہوتا ہے (کا خطہ بو صحفہ ۱۸ ب اور سفی ۔ 325) ۔ بیت العقدی مریوی وَدو کی تفریق رو قلب سے اس طرح کی جاستی ہے کہ مریف سے بیکا نے کی حرکت کرائی جائے ۔ بیدا شدہ حرکت دودی کی موج ہوا اپنی فی سکنڈ کی شرح ہی مری بی نیج کے طرف کھیلتی ہے مریوں ہے کہ مری بی ایک موج کے لئے تخفیف پر اکر دیتی کے مری و ویں ایک لمری کے لئے تخفیف پر اکر دیتی کے مری بیت خفیف ہے تو مگل ہے کہ یہ موج اس بی سخدت بیدا کر دی ہے کہ وونوں میں بہت عام طور پر لازم ملزوم ہوتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس وونوں میں بہت عام طور پر لازم ملزوم ہوتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس موتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس موتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس موتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس موتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس موتی ہوتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس موتی ہیں ۔ معدہ کا در دستر ایوف پر محکوس کے برا بربرا بر اور نہا بیت عام طور پر نا ف کے گرداگر د ہوتا ہے ۔ اثنا عمشری کا در د

تقریباً اسی لیول پرلیکن خطر درسانی سے ذرا دائیں طرف کو محسوس ہو آ ہے معا مصائم (jejunum) کا دروغا لیاً اف سے نیجے محرس ہو آہے۔

حشِّا فی ورو (visceral pain) تجربتهٔ اس طرح بیدا کیا ماسکن ہے کہ اک حنا رکے اندر کھی ہوئی ہو اکی تقیلی میں محبول کر ہوا بھردی مائے۔ یہ دردحت ای دیوا رہ کیالی عصبی منتهاؤں کے کھنچا تن حاسے کی وج سے ہو آہیے (21'21)- مُرِی ایک بیاعضو بحس كى تختيفات نها بين كال طوريركى كى بدر مرى كاندر ندكوره بالاصم غريب کی موجو د گی کا نتیجہ میں ہو آ ہے کہ دو دی البوکت موجو ل کا ایک سلسارُ میں کے نیجے تک گذرجا تاہے۔ ہر بارجب کہ ایب موج مقیلی پر منبکی اُسے بیکیا دیتی ہے ور و کم ما غائر ہوجا آہے' حس کی دحہ یہ ہوتی ہے کہ عضا منتبض **بور کتیبلی نے ت**طرکو کم کردیٹا ادع^ع ساختوں پر بڑے ہوئے بار کو دور کر دیتا ہے تقطع نظر اس کے کہ اس انتباض ایک لبند" انجماشی" و با کربیا ہوجا تاہے۔ موج کے گذرجا سے کے ساتھ ہی در دعیر ہونے لگنا ہے' کیونکہ ووران '' انبہا ط'' (''diastole'') میں دیوار بھیرتن کر گھنچے ما ہے۔ ایسی صورت میں دروغیر سلسل یا'' مڑوڑ'' کا سا ہو آہے۔ ایک سادہ عضلہ کے تنا وُکی تعریف یه کی گئی ہے کہ بیرانس کا وہ تنا وُہے جو کہ دوران انبساط ہیں ہوتا ہے' اوروہ وروجو تجربتم بیدائیا جاتاہے اس تناؤ کے ٹرمد جامے کے ساتھ والستہ دو-اگرا كى يز يخلينے والى يا بى تقيلى استعال كى حائے تو در دملس اور نهايت شديد وعا ہو کہ حرکت دووی کی موج اپنے ممریں رک جاتی ہے۔ یہ دروایک عد تاک نو مو کے منبا وُکے باعث ہو تاہے' لیکن' اس منطقہ کے اندر کی عصبی *س*اختوں پر بار ک^{و جم} سے میں بنوتا ہے جوکہ تھیلی سے اوبر انکاشی طور برنقبض عضلہ کے اور ال سے بنجے کے مس عصلہ کے درمیان ہے جو کہ ہما بعادی طور پر نقبض اور اسی لئے اب تک تھیلی سے تنا ہواہے۔ بہی وج ہے کہ در دم حرکات دودی کے ساتھ بدسے بدتر ہوجا آہے۔ یہ تجربہ کس ورو آک شنج کا قایم مقام ہے جو قنان کے اندر عکہا کے صفراء یا سَکُروْ کی موجود گی کے ساتھ والبتہ ہے ۔ کھو کھیے اضاء میں بڑا ہوجائے کی بیسے (شیر مُکنْن ی اصطلاح میں) اپنی ٹوخت " آگینڈا " (''posture") بدلنے کی بٹری طاقت ہوتی ہے' اور اگر کوئی جم عزیب ایسا ہوکہ وہ ابتدا رُعلامات بیدا کردے تواس کا یہ علامات

پیاکر ایس وقت موقوف ہوجا آہے جب کر صفواہ نے دانیوں کی تطویل یا جدید ترتیب
کے ذریعہ آناکا فی بڑا ہوجائے کہ وہ بدوں کھنچے ہوئے اس جم غریب کواسے اندا
گرفت کرسکے لیکن بیمل مرف کسیفدر تدریجا ہی واقع ہوسکتا ہے۔ اسبواسطے کسی
دیشے کی وصنی تطویل میں اور اس کے اس کمنچا کو ہیں فرق کرنا چاہئے جو کہ در د بیدا
کرا ہے۔ خواش مقابل کا طریق عل بالخصوص یہ ہے کہ وہ کینڈے کی زیا وقی معکوسی
طور بر بیداکرتی ہے۔

و بنا ہوائے گولے کا اس معدے میں پیدا ہو اسے۔ سینہ یں کرہ یا ہوائے گولے کا احال مری ہیں ہیدا ہو اسے دیریں جھے احال مری ہیں ہیدا ہو اسے دیریں جھے میں ہموں ہو اس کے ذیریں جھے میں بھوں ہو اس کی وجسے پیدا ہو اسے میں بھوس ہوتا ہو اس کی وجسے پیدا ہو اسے بیرا ہو اس بیرائ کا اس کی وجسے ہوتے ہیں جواس بیرائ کا ہم کی گئے ہے کہ براحماسات نوعی منہتا ئی اعضا کی وجسے ہوتے ہیں جواس سے پہت ترور جرکے تناؤ کار وِعل ظاہر کرتے ہیں جتنے ور جرکا المی عھیی منہتا ہیں ظاہر کرتے ہیں جتنے ور جرکا المی عھیی منہتا ہیں ظاہر کرتے ہیں جاتے ان احماسات بیرور دکا احماس عالب آجا کا اور ان کی جگہ لے لیتا ہے جیسے تناو میر متناجا آجہ ان احماسات بیرور دکا احماس عالب آجا کا اور ان کی جگہ لے لیتا ہے جیسے کرتے ہیں دوسری جگہ بھی واقع ہواکر واجب تیری کا احماس اور ان کی جگہ لے لیتا ہے جیسے کرتے ہیں دوسری جگہ بھی واقع ہواکر واجب تیری کا احماس کی جگہ لیتا ہے کہ جماس کی جگہ کے لیتا ہے کہ جماس کا حماس کا حماس کا حماس کی جگہ کے لیتا ہے کہ جماس کی جگہ کے لیتا ہے کہ جماس کا حماس کی جگہ کی واقع جماس کی جگہ کے لیتا ہے کہ جماس کی جگہ کے لیتا ہے کہ جماس کا حماس کے حماس کے حماس کا حماس کی حماس کی حماس کا حماس کی جگہ کی دو ترکی کا حماس کی کی کی کے حماس کی حماس ک

و بیارشکم کی توسیع کے باعث ہوسکتا ہے۔

ا نتنامات کے تقریباً ایک ٹانبہ کے بعدا تنارعته ری میں بھی وہیں ہی موہیں ہیلا موسم سوو مضم کا درو و او ارکی عصبی المی منہما وُں کے کمنیا ُو کے باعث ہو ماہے جبکی تطبق دورب مثالان سے ہوتی ہے کہ مور معنم اکٹر معدے کو خالی کرنے کی اکام کوسٹ شوں کا منتبحہ ہو تاہے (24)۔ یہ یا لکا مکن ہے کہ بعض مالتو ن میں نخان کے باعث عفىله غيرهمولي طور برنمد وبذير ہو حامے اور اس كا نينجه يه ہو كه آلمي نتها وُل كا كھنجا وُ ننبنةً برسعه نرا مبياطي دباؤ كے تحت واقع ہومائے۔ نيكن جہاں دباؤز يا دہ ہو واپ عصلاتِ عاصرہ کی ہمزاں میدودی بھی واقع ہونی جاسئے، ورنہ ما فبدخارج ہوجا ہُیں گے، اور بہبہت مکن ہے کہ سورہ ضم کے علا مُدیکا اولی انحصار ذیل کی دوعلامات میں ہے ایک پر ہو: _عضلی دیوار کی غیر میمولی تمدّو پذیری - باعضلات عاصرہ کی مسدود ی باشا بدان کا عدم انتخار یمکن ہے کہ عضلات عامرہ کے علاوہ دوسرے مقامات مثلاً مری یا اشناء عشری من یامعدے کے انخا کے کہر پڑ محدودا کمقام انقباضات رسننجات ببیدا مومائیں ۔ معدے میں کا در دعموماً دوقسم کا ہونا ہے۔ وہ غذاکے تھوٹری دیریف ہوسکتا ہے یا میند مکھنٹوں کے مبداس وقت ہو تاہے جب کہ معدہ غذا سے خالی متوا ہے مین نام نہاد العوالجوع۔ بیرائے بیش کی گئی ہے کہ ان قسموں کے در دکھیا تھ دواہم عالمات بائے جانے ہی ، جودونوں کے دونوں والدار کا لفنی و بدا کرنے کا رجان ر كھنے ہل ۔وہ يہ ہيں ہے۔ (١) ملج البواج بالكل بلا را دہ ہوسكتا ہے اور (١) معد غفائے مخاطی سے و رک إفراز ہونا۔ فی الخنیفت به عالمات نغویفی بیجھ گئے ہمن كيونكه مليج البيوا وباؤكوزياً وه كرد بنيا اور اس طرح معدے كے عالى ہوئے ہيں مُمدموّ ماہم اورافراز کا ویرنک ہونے رہناکسی مضرت رساں شئے کے لئے اکم فق (diluent) کی طرح عل کرتا ہے اسی طرح حس طرح وہن میں ہونے والی خرائش ریتی افراز کمترت بیداکردتبی ہے (24)-

اب بک ہم نے اگر دو کلورک ابٹر کے متعلق کوئی غور نہیں کباکہ آیا یہ می دود کے بیدا کرنے ہیں کباکہ آیا یہ می دود کے بیدا کرنے میں کوئی صفحہ لے مکتا ہے یا بنیں۔ ھ د. فی صدی اللہ کے ۲۰۰۰ سی کا معدی نلی کے فرر بعد دینے بر معدی قرد کی مجیبت ہم مریفنوں میں دو کی صورت میں اور موسی میں بلا درد کے موئی۔ اثنا عشری قرصہ کے لئے ایسے اعداد الم اور

۱۹۴ ننے . مزبدرآل ان اصابتول میں تعی در و ہوا کہ بن میں صرر سمدہ سے بہت • ور تَمَا (17) ، لَبَكِن إن احا تبول بِي النهاب المعده كو خارج ا زبحت نهيس كبا جاسكتا تحا ترشد سے جو در و بیدا ہو تاہے وہ تنا بے معدہ کا تنا و بڑھ جاسے سے بیدا موتا ہے ۔ سورہ صنمہ کی متلی یا ٹیری کا احمال ما در وحکن ہے کہ معکوس طور پر فٹے یا اُ بکائیا پہاکردے جوغذائی خطع کے بالائی مصے کے لئے اپنے ا فیا حارج کرمے کاسر بم ترین ا ورمحفوظ ترین طریقہ ہے۔ ببر ڈسانچہ کے مختلف عضلاً ت کے قوی انقباضات کی درسی ہوآئے جن سے معدے کے مافیہ مری کی راہ سے اور دہن میں سے ہوکر بزور خارج ہوجانتے ہیں۔ بالغوں میں تھے عموماً آبک نہایت دَر د ناک فعل ہو ناہے ایمکین یہ در د نا لیا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ معدے کے ما فبہ ایک میدود فواد میں سے سرور خارج کے ماتے ہیں۔ نئے بجائے خود ملاؤر د ہوتی ہے جیساکہ خود راقم الح وف سے ایک بارأس وفن متابره كياجب كه الل عن ابك سخت قاتا طريح سرك بر مبدهي موني تغلیلی کوخو و اپنی مَری کے بنیجے وعلیلنے کی کوئشش کی۔ اس کے سواکچھ نہیں مواکہوہ ت كمى نقباضات سے امريل آئى۔ نها بت عبوت بچول كى تئے اور مبٹر يا نى قفے بلا دُر د ہوتی ہے 'اور اکٹر یہی صور ن حالات اُس وقت مبی مِوتی ہے جب کہ فیے درون مجى مرض كى وجد سے بو - اسخناك منيرك زيري صفى كاتيج في كے حكات پیدا کردیتا ہے۔عضلاتِ شکم منقبض ہوتے ہیں اور معدہ بے حرکت رہتا سپے (11)۔

(۲) مزمن سوء هضع بپلاکودینے والے صراحت: ____ (الف) خودمعدوہی اولی سبب ہوسکتا ہے 'یا تو اپنے عضلہ کی آ کی کمی کے بیتی کے طور پر (اس حالت میں معدہ اکثر لٹک بڑتا ہے۔ ملاحظہ ہوسفی ہے (339) 'یا جلی عصنوی مرض جیسے کہ معدی قرصہ اور سر لمان اور بو ابی نین 'یا مزمن التنا۔ معدہ کے نتی کے طور بر۔

التهاب معدہ کے تیج کے طور بر۔ (مب) سورہ ضم معکوس طور بران ضردات سے بیدا ہوسکتاہے: ج عنوی خردت جو کہ فاصلہ برواقع ہول کنیز اثنادعشری قرط مزمن التهاب زائدہ منگہا معفرا اور مرارہ کے دوسرے صررات مزمن التہاب لبلبہ ضررات گردہ کا لفعوں

مرکت پذیرگرده اور سنگ گرده و و قبض کے بعد نا نوی فور برجی ہوسکا ہے ۔ برال ناع کے معدی برگرات میں اولی خرر مجھیا عصبی جڑوں ہیں ہو گاہے ۔ فربح صدر یہ کے معدی برگزات میں اولی خرر مجھیا عصبی جڑوں ہیں ہو گاہے ۔ فربح صدم سونہ ش سیند) ۔ یہ امرکہ اس شالول میں سو دہفتم کی بیدایش معکوس طور پر ہوئی ہے اسالہ تو فریل سے ظاہر ہوتا ہے ۔ مزمن التہا پ زائدہ میں زائدے کے دقبہ پر دست ووزی کردے سے معد ہے کے انتخاائے کہا گا ایک می و دالمقام شنج پیدا ہوگیا ۔ ایسابی شنج علیہ کے وقت ایک آننا عشری قرم کی آر مطونی سطح کی برتی ہیج سے بیدا ہوگیا ۔ ایسابی شنج علیہ سنگہائے صفار سے مقان کے کہا میں شراسینی ور و معدی حرکات کے ساخہ و البتہ بایا گیا۔ ایک مزمن طور پر ملہ ب زائدہ کی دست ورزی کرنے پر معکوس تحت القصی ورد

مزمن التهاب معده کی طرف منوب کیاجا تاہے۔ ترینی کی جا کہ اساره کرتی ہو گاروں کے طرف اشاره کرتی ہو گی اصطلاح ایک ہی ختلف الوقوع علامت سیف کھٹی و کاروں کے طرف اشاره کرتی ہو جن کے ساتھ معدی افراز میں کنزت جمض الملے مہی ہوتی ہے کہ بہی موتی عصبی مرض یا اختلالی سوء هصند و احتمادی افراز میں کنزت جمض الملے معنوی عصبی مرض یا اختلالی و اغی حالتوں کا سوء مضم بیان کرنے کے لئے استعال کی باتی ہے کہ عدم اشتہا اور متلی کے جماد ترامیف کو مقال برخصوس ہوئے والی بلے جمینی اور ڈو بینے کا احس ہو کو دیش نفلی عصبانی حالتوں کا مینہ خاصہ ہیں۔

عصبی عدم (نشته (جرائم موا ایک نوان فرات کو اسم ایک نوب ان مورت موقی ا مین جس کا ذکر الله (الله) سے کیا ہے کہ ایک اور الاعز ہو جا تی ہے۔ وہ باین فدالیے ہے اور لاعز ہو جا تی ہے۔ وہ باین فذالیے ہے اور لاعز ہو جا تی ہے۔ وہ باین کرتی ہے کہ وہ غیر مردی ہوئی ہی خامر کرے۔ مون کی ابتدا بہت کی مثالول میں اس طرح ہوتی ہے کہ مریضہ ابنا جسم عجر برار کھنے کی کوشش کرتے گئے ہیں بلکہ اس کا بیچھا لیسے ہیں اور مرزنش کرتے گئے ہیں کیکناس کا جا گئے ہیں بلکہ اس کا بیچھا لیسے ہیں اور مرزنش کرتے گئے ہیں کیکناس کا جا گئے ہیں بلکہ اس کا بیچھا لیسے ہیں اور مرزنش کرتے گئے ہیں کیکناس کا جا گئے ہیں ہوتا ہے کہ وہ اور بھی زیا دہ متعدی کا اظہار کرتی ہے وہ کمن ہے کہ تغذیہ کی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ اور ایک بیچھا لیسے ہیں اور ایک بیچھا ہے کہ اور ایک خاص مرصنہ کی سے مدرن کی نو سن بہنچ جا ہے۔ علاج سختی کے ساتھ کرنا چا ہے اور ایک خاص مرصنہ بیونی جا ہے تا کہ یہ نقین ہو کہ وہ غذا در حقیقت کی گئی ہے۔ سرکش یاضتہ می مرسنہ میں کہ ناک کی راہ سے غذا در حقیقت کی گئی ہے۔ سرکش یاضتہ می مرسنہ میں کہ ناک کی راہ سے غذا در حقیقت کی گئی ہے۔ سرکش یاضتہ کی مرسفاوں میں کہ ناک کی راہ سے غذا در حقیقت کی گئی ہے۔ سرکش یاضتہ کی مرسفاوں میں کہ ناک کی راہ سے غذا پہنچا نے کی ضرورت بہنی ہے۔

رورہ منی کی علامات سبب من کے دفع کردیے کے بعد کمن ہے کہ کچیم میں ہے کہ کچیم ہے۔

مک باتی رہیں ۔ اس کی مثال ایک ستے ہے سے لتی ہے ، حبس میں مُری کو ایک ستیلی سے سے لیا گیا گا کہ دَر و پیدا کیا جائے ۔ عظم القص پر کی جلدالیم متی اور کشت بیں دَر و تھا۔
ستے بیٹمتم ہوئے کے بعد یہ دونوں علاملیں چیند گھنٹوں تک قائم رہیں اور دوم ہے دن معمولی سویضم کا ایک شدید محلہ ہوگیا ۔ غالبًا مُری کے عضلی ریشے تعفیلی میں معموس معدی اختلالات بیدا ہوگئے۔
ہوگئے ستے اور کن سے معکوس معدی اختلالات بیدا ہوگئے۔

علامات ـ بيمنتف مربينون بن مختلف بوتے زن ـ

کی اس در در کے بوائے موالی اور کی موسی کے باری در دسے ہوتا ہے 'وغلا کیے کے بعد شروع ہوجا ہے 'اور کی موسی کے جاری رکم بتدیج موقوف ہوجا ہے۔

ید در دعوا ناف کے گرد 'اور الخصوس اس سے ذرااور 'یا مق ننجی کے لیول پر یا بی ضلی ماشیہ کے برابر برابر واقع ہوتا ہے جون ہے کہ یفطم العص کے بیجے موس ہو۔

یا میں ضلی ماشیہ کے برابر برابر واقع ہوتا ہے جون ہے کہ یفطم العص کے بیجے موس ہو۔

اس در دکو وجع القلب (cardialgia) یا سوزش سیند (heartburn) کہتے ہیں۔

اکثریہ ' پشت کے آرپار ' جاکرت اوں کے در میان محس ہوتا ہے میکن ہے کہ مودی و میں مول ہوکر در دابر و بیداکر دیں۔ دوسری اصابی در دابر و بیداکر دیں۔ دوسری اصابی در دابر موجا ہے میکن ہو کہ بوتا ہے میکن ہے کہ در دکے برائے کے موف ایک تکلیف میتوں' یا ئیری کا اصابی یا جی دو بنے کا اصابی ہو یا شکم کو دبائے مرف ایک تکلیف میتوں' یا ئیری کا اصابی یا جی دو بنے کا اصابی ہو یا فصلی کو دبائے برخی والے نیر میتوں ایک بعد اوبر کی طید براوپری الیمیت موجو کہ والے نام ما فی یا کہ در والے نے برخی کی دو بنے کا احمال ہو یا ایک کیا ہو کہ کو دبائے برخی کو دبائے برخی کی مید براوپری الیمیت یا ئی جائے۔

مریجیت - اس کا وقوع برہفنی کی تمام ہموں میں عام ہو اہے - معد عیو جاتا ہے اور در کار آنے سے دروی تخیف جاتا ہے اور در کار آنے سے دروی تخیف ہوتی ہے اور در کار آنے سے دروی تخیف ہوجاتی ہے ۔ ریحیت کا سبب عمو ما لمع الهواسجها جاتا ہے (الماضط ہوسفیہ 338) المین بعض اوقات ریحیت جزء اُس وی ک کی وجسے ہوتی ہے جوا تناعشری کے مسلوی ما فیہ کے بازروموین اور معدے میں ترشی معدی ما فیہ کے ساتھ اُس کے ل جا جاتی صدی بیا ہموتی ہے۔ اس طرح معدے کے اندر کی کیس میں بعض اوتات ، افی صدی

، CO يا ئى گئى جە -

و فاق بین می میست می ایک عام علامت مواکرتی ہے، اور فیے نسبتہ کو کنر الفیع علامت مواکرتی ہے، اور فیے نسبتہ کو کنر الفیع علامت ہواکرتی ہے ۔ فیے کا دہ اوہ علامت ہواکرتی ہے ۔ فیے کا دہ اوہ الفر ہواکرتی ہے ۔ فیے کا دہ اوہ او مکا کی ہوئی غذ ایر شتل ہو تا ہے یا عرف مخاط بر۔ متوا ترقیح ہوئے کی حالت بی محمل ہوگئے ہوئے کی حالت بی مخت ہوں۔ حوفان القلب ، (pyrosis) محن ہوں۔ حوفان القلب ، or water brash) میں میں ایج کی کچھ مقدار ڈوکار کے ذریعی سے منہ میں آجاتی ہے ۔ یہ ایم بعض اوقات تعدیلی تعال والا یا قلوی ہوتا ہے اوالیت کا اور ایک

حالت میں اسے عمواً بیشترریق نیشتل سمجھا جانا ہے۔ لیکن یہ اکثر ترمشنی ہوتا ہے۔ اس کے سانخد طلق بی اور فظم الفق کے پیچیے جلن کا احماس ہو تا ہے۔ یہ ترشہ سے جلنے کی وجہ سے نہیں ہوتا مرکبو ککہ اس طاقت کا ترشہ مری میں کوئی احاس نہیں بیداکرتا۔

عام علاها من - زبان مخلف طرزی دوتی ہے۔ تبض اوقات وہ فردارمو ہے۔ یہ فریتلی اورسپید کیا د بنراور زَرِ دیا مجوری جوسکتی ہے - وہ فرجو اکثر پائی جاتی ہے

رقنی غذائی وج سے ہوسکتی ہے جب کرچبانے کاعل نہ ہوا ہو یا سیالان رہی کی کی مجم اسے ہوں کا میں کا میں کا میں کا م سے ہوسکتی ہے جب کہ سطح کے چھیلکے رگر اگر مدانہ ہو سے ہوں۔ اِس کے ساتھ سانس بودا

ہونی ہے۔ قبض اکثر ہو اگر ایک کیکن مکن ہے کہ اس کی اثنا میں کہمی ہمی اسمال موجائہ۔ بعول نیبر بندیر ہونی ہے کا مکن ہے کہ بیاس موجود ہو کا الحضوص قبے کی حالت میں بیوہونیم

کے ساتھ اکٹر طیدی ٹور زات کے احراز گلا ہی گئی (rosacea) 'مٹ رئی (urticaria) ' اور معمولی کئی بائے جاتے ہیں۔ بدن پرعام طور پر کیا زیا وہ صبیح الفاظ میں عصبی نظام پرجوانز

مور مول می بات باسر بات برق برق مولید یا دیاره بیج العاطی بی بی مطام برجارد مولا بنهٔ اس کا اظهار کلمندی محنت کے لئے بے رضیتی جیرا نظر کے موضوی احاسات

غنود کی جراجرات بن اور دماغی سنی کی صورت میں ہوتا ہے۔ علاوہ ازین خیف عدم

دمويت يا بيميكاين كسنفد د نقصانِ تغذيهُ اور مزمن اصانبول مي جبره بيتطيف يك تنديد من تا تا بينزرن من المنظمان تغذيهُ الرامز من الصانبول مي حبره بيتطيف يك

تشولیش کے متقل آارکا یا ایجانا بھی غیرعام نہیں۔ سیکن دوسری شالوں تمین خرا بی معدگی کا دُیادہ ملالہ یہ نہیں اور میں:

استخصے۔ نبوربیصنی کے علامات 'اور غذا یا بھوک کے ساتھ اُن کا وابستہ ہونا' اس فدرخصوص وتمنیہ کے کنشخیص میں کوئی دقت میش نہیں تانی ۔ بایں ہمہ اُلطالت

کے سبب کی شخیص کرنا ایک الکل دوسری بات ہے ' اور دیرینہ اصا تبول میں کا کیا ہے۔ سریری امنخان کے علاوہ عذائی خطہ کے لاشعاعی امتحان مخفی خون کیے لئے بالکے

امنحان امتحانی خوراک اور اثن*ا رعثہ*ی کے افیہ کے تجزیۂ ان سب سے قمیت_ی معل^{یہ}

کا قابل ہو نامکن ہے۔ اس وقت بھی جب کہ معدے کا کوئی ٹر امون خارج زیت

کر دیا گیا ہو مخفی خون کی موجو دگی مکن ہے عنائے تخاطی کے نز فی صرر کر و لالت د۔۔ حومکن بینے کہ مزمن معدی التہاب کی وجہ سے ہو۔

علاج - اگر کوئی مرض یا ناقص طرز زندگی سور بهضم پیدا کررسی بوتو اس

تدارک کرنا خروری ہے ۔خصوصاً فتی عفونت کے دفعیہ کے طرف متوجہ ہونا جا ہیں ۔مورا ہم کے حقیقی علاج کی جاعت بندی حب ذیل طریقے پر کی باسکتی ہے: ۔۔۔

(1) غذا یخام الین غذاؤ سے کہ جن کے اندر تعیلوں کے بیول اور تعلکول کی 337 شكل مي غير مِنهم بذر رُنفل موجود مول مربهي كراما بينية اور عشوس غذ اكوشكنه سنه بملم لِدى طرح جِالِينا عاسِيمُ ؟ وانت بنول تو اس كا يُولاً كرك كھا ا عاسِيمُ - تيز فُرْسُولاً یا مالے دار چینبول کی ہوئی عذاؤل کئی کئی احزار والے کھانوں گرم مالوں کے کمفے بیلول اور کمی چیزول جلسے کہ مولیول سکاد (salad) وغیرہ کا استعال منع ہے۔غذا ساره بونی جا بر متے ملکن حن چنرول کی احازت ہے ان کی ام بنام فہرست و سینا نامکن ہے۔ بہت کیجہ خودمریق کے تجربہ رمنحصر ہوتا ہے ۔منڈر دبا ذیل معول یاد ر کھنا جا بیئے: کے غذائیں معدے کی ہینے کرکے ایک اعلیٰ درج کا برسٹی رس بیداکرنی ہیں جس کے ساتھ بیلیسن تھی پیدا ہوتی ہے اور یہ عد اکیس الیسے واسطہ کے اندر مہتری ہضم ہوتی ہیں۔ نشأستہ وارغذ ایک رابن کے اینزیم (enzyme) سے ضم بوتی رک ا حیں المے لیئے نعنیف سے قلوی واسطہ کی ضرورت ہوتی بین ایکن شحوم الم ٹارو کلورک ا ببٹہ کا افراز کم کروننی اور معدے کے خالی ہونے میں تاخیرواقع کرونتی ہیں۔ کہم معمولي حالات سليمة تتحت اور بالمخصوص اس وقت جب كه معدى رم كبيقدر كم موكول کھانے کے متروع میں و بنا جا ہیں تاکہ معدی رس کی بیدایش کی نہیں ہو اور علیہ کما مے کی کمیل نشاستہ دار غذائوں اور تنحوم کے در بعہ کرنی جا سے جو سے بول إلج (cereals) کیا میلون اورساخه بی سکه یا یا لائی کی صورت میں بوا - اس کے برعکس کا معدى دى كا فراز نهايت افراط كے سائقہ ہو توانتداءً شحوم (﴿ ا اونس رغن تيك یار و من کے اندر سار ڈین محیلیاں مکہ کے ساتھ وی جائیں ا) اور از ال بعد گوشت اور أاج وغره وين سع بهترين تنائج عال موسكة بس منتج ك ذريعه افراز كوكم كزيك طریقہ فالیا بہنرہے برنسبت اس کے کہ معدہ کے اندر ایک روکلورک بن جالے ہے بعث اس کی تعدیل دواؤں کے ذریعہ کی جائے ۔ کمی غذاؤں کے ساتھ حیر بی نہیں دینی چاہئے، اورمکن ہے کہ لیم خنز بریں زباوہ جربی کی موجود گی ہی اس کاسیب بوکہ وہ نا فالس بردات ہوتا ہے۔ مجھائی حل کی بہت سی شمول میں چر بی نہیں ہوتی عمو اگرب سے زیادہ مت الل

بروائت ہوتی ہے۔

زیا دہ شدید اصابتوں میں ممولی جاست کا کھانا لیا ہی نہیں جاسکتا اور بعین ا معررت عالات الی ہوتی ہے کرجب معدہ میں غذا بختوش ی تقدار میں ہوتو وہ اپنا فسل بہترین طور پر انخام دیتا ہے اور جب معدہ بھرا ہوا یا بالکل خالی ہوتا ہے تو در دیا تخلیف محوس ہوتی ہے ۔ اسیوا سطے غذا ایک وقت میں تقوش ی مقدار میں اور متواتر وقفول کے مبد دینا منا سب ہے ۔ لمکے ہے نا شخت اور دو پیراور دات کے کھانوں کے مطاوہ ان اوقات پر بھی تقوش اکھا لینا جائے : ۔ سبع کے وقت سوکر ایسے کے بعد صبع کے در میانی وقت میں م بجے سنام کو اور رات کوسر سنے سے پہلے ۔

غدا کے مایع صدیر دولقطول سے نظر ڈولی جاسکتی ہے۔ اولا سال کاوہ مجم ہے جو غذا کے عقوس صفے کے ساتھ ال کر ہفتم کے لئے انسب ارتکان concentration) بداکر دیتا ہے۔ اس کو کھانے کے دوران میں یا کھانے کے فوراً بعد لے لینا جائے۔ اور بہ جو بس کھنٹوں ہی ایک پنٹ یعنے ڈیٹر ہواؤ تک لیاجا کتا بعد لے لینا جائے۔ اور بہ جو بس کھنٹوں ہی ایک پنٹ یعنے ڈیٹر ہواؤ تک لیاجا کتا ہے۔ مزید بال جو مقدار میں ایک یا دو پیٹ ہوتا ہے وہ ہے جو کر جم کے عام تحول میں ضروری ہوتا ہے۔ اسے کھانے سے کے فام تا دو بالدات اور ما بعات کو ہمیشہ گرم کر لینا جا ہے۔ مناسب ترین سالات یا ہی ھلکی کیا جا بدات اور ما بعات کو ہمیشہ گرم کر لینا جا ہیں۔ مناسب ترین سالات یا ہی ھلکی کیا یا کو کو ہیں اور یقیناً دودھ ہی جو کہ ایک اہم خذا ہمی ہے۔ الکھل نہیں لینی جا ہے۔ یا کو کو ہیں اور یقیناً دودھ ہی جو کہ ایک اہم خذا ہمی ہے۔ الکھل نہیں لینی جا ہے۔

سور بہنم کے بعض مریض بہت لاغر ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ ناگوار تنائج کے خوف سے غذا سینے سے انکار کردیتے ہیں۔ ایسے مریفوں کے لئے بہتر رہام کا فروری ہے اور اُئیبس اپنی قاعدی احتیاج (basal requirement) (ملاحظ ہو صحفہ مردی ہے اور اُئیبس اپنی قاعدی احتیاج (basal requirement) (ملاحظ ہو صف سے اُند غذا کینے برمجبور کرنا چا ہے یہاں تک کدان کا وزن مجرا آتا ہی ہوجا ایک عدہ مجویز یہ ہے کہ تغیر بذیر تا شقہ اور دو پیراور شب کا کھانا ویا جا کے اور غذا کی مقدار قاعدی احتیاج کے معاول ہو۔ علاوہ ازین سوکر اعظمنے کے بعد الا بج مبئے ہم کے شام کو اور شب بی آخری چیز کے طور برس مینے (ایک سیردو جیانک) دو دو صد لے لیا صابح ہوئے۔

اد و بيله - به صرف اسى وقت تحرير كى حبائيس جب كه غذا كى براهتليا لم تنظيم

ً ایسے کے باوجو دعلامات کی شکا بہت ہو۔ ایک نہابیٹ نفع کجش چیز ہ⁰⁰ ہے، جومعدے کے اندرة زادكراني حاسكتى ب اورس كافعل معدى انقباض كا امناع كرنا ياذ كارس لانا سب من سے درول معدی دیا وُ کم موموا ماہے۔ دو آ میزے تمار کئے جاتے ہیں: ۔ (۱)مورا کی كارب . گريين ٣٠ نميهاندهُ طِنتهانه مركبُ تا بحداً بك اونس . (٢) سانترك أيب يُرْ ا کربین .۳۰ ی**آب کلوافارم سا بحداً کیب اونش ب**ر گارو*ن کا اعظم اشریبال کرنا مو*تو سیبلے المربع كے بي فوراً دومرات ميزو استعال كياجا أے۔ اگراس ميضيف تراش ميداكروا ہونو ٹیلے آمیز سے کا ایک ٹی سیون فل کینے کے بعد دوسہ ہے آمیز سے کا ایک ٹی سیون فل کیا جا ادراس كأكرار كباجا ميريهان مككه درويا تحيف كالزالد موجاعه يمودا بأني كارب كه بجائه بمارند كخفز (prepared chalk) أورميكنيا كارب (mag. carb.) كيمها وي مصول كا ايك نی میون فل قدر سے یانی کے اندر ملا کر اسی طرح استعال کیا جاسکتا ہے میگنیسیا کارب اُس قبض کور مع کرنے میں مفید عل کرے گا جواکٹر موجود ہوتا ہے ۔ حب سوڈا ہائی کارب تنها دباجاً ماہے تو ورور فع کرنے میں ہی کامفید الرُ تقریباً نقینی طور براسی وجسے ہوتا ہے کہ معدے میں کے ترشہ سے و CO آزاد ہوتی ہے ' نہ کسوڈ اہا ٹی کا رہے کی غوی خاصیت کی وجہ ہے۔ سائٹرک اینڈ دینے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اس عل کو اور عبی زیادہ یقینی کرو نیاہے اور دوران مضمیں و فعند معدی رس سے المدر وکلورک ا ببڈ کی تعدیل کردینا غالباً بہت سی اصالبوں ہیں ایک خراب مزاولت ہے آگرہ CO ك انرسى بالكل على ده ايك قلى تجويز كرنا مقصود مؤكومكنيسرة كسائد استعال كباط سكنا ہے۔جہاں بیٹ بہ موکہ غشائے مخاطی بی صررات موجود ہیں اُموا ب اِن صررات کو ایک بلینزیسے ڈھائکنے اور اس طرح ان کی حفاظے کرنے کے مقصب سے کیپ منہ (bismuth) یا کے اولین (kaolin) تجویز کرسکتے ہیں۔ لیکن انھیں خاصی ٹری تعدارہ میں مثلاً ما ام ڈرام کی مقدار میں لعاب (mucilage) کے ساتھ انی میں ملت کرکے دینا جاہنے یں دہفتم کی مبعض اصا تبول میں مرقق بائڈر وکلورکِ اُسیڈ' ایک ڈرامہ مگ كى منتادوں میں ' یا بی کے ساتھ خوب با كاكر كے طعامے کے ساتھ اور سس كے بعد ليا جائے تو بہت مفید ہوتا ہے' الخصوص اُس وقت جب کہ معدی دیں کا HCl بست مِمُ ا وربہن رسحبت کے مائھ جہرے کی تمتما ہمط موجود ہو' جیسے کد گلا بی کنی کی اصا نبول^{یں ۔}

دوسری دوائیس من کو کاسر ریاح کہتے ہیں 'زان دراز سے لی گئی ہیں اور ان کی لی ہمیت ہے۔ وہ یہ ہیں بیس مال دولیٹائل (Sal volatile) 'کیلہ کا صب بغیہ ipecacuanha) 'کیلہ کا صب بغیہ vomicæ) نب اتی مُریّبات (vegetable bitters) میسے کہ کیا کمبا کی جڑ (calumba root) 'اور طیرا ندر روندیا بند (volatile oils) میسے کہ رونن یودینہ۔

تطبیعی طریقے۔ شکر کے بالائی صدیر لگائی ہوئی مرارت ایک توی مرتہ ہے کاورفالبا اپنا کل خراش مقابلی طریح معکوس طور برسوٹر حشائی حرکات بداکر کے کرتی ہو مرارت کا استمال کھانے کے بعد کہتی ٹستیو (Gamgee tissue) کوشکر کے گرو با ندمہ کو با ایک تعبوی نعتل نہ برگرم بانی کی تعبیلی یا برقی یاسمولی بولٹیوں یا بلسترول [جن می امنی فیا ایک تعبوی نعتل نہ برگرم بانی کی تعبیل ایسترول (thermogene wool) شال میں افعال مرکی تعبیل اطلاق سقوط المعده (gastroptosis) کی ما پر ہوتا ہے کہ جس میں افعال مرکی کی قلت ہوتی ہے صفو معلی بربیان کئے گئے ہیں۔ بربی تاکہ دورو معلی کی قلت ہوتی ہے صفو معلی کے اندر ایک لگی گرونے فیا ہے تاکہ دباو کی بوجوائے۔ یہ مارفیا دینے کے تنبت زیادہ مناسب ہے کی تعبیل ہوتا کی کرونے کی میں کا دبا کا کر بربوما ہے۔ یہ مارفیا دینے کے تنبت زیادہ مناسب ہے کی تعبیل ہوتا کے ایک تعبیل ہوتا کا دبا کا کر بربوما ہے۔

بلعالهوا

(ærophagy)

بلع الهوا یا کمیزت ہوائگنے کی حالت ری سودہ منے کی ایک قسم پیداکردتی ہو گذشتہ زا دی معدے ہیں گس کا اجتاع تحریکا نیجسم با جا اسکن طبی طور بر رکسی معتد بہ حد تک نہیں واقع ہوتا کیو کہ معدی افیہ بہت ترشی ہوتے اور معدے ہیں بہت فلیل عرصہ تک ٹہرتے ہیں۔ معدہ کا سرطان سلو ، جو برّ ابی صنعیق (pyloric بہت فلیل عرصہ تک ٹہرتے ہیں۔ معدہ کا سرطان سلو ، جو برّ ابی صنعیق stenosis) ہیدا کر و تیا ہے ، وہ خاص حالت ہے جیس سے تخریکی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہیو کہ ہی موجہ وہوتے ہیں فیسسی طور پر فالد ایک ساتھ کسیقدر ہوا تکلی جاتی ہے ، جو الا شعاعوں کے ذریعہ معدے کے اندر کو طور پر فائد اکے ساتھ کسیقدر ہوا تکلی جاتی ہے ، جو الا شعاعوں کے ذریعہ معدے کے اندر کا موجہ وہوئے کہیں گئیں۔

دائیں وایا فرام سے باکل نیچے ہی ایک صاف رقبہ کے طور پرد کھینے ہیں آتی ہے اور وہللی آواز بدیداکرد بتی ہے ہو معدے کے بالائی عصد پر قرئع کرنے سے قال ہوتی ہے۔ وو طالت ہو لیم الہوا کے نام سے مشہور ہے، مرف الیم وقت موجود جمی جاتی ہے جب کہ ہواکی ہون ذیادہ مغدار ہیں بڑگی جائیں اور خاص کر جب کہ یکل کھانوں کے درمیان مجی جاری رہے ۔

بحث الباب - بلع الهواكي اما بُون كے تين گروه ہوتے ہيں : _

ا۔ سوء المصنعی ۔ اسے اس طبی میکانیت کامس کے ذریعہ سے معدے میں ہواد اخل ہوتی ہے (24) مبالغہ اس مینا جا ہے اُل العظم ہوسفے میں ہواد اخل ہوتی ہے (24) مبالغہ اس مینا جا ہے اُل

فی لغورز ور کے سائتہ باہر نکال دی ماتی ہے۔ اور بھی دومری اصابتوں میں ہواؤتھا

کے ذریعہ معدے کے اندر کھنچ آتی ہے۔

۳- ا فراطِر بین - اِس کاسب مبهم ہے ۔ لیکن جب یہ بیدا ہو اہے تو مریف ہے ون بھر برا برشکلتے رہنے ہیں اور سانچہ ہی ہوا ایعی گلی جاتی ہے ۔

این بی می و و در اموار کے اندر زیادہ گیس کی موجود گی لا شعاعوں سے افران موجود گی لا شعاعوں سے

لمی*ی جاسکتی ہے ۔* مکن ہے کہ معدہ حمیوٹا ہو یا ٹرا ہو۔ سات

سٹریائی اصابتوں کے لئے مکن ہے کہ علاج کے خاص طریقوں کی صرورت میش آکے (ملا خلہ پوصفرہ 785) ·

سغوط الميث و

(gastroptosis)


اسباب من 327 بربتا یا گیا ہے کہ تفوط المعدہ بالکل تندرست اضاصی میں واقع ہوسکتا ہے کہ بینے لمیے اور سنگ سینہ اور سنگی والے اشخاص ہیں۔ یہ مالت مردوں کے تعبت عور توں میں بیٹنی عام ہوتی ہے ۔ جن عور توں کو کوئی بجیہ نہ ہوا ہو یا زیادہ سے زیادہ ایک یا دو بیچے ہوئے مہول وان کے تعبت اکثریہ آن مورتوں میں زیادہ عام ہوتی ہے جن کو کئی بیچے ہو بیکے ہوں ۔ یہ بالحقوم تیس سال سے اوپر کی عربی ہوتی ہے ۔ علامات کا بہلے بہل انتخافت ماد نوعی حمتیات یا المتاب نوائدہ دودیہ کے بعد یا دائدہ دودیہ کے بعد یا جا رہے بعد مورت یا جا رہے بعد مورت یا جا رہے بعد مورت المدہ بیدا کر کئی ہے۔ اور جمان مونت یا جا رہے بعد مورت ہوں۔ یہ بیت زیادہ محنت بھی مقوط المعدہ پیدا کر سکتی ہے۔

340

رُسُلُی کثیرالوتوع تحی (و ۲) میکن که ترشگی تعی تحی (۲۱)
دسین کے بعکہ بین کو انتہا ہی و صنع میں رکھ کر لا شعاعوں کے ذریعہ سے دکھیا جائے یہ اسی کی بینی میں اسی کے بینی کے بعکہ بینی کو انتہا ہی و صنع میں رکھ کر لا شعاعوں کے ذریعہ سے دکھیا جائے یہ جب معدہ کر ابنوا بو تو مکن سے کہ اسمنا کے کبیراس قدر نیچے بوکہ انتہا ہی اصا بول ک جب معدہ کے ممل و توع کا نیچ ہونا تندکستی کی حالت کا مسانی نہیں کو اور ایسے عاملات موجود ہیں جو عارف کو تو انتہا تک استی جو است کا مسانی نہیں کا اور ایسے عاملات موجود ہیں جو عارف کو انتہا کہ اسمنا کر سے بیٹ استی حالات کو بید استی کا مسانی نہیں کا اور ایسے عاملات موجود ہیں جو عارف کو رک سے استی کو اس کا مسانی نہیں کا اور ایسے عاملات کو بید اکر سکتے ہیں (ملاحظ ہو صنع ک کے مل و توج کا ایم عامل ہوتی ہے۔ قلت منش کا تبوت غیر شفا ف کھا۔ آب ساتی موجود ہیں میں کی مفدار ہی مالی ہوتی ہے۔ قلت منش کا تبوت غیر شفا ف کھا۔ آب ساتی موجود ہیں میں مندار ہی میں اور دینے سے حال کیا جاسکتا ہے جلیے حالات ہی جاسکتا کی منعال ہیں ہوتی ہے۔ قلت منش کا تبوت غیر شفا ف کھا۔ آب ساتی موجود ہیں میں اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ غذا کے استو انہ کو اکر بی مقال کیا جاسکتا ہے جلیے حالات کی موجود ہیں جو ساتی میں قلمت نمش ہوتی ہوتی تعداد کی صدرہ نمی کی خدار کی تعداد کی صدرہ نمی خدار کی تعداد کی صدرہ نمی خدار کی استی کی خدار کی تعداد کی صدرہ نمین قلمت نمی نوعذا کا انبدا کی صدرہ نمین قلمت نمی نوعذا کی تعداد کی صدرہ نمین قلمت نمی نوعذا کی تعداد کی صدرہ نمین قلمت نمین نمین قلمت نمین کر نمین قلمت نمین کی نمین کر نمین کر نمین کر نمین کر نمین کر ن

ك قريين من درج كئه بوك اصاد خلا مركه نفي بي كدستوه المعده كي فريجي يده ١٠٠ مستوم . جن مي شكي علامات موجود مح يكتني اصانتون من به علامتين موجود مقين (26)-








ایک مبین فتی معدو کی شعاع گاشت. یا یک نصو ناسا معدو این کی بیری سے بھوا ہوا اور کم میں وار پار عضی طور پر بیمیلا ہوا ہے بینی کم میں بہت بلندی برب اور حرففی و نوں سے بوکہ نصوبر من کھائے ہیں گئے بہن ویر و افع ہے۔ انیا عنہ کی کا اول حصّہ معدہ کے بوابی سرب کے پیجھے بچھا ہوا ہے۔ سبر یکری نصور اساحضہ کر رکیکا ہے اور نئے نظر قربا ہے مدہ کے نعریں ایک ہت بڑا ہوا کا ملائ ڈکھائی ڈا یا دامہ کے عیس سے بطراتی ہے معدہ بیک سال کا بالائی لیول جو کہ افقی ہے ہواسے نیج نظرت ہے۔ (مسٹر ذیلیول سے لاک کے لئے ہوئے جمف سے)

بعبد کے مصد معدے کو ایک تنیلی کی طرح مرکر دیتے ہیں (24) (طاحظ ہوتکل ۲۸) ہے اور اللہ اور لا شعاعی شہاد ت پی) معدے کے خالی ہونے ہیں عمراً تا خیر ہوجاتی ہے (۵ ھ) اور لا شعاعی شہاد ت کے اکثر بنہ حلّیا ہے کہ زائدہ وو دید کی غیر طبعی حالت (۵ ھ) کو لون میں اخیر (۲۲) کم متعوط القولون (۱۲۵) اور لفائغی رکو د (۲۲ م) موجو دہے ۔ معدہ کے نیچے ہوئے او رکئر تلت منش کے با وجو د معدے کے حرکات و و دید خاطی بائے گئے۔ متحریز کا طریقہ ہرہے کہ برجھ با قاعدہ ورزش کی جائے ہیں کا کے میٹول ورزیا دہ محنت سے احتراز کیا جائے غذا الیسی کی جائے کئی آپیل



اورترکاریاں بدافراط بون بیاخانہ جائے ہیں پابندی وقت کی عادت ہوائی جائے اور آنتوں کی مبریے قاعد کی یا علاما تِسور بہتم کے طرف فوری توج کی جائے۔

سقوط المعدہ کی ایک سریری علامت یہ ہے کہ ناف سے اوپر خطو وسطی میں دبانے سے ور دبیدا بوجا تاہے اور اگر بھم زماں طور پر ارتفاق عانی سے عین اوپر دبا یا جائے تو اس میں فوری تخفیف پیدا بوجا تی ہے۔

دبایا جائے تو اس میں فوری تخفیف پیدا بوجا تی ہے۔

علاج یا نسبتہ ضیف اصابتوں میں کمن ہے کہ کسی علاج کی ضرور سے نہوئ کہ در نرخو گئر ورت وغیرہ کی در نرخو گئر وال میں ایک بیٹے المعارے اور کسرت وغیرہ کی در نرخو گئر والے کی نواری یا مجلیتی یا شمشیرزنی کی مشقوں سے کچھ نقویت دینا مفید ہو۔

مشکی دکاک اور بجلی بھی مفید ہوسکتی ہے۔ زیا وہ نمایاں اصابتوں میں ایک بیسی کی

مسل دن عمر بہنے رہنا چاہئے۔ یہ بیٹی المبی بنی موئی ہوکہ ارتفاق عانی سے عین اویر سخت دباو والے۔ اور بیٹی کے اندر کے طرف ایک عمیوٹی اُجری ہوئی گدی رکھنا آیک عدہ بچویزی کے اندر کے طرف ایک وقت میں کھانے کی خفوڈی خفوڈی مقابی لینی چاہئیں اور کھانے کے بعد مریف کو دائیں کروٹ برلیٹ جانا کی پاوں اور کا مقول کے بل حیلنا جا ہے۔ اس نے نداکو بواب کے آر بارگزر سے میں آسانی ہوگی۔

مبٹیریا بی تفئے

(hysterical vomiting)

دوسرے ہیں بائی مظاہر کی طرح 'برطیر یا ئی تئے بھی موا کسی اپنی شکا بت
سے بیدا ہوجاتی ہے جس کی علامتوں ہیں سے تئے ایک علامت ہوتی ہے ، اورجب
اسی شکا بت رفع ہوجاتی ہے تو یہ نئے ایعاذ کی وجہ سے جاری رہتی ہے ۔ وہ نئے جو
حل کے ساتھ قدرتی طور پرمثلازم ہو اگرتی ہے 'ایعا ذید برافراد میں اسی وجہ سے
جاری رہ سکتی ہے ۔ اس فیم کی فئے التباب زائدہ دودیہ کے حلہ کے بعد اس وقت بمی
جاری رہ سکتی ہے جب کہ زائدہ دو ویہ جرای علیہ کے ذریعہ سے خارج کر دیا گیا ہو۔ دوالن
جنگ میں ''گیس زدگی" کی علامتوں میں سے قئے ایک علامت نعی 'اور بہت سی اصابتو میں بسٹریا ئی قئے بدا ہوگئی۔

عُلَاج ۔ دوسری ہسٹیریائی اصابتوں کی طرح کس میں عسلاج نفسسی (psychotherapy) کا استعال کرنا جاہئے۔ مریفن کو اصلی صورت حالات سجھا دنیا جاہئے۔ مریفن کو اصلی صورت حالات سجھا دنیا جاہئے ۔ نتما م مفعوص دوائیں اور غذائیں جو ابتدا ڈفٹے کی وجہ سے تجویز کی گئی تعمیر کا ادر جو مکن ہے کہ بدر بیدا بیا فراس حالت کو جاری رکھیں اب بند کردنی جائیں اور مریف کو معمولی غذا لینے کی ترغیب دنی جاہئے ۔ عمیر العلاج اصابتوں ہے کہ بدر ہو گئی کردا ہ سے اشتاع شری میں دبری ایک سبتلی نلی گزاد کرمریف کو غذا و بجائمی سے م

-4

دوری شفیځ

(cyclical vomiting)

تنجی اور بهنیتالی مز اِولت دو بون بی پیشکا بیت مین تا نبره سال عمروالیه بيول مي سنبته عام بوتي بي إگرچ اس كا امكان بي كه اسي مصفراء كے حكول" ("bilious attacks") كى نتخىص كے تحت نظرانداز كرديا عاك جوغذاكىكسى بے اختیاطی سے منوب کردئیے جاتے ہیں ۔اِس کے حلے مختلف فاصلوں پر ہواکرتے ہں اور زہنی یا و ماعی بیجان رجیها کہ طیسوں کی شرکت سے یا منخان دیسے سے پیدا ہوجا آہے) سرایت (جیسے کہ زکا م اِالتہاب لوزہ) زائد عضلی محنت رجیسے لار ما بقتی کھیلول میں) یا بھنے سے (جیسے کہ موٹر کی مواری میں) سروع ہوجاتے ہوں۔ اکٹران کی موجود گی کی ایک خاندانی سرگذشت مونی ہے۔ اور کسس شکایت کے مومنوع بعضًا وقات (گوکہ ہمیتہ نہیں)معمولی سحت کی حالت میں نہیں ہوتے ' اور وہ متعبضُ غفلت مشخوب عصبي مزاج مشب بولي (nocturnal enuresis) عجبتري ين (backwardness) ، کیٹون بولیت (ketonuria) وغیرہ میں متبلا ہوتے ہیں۔ علاما ت محدد فعتهُ شروع بوجا آب علامات جود با تين دن يک جاري ر منت بین به بین: سلمندی غنودگی در در رئے نے اور انبطاح دا رتفاع حرار ست جو مکس ہے کہ مووا درجہ فارن ما ٹرمل کا ٹرنیج عائے ، پہلے دن صرور موجود ہوتا ہے۔ و در سنکی بو آسے جواکہ وائیں حرففی حفرویں بو آب اور مبض اوفات بسکے سا تقرالیمیت اور استواری موتی ہے جیائی التباب زائد و دودیہ سے مثا بہت پیدا بوجاتی ہے۔ راقم لحروف کے ایک مریض میں یا خاسے ملکے آغاز می بدبرداراور حلفتم ہومائے کے بعد غیر عمولی طور پر بڑے تھے۔ قاعدہ ب کہ حلد کے دوران م قبض ہوا کرا ہے۔ مریض کی فقے اور سائنس دونوں میں آلیمیٹون (acetone) کی (B-oxybutyric acid) مائے جاتے ہیں۔ یہ کتیونیت حلیک آغاز میں کے خاتے

342

شروع ہونے سے پہلے موجود ہوسکتی ہے۔ اگر نفے جاری رہے تو بچے ظبری وُبلا ہوجاً ہو کہ اُس کا سے ہونے ہوئے ہوئے ہو اُس کا سکر بازکشیدہ جہرو انتکا ہوا ہو اُب اور آنکھوں ہیں گراسے بڑجاتے ہیں کہم بی اُس کا حکم مہلک ہوتا ہے اور ور ور رور نہیان بیمپنی تشنیات کے سائنہ ہوطی کیتونیت کی وجسے قوا ہوجا آ ہے (ملا صلہ ہوسنی 646) - مہلک اصابتوں ہی طرب ہوم می کی مالت میں یا ایک ہے۔

آمراً صنیات بعض اصابتوں نی قلیل شکرد موبت پائی گئے ہے، اور بعض میں خون کی شکر موبت پائی گئے ہے، اور بعض میں خون کی شکر موبی میں خون کی شکر موبی میں اساری کے جمعے در بعیر سے ایڈر نیالین کا افراز زیادہ کلتا ہے، اور یہ کمو بن شکر کو بڑھا ہے (ملاحظہ بوصغیر 479)، اور بالآخر طکر کی گلا تحوجن کو گلو کوزگ شکل میں برافراط منتشر کردتیا ہے، جوجم کے اندر برسر عدن حل جا آجے۔

کنی بر اورعلاج می کورک تمام اور علاج اس طرح کیاجاسکتا ہے کہ برافراط شکروی جائے ہے۔ اگر بچے ہے ہوش ہے توہ فی صدی ڈکٹروں (dextrose) ایک افغیل بوش ہے توہ فی صدی ڈکٹروں (dextrose) ایک افغیل انسان بنی انبو یہ کی داہ سے جو کہ لواب یا اثناعشری تک داخل کردیا جا تاہے والمل خطابو صفحہ ایک اور معا و تنقیم کی داہ سے دیاجا سکتا ہے ۔ کیتونیت کا علاج یہ کیڑت سیالات سور دابا کی کارب وغیرہ دے کرکن ایجا ہے۔ لیکن ایسولین بنیں و بنی چا ہے۔

معده اورانناء شركي كاحادا نتاع

(acute dilatation of the stomach & duodenum)

معلى اورا ثناعشى اللاؤس (gastric & duodenal ileus)

معلی - اس قسم کی اصابتیں نفیۃ شافی ہی اگرے اب ہمہت اصابتوں کا اندراج ہواہے - ان کے وقوع کا سب آسانی سے ہم میں نہیں آیا ۔ اِن کی فالب تعلیٰ میں تسدد وکا کوئی صریح سب نہیں ہوتا الیکن مبنس اصابتیں معدے کوحدسے زائد بھر لینے کے مبد (خاص کر سبزی ترکاریوں سے) سب دا ہموٹی ہیں ۔ کثیرالمقدالیس ملد پیدا ہوکر معدہ اسیطرے بھول جا اے میں طرح کہ ایک جمیر کا بیاد معدہ (rumon) رے گیروں کھالینے کے بعد یہند اصابتیں تفریکے کے بعد واقع ہوگئی ہیں اور گمان الب کے کان میں معدی عضام شامل ہوجا آہے ' اور ایک ہو تھائی سے زاکدا صابتیں برای اعال کے بعد ہوئی ہیں۔ ایسی اصابتوں میں قیاس ہے کہ معدم میں کے ماتھ مربینوں ووابا منت مض ہے' بالخصوص جب کہ وہ انتظر ہو' کیو نکہ اس معدم میں کے ماتھ مربینوں کے جوانگل کینے کا امکان مواجے۔

اس کا آفازی ما بیت تاگهانی بوتان دریفی کوتے بوئے کئی ہے کے ساتھ وہ بارباد ہرے بھورے یا رمادی سیال کی بڑی مقداری باہر کالی تیا ہے کہ سے ساتھ وہ بارباد ہرے بھورے یا رمادی سیال کی بڑی مقداری باہر کالی تیا ہور کے اس کے ساتھ معدی تقلیف درد و اور آلیمیت ہوتی ہے دیش موراً اپنا بائی ورزیر بی صورت میں بہت بھولا ہوا ہوآ ہے کیکن تنراسیف نسبتہ بین کا جو اس مرکت وودی بالکل استثنائی طور پر بائی جاتی ہے (سی ۔ تقامین کی جع کردہ چرالیس اما تبول میں سے مرف ایک میں) ۔ لیکن گمک توج اور جباکا کو کی مختلف مقداری مالی ہوتی ہیں ۔ مریض مہبوط ہوجا آ ہے کہ آسے بیاس لگتی ہے ، بیٹیاب کی مقدار کے موتی ہیں ۔ مریض ہوتا ہے ۔ یہ علامتیں چندور کے سال کا کم رہ کئے ہیں ۔ موتی ہیں ۔ یہ علامتیں چندور کے سال کا کم رہ کئے ہیں ۔

مرت کے مبدمعدہ بے انتہامتر در ہوتا ہے اور نیجے عار تیک نینجکر اپنے اوپر نم کھاتا ہے اور اس کا ایک مصد آتا مشری کے طرف واپس لوٹنا ہے مبض افغات تمدد کچھ دورا نینا عشری میں بھی بھیلی جاتا ہے۔

پاکس (Box) اور و آکیس (Wallace) کے شاہرات سے ظاہر ہوتاہ کہ است کا ہر ہوتاہ کہ است کا ہر ہوتاہ کہ است علی است ایک بار شروع ہوجا آہے تو متمد و سعد و سلم میں گرجا آہے اور اشنا عشری میں ایک تند و پیدا کرد تناہے عیں کو رہ سے معد سے گیبوں کا خارج مونا رک جاتا ہے اور اس طرح اِتساع میں اور زیادتی ہوجا ہے۔ اور گیبیں جنی زیا وہ جمع موتی ہیں اُتنے ہی زیاد و لیسنی طور پر وہ نا ہے تہمیں ہوسے پاتمیں۔

علاج - ایک لمی داخل کر کے معدے کے انیہ کوم کہ بہت وہا وکے تت میں کلل لینا جا ہے۔ مریض کو مُن کے کل لیٹنا جا ہے ۔ اور بستری بائنتی کو اُوکھا انتظادینا جا ہے گاکہ کوئی تنیات جموع دہوں سیدھ ہوجا کیں۔ ا ندناعشری - ال حالت بی مکن بے کہ اماد متی عروق کے دریعہ سے مضنی پر اربوکر خواہ اس کے ماختری مائی موج کے قریب مننج ہویا ہو تعدوی بیا ہوجا ا پر اربوکر خواہ اس کے ماختر اثنا عشری صائمی موج کے قریب مننج ہویا ہو تعدوی بیا ہوجا ا جے ۔ اثنا عشری کے اِتساع کی ایک مزمن حالت خالباً زیادہ شاذ بنیں اور اُس کے ساتھ مور جنم کے علا ایت مندوستکم اور صفرادی قبلے بھی موتی ہے ، 8 اید۔

التهاب معده

(INFLAMMATION OF THE STOMACH)

طادالتهاب المعده

(acute gastritis)

اسباب معدے کا ما الہتاب یا ما و معدی نازلت مختلف قدام کے خرایش اور وں کے فر بعد بیدا ہوسکتی ہے۔ معدی التہاب کی شدید ترین مقی می نز شول یا دوسے آگالات سے نشر واقع ہونے کا نیتجہ ہوتی ہے۔ زیادہ مام استیں ناقا بل ہنم غذا مثلاً بحید نگا مجمل کے کی کرنے یا کھیرے واد مجبل یا کھی بیل یا ایسے گوشت مجبل بیل میزی ترکاریوں یا دوسری غذا ہیں جو سرنے ملی مون کا استعال کر ہے ہیا ہوتی ہیں املاط موصف 1867 ۔ جن نج یدمن گرم کے موسم میں عام ہوتا ہے شیرتوار بھی اکثر التہاب المعدہ میں مبتلا ہوتے ہیں جس کے ما تعدالتہاب المعدہ میں مبتلا ہوتے ہیں جس کے ما تعدالتہاب المعدہ میں مبتلا ہوتے ہیں جس کے ما تعدالتہاب المعدہ میں مبتلا ہوتے ہیں جس کے ما تعدالتہاب المعادم معدی قوصلہ کے عنوان کے متحد معدی قوصلہ کے عنوان کے متحد معدی کا میں خال ہوتے ہیں۔

مرضی تشریح ۔ الگیس سین ارٹن (Alexia St. Martin) کی شہور اسابت ہیں یہ است کیا گیا کو ختا ہے نماطی فراش کے معدمدی تغیرات مودار موجہ ہیں۔ سرخ داسف بدا ہوجاتے ہیں ہو معض اوقات رہی مواوسے محر جاتے ہیں ایس خ طبتیاں یا قلامی پیڑیاں یا خراست یہ گیاں موجود موتی ہیں۔ معدی س کا افراز کم مقدار میں ہو اے اور نماط آزاد انہ خام ہوتی ہے ۔ بعض اوقاست خنیف نرف ج

واتع ہو آہے۔

علامات - اکال مم سے وعلامت بیدا ہو باتے ہیں وہ یہ ہیں: - شراسیف میں ماد دروا درالیتیت ' نون اور مخاط کی ہے' اور تبوط - بار باس کا نیتو موت ہوتا ہے۔ یہ اصابیں مومیات کی کتا بور میں بیان کی گئی ہیں۔

عادالہماب المعدہ کی اس الله بت یں گرجس سے زیا وہ واسط برلی ہما ہے ا علامات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ حا دموں ہمنے لے تیمیز خواروں کے سعدی معسلائی النباب کا بیان مبدی درج ہوگا۔

يه يا در کهنا چاست که تب محرقه انفسلو ننز ا اور البت اسب زائده دود به انداره ودوبر (appendicitis) جميعه امراض کا آفاز طوالتهاب المعدو کی مورت اختيار کراي يو-

حلاتقیحی النها معلی (phlegmonous gastritis)- مدیکی یا فلغمونی النها ب معلی (phlegmonous gastritis)- مدیکی و النها ب مهاست از واقعه به جریا نوایک محدمد فراج کی کلی یا ایک ری در در شس کی صورت می واقع مواجه - ال کے طلاعت عمراً ما و معوی سند و مدریر شس کی صورت می اور ساتھی علامات سے متنا یہ ہوتے میں اور ساتھی شرامی فریشدید ور و تو اسے (30)-

مزمرالتهالميث

(chronic gastritis)

بوم ان سرمع تغیرات کے جموت کے بعد معد میں اس کا بعد المات بعضم ما قع بو جائے ہے ابحث رونما ہو جاتے ہیں ، یہ مرض انتہائی بحث و محمیم کا موج کے اند و افی صدی فارلین کا اختراب کردینے سے عمدہ تثبیت ماصل ہوں کتی ہے۔ مرض التباب المعدہ ووط بقوں سے بہا ہوجات ہے ہے ۔ مرض التباب المعدہ ووط بقوں سے بہا ہوجات ہے ہے ۔ ۔ (۱) جوئے خون کے ذین وجہ سے کا ان تنی یا ساری عاملات سے جو بوری معدم کو اون کردینے کا رجی ان رکھتے ہیں۔ (۲) بلا وا سطم کو اون کردینے کا رجی ان رکھتے ہیں۔ (۲) بلا وا سطم کو اون کردینے کا رجی ان رکھتے ہیں۔ (۲) بلا وا سطم کو اور ان بال ہوا ہا البالیات کا خشا کے مفالی بیا تر ہوئے سے جو کہ معدہ کے وروز میں موجود ہیں۔ یہ او لا بوا ہالت ہو البالیات المعدہ (جس سے معدے کا المعدہ (فرن موجود ہیں (جس سے معدے کا المحدہ اون موجود ہیں ان جو جا ہے کہ کرونکہ مدے کا فید دو سری کسی جگرے نبیت اسی تھی نیادہ نوا ہو دورک ما تھ دوائے ماتے ہیں (31)۔

ب علادوم

ضرورت ہو اہمشامین (histamine) کے ہر ربی گرام کا انتراب کریے کی صرورت ہو۔ متعل مے ترمشکی ایم کیلوسی کو ئی خلی حالت نہیں پوسکتی۔ لہٰد اشدید عام دمو سیت یا سرطان المعدد کی خیرموج دنگ میں اس حالت سے مزمن التہاب معدہ خلاہر ہوتا ہے۔ بہ ذیا بیطیس اور گر مالو کے مرض میں عام ہے۔

بے کہ بے ترشکی کر ت وقع عرکے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔
مرضی تشریح ۔ فون داوسموں میں ابتدائی التہاب اپنی موجو دکی مزور طیو
کی در بین سے ظاہر کر تاہے جو معدی فدد کے در میان واقع ہوتی ہے ۔ کی عرصہ بعد فدو
فدبول جو جاتے ہیں اور اُن کی جگہ اُر کی افت پر ابو جاتی ہے گیا بعض مقامات پر فد و
وکری ہو جاتے ہیں ۔ بعض او قات معوی سرحلم مع جام نما فلیداور بلکہ جو فد ولا انبرکو
(Lieberkuhn's glands) کے پر ابو جاتے ۔ جرا بی التہاب المعد و follicular میں تھی ہے ۔ ایسے ہی تغیرات بوا ہی میں میں ہی واقع ہوسکتے ہیں کی مزید ہو ایسے ہی تغیرات بوا ہی میں ہے واقع ہوسکتے ہیں کی مزید تا ہو اور اور یری تا دکھات ممیز ہونے ہیں ۔
ایک جاتا عدہ سعدانیت ظاہر ہو اور او بری تا دکھات ممیز ہونے ہیں ۔

علامت خون دا دقس می عام ترین مالات یدیس و در محت تعبق یا است خون دا دقس می عام ترین مالات یدیس و در محت تعبق که ایسال یا دی باری باری سعه دونون دخی د بات ند بار طیمون یا تقرع کے ساتھ جیسی کمه متعلق معلم معرم دموست میں بائی جاتی ہے تکان دخفاض بے خواجی دوشتیت کی تھی ہے۔

:44

سوم میں علامتیں بالکل ہنوں معلوم ہوتا ہے کھانے کی موجود گی کا انحصارا ابتیاب کی خالیت برمواها ـ إنانه من من نون إياماً أب ـ اس كرمكس بوابي التهاب المعده بالكام يسيم علامات بدا كُرسكنام يصف كرانك مجاورالبواب قرصه (بوطا خطيمو) كه بو نفي مي اورسانيني باهما روکلورک ایپذکا افراز معمول کے نسبت بہت زیاوہ ہوتا ہے! عد عد *و گرمنگی فیکہ تنے ا*لعہم موجود ہونے ہیں۔ مزید براس جب معدے کا توابی حصہ بھنمی قرصهٔ کا عث بدر بعد علمیہ وور کردیا گیاہو اتو اس کا خود بین سے امتخان کرنے پر یا یاجائے گاکہ اکثرا و قامت ایک ترابى البتهاب المعده بكدالتباب اثناعيرى موجودت جواب امرير ولالت كرايحك ممنعی قرصاکٹر او قات محض اُسی حالت کی ایک ترقی یا فندشکل ہے۔ مرمن ابتهاب معدو آخری در حول می جب که به نزمنگی بردا مو دبا تی بدی خر دخلوی عدم دمو بیت (س عدم حامضي عدم ومويت ؟ متلف عدم وموبت اور خلع شوكي كم تحت الحاوم موي انحطاط كرك ته مثلازم إيا جا تا ہے۔ ير طان معده كى استعداد بيدا كرا ہے اليكر بهاں جوثت مِیش آتی ہےوہ یہ ہے کہ بے ترمشگی عور تول میں 'سبتہ زیا وہ علم ہے ' حالا کہ سرطان **معام**

مردو*ن بن ز*یا دہ عام ہے۔ میں بیات میں ایک میں ایک ایمیت پہلے بیان کی گئی ہے۔ وہ مور مضم جوبیش افراد کے ساتھ مثلازم ہوالتہا ب المعدہ سے اور بالنصوص اس کی بوابی ضم سے منوب کیا جامکما ہے کہ بشر طبیکہ اس کے دوسرے اساب سینٹنی کرد کے گئے ہوں ۔

علاج _بے ترس کی کے لئے ایک ڈرام لی ڈروکلورک ایٹدمرق acid) (.hydrochlor. dil چارا ونس یانی ین کمانے کے ساتھ دینا چاہئے ۔ سور بعنم کے

علاج پر پیلے غور کیا جا جیا ہے ۔ مرف

(peptic ulcer) معله اورا مناعثیری کا قیدما

ترشئ معدى س كالمتقرعا وتأمناس موسع والعدمخاطي اغت برتقرع وزم مو نِهامیت اِمکان برو ماسے - ایسے قروع کو برلحا لا ہموات هضهی کہتے ہیں ' اور ا^ن کی کئ نسی بېرنۍ بیں۔ حاد قرصه(acute ulcer) جو نهایت عام کور پرمتعد د ہوتا ہے،

می غشائ مالمی کے ایک مجوٹے سے اوری آوکل سے اے کرایک ایج قطر یک مختلف ہو آبنے۔ مزمن قورع (chronic ulcers) عمواً منفرد بیرتے ہی اور ان کی بیترین جاعت بندی اُن کے محل و قوع کے لما ظ سے کی جاسکتی ہے و۔ ۱۱) میم معید و میں عموا ت زما ده ترتیملی سطح بربه (۲) معد-یا وہ فریب منس جاتے۔ (س_ا) اثناعشری کے بیلے جھے می*ں عمو* ما بیٹھیے کی طرف۔ اِس سلب یہ مریتے ہا در کمینا جا ہے کہ اثنا عشری کے پیلے جننے کا فعل ایس کمے دورس معول کے فعل ہے الکل مختلف ہوتا ہے لیکن وہ معدے کے بوابی حصے ہے زاد قریبی شا بهندر که تاب . مثلاً ترشی کیمس بواب کی راه سے اننا وینری کے پہلے تھے میں وصلیلی جاتی ہے اور جب تک کہ حرکت دور یہ کی دوسری موج کچھ اور کمیوں ایکے کھ طرف نه وتقلیلے جو اس کی مگد سے وہ و ہیں تقیری رہنی ہے ۔ عین برا بی حلفہ برواقع مجو والے تروح مینداں عام نہیں ۔ مبر معدہ میں کے قروح اکثر ممیز خصا مکس ر کھنتے ہیں ا اوران قروح اور بوابی تووج کو ملفل اس مجہ سے کہ یہ دو تول آغاق سے ایک ساتھ معدہ کے اندرواقع بوئے بین معملی قرح "کے موان کے تحت ایک ساتھ گروہ بندكر سنن سے بہت كھ فلط مبحث بيدا مو كيا ہے حالا كك بوا بي قرم اثنا عشري كے قر*وح کے مائة ن*نبتۂ زیادہ قریبی مشاہرت دیکھتے ہیں۔ بوابی اور انتا^{عو} شری نست رہے ہ ايك ساتع مجاور اللواب تروح (juxta-pyloric) كى حيثيت سے غور كرا جائے معدہ اور اثناعشری دو ہوال کے قروح بیک وقت موجو و معطعے ہیں۔

اسباب. ما دیمنی قروح بے قاعدہ طور پر ما بجا منتشر و اتع ہوتے ہیں اور غالباً مرود عورت دونوں مبنوں میں الکل عام ہیں۔ کین دہ عورتوں میں اسبتا را اور غالباً مرود عورت دونوں مبنوں میں الکل عام ہیں۔ کیاں دھتے ہیں۔ ہیں زاوہ عام ہونے ہیں اور بالمفعوص جبم معدہ کو او ف کرنے کارجمان رکھتے ہیں۔ ہیں متفام کے بیض قروح مزمن ہو جانے ہیں اگر جوان میں سے بیٹیر کافی سرعت کے ساتھ مندل ہوجاتے ہیں۔ تا ہم مکن ہے کہ بید میں وہ بھر بیدا ہوجائیں اور بھرمندل موجائے میں اور بھرمندل موجائے میں اور بھرمندل موجائے میں۔ اس تا ہم کی کارجمان دھتا ہے کیاس قرح کریت کھڑی معدہ مروول کے تنبت بھر کا معدہ مروول کے تنبت کی کارجمان دھتا ہے کیاس قدم کا معدہ مروول کے تنبت

عورتوں میں بہت زیادہ ِ عام ہے(32) - معنمی تقرح مورتوں میں نہا بہت مام کورج جمعید کے اندرواقع ہوتا ہے کیکن مرول میں وہ نہایت عام طور بر مجاور البواب خطی میں مواکل ہادراس قدر اعبی طرح مندل نہیں ہوتا ۔ اسی وجہ سے بم یاتے ہیں کہ (۱) مزمن افتنا حشرى قرح عورتول كحانبت مردول بي ج سكَّف سے ليَّ كَرْجِي كُنَّا مَكُ ہوتا ہے، نیکن (۲) مزمن معدی قرصہ دونوں منسوں میں تقیریباً مساوی طور برعام م**والو**ا لیونکه بود بی خطه میں مذکر تقریم کی کثرت و نوع سے مبر مسدہ کی مونث کٹریٹ و قوع کی تغزيباً تعدل بوط تی ہے اور ٣١) قرحی مُدبات زلی وہ عام طور برجیم معده میں سطح مِي (33) - طال من يه إدهاء كما كما سي كورتون من اثنا منزي قرص معدى قرصه كي برنبت زیاده مامه یک لیکن پیکه التهاب مراره کے سلسار علامات سے سی کی مثابہت إِي مِانى سَبِ (29) ـ مِضى رَصْ فاندا زُل مِن واقع بوسے كار جان ركمتا ہے ـ نها يت ا تفاقی طور پر معدی قرصه تشک کے مبب سے ہوتا ہے۔ بلا در و تنے اِلدم جونوج ان ورا یں اس قدر عام ہے اور عبے معلی نضبض (gastrostaxis) کیتے ہیں مادتقے کے باعث بیوتی ہے ۔ یہ صررات اکثراد قات ہِس قدر عمیر نے موتے ہیں کہ ایمنسین زنی "ا رکلات کہتے ہیں' اور اس قدر وبیع بھیلے ہوئے کہ مکن ہے کہ خشائے مفاطیٰ تقفرخون اُ كالمنظر مين كرب البي عالب مين مزمن التهاب المعدوكا اشتداد موجا آم بي مضمى قرحداوربوا بی التباب المعده كاتعلق بیان موجيكا ہے ۔ اثنا عشري قرص كا وقوع شيروار بوں میں جی بان کا گیاہے۔

مرضی تشریح۔ حاد قوحہ۔ ابتدائی درجہ میں کمن ہے کہ ایک اوپری سنخری مردموج وہوئی سے کہ ایک اوپری سنخری مردموج وہوئی ایک خفیف سی انٹی مردموج وہوئی ہیں۔ کے حاضے سنخ میں اورجہ مخاطی طبقہ کی ایک خفیف سی انٹی موٹری اور و بیز حکتی پرواقع موئر بھراکہ ان اور یہ بیندا اکثر متنی خون کی آیک بیلی یا ویرت مجموعے موٹری مرکب جانا ہے۔ جب انہ ال ہونا ہو تو اس برت کے مدا موکر اتر جاسے سے ایک ساف بیندا افی رہ جانا ہے۔ یہ تروح ایک سنبہ کی ہوئی شکل کے موتے ہیں۔ ایک سابہ کی جوئی شکل کے موتے ہیں۔ منبہ گی جوئے قوم واکل اُسلے موتے ہیں۔ کیو کہ وہ صرف نی طی طبقہ کو اور اُن کی کل سنبہ گی ہوئی شافے ہیں اور اُن کی کل ایک اُسلے موسے میں اور اُن کی کل


ں پینی نکا بُٹوتی ہے کیوکہ قرصر جرب جرب زیا وہ زیا وہ گھرا کی تک چید کرآجا آ ہے اسی قدر ِ **اِ وَهَ نَنَكَ مِوْمًا عِالَابِ ـ مِنْ مِن قرحُهُ عَمِواً نَسْبَدُّ بِهِتِ بِرَا مِوْمَاتِ ا**ورَكُمُن ہے كه أس كاقطره يا الني تك ينني جائے . وه ديوارمعده بي كرا بيليات ، التيابي لني اسا ماوہ کی در ریزش ہونے کی وج سے اس کی کوریں دبیر اور اکھری موئی موتی ہیں اور متقرح سطح کے اوریسا یہ کئے ہوئے موتی ہیں ۔ اور د آزت متوڑے فاصلہ کک ہم ہی ایل کی غث کے مفاطی میں تھیل ماتی ہے جب مرین قرند فعال حالت میں ہو اسے تو اس کے منيد يمي اغثاثي التهامي ارتشاح كا اكت ننك نطقه موماسي جب وه حالمت المال میں ہواہے توعثینہ علی ہ ہوکر قرمہ کا مینداصا ف ہوجا آ ہے اس کے ماکشیے نسبتہ زیادہ چینے بوماتے ہیں اور سرطر اندر کے طرف بڑھ کر ببنیدے یر آما تا ہے۔ ترحیہ

تعن مي عل اندال شرا بوارتها به ـ

جَب يه تغرِح إدليلون كالسبنيج ما ما سه نومكن سه كه باربطون بجشكواشقا^ب واقع **ہوجا سئے۔** بیانشفا ب معدہ اورا ثنا عشری دونوں کی ٹیچلی دیوار پر برسنب اکلی ہوا^ا کے زیا وہ عام ہے۔ حثائی افید کہغهٔ بار بطونی میں د انس ہوجائے ہیں اور شدید عسام السِّناب إربطون يا ايك زياده محدود المقام عبورًا بيداكردية بن ركرد معلى خراج .perigastric abscess 'یان سد ا تفرامی مورزا perigastric abscess :abscess) (ملا حظه موصني 416)- اب نهي تعيور المكن عدد الغرام كوميد كروات الرية ذات الجنب! البّاب *تا رمور بيدا كروك يامكن بيمكه به قولون بالأنتاع شرى ي* حیب کردے کیا بیم حکن ہے کہ یہ عام کہغہ بار بطونی میں عیوٹ بٹیسے ۔ مزمن انتقاب كى مطلاح س قرندكيليئه متعمال آل جرجوا ك قت ينخطوا تصورًا كركے عمر واز تك كيمغهُ بار بطو ني كه المر بار سبّائ اس سے انفعالت بن كرفاص كيفه باربطوني كے ما بھ مواصلت نتطع کرویتے ہیں۔ حکن ہے کہ یہ اِنفہا مات اس قدر کنٹیف موں کہ سرطان کا کمیان بیداکردیں .معدہ اِس قرصہ کی راہ سے ایک بڑے کہفہ سےموامل*ت حا*مل کرلتیا ہے جومعدے سے با ہر ہو گاہے اور مبض اوقات تا جدُ صغر کے بیٹیز جھے برتا ال ہو آہو۔ سنبته زياده اكتزيه رموتا ہے كه النهّا بى كام على على كيسليّا ہے اور بِس سے بيلے كه اثبقا واتع ہوسکے معدے کومتصلہ اعضامیں سے کسی ایک کے ساتھ جیکا دیتاہے۔ یعضو مِتیتر

اوقات لبلہ یا مگر کا بایال گفتہ ہوتاہے کیکن کہی کہی ڈاکفرام طحال تولون اگر ہائی۔
شکر بلکہ فوق الکلوی کیسہ کے ساتھ بھی انفغام واقع ہرجا آ ہے۔ بھر تقری مل آل جگا چیلے ہوئے مفنو کے اندرمبیل جا آہے اور س طرح مکن ہے کہ مگر اور لبلبہ کے اندرکیفے بن جائیں۔ نہا بیت سٹ ذامیا تبول بی تولون کے اندریا طبد کے آرپارنا سور پیدا ہو سکتے ہیں۔ نرف ایک عام واقعہ ہے ، جو بیشتہ ان معدی عرف فی ہی سے ہوتا ہے ج قرصہ کی دلوار میں ہوتے ہیں کیکن بیض افقات لبلبہ کے ساتھ انقیام ہوئے اور اس کا تقرح واقع ہوئے کے بعد طحالی شہان سے می نرف ہونا ہے۔

ا مراضیات ۔ برلن (Bolton) ہے ایک بنفوص معدہ سمی معل تہا ا کرکے اور معدے تی بار مطون سطے کے نیچ اس کا اشراب کرکے حیوانات میں تجربنہ قروح بدا کئے ۔ اشراب کا نمیجہ یہ ہو اکہ ظلیات حیو بہت ابودہ ہوگئے اور معدے کے ہا کڈروکلورک ایڈ سے ان خلیات کے ہمنی میں صعد لیا جس سے ایک حاکہ قرحہ لے بن گیا۔ جب معدی ما فید کو قلوی رکھا گیا تو قرحہ نہ بنا۔ انسان میں قدارتی طور پرواقع ہوسے والے قرص کی قوجہ بھی اسی اصول کے مطابق کی جاسکتی ہے۔ مکن ہے کہ ایسے کئی مخلف عاطلات ہوں جو برائش کے معدہ سمی مصل کا ماعل کرتے مول اسٹار مداویت جو کسی دومہ ہے متعام پر کے عفونی مراکز مزمن طور پر لیمتہب نا مُدہ وودیہ یا مرارہ عفونی و انتول یا وسیع اور مرابیت و دہ احتراقات کی وجہ سے بیدا



ب انخااصغیر برمعدی فرط جوکد ایک طاقعید کے ذریعہ دکھایا گیا ہے کچید مقابی شع موجود ہے ۔ (شعاع کا تی مسٹر لسٹرسے لاک نے لی س) القان موجود ہے۔ (شعاع کا تی مسٹر لسٹر سے لاک نے لی س)

میمونے عروق کی وریدی طفتیت مانز ن حوبعض او قان ی^ا بی تسدو **کی و**ج اقع ہوجاناہے یتٹا و موقعوں پرحکن ہے کہ معدہ راہ را سے کسی حوث سے زخمی يوحائے ً باايک أولى والى النهاب المعدة موجود ہو۔ يا نظر وكلورك أسڈا ورجيبين إنتخرى بافت كومِفنم كركمه قرحه بيداكرديتي مين . قروح بوكين جونخر بتهٌ بيدا كيم كيُّخ بآسانی جند ہی مفتول میں اقیھے ہو گئے ۔جب ان قرمے کو حراثیمی کا شو ک سے سرایت مُسْسُ كُ كُنَّ ؟ يُامِا وْرَكُو عِدِيمِ الدِّم بِنَاسِطَ كُمُ لِنَهُ أَسْ كَا تُونِ مُكَا لَأَكْبِيا تو إندال كي نشرح ميں بہت كم تبدلي مولي ليكين جب إن جا يوروں (مبيّوں) كو ود وھ کے بچائے گوشت کی غذا دی گئی یا بواب کی کسی قدر مدووی پیدا کی گئی ' -اكرمنده خالي موين من ما خيرومائئ تو إندال واقع بهولين_ه من واضع طور بر^{سان}. ہوئی ۔ بندروں من ا^{ار} ڈروکلورک ایٹ دینے سے اِند ال میں کمیع**در ن**اخیر مُوَّمُهُ بواب کو جز اُرُمندو دُر رسینے سے یہ تاخیر نمایا ل طور برزیادہ موکنی به اس میں شک نہیں کہ ا نبان میں بہت سے قروح کا فی سرعت کے ماتھ اچھے ہوجاتے رہی لیکن ان کی تجھ تعداد اليي ہے جوكة قائم رہتى ہے اور بتدريج متغير جوكر مزمن قرصر بن جاتى ہے جس كلاو مكن سبب موسكتي أي :- (١) مكن عيد كم إلى دوكلورك أيد إلى تغير عيداكر في مي مصدليتا بويلين محاور البواب قرصه كي حالت مي معدى صالمي تفويه -gastro) (jejunostomy کا علبۂ معدی سے انٹر روکلورک آبیٹدی بہت کم تغیر پیدا كراب اوران مثام است ينظامر بواب كريال كوئى برى المميت بنيل ركمت (30) (۲) مدى ديوار كے تناوكى زيادتى عبى مام بے جودرويا تكليف كے احماليا بداكرويتى بيئ اوريد ركات جوكه فالب عضلات عاصره كى مدورى يا إلائ عندالى فَطَ كَ مِعْلَف صول كَ مِسْمَا ت إ مزمن المناحشري الماوس chronic duodenal) (40) ileua) کے ساتھ متلازم موتی ہیں مکن ہے احدیمی زیادہ ابھ عال ہول مجبو تکہ تنعبتہ لمندور مرکے دباؤکے اندر احات طال ہوئے ہیں (7) - میکن ہے کہ ایک دائرہ فاسدہ قائم بوجائے مینی اولاً قرص لمبند تنائر بیدا کرد تناہے احدوہ اس کے اندال كوروكف كارجان ركمتاب مكن ب كهائدروكلورك أيسداس طرح على كراموكوه بواب ی معکوس مسدوی بدر ارکے ال طرح میکانی عال کوزیادہ شدید کردتیا ہو-

بالآخر بيختينت بيان كروينا مزورى ب كالوزنمين اور مختلف منبول ساريت مثميت والے نبقات سبعید کی الیے نبلیں جوا کی گئی میں جن کے وریدی اشروا سے ما ندوں میں سىنى قرمە بىداكردىيى ، درانسان كى قرونى مى يى دىنى عىنويەت كى الورياوة و بوت عي خاسخي معلوم او ما ب كوس طرح تب محرق كم عصية امت ير طدا ورموتے میں اسی طرح بیمی معدے اور اثنا عشری کے کیے ایک نوعی العن ر کھتے ہیں سیس نظمرکو انتخابی تحیز (elective localization) کہتے ہیں (41)-اعنی قرص کے ساتھ النتاب زائدہ دود بداورالتہاب مرارہ ہمزا س طور برموج دموسکتے میں (مشکم مثلث) اور تعبوں اضرار سے ایک ہی نبقہ سب تفرید کمیا گیا می 199 علامات - حاد قوحه متعدد اصابول ين بهلى ولالت ورصي نزف ہونے کی دج سے ہواکرتی ہے۔ معل ی قویحلہ کی اصابتوں میں اکثر السے عيد الدم يعين تون كي مَن برجا يكرتي عد اور مكن عد كنون فالعن بويامدكا ا فيدكرما تذمخلو درو مريض كوفشى سى محوس بوتى بيد تراسيف مي فني كا احاس ہو تاہے' اور چند منٹ این خون کی تلے ہوجاتی ہے جس کی مقدار آیک اورویٹ مک برسکتی ہیں۔ معدے کے اندر نکلے موٹ خون میں سے کیمدا نت کے اندر بنیج ما ہے' اُس کی ہمریکلو بین (hæmoglobin) متغیر بورکر بیبیا ممبن (hæmatin) آور سیار لور فا کرین (hæmatoporphyrin) بن ماتی سے اور عیر جو احابتی موتی بس و مساه الا راب سين يا كاركول جيسي بوتي ربس - اسى مالت كا مم جازدم الاندي (melana) ہے۔ مکن ہے کہ ایسی ا ما بتیں تنے الدم کے موقوف بوط سے کے چند کمفنوں بعد ظاہر ہوں ۔ فانعی خون کی تفید آنا سٹنا ڈہی مہلک ہوتا ہے۔ عمو کا وہ بكله موقوف بوط تى سنه اورمكن سه كه كررنه جو فن ك نقصان كى وج سس تنديد ورجه كي عدم ومويت اور كمزورى بوط تىسے - اشنا عشوى قوحلى تے الدم کا ہونائبی مکن ہے۔ لیکن رعجا ن یہ موتا ہے کہ خون کا بیٹیتر حصہ براہ معاممیّتی براز دم الاسود کے طوربر خاج ہوتا ہے۔ نزف کے علادہ مصمی قرصور مصمے ملا بداكرسكتاب من كام فاز ماد برابد ان طاه ت كے ساتم المدمدى افرازى اِ مَالتُ بِي بِوماتِي ہے میا کہ پہلے بیان کیا گیاہیے (منحہ 335 بر) ۔ قب رہ کے

إطب يطددوم

ا نشقاب سے شافری اس کی موجود گی کی بیلی دلالت کال موتی ہے۔

حسم معل لاکے موس قرحه کاممیز فاملہ دی دہے ج ففرون خخری کے عین نیچ کر نثراسیف میں گہرائی رجموں ہو آسٹے یا بعض او ّفات نا منسے زیّا قریب اخطِ درمیا بی سے دامی*ں جانب کو* یا ائیں جانب کو 'اوربائ*س کے تنب*ت دائ*س جا* كوزيا ده كثرت ہے۔ يدا دخال غذاہ ہے بيدا موجا آسيے اور كھا لخ كے نصف كھنے مجہ سے بے کروو تھنٹے بعد تک شروع ہوتاہے۔ ممکن ہے کہ بہتے موسے تک شدت کے ساتھ جارى ربين اور من سيمس من عمواً تخنيف موجاتى بي الى وقت جب كغفذا ·عدے کو چیوڈ کر آ گے جاتی ہے اس میں افاقہ ہوجا آ ہے۔ وروکی نوعیت ' اخسنہ یا ناقب ماسوزشي موتى سے اور يكسى وو مرے معدى عارضه كے نبت اس مفر ان او شدید نوغمیت کا موتا ہے ۔ بعض اوقات کیشت میں اوسے طبی فقرا کے درسیان بلکہ پیٹانی برہمی ورو ہو آہے۔ ور دے ساتھ ہی اور اکر اوقات ورو کے رفع ہوجائے کے بعد بھی کچے تھوڑے عرصہ تک مبلدی بین مستیت دیکھی عباتی ہے ' یا اُرطید میں ہلی سی تیٹ کی بھری جائے تو تکلیف معلوم ہوتی ہے سوزش سینہ (الماخط موصفحہ 336) کسیقد رعام ہوتی ہے کیکن گرسنگی کے درومرف ایک جو تعالی اصابتوں ملی کھتے ہیں۔ مگر مدے کے اکل مالی ہوجائے میں اکثر ارخیر ہوتی سے اگر حیا بتدا و حبالہ می معدے سے باہر بیل ماتی ہے (33)-اُنڈروکلورک أبیڈ کا افسنسراز لمبی یا یاجا تا -(39)-

مزمن جعا و ۱ البواب قوحه درد کی نوعیت و سی بی بوتی ہے جیسی که

یہ بیان کی گئے ہے ۔ لیکن مبن او قات درد تا ت کے دائیں جا نب محوس ہو آئے

اور وہ غذا کے دوتین یا چار گھنٹے بعلیت معراب یا مریف کو علی الصاح جگادیتا

ہے ۔ یہ درد کچھ غذا لینے سے کم ہوجا آ ہے 'اسیو اسطے اس کو دی د کو دستگی کھتے ہیں۔

اس مرف کی اصابتیں دوقعموں کی ہوتی ہیں : ۔ (۱) جب کہ بواب آزادان طور پر کھلا ہوجا آ ہے ۔ سکونی رس کی نیا یاں بیش نرش کی موقی ہے ہو جو تا یہ اثنا عشری قرمہ کی صالت میں نیا یاں ترین ہوتی ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہے کہ بودا ہے ۔ مکونی رس کی نیا یاں بیش نرش کی موبا ہے ہے بودا بیت نیز تریش کی مالت میں نیا یاں ترین ہوتی ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہے بعد نہا یہ تن ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہے بعد نہا یہ تن ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہے بعد نہا یہ تن ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہے بعد نہا یہ تن ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہے بعد نہا یہ تن ہوتی ہے 'اور معدہ فالی ہوجا ہو با ہے بعد نہا یہ تن بر ترک میں کی افراز طویل عرصہ تک ہوتا رہتا ہے ۔ (۲) جب کہ بواب

ابتداد تو ازاوانه لور برگملتا م کیکن بعد می اس کاشنج بوجا آب ۔ یہ بوابی فیق کا ابدائی وربہ ہے ۔ معدی کیس کا بازگر دو کلورک ایٹ ایک جیاستا جوامنی ظامر کرتا ہے اوراس کے ما تدھی لویل عرصہ کک ازاز اور بیش ترشکی بائے جانے ہیں۔ لیکن معدے کے خالی بوٹ یہ بی ورب کے بی بری شریان معت کے خالی بوٹ یہ بی ورب کے بری بری شریان متا کل بوٹ یا جو کئی بوتو مکن ہے کہ ترف سے کہ ترف سے کہ ترف سے کہ ترف کے بوئے نون میں اس کی شریانی جی باتی د ہتی ہے ۔ مکن ہے کہ طلا ات میں تخفیف بوج اے کیکن مدرک بر معدہ کے ترحہ میں کیو کہ اعناز ذیر بری تا جی تا ہو جائے ایس اور اس اس علاج کی زیادہ مزورت موتی ہے ۔

تعفیص فی فی الدم کے مریف ہیں جہاں نزن ہی واحد علامت ہو ساری مبدارو المے حاور حکی مت ہو ساری مبدارو المے حاور حکی تنفیص قایم کرنے ہے بہلے کہ بت حبار (cirrhosis of the مبدارو المع المان عدم ومویت (splenic ansomia) کاخیال مزود کر لینا جا ہے۔

قدر الدم کو نفث الدم کے ماتھ یا کمیر کے بعد و اتع ہو سے والی خون کی تھے کے ساتھ تنظ ملط نہیں کردینا جا ہے۔ مزمن جنمی قرم کے ماتھ من شکا بیوں کے خلط کمط ہو جانے کا

امكان بواكر ما ب وه يه بي السود عنم ك مُتلف اقدام ج بيل بيان ك كُر أي المي المان المراكز من المي المي المي الم مرطان اور مزمن المبتاب زائده ووديه (زاكري ويتضم : appendix dyspepsia) يا وومور مضم جوصوان معفراديه (gall stones) كم ما تقدمتلازم مواهد -

کی ایسی استانی فقد است بو آزاد ای فقال کا پدرد کورک ایندار کا اندار کاند ظاہر کے معاور البواب قرصہ کی تا مید ہوتی ہے کہ ہس غذا ایس خون کی نیا یت خیف سی مقدار کی موج دگی نیا یت معنی خیرہے ، گو کہ مکن ہے کہ وہ غشائے نماطی کی خنیف سی اس صرب سے بہا ہوگئی ہوج نلی سے واقع ہوجاتی ہے ۔ لیکن یا خانوں ی نخی خون کی اور برازی خلاصہ یں ہیا تو پور فرین کے طیف کی موج دگی معدی یا اشتاع شری قرحسہ کی تا مید میں ایک قمیتی شہادت ہے ۔

مزمن معدی قرصری تا ئیدس سے زیا دہ تمتی شہادت غیر شغاف غذا کھانے كربدلا شعاعول كے فديد سے مال ہوتى ہے۔ انخلاف مغير كے قريب مدے كى كوريك عِيونًا أبحارُ ايك قيف إنفيلي كي شكل بن تكلا موا تظرية اسم رجيد طا تجيه يا عطيف كِتِّة بِينٍ) (ملا خله بوصحفه ٢٣ ب) . إن البحار كا الحصار قرحي كهفه كه أندر معد كما فبيه کی موجود گئی بر ہوتا ہے ۔اوراِگرعل اند مال میں وہ کہفیرٹ ریا ہے تو یہ اُنجار نہیں نظر اِنگا۔ معدت كى يجيلى عطى بركا وحى لهفه أس وقت نظرنبس آئے كاجب كه معده بهرا بوا موايكى تشفیص کے لئے بہ صروری ہے کہ جب مریض پہلا تو الد کھا بیکے تو دیوار شکر کو ا تھ سے العاطرة مهلا ويامايي كم كما يا مواغير شفاف اده دايوار معده بريبيل مائيل كمسس ب کچه ما ده قرحی کهفه میں بیمکیہ کرائس کو نمایا*ں کر دستےگا۔سب میں نہیں گرمبض اصابتو*ں مِن بِيهُ بِمِلِدِ انْحَنَا سُكِ كُبِرِكِ الكِر، كَهِبُ وندا سِنا كُتُلُ وَ يَا تُلْمِلُهِ مِكِسَاتُ مَسْلازم ہواسبے واسی لیول پر آئس سے سی قدراو پر اینے ہوتا ب اور نے کے امث سدا بوجا ناہے اور مکن ہے کہ محدود المقام دروناک نقاط نبی مول عمل ہے کہ بلا ابحار كفيد وندادة بنهاري نظراك اوركس كامل وقوع تتقل رب جب كدعلامات برس ينتيج تكا لاجائے كاكة وصد مندل موكيا ہے - ايسى حالت بين مكن ب كديني إفت عيجادكى وجرسے پرتشور متقل بوعائے اور ایک ند بی سریت گھڑی معلی دیدا بوعائے . یہ وندانه انتامشري قرصها التباب زائده ووديهى والتي بي بي واتع بوسكانه والداد

بزات نووسدی قرم کاشفس نہیں۔ یہ و کیمنا بھی اہم ہے کہ معدے کے خالی ہونے میں کھٹی اوقت ملک آئی ہوئے میں کھٹی وقت مگر آئی ہے۔ کا کہ بترائی سنتی کا بیتہ لگ جاکے بیٹبت تعالی وازر من سے بدائنارہ ہوگا کہ معدی قرصہ تشکی ہند، جنانچہ دوسرے مناسب طبی علاج میں کے طاوہ وافع آتشک تدا ہرا ختیا کرنا جا ہے (38)۔

مزمن اثنا مشری قرص کی تشخیص اثنا مشری کلاو کے لا شماعی منظر سے کہا گئی ہے۔ اگر غیر شفاف غذ اکے ساتھ سوڈ سیم بائی کار برنیٹ دے ویا جائے تو یکا وہ ہم بائی کار برنیٹ دے ویا جائے تو یکا وہ ہم بائی کار برنیٹ دے ویا کہ ان کا انحصار کیے تو دکھلائی دیتی ہے۔ اس قرص کی شکیس نہایت تغیر نے پر موسمعات ۲۷ اور ۲۵)۔ قری کہف پر بوتا ہے اور کی معنلی کم بقد کے شنج پر (الاضلہ بوسمعات ۲۷ اور ۲۵)۔

انناعشری کے علفات کا شناعوں سے نظر آتے ہیں اور نسبتہ مام ہیں۔
قرید سے ان کو تمیز نہیں کی باسکتا اور بلاست بیض اصابتوں ہیں وہ سندل سندہ
قرطات ہی ہوتے ہیں۔ اہم طلائت اکثر اوقات قرصہ کے علاقات سے ملتے جلتے ہیں۔
پاکدٹ بالعمرہ ایک انگلی کی نوک کی جاست رکھاہے کا اور حصہ اول اور حصہ دوم کے
اتصال پروام ہوتا ہے۔ یمن ہے کہ وہ حصہ ومم اور صد سوم میں اور معاری واقع
ہو' لیکن یہاں س کا علاء ت بید اکر نا اس قدر عام نہیں ہے۔ مرارہ کے ما تعوان خام من اور حصہ دوم اور حصہ دوم اور حصہ سوم کے اتصال پرمروٹر بڑا کا علاء ت سے ملتے جلتے من اطر بیداکر تا ہے (34)۔



اي شاع گاشت بود ايد خبي آناميز فاجار في سايل تنظيم شاود ايكي يوسده دبوان صدده ايل شاع مجانب تي درايد خبي آناميز فاجار في سايل شاعش ادرايكي يوسده دبوان صد معرب مير تي دوي موسيكي ديكي في بالان دوي سايل دوي سايل دويا تا بيانوند تامتر ق يوان حقيد فابرك - درية دنيمون يئه مال كميائي وسامحنوب)



بسنتعل ملكائت جوداتق كي وجدير وانتا ونزى كلادئ برزق به ايد درئ دودى موق معدوك بوابي صفه ايكسنته جوكه أننا عنزى قرصنكا بركرت به بستاع تأكم بعدى موجود كي كماعت منووم جس كما مَصْنَحَ اورْتَا بدامَا بِ هِي مودِور بِ -معدد كابوان صعبي فالمركياكيا بِ - (مسودُلمِوليوليدُ بي الكَ

يائي ماري عارونة الحكريون قال كردسار ري ء ليامون محوري

ج كير مت ك رسنة الله - بدك امرى لالت ب كدموشر علاج عذورى بند ودوكى عدم موجو دكى السام بدرودكى عدم مدل جور أسبه اور البي صورت مي به به به بي بي الله المربر ولا لت كرتى به كرق مدمندل جور أسبه اور البي صورت من به به به بي بيا بوسنة عن سب به بي بيا بوسنة عن المات كه تحت عن سب علا بات اور بالخصوص ور دكه زائل بوسنه مي بدو بيني بوئ برى سبه يلهى جامت كدمن قرح كا اندال واقع بوجا الها اكرجه بيمكن به كراس عل مي مهينول لك عائن ا

علاج - مقاصد علاج بي سے اہم ترين يہ ہے كه معدے كوخى الا مكان ا و یا مائے رمریفن کو بیاسٹے کہ بننز پر لیٹ جائے ، تما کو نہ بیئے اور چینہ مفتول بعد یک ورزش بی مرف مقول ی کرے ۔ معدے کو" ارام دینے" کی کوشش کا ت ہم طريقهٔ جس مي مريض كورگا مَا رسمفنون تك منه كي راه سه يولي غذاليينه كي ام زست نه دی جاتی ککرال کے بچائے براہ معامتنتیم غذا یہنیائی داتی اب ترک کرویا گیا ے۔خالی معدے کے مشہوراً نقباضات گرسنگلی سے خلاہر ہو ماہے کہ وہ ملاج ایس مغالطه پرمبنی تفاء معدے کو آرام دین کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نغدا ایک وقت می تصوری لی مائے اور کند الوقوع و تفول کے ساتھ لی مائے۔ ون کے وقت مریش کو ہر کھنٹے یا داو دو گھنٹے کے فن صلوں سے غذا دی ا ہے کیکن شبریں کال آرام دیا جاتا ہے۔ غذا کی خاص حبیبے رووھ ہوگی ' اور اس کے ماتھ کیے انڈے بی الائے جاسکتے ہیں بشرطیکہ مریض انھیں برواشت كرسكے ـ رائب (junket) اور بالائ اراروٹ كر و " الو يا آر في حوك يورى (Artichoke puree) تعذائ بنجر (Benger's food) مسنع منقی کی جیلی اور آازه میل کارس می علاج کی ابتداری سے دے مکتے ہیں۔ کچے عرصہ معبد الم کی جائے مہتلی رونی (bread) اورمسکه اور توسط میسی بونی مجولی چوزے کا تیمه اور کوست کا تیمه مج شامل کمیا جا سکتا ہے ۔ خاص کھائے سے پہلے رومن زیتون کا آ دصا اونس دید اجائ۔ الکحل اور تنمباکونوشی کی اجازت یه وی جائے ۔ مریض کوئی وقت بھی بھوک نہ سکتے بائے۔منتلاً رات کو ماگ ایشے پر ایک بارزائدغذ ای مزورت ہونا مکن سہے۔ ور و استواری یا خانوں کے مخنی خوت اور قرصہ کی لا شعاعی شہاَ و ت کے عباتے رہنے گئے

چەدەردىزىك بىنتەيىل كىلاكى ھارى دىكىنا جاسىئے۔

مفنى قرم كه علاج من قلويات (الفعوس موديم با في كاربيم ببيت مل بين اور طريقه سيبي (Sippy's method) من متوالم مقاوي و كمرمعدى يه کو بميشة قلوى رنگھنے کی کوشش کی جاتی ہے چقیفت یہ ہے کہ بیف اصابتول م ل تنی فلی دی کئی ہے کہ جوالتہاب گردہ اور بول دمویت پر اکر نے کے لئے کا فی ثابت ہوئی (42) - إس امركيمنتعلق كمرآيامعدي رَس كا ترشه في الحقيقت مزمن قرحه كوّازه ركھينے كالبب بوسكتاب سيلي مستسه ظاہر كيا كمياب - ببرسورت زيا ده معقول طريقے سي م کہ جربی بالائی یا روغن زیون وغیرہ کی صورت میں دے کربیش ترمشگی کا روعل کردیا طائب واقم الحوف كا طريقه مرف ووسفوف استمال كرية كاست يعين برى أبيروهاك (prepared chalk) 'اور ایک آم (carbonate اوربری پیروفیاک کا-ان دونوں میں سے سی کا ایک ٹی سیون فل این ما دووم میں برکھا سے کے بعد اور اِس سے وگئی متنا دسب سے آخری جیز کے طور لینا واست دوسراع منوف كاستمال زاوه باركركدا معاد كفل كوبا قاعده بنالياجا أبي ان اودید کا مفید علی درد اورسائقد می سوزش سیند می تخینف بید ا بوجاعدسے موتا ہے مکن ہے کہ بر تخفیف اس وج سے بوک کاربن ڈائی آگا کڑ (CO) آزاد موجا آ ہے۔ اور جب کم ترمشکی موجو و ہوتو ساتھ ہی قدرے سائیرک ایٹ (citric acid) بخونر كرديينے سے نبايت كا مياب تنائج عال ہو كئتے ہيں الاعظ ہوصفحہ 338) - عالا مقصد يه بونا عاسم كرمريس كولول عرص كك در د اور تحليف سي بجا إ ماك، اور اللع قرص مبی مبدرے مندل ہومائے گا۔ در و کے علاج کے لئے دورری ووائیں یہ ہیں : طنخیہ بلا ڈونا ہ۔ اقطرے اور ایٹروہین کے اشرا ابت بقدر با گرین افیون محموری متنادون من خلاصة إنسبغيد كي شكل من يا لا كرارفيني إله روكلوريدي (liquor) morphine hydrochloridi) . ایا دا تطرول کی متادول میں شدیا ما تبول مي تحت الجدى إشراب سمال كيا عامكة ب كرون بي كدا فاقد حال بوما يعسلان بدر ميرا فيون كوم توف كردينا جاسئ - شراسيف برمتعامى لاستعات كا امتعال كرسكتة بي (لل خطه بومنو 338) - مكن بي كه أن اصابول من جن مي متذكرهُ إلا طبي علاج سي

دردادر تخلیف جلدو فع نہ ہوجائیں' ابک اثنا حشری آنبو بہ کے در میدسے فذا بہنجا نا بڑے یہ اُ نبو بدایک وقت میں ایک ہفتہ کے لئے اِسی وضع میں رکھا جا آ ہے' اور یہ با تخصوں مزمن معدی قرصر کی صالت میں قالی استمال ہے۔

الركبيرن زن واقع بوتوم يف كو ارفياك زيرائر ارام كي مالت بي ركهنا

واسب اورکیلی از اورکیلی اورکی

ر مثلاً دائی عرق کو گرہ لگا کر باندھ وینا) نجی کا میاب ٹابت ہوئی ہیں۔ اگرایک السے مریض پڑجس کا معدی قرصہ میں متبلا ہو نامعلوم ہو کہ انتقاب کے علامات (ملاحظہ ہو النتاب بار مطون) کا حملہ ہو جائے توجس قدر حلامکن ہو کیسے پانچ یا جید تکھنٹے کے اندر کشکے کو کھول کر کہفہ بار لطوبی کو وصور النا اور قرمہ کو ٹاکھے لگا کر

عكل الوقوع خیال كیا جا سكتاہے ۔ مزمن قرصہ سے نزف رو کھنے کے لئے جراحی تداہیر

سى دينا چاسيئے۔

یراف تقرع میں میں کے ماتھ در داور تفے کیا شدید نز فات باربار واقع مین اربار واقع مین کے سہتے ہیں کا شدید نز فات باربار واقع مین کہ رہتے ہیں کا قرد تی طور پر جراحی عملیہ کے متعلق عور کیا جائے گا۔ بداک اصا توں میں نہا بہت کا میاب ٹا بت ہوا ہے جن میں قرمہ کے ساتھ بواب کا منیق یا ند ہی رہت گھڑی معدہ موجر د ہو۔ مزمن معدی مسترص کے ساتھ بواجی عملیے کئے جائے ہیں ہ۔ معدی مسامی تعویہ

(gastro-jejunostomy) بعض اوقات التيصال ترصكه ما تقه المحواة كوريد (gastro-jejunostomy) كما توسيد المواق كوريد المواق كوريد المواق المعالى المواق المواقي المواق المواقي المواقي المواقي المواقي (partial gastrectomy) (يصند معدك كوري المتيسال (gastro-deve) - (sleeve) اورمعد كا استيسال (sleeve) اورمعد كا استيسال (gastro-deve) المراجي كريم المتيسال (gastro-duodeno-pyloro-plasty) اور المتيسال معدى الما تاعش المواقي المواقي (gastro-duodeno-pyloro-plasty) اور المعدى صائحي تفويه (gastro-jejunosiomy)

مخریز بسب کوئی قرصندل ہوگیا ہوتوں امری انتیاط رکھنی چاہئے کہ کس کا کئیں ہونے پائے ، جو آبانی واض ہوجا آ سے ۔ دانتوں کوزین ازائدہ دودیئی مرارہ فرق میں کے عفری مرکز دس کا تدارک کرنا چاہئے ، اگر ضرورت ہوتو علیہ کے ذریعہ سے ۔ کھانا دودہ ہفتہ اور منظم و قفول کے ساتھ کئی بارکر کے لینا چاہئے، اور فلا ایک کے ساتھ کئی بارکر کے لینا چاہئے، اور فلا کے ساتھ کئی بارکر کے لینا چاہئے، اور فلا کے بینے ہوئے کا قت والی و مسلی کھا کے وقت دے سکتے ہیں ۔ الکمل سے بریمبزی بہترے ، اگر چرسٹ بد ہلی انگوری شراب اور نما یت کی طاقت والی و مسلی کھا کے وقت دے سکتے ہیں ۔ مریض کو چاہئے کہ است کہ طاقت والی و مسلی کھا کے اور توب بیاکر کے میں ایک خبر گری صنوری ہے ۔ مریض کو ہا وہ دہنا چاہئے کہ است کہ کہ در دکا حملہ ہو نے پر اسی غذا ہے کہ کہ میں ین یا و ہردودہ ہولیے والی فرائی کے در کا حملہ ہونے پر اسی غذا ہے کہ کہ میں ین یا و ہردودہ ہولیے والی فرائی کے اس کے اور کھانے سے پہلے روغن زیون لیاجا سکتے ۔

معدی صابی تفوید کے عواقت ، اعداد وشار ظاہر کرتے ہیں کہ معدی مائی تغوید کے ملائی تغوید کے مبدیال مائی تغوید کے ملائی تغوید کے بعد شفایا بی مونا ہر گر صوری نہیں ۔ گائی (Guy) کے بہتال میں طلقائم اور مصافی کے درمیان ۸۰ اعلمیہ کردہ اصابتوں ہیں سے ۹۵ فی صدی مرفیق مات برس بعد شفایا بیا نستہ بہترین تائج بوابی شنی میں پائے گئے ، گر ۲۵ فی صدی مرفیق کی طالت غیر تشفی بخش تھے۔ بہترین تائج بوابی شنی میں پائے گئے (43) و کا واق رمین کے مدد والا ات کی شکایت تھی امتحال کے کیے گروہ میں جنمیں معدی صافی می فی مدد و سے معدہ میں تاخیب مند و مدی تاخیب مند و مدی تاخیب مند و میں اختیب مند و میں تاخیب مند و مدی تاخیب مند و مدی تاخیب مند و میں تاخیب میں تاخیب مند و میں تاخیب مند و میں تاخیب مند و میں تاخیب مند و میں تاخیب میں تاخیب مند و میں تاخیب میں تاخیب

(۲۴) وغیره علامات ولی کی شکایت یا نی گئی ، ۔ ورد (۵۰) ریمیت (۴۰) تئے (بم) کر درد کا میں سوک درم کا کر درد کا کے سر (۲۲) ۔ مکن ہے کہ مربیعو میں شکر بولیت یا نی جائے اور جمعے کے مشل کی قلت جو (۴۲) ۔ مکن ہے کہ مربیعو میں شکر بولیت یا نی جائے اور شیم کے مشل کی قلت جو (۴۲) ۔

معلى عاتمي اورصائلي قوق [gastro-duodenal & duodenal]-

(ulcers) مردی صائی قرمین مقام تفود پر واقع ہوتا ہے اور بیشتر اصابوں ہی وہ کئی فیرجذب فی بر میں ساکھ کے استعال سے یا دموی سلو سے یا دوران علیہ بی سنکنوں سے کوفتنگی ہوجائے کے استعال سے یا دموی سلو سے یا دوران علیہ بی سنکنوں سے کوفتنگی ہوجائے کی وجسے ہواکر اسے کہ ایسی ماطات کی موجودگی کے سب سے درا ہی آگے واقع ہوتا ہے 'اور وہ بنظا ہرانیس عاطات کی موجودگی کے سب سے ہوتا ہے جوکہ انتخاص فرص میں جسے کہ اسی مرکزی عفونت سے سامیت زدہ ہوبا اکر جس کا استیصال مذکیا گیا ہو ' بیش ترمشگی جو با وجود علیہ کے برمنور باتی رکھی ہو اور فرم کے گردیا چند زائل میں سنتو بات اور تبدیل شدہ ذاتی می کوک علامات و بسے موئے ہیں جسے کہ انتخاص فرد نبیت کسی فدر نبیج ہیں جسے کہ انتخاص فرد نبیت کسی فدر نبیج ہو ایک ہوبا نبی جو ایک بینے میں اور اُن کے ساتھ برازی ما دے کی تی ہو تی ہے ۔ غیرشفاف غذا واقع ہوجاتے ہیں اور اُن کے ساتھ برازی ما دے کی تی ہوتی ہے ۔ غیرشفاف غذا دیے بعد یہ لا شعاع سے عمر آ رئیس دکھلائی دیتے ۔

تعسلاج من تفرح کاعلام اسی امول برکرناچا سے جس طرح کے کہنی ورت لاحق مواکی ایک جس طرح کے کہنی خرد کا کیا جاتا ہے۔ مکن ہے کہ علیہ کرنے کی صرورت لاحق مواکی اگر اب المبی طرح کام کر داہت تو مکن ہے محدی صائی تغوید کو بند کیا جاسکے ۔ دو سری اصا تبول کے عسلاج کا اختصار لا شعاعی کمشوفات پر ہوتا ہے ۔ اگر معدہ خیر صحولی سرعت کے ساتھ فالی موجا آ ہے تو کمانا کھاتے وقت ما بیات نہ لئے جائیں عکن ہے کہ دُلک اور معدی تغیام فید ہو۔ عمولًا یہ مریف شخم کو ایمی طرح برواشت نہیں کرسکتے ۔

اتساعالمِعدَه

(DILATATION OF THE STOMACH)

مکن ہے کہ اتساع معدو نہا یت تدریج طور پر واقع ہو (مزمن اِلتّاع = acute = معدو نہا یت تدریج طور پر واقع ہو (مزمن اِلتّاع = acute) میں ہے کہ بالکل دفقۂ ہو دائے (ما واتساع = dilatation) ہو خوالہ کر کا بیان ہیں سے پہلے درج ہو میکا ہے۔

مزمن اتباع المعد

یرمدرمُ الله کانتیجه بونایه: - (۱) ده مخلف التی ج بواب کی مدودگا بیداکردینی زین بس سے معدی د بوار می بیش پر درده به جاتی ہے ۔ اور ۲۱) وه حالتیں جمعنی دیواروں کی توت القبائل کو ننگر کردینی ہیں (الماحظه بوستوط المعدہ) ، مدودی کے ہسباب یہ ایس : ۔ لواب یا اثنا عشری کے قروح کے ندبات ۔ لواب شخ جو قرب وجوار کے نقر کا کا فوی نتیجه ہو۔ معدے کے بوابی حصے کا مطان ۔ لواب کا میش برورشی منیق ۔ برونی دیاؤ کا انفاات کے ذریعہ کر جانا کی ایک متحوظ کردے کا میش برورشی منیق ۔ برونی دیاؤ کا انفاات کے ذریعہ کی دیا شدہ ندبات کی نیا می موج سے پیدا شدہ ندبات کی نیا ہے موال مربی ی روزن کو ما کو کی رہے ہیں ۔ ا

یہ عمراً مربلی دوزن کو او ف کرتے ہیں۔

ہوائی طبی کے مبدکے اساع کے طبیعی امارات ۔ نمایاں اصابتوں میں جب شکم برہنہ ہو تو وہ غیر مثاکل نظر آ آ ہے اور اپنے ایس نصف میں ایک گول آ بھا میش کر آ ہے دور اپنے ایس نصف میں ایک گول آ بھا میش کر آ ہے ۔ بیا بھارناف کے لیول سے نیچ یک چیلی ہے ، اور اس کا زیری مامشید ایک خم دکھتا ہے جو نیچ اور ہا مرکے طرف محت ہوتا ہے ۔ وقت الما مات کے زیر سی صفح سے خط در میانی کے وابنے جانب ک جاتا ہے۔ وقت الم قات کے زیر سی صفح سے خط در میانی کے وابنے جانب ک جاتا ہوا ہے۔ وقت الم قات کے زیر سی موری کی ایک مورج اس اس کی مورے ہوئے صفے پر سے عرصاً بائیں جانب سے داری اور نینے کی جانب جاتی ہے ۔ بائیں جانب کی انتہا پر ایک حصہ تقریباً ہمیں کی جانب کے دار بر ہمرات کی ہوئے محد ان محد بائی جانب کی انتہا پر ایک حصہ تقریباً ہمیں کی جانب ہمیں کے دار بر ہمرات کے درابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا ہے کے درابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کے درابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا ہے کہ مورابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کہ مورابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کہ مورابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کے مورابر بر سروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کہ مورابر برسروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کا میں اور کیا ہمیں کیا ہمیں کے درابر برسروے ایک محد برائے مار نیا دیا ہے کہ مورابر برسروے ایک محد برائے میں کیا ہمیں کے سے کھور کیا ہمیں کیا گور کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کیا گور کیا ہمیں کیا گور کیا گور کیا گور کیا



شعاع گاشت ایک متس معده کی بوکد تفزح کے بعد بوابی مین کا نانوی متبہ ہے معده بڑا ہے اور کم کے وار بارعضی طور پھیاا بواہ ' اور اُخناء کیے برقفی وف سے کچھ دور نیجے نک جلاگیا ہے ۔ کھا ناکھانے کے وو گھنٹہ بعد یہ بریم سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن کھانے کے تھوڑے حصے بواب کی را ہے گزر چکے ہیں اور معاد صغبے کی کنڈلبور میں اوھرا دھر مند تنظر آتے میں انجناکیر برمعدہ کے بوابی حصہ کے آغاز میں حرکت دودی کی ایک خفیف موج نظر آنی ہے ۔ (مسرڈ کلبولنڈسے لاک کے لئے ہو ہے تھی)
مانھال معد 151 ا با نے برطی طور پرمزائمت محوس ہوتی ہے۔ چندئ انیوں میں یہ اُ جمار بیٹھ وا اسے اور ایک دور اصنہ مونستہ دائیں طرف کو ہوتا ہے استے ہی عرصہ تک بھول کر امجر محکیہ ہم آئے۔ جب موری دیوار کا ایک ایک صدیکے بعد و گیرے سخت ہو کر اصر محکیہ تو ہی کے بعد مارا انجار میٹھ وا ایسے ۔ یہ نظم خو در وطود پر رو نیا ہوتا ہے ؟ یا مکن ہے کہ دیوارٹ کو لا تھ لگانے ہے سنسر وع ہوجائے ، یا اُسے انگلی سے تیزی کے ماتھ تھیلئے ہے ، یا بعض او قائد محفی سے کو مریض کو ہلائے پر ہوتے ہیں اسے موری حولت میں موری ہوتے ہیں اور یہ جھالت سی ماسکی اور محوس کی ماسکی اور محوس کی ماسکی اور محوس کی ماسکی اور محوس کی ماسکی ماسکی اور محوس کی ماسکی ماسکی اور موری کی ماسکی اور موری کی ماسکی ماسکی اور موری کی ماسکی ماسکی اور موری کی ماسکی ماسکی موری موری کی ماسکی ماسکی ماسکی ماسکی موری معد سے کو مالی ہونا جا ہے ۔ لیکن اس کی کو گا ایک ایک نے ہے یا اس وقت د جب کہ ملی طور پر معد سے کو فالی ہونا جا ہے ۔ کی خوالی معد سے کو فالی ہونا جا ہے ۔ کی خوالی معد سے کو فالی ہونا جا ہے ۔ کی خوالی کی ماسکی موری معد سے کو فالی ہونا جا ہے کہ میں خوالی کی میں کا کا کا کا کا کا کیا ہوں کی سے کہ کی میں خوالی موری معد سے کو فالی ہونا جا ہے کا کی میں کو گا اسکا کی کے چھ یا سات گھنٹے مید ۔

مزمن اتساع کی بہت سی اصا توں کا ایک نمایاں فاصدوہ طرزے کوس پر قئے ہوتی ہے۔ فذا مین یا چارون کک معدے ہیں رہتی ہے اور بھر کیار گی ۲ یا س پنٹ ستال قئے کے ذریعہ نکل آ آئے۔ یہ نمواً را دی اکل بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی سطح پر جباگ ہو آہے۔ اور خرد بینی امتحان ہے اس اس لہن کے کثیر التعدا د بندرے نبعات مزمیہ (sarcina) اور لمیے مصافی کی کے مصیتے نظر آتے ہیں جو آ بلر ہو آ مس کے عصیا حت (Oppler-Boas bacilli) ہیں۔ وور کی اصا توں ہی تے زیاوہ بار بار ہوتی ہے اور اس کی ایک وقت میں با ہر نملی ہوئی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔

تے کے علاقہ مریض تحلیف یا حقیقی در دمیں مبلا ہوتا ہے ہوا فید کے اجتماع کے ساتھ بڑمتا جا آہے ، اور اُن کے علامہ براسس میں عارضی طور برا فا ہوتا ہے۔ شدید پیاس کر دری کاغری شحوب اور مبن مجی دکھا جا آہے۔ مکن ہے کہ زیا وہ ذہنی انتخاص اور مبن اوقات و تعنہ وارکز ز (tetany) اور شخاص عوب در کر وری وہ حالت ہو کہ کہتونیت موجود ہو [یہ وہ حالت ہی جس میں ہے کہ کیتونیت موجود ہو [یہ وہ حالت ہی جس میں ہے کہ کیتونیت موجود ہو [یہ وہ حالت ہی حس میں ہے کہ کیتونیت موجود ہو [یہ وہ حالت ہی حس میں ہے کے اندر ایسٹونی اجمام (acetone bodies) کی میں جسم کے اندر ایسٹونی اجمام (acetone bodies) کی میں جسم کے اندر ایسٹونی اجمام (acetone bodies) کی خات میں اور میں میں جسم کے اندر ایسٹونی اجمام (acetone bodies)

تضیفی ۔ الآخرال کا انحصار لا شعاعی استان پر ہوتا ہے ؟ جو نجر شعاف علی استان پر ہوتا ہے ؟ جو نجر شعاف علی الحملانے کے بعد کر باتا ہے (الما نظر ہو صحفہ ۲۷)۔ معدہ نیجے کوا وردا ہیں طرف برا ہو جائے معدہ جدا تبدا اُر حمن ہو گار میں کے ساتھ معدہ طلا خالی ہو جاتا ہو۔ بھر حرکت وودی فیر معمد لی طور بنتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو گار ہو ہوئے گئے ہو گئے ہو تقر برا اُر و صافحا اَا بطور تقل اِن اُر اُل مختف ہو جاتا ہے۔ آخری ورج ب میں کئی ہو کہ حرکت دودی معنی کا ہے واجہ نظر آئے اور می معدہ بھر ابوا رہے۔ کسری احتیا ہی معدہ بھر ابوا رہے۔ کسری احتیا ہی معدہ بھر ابوا رہے۔ کسری احتیا ہو اور آزاد ایکٹر روکلورک ایسٹہ کا تبدر ہم جو مشاہوا معنی ظاہر بھو تا ہے۔

ا فذا در براب كي ننگي كي وجهت واقع بوسن والدا تساع كا أموقت كا أموقت كار براندا در بنا الازمي بين جب ك كرسد و بداكر من والا مرض إقى بهن الدخراجي ا

علاج ۔ اس کا علاج ہواجی ہے اور زیادہ کڑت ہے معدی صائی تفویہ
علی میں لائی جاتی ہے۔ ایک ، فتی تعکین وہ تدبیر کے لود پرسی ہے کوطبی المح ہے
وصورہ النے کاعلیہ (تغییل) اکثر بہت منید ہوتاہے۔ اس علی کا بہتے یہ ہوتاہے کہ
حد سے زیا وہ شنے ، مو کے معدے سے وابع اور غیر ہفتم شدہ غذا کا اجماع خاج مومانا
ہے اور ساتھ ہی یہ اس نازئت کے لئے بھی نقی بخش ہوتا ہے ہو کمن ہے کہ اتباع
کے ساتھا تھ موجو و ہو۔ رَبر کی ایک بلی ہو ایک قیف سے لگی ہوئی ہوتی ہے معدے
کے ساتھا تھ موجو و ہو۔ رَبر کی ایک بلی ہو ایک قیف سے لگی ہوئی ہوتی ہے معدے
کے ساتھا تھ موجو و ہو۔ رَبر کی ایک بلی ہو ایک قیف سے لگی ہوئی ہوتی ہوتی معدے
کے اند داخل کر وی جاتی ہے ۔ قیف کو تمینے لاکواور اسے ایک مناسب
علی ڈال کر معدے کو بھر دیاجا تا ہے ۔ جھر قیف کو نیج لاکواور اسے ایک مناسب
علی ڈول کر معدے کو بھر دیاجا تا ہے ۔ وحو ہے کاعل روز اندایک باز ہسے
عگرز کا از الدکر ہے کے مقصد سے کیاجا تا ہے ۔ وحو ہے کاعل روز اندایک باز ہسے
مرز کا از الدکر ہے کے مقصد سے کیاجا تا ہے ۔ وحو ہے کاعل روز اندایک باز ہسے
مرز کا از الدکر ہے کے مقصد سے کیاجا تا ہے ۔ وحو ہے کاعل روز اندایک باز ہسے
مرز کا از الدکر ہے کے مقصد سے کیاجا تا ہے ۔ وحو ہے کاعل روز اندایک باز ہسے
مرز کا از الدکر ہے کے مقصد گفٹ پہلے کرنا جائے ۔



ایک نواع گاشت جوک ریت گوری انقباض ظاهر کرتی ب و بالانی خاند بوکه بیریم سے بھرا ہوا ہے ایک گول زیر بوک کار مرکو تا اور زیرین خاند کے افر د فال بونے کا فتح انخار مبغیر کے قریب واقع ہے اور بالالی حانہ کے فرق سے اور جو بہ اس امری ولیل ہے کہ ربیت گوئی بیٹ کچھ شیخ بھی سافق موجود ہوتا ہے۔ قرحی باطیہ امری ولیل ہے کہ ربیت گوئی بیٹ کچھ شیخ بھی سافق موجود ہوتا ہے۔ قرحی باطیہ کار ایس طرف کا کنا معدہ المعدہ کی طرف مقدم ہوتا ہے کہ فتح کا دائیں طرف کا کنا معدہ کی طرف مقدم ہوتا ہے کہ فتح کا دائیں طرف کا کنا معدہ کی طرف مقدم ہے در برین خان میں کہتا ہوا نظر آتا ہے جہاں یہ عدہ کے بیندے پر بیٹی جانا ہے اور العنی اللائی کی طرف مقدم ہے ایک کو کہ بیندے پر بیٹی جانا ہے اور العنی اللائی کی طرف مقدم ہے کہ کو کہ بیریم معدہ سے باکل نہیں بکلا۔ (مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بکلا۔ (مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بکلا۔ (مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بکلا۔ (مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بکلا۔ (مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بکلا۔ (مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بھول کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بھول کا در مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بھول ہوئے کو کا در مسٹر ڈبلیو لنڈسے لاک کے لئے ہوئے صحفہ سے اللائیس بھول کی سے دوئے کا دوئی ہوئے کو کو کھول ہوئے کو کھول ہوئے کوئی کی لئے ہوئے کے کھول کی سے کھول کی سے کھول کوئی کوئی کوئی کھول کی لئے ہوئے کے کھول کی کھول کوئی کھول کوئی کھول کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کھول کی کھول کوئی کھول کے کھول کوئی کھول کے کھول کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول کے کھول کی کھول کوئی کھول کے کھول کوئی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کھول کوئی کھول کے کھول کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کوئی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کھول کے کھول کوئی کھول کے کھ

معدفا كاربيت كحطرى نقبا

(HOUR-GLASS CONTRACTION OF THE STOMACH)

برطالمت تقریباً ہمینہ ایک مزمن معدی قرصہ کے انداب کی وجہ ہے ہونی کو اگر جبر کم کم کمی گرد معدی انفعامات ہمی معدے کو طرسے پیوست کرد ہتے اور کمتنی دا نع کرکے ایسی ہی شکل بیدا کر مکتے ہیں۔ رطان معدے کا خیتی پید اکر سکتا ہے اور سفوط المعدہ کی حالت ہیں معدہ ایک بالائی اور ایک زیریں مصفے ہیں منقسم ہو جا تا ہو جن کے درمیان میں ایک تنگ گردن مائل ہوتی ہے۔ لیکن حقیقی ربین طعظم ی انقابان سے ان حالتوں کی تفریق کرنے ہیں کوئی وقت نہیں جیش آتی۔

علاماسند متلازم مودی قرح کے علامات موتی بیکن جب آخرالد کرکا طور برمندل بوطکیا ہے اور نضیق بہت زیا دہ موہائے تومر بیض کو یہ شکا بت موتی ہوکہ وہ ایک وقت میں غذاکی حرف بھوڑی مقدار میں ہی لے سکتا ہے ، اور نسبتہ ٹری تعالیک

فوراً والبن کل آئی بین جنائج اس برمری کے تعدد کا شہ بوسکیا ہے۔

سخیص ۔ ببغیر شفا ف غذادیت کے بعد لا شعاعوں ہے مل میں لائی جاکتی ہو۔

معدہ ایک بنگ گردن کے ذریعہ سے دوخا ان میں تعتبی بوتاہے اور برگردن بالائی خانہ سے بنچے کسلے بہوئے۔

بالائی خانہ سے دائیں جانب بجڑی ہوتی ہے ذکہ اس کے سب سے بنچے کسلے بہوئے مصدید۔ یہ بالکل میز خاصہ ہے اور اس حالت کو معدے کے اس ننگ بڑ لے سے سفرت کو اس منگ بڑ لے سے سفرت کو ایس منگ بڑ کے سے سفرت کو ایس منگ بڑ کے بولاوہ بنائج ان دونوں خانوں کو بریم کی مفن ایک نہایت باریک سی لکے جوڑتی ہے۔

جنائج ان دونوں خانوں کو بریم کی مفن ایک نہا بہت باریک سی لکے جوڑتی ہے۔

جن شخیج موجود بہوتو مکن ہے کہ وہ احتیا کا کے ساتھ دست درزی کرنے پر یالفندے جب شیخ موجود بہوتو مکن ہے کہ وہ احتیا کا کے بعد کی بعد کی میں جا نے وایک ایک ایک معماد کے طور پر کھی موجود ہوتا ہے کہوں نہیں موتا اوروہ گردن کی دائیں جانب کو ایک ایسار کے طور پر کھی موجود ہوتا ہے کہوں کی دائیں جانب کو ایک ایسار کے طور پر کھی موجود ہوتا ہے کہوں کی دائیں جانب کو ایک ایسار کے طور پر کھی موجود ہوتا ہو کہوں کی دائیں جانب کو ایک ایسار کے طور پر

نظراً ما سے (الماضطه موصحفه یا) به

ر مان ن کی الت میں بالید معدے کے اندر اُ بھری ہوئی ایک میاف دقبہ کی طرح نظر آئے گی (لاحظ ہوسفی 355) کی اگروہ ایک فرے سے پیدا ہوئی ہے تو لا شاعی منظر دیا ہی ہوسکتا ہے جیا کہ دمیت گرش انقباض ہیں ۔ الا شاعی منظر دیا ہی ہوسکتا ہے جیا کہ دمیت گرش انقباض ہیں ۔ عسسلاج ۔ واحد کارگر ند بیرص فرج اچی علاج ہے ۔ "کی کوچ ڈاکیا جا سکتا کی ا یا فرنی کہند کو تبعدی کہنے سے ایا صائم سے حوڑ دیا جا سکتا ہے۔

ببيدائشنيريشن رَوِثْضِق

یہ بوابی تسدو کی ایک قسم ہے ، جس کے طامات بالعموم بید انٹس کے حیند روز بعد سے کے رحمے امات مفت براک اور نہا سے عام طور پر زند کی کے انتدائی جا، معتول کے دوران میں طاہر مواکرتے ہیں (47)- الرکیوں کے سبت یہ موض اوکول مي تقريباً إلى يَخ كنا زياده عام م علاات يه بوت بين : - قط كابونااورمبن (مس کی وجریہ ہے کہ تول کک جوغذ البہنیتی ہے اس کی مقدار تقوری ہوتی ہے ؛ اور لاغری۔ اور ملے شدہ ما ذے اکر کثیر المقدار جوتے ہیں اور بہت زور کے ساتھ با ہر نکلتے ہیں۔ ابتدازوہ غذائر شتل ہو سنتے ہیں کسکن کیچے عرصے معدم کالنہاب معدة قايم بوجا آسئ توال مي فياط اور متغيرت و نون غي بواسي ليكن مث ذبي می مفراد ایکی جا نبسے وائی جانب کے طرف مرکت دودی جربرا بی سنیتی کا اس قیدر ممیز خاصہ ہے و بجی مائے گی۔ اور تفتریباً تمام اصابتوں میں (جن می مکن ہے له خوراک لیتے وقت اور مس کے بعد نہا بت عزر کے ساتھ اور دریک امتان کرنا یرات) خطور ملی کے وائیں جانب صلی طاحت یہ سے ذرایعے ایک سلعہ یا وازت یا کی جائے گئی جس کا قطر لی ایس ہوگا اور جر براب کے انقباض کے ساتھ سنمتی میں و مت اً فوقت بلتي رب كي اوراس طن سدون ست تمبر كي ما سيكي - يو كم منوى مرض کے بغیر بھی مرئی حرکت دوری کا واقع ہونا مکن سے لہٰدایقینی تشخیص تکے لیے سلعه کی موجود گی ضروری ہے۔ لا شعاعول سے بھی مدو بل سکتی ہے۔

یہ مبازت بواب کے عضلی ریشوں کی الخصوص مدور دیشوں کے طب بفد کی ایش کو ین ہے اور عالیاً جنینی لاندگی کے دوران میں نمویا ب بوجاتی ہے۔ وہازت یا دنت تووے کے اندر غشائے مفاطی میں شکنیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔

علاج - طبی علاج یہ ہے کہ معدہ کی تنسیل کی جائے اور اس کے بعدگا رہمی غذائیں دیجائیں ۔ تنسیل کے بعد (حبس میں قلیات کے استمال سے اجتناب کراچاہے کبونکہ ان سے کیٹر قلویت ہوسے کا خطرہ ہے) معدہ میں اٹر دبین کی میو فی چیوٹی نوای بق رہنے دینی جا بہتیں ۔ لیو مینال (luminal) کی الیمی خوداکوں سے کہن سے بحیہ عنودہ دہے عدہ تمائج درج کئے گئے ہیں۔

اِس طل مِن بَهْرَ ان نمائج رام مُیٹ (Rammstedt) کے علیہ کے درہیہ عالی ہوئے ہیں۔ یہ اس بہترین نمائج رام مُیٹ الطونی کے سلعہ کے اندرایک طوائی کا خت مُن کے مِن کی جد غذا بہت ہم ہم خت کے بنا طی کا کہ تسدور فع ہوجائے ۔ علمیہ کے بعد غذا بہت ہم ہم اس اُن مین مُن کی بار میں اُن میں کہ کہ کہ اُن میں کہ کہ کہ اُن کی بڑھا و سے سے بالعموم اسہال آنے لگئے ہیں کم کہ کہ کہ دوران میں غذاکا ہیج موج و فنہ ہو ہے کے باعث مصنی انزیوں گذشتہ تجوع کے دوران میں غذاکا ہیج موج و فنہ ہو ہے کے باعث مصنی انزیوں گذشتہ تجوع کے دوران میں غذاکا ہیج موج د فنہ ہو ہے کے باعث مصنی انزیوں اس وقات ہے کہ ہوگیا ہے ۔ کہ نورائہ و الما کے اسی قسم کا عدم کمل بایا جا گا ہے ۔ بعض اوقات ہے سے طرحان موجاتا ہے میں میں برازیشی ہوتا کہ اس مون میں صفراوی اور فالبًا نقراسی عدم فاہینے می کہے حصد لیتی ہے۔ کہ حصد لیتی ہے۔

سرطان معده

اسباب مدے کا سرطان تبیتس سال کی ترہے پہلے ثناف ہی و کمیعاما آئے اور اس کی ۹۰ فیصدی اصابتیں چالیس اور سائٹ سال کے درمیان کی عرون میں واقع موتی ہیں۔ یوعور توں کے نسبت مردوں میں 'دگانا عام ہے۔ تواریث سرطان مدہ میں کھی کمایاں معمومیت نہیں۔ یہ امیرو عزیب دونوں میں مرادی الوقوع ہے اور کسی خام ہوئیت

<u> کے ما خو</u>تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے متعلق بڑی بجث ہو ٹی ہیے کہ آیا سرطان عمواً معہ ف توص سے پیار موجا کا ہے یا نہیں۔ اس رائے کے خلاف یہ واتحدہ کر اشناعشری قرص ماست عام ہے ما لا کا۔ اُن عنری کا سرطان نہا بت سنا و ہو آہے۔ سرطان معدہ کی محاسس اصا بتوں کے ایک گروہ میں 4 ھ فی صدی ٹی سرگذ رشت ایک سال میلئے تک مانی تھی مکین اس بے زائد نہیں۔ ، ی فیصدی میں دوسال پہلے بک کی سرگزشت نوجو دختی (57) کہندا بینتراصا بزن می سرسری طور براوی سیمینے که دو تبائی مربهنون می سرطان منحود بخود يْترورع بروجا نابيد (46) الرحيمنز من التهاب المعده اور الحصوص معده كي معدانيت تكمنه اسساب معترين - بانى مانده اصابتول بي يه معدى قرحه كانتجه مو ماسه -امراهنیاتی تشنریح برطان سدے کے تمام صول کو اوف کرسکتا ہے لیک مر بینوں کی عالب نغداد میں تواب ماؤف مومائے۔ اور مُریس بہاں سے معدے کے متصارمعول سي سين ما تا بيم بالخصوص انتاك سفرك برابر اكرية أورادى سيكوما وف کرآہے توعمونًا اس کا ملہ مُری پر بمی ہوجا تا ہے۔ بعض او قائنہ معدے کی دیوار مکیسا ل الموريرورر يخذ اور د بنير بوط تى به اور معده بحيثيت مجرعى مسكر كرهمو فى جامست كا بوجاً با معد استه المعد الله المعد (leather-hottle stomach) بيند بي ستشات كوهياركر رطان معه کُره آسارطان (spheroidal carcinoma) با اُستواز نما مسوطان (cylinderical carcinoma) في شكل من مومًا يه اوراول الذكر نسنة بهبت زياده عام ہے۔ ان دورو سیرے مرقبرلین بات کی زیادتی کی وج سے جردی (scirrhous) رسكتي شعار يا أس كي فلت كي وج سلي كبي (medullary)- اور دونون مي كولائدي انحطاط واقع ہومکتا ہے' اگر جدید کرہ آسانسم میں زیادہ عام موتا ہے۔ جردی تغیر عام زین ہے۔

سرطان کی ابتداء غشائے مخاطی کے فد دیکے سطی خلبوں کی بیش بالیدگی سے بہانی ہے۔ بہا لیدگی ابتداء غشائے مخاطی کے فد دیکے سطی خلبوں کی بیش بالیدگی اور تبایئ ہے۔ بہالیدگیاں تخت المخاطی بالد المجار ہواتی ہے۔ تام طبقات کو او من کر دیتی ہیں۔ معدے کی دیوار موٹی ہوجاتی ہے۔ اور ہالیدا تناعشری پر ملا تو وزہیں ہوتی۔ آخری اور ہالیدا تناعشری پر ملا تو وزہیں ہوتی۔ آخری ورجوں ہیں دہ اکثر اندر وی مطبح برستدع ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کہ متصلی شائد وہ اکثر اندر وی مطبح برستدع ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کہ متصلی شائد وہ اکثر اندر وی مطبح برستدع ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کہ متصلی شائد وہ اکثر اندر وی مطبح برستدع ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کہ متصلی شائد وہ اکثر اندر وی مطبح برستدع ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کہ متصلی شائد وہ ا

زائدوں کی گرئی الیدگیاں ظاہر کرے جوکہ من التہاب معدہ کا نیجہ ہوتی ہیں۔
مکن ہے کہ یہ تعربی علی عروق کو متاکل کرکے نزف بیدا کردے بیاوہ قرعہ کے
سبت سرطان میں یہ بہت کم موتا ہے کہ نزف کنیر مقدار میں ہو۔ بوابی بالبد کے بیدا کرده
ضلیق کا نیتجہ اکثر اوقات اتساع معدہ بوتا ہے۔ سکین ایک متارہ نما معدہ - leather)
ضلیق کا نیتجہ اکثر اوقات اتساع معدہ کا اِنضام واقع بوطانا ہے اور اس کے بید کی ہے تو عام
طور بروو مسرے اعتمالے معدہ کا اِنضام واقع بوطانا ہے اور اس کے بید کی ساتھ انضام واقع بوطانے) سرطان کا حملہ ہوجائے۔ اس طرح جگر اور لیس کے ساتھ انضام واقع ہوجائے میں مرطان کا حملہ ہوجائے۔ اس طرح جگر اور لیس کے ساتھ انضام واقع ہوائے کی مرطان کا حملہ ہوجائے۔ اس طرح جگر اور لیس کے ساتھ انصام واقع ہوجائے کی مرطان کا حملہ ہوجائے۔ اس طرح کا اور است مدود کو بیدا ہوجانا کمن ہے۔ فوادی سرے کا سرطان کشرافا کی مرحکہ اور موتا اور است مدود کو تیا ہے۔

مری برحمد آور موبا آوراً سے مدوو کروتیائے۔ منتف اعضاء باربطون کی لبلیہ کی میچیر ول اور مصلہ لمفائی غدویں تا نوی جاوواقع ہوجاتے ہیں۔ یہ ماسار نفی کیس باربطویی اور با بی غدد ہیں اسکی جیا کہ مری کے مرطان میں نمی ہوتا ہے ' بعض او قات بمنفی لمفائی غدو بالکل ابتدامیں اوف موجانے دیں -

علا مان - سریری نقطهٔ نظریت ان اسا تبول کے دوگروہ موتے ہیں ال الحاطی کے دوگروہ موتے ہیں ال الحاطی کے اللہ کا فی کا خوامی ملی مالی میں معلل اور اس کے ساتھ می کا فید کا غیر سمر لی متباس موسی الم نبیس ۔ اِ نبیس ۔

(۱) ال گروہ کے ابتدائی درجوں کے علامات خاص کرسورسفتہ کے علامات موستے ہیں۔ اول توعدم استہااور متلی موتی ہے اور پھرجی کا ڈو با بابا نفذ اکے بعددرور اور رکیست ۔ یہ کر بری نٹر الیف میں ، یا سوزش سبنہ کے مفام بر موسکتا ہی جب سرطان بواب کے مفام بروا نع ہو توفیے کا اس حالت میں حلائر واقع مو نے کا اس حالت میں حلائر واقع مونے کا اس حالت میں حلائر واقع مو نے کا اس حالت میں حلائر واقع مو نے کا اس حالت میں حلائر واقع مونے کے اس کے کہ جب وہ آب افقط ہے دورو انع ہو۔ فئے میں فالم اس کے ساتھ کی وہیش موجود مونی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کی وہیش میں موتی ہے اور اس کے ساتھ کی وہیش میں موتی ہے کے ساتھ کا موانون اکٹر ڈروقوں کا منظر مفاط یا نون کی دھاریا ل می موتی ہیں۔ می کے ساتھ کا موانون اکٹر ڈروقوں کا منظر کھتا ہے۔

ر۲) جب بواب کے فعل میں کوئی خلل نہ ہوا ہو تو بالبد عمواً جم عدہ میں ہوتی اسے الیکن ہمیشہ نہیں۔ مکن ہے کہ جب کک کہ البد بہت زیادہ ترقی یا فقت نہ ہوجائے کوئی ملامات موجود ہی نہ ہول ، اور بھر قرب وجائے کی صلامات موجود ہی نہ ہول ، اور بھر قرب وجائے کی سے خوال بہتا ہے اور متغیرہ فوت بہتا ہے اور متغیرہ فوت بیا الوجائی ہے۔ اس سے جوعدم دمو بت پدا ہوجاتی ہے ملک ملعہ غیرجس بذیر ہو سے کی حالت میں ہس سے تعلق عدم دہ بت پدا ہوجاتی اللہ ملعہ غیرجس بذیر ہوسے کی حالت میں ہس سے تعلق عدم دہ بت وصفہ موجود ہو۔ (pernicious کا شبہ بدا ہو مکتا ہے ۔ ساتھ ہی مکن ہے کہ ترقی نے رضعفہ موجود ہو۔

عام اور بریم اجا ماسکا ہے کہ سرطان کی اصا تبول کی فالب تعدادی ا بہب مسلحہ کسی دکسی و فت با باجا قا ہے اگر جدوہ ابتدائی تین یا چار دہوں میں شاف ہی شاہ کو اور مبعنی اعداد و شار کی روسے وہ ابتدائی جد ہمینوں کے اندر سرف ۱۳ فی صدی اصابو میں مانا ہے یسلمہ کامل وقوع البحث بمعدے کے اوف صفے کے لیا طاب مختلف موتا ہے۔ بوابی سلمہ عمواً خط درمیانی میں کیا کمبیقدر وائیں طرف تقیق ضغری اور ناف کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ جب معدد بہت تعم ہوتا ہے تو بیسلمناف سے جی نیے ہوتا ہے۔ جمامت میں وہ ایک انروٹ سے بی نے کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ بابتدا اگر وہ آواواند فور برحرکت بذیر برتا ہے اور شبق کر ایک میں کی اس کے درمیان سے کے درمیان سے کے درمیان سے بی کے درمیان کی کے دار برتنی کے دار برتنی کو ایک انہوں کی کے دار برتنی کو ایک انہوں کی کے دار برتنی کو ایک انہوں کی کو میں کی سے کے درمیان سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی سے کے دوم انفعال میں بیا کر ہے اور میں کی دوم انفعال میں بیا کی ہے دوم انفعال میں بیا کی ہو ایک میں بیا کی ہے دوم انفعال میں بیا کی ہو کی ہو

دادہ فہت ہوجائے۔ اکثر اوقات اس نریرافیادہ اور طی کا مکم مقل ہوجا ہے۔
ترج کرنے پروہ اسم یافیرکا لی طور پر کمی ہوتا ہے۔ اُسے اِ تع سکا سے سے در دموس ہوتا ہے۔
اُسے اِ تع سکا سے میں انتقاب کیف اور اس کے جدائماب
اربطون سا ہوجا ہے۔ میکن اس حادثہ کے طابات مہم موتے ہیں اور ماف فایانیں
ہوتے۔ لیس اربطوفی غددکا سرطان ہیروں کا بہتے پیدا کر دیتا ہے، اور بہی میتج بڑی مرد اللہ کی طفیت سے بھی پردا موجات ماہ کی طفیت سے بھی پردا موجات محدی قولون نامور (جو بیشتر سرطان کے معدے سے قولون کے معدے کے غیر مضم شدہ مافیہ ہوتی ہے کہ معدے کے غیر مضم شدہ مافیہ ہوتی ہے کہ معدے کے غیر مضم شدہ مافیہ ہوتی ہے کہ معدے کے ایک مواج ہوتی ہے کہ موجاتے ہیں کا یہ کہ برائی سے براہ مراست قولون کے اندر اور یہاں سے براہ مواج ہوتی ہے کہ کو لون کے اندر جیاجاتے اور بھیسر ایک کی در بیو بھی جاتے ہیں۔

ایک کرازی ہے بوتی ہے کی کو کہ قولون کے افیہ معدے کے اندر چیاجاتے اور بھیسر ایس سے قرائے ذر بیو بھی جاتے ہیں۔

یہاں سے قرائے ذر بیو بھی جاتے ہیں۔

ر المسال المسال

مدت مون ۔ یہ بیاری عام طور پر جید اوسے دوسال کک ماری رستی ہے۔ دو تبائی اصابتیں المحد مجمعینے سے کم جاری رہتی ہیں اور ایک نہا بیت محوری تعداد دوسال سے زاکد کے جاری رستی ہے۔

تشخیص ۔ سرطان اپنے آخری مداج میں سلحہ کی موجودگی کی وج سے معہ کے دوسرے بیشتر امراض سے سخناخت کر لیا جا تا ہے۔ کہی کہی ایک بڑھے بوٹ سخت عنقی عذہ کے لی بڑا خوس کے دوسرے بیشتر امراض سے سخت عنقی عذہ کے طرف اِشارہ بوائے ۔ اگر کو ئی سلوسٹنا خت نہ ہو سکے توجیا کہ بہلے تبلا یا گیا ہے کہ طرف اِشارہ بوائے ۔ اگر کو ئی سلوسٹنا خت نہ ہو سکے توجیا کہ بہلے تبلا یا گیا ہے کہ سرطان کا متعلق عدم دمویت (pernicious anæmia) کے سابقہ کا مزمن موہ منہ اور انعنام کی کے مناف کا میں اور انعنام بو میں ۔ استنتائی اصابتوں میں یہ می کئن ہے کہ حصول کا وہ تشا کے کہ برسرطان کی جسے دیں ۔ استنتائی اصابتوں میں یہ می کئن ہے کہ حصول کا وہ تشا کے کہ اور انعنام بھ

قریہ سے پیدا ہوجا آب سرطان کی مشاہبت پیدا کروے ، مریعن کی عمراہ ممن کی بیٹر قلب ل مرت کی بیٹری کس کی تتخص میں اہم مناصر ہیں کیونکہ بیٹیز اصابجوں ہیں سرفاہ سابغہ معدی قرص کا نتیجہ زنہیں موتا۔

مریف کوسب میں دو وہ کے اندرووٹی میون فل کو کمہ (eharcoal) دبنا چاہئے اور دوسرے روز علی العدباح میں کے معدے کے افید کا امتحان کرنا چاہئے (49) - سازہ ہمتنے مرکئی خون کی موجو دگی سرطان کی طرف اشارہ کرتی ہے، بالحضوص جب کہ خون میں طرح ایک سے زائد موقع پر با باجائے کی لیکن کو کمہ کی موجو دگی سے معدے کے فالی موجہ نے میں تاخیر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فیصدی اصا تبول بر مسکونی تل میں خون موجو و تھا اور یہ فی صدی میں آزا و کا ٹرروکلورک اُیڈ بالکل نے تھا (57) خون کا سلول ساؤ مرطان کامیز خاصہ یے گرمج آنفاق سے ہمنے والا وا فرنز ف اغلباً قرص کا میتجب

ہو آہے۔ دُر دِ قہوہ جیسی نے دو بول حالتوں میں دیجی جاتی ہے۔ معدے کو دھوڑا لنے کے بعد ایک امتحانی خوراک وی جائے۔ امتحانی خوراک کے اندر لیکٹیک آبیٹر کی موجو دگی سرطان معدہ پردلالت کرتی ہے۔ ما4 فی صدی اصابتوں میں بے ترشگی عنی ۔ جینا نجی از او ماکٹر دوکلورک ایسڈ تغیر نہیر



الف معده بریم سے بعد ابواب ، ابل حقد میں سرطان کی موجود کی تقس پری سے ناہم ہوتی ہے ۔ آناعشری کلا، آبی عربی الف اسلامی کی است مسلم و للبولند سے لاک نے لی ہے)



۔۔ ب سرنان کی وجہ سے ایک متمارہ نمامعدہ ۔ (شعاع بھاشت مسٹرڈ لمیولنڈسے لاک نے لی ہے)

ندد کا با لکل استیصال نه کیا دا سکے موت اگر سرے ۔ عِسلاج ۔مشتہ ابتدائی اصابخوں سے شکم شکا فی کے علیہ کا مشورہ دنا

بهر المراع - طابیه البدای اها بول ی صدر مقای می مود دید بهر به البدی استهال می تقریباً واحد شفا بخش طریقه دے - اس وفت جب کدا یک گوله محموس موسکے به علیه بعد از وقت تا بت بوگا کیونکراس وقت تک بالبد میل مکنی ہے اور لمفائی غدو او ف موجاتے ہیں ۔ معدی صب می تفوید کا علیا کے تعینی تدبیر کے طور پر انجام دیا جاسکتا ہے جمینی لاشعای علی می آزمایا جاسکتا ہے -

اگراتیاع نایاں ملامت ہذاور مہر جندرہ زکے بعد غذاکی بڑی مقداریں قئے سے کل عاقی بون تو مکن ہے کہ معدے کو روز انہ وصور ڈالنے سے عارضی تشکین معلوم ہور ملافظ ہوصفہ 352) کیا مریض کو در وحموس ہوسے کے وقت ایک نلی دال کرلینے کی ترکیب سکھلاوینی میا ہے ، کیونکہ بعض او فات مرت اسی مادہ ند ہرسے تقبض

(CONSTIPATION)

آنوں کے صوت مندفعل کا انتصار غذائی کا فی درد پر ہوتا ہے کہ جس کا فیفلہ براز کا اور بنا آ ہے نیز معانی درسول کے قدرتی افراز براور ایک ایسے معائی عفلی نظام بر جو آسانی کے ساتھ مہتہ جو اور اتناکا فی قوی ہو کہ براز کو ایک مقام ہو وہ مقام کہ ایک وظیل سکے ۔ لیکن یفس مختلف افراو میں مختلف ہو آ ہے وظیل سکے ۔ لیکن یفس مختلف افراو میں مختلف ہو آ ہے وظیل سکے ۔ بیشتر اشخاص میں پانیا نہ دن ہو میں ایک دن جو ڈرلر ہوتا ہے ، لیکن دو سرو س میں روز انہ دو باز اور لبصنوں میں صرف ایک دن جو ڈرلر ہوتا ہے ، میکن دو سرو س میں روز انہ دو باز اور لبصنوں میں صرف ایک دن جو ڈرلر ہوتا ہے ۔ جب جو بسیں معنظ کے طبی عرصہ سے ۔ یہ نیتجہ ہوتا ہے د ان بڑی آ نت کے طول میں دو برازی عام مرکت میں نا خیر کا (قولونی سکو د = colonic stasis) یا جم ی طول میں برازی عام مرکت میں نا خیر کا (قولونی سکو د = colonic stasis) یا جم ی طور یا ان دو نوں اعالی میں تا زخر کیا ۔

ا۔ معانی تنال میں برازی عام حرکت خالصاً غیراراوی موتی ہے اور ہس کا انخصار معانی ولیواری کا فی عضلی طاقت بر ہوتا ہے 'جسے مناسب غذا سے معقول

ی بنیمی ہے۔ کمزور معنلی نظام ایک موروثی قعمور ہو سکتہ ہے، یا مکن ہے کہ وہ آخری ایری بنیمی ہے۔ کمزور معنلی نظام ایک موروثی قعمور ہو سکتی ہے، یا مکن ہے کہ وہ آخری ایری کارٹ میرو میں مارٹ کی کارٹ بنی کمزوری محتیات اور حاد امرافن میں واقع ہوجا تی ہیں اور عدم و مویت اخضرت اوران امرافن کا نتیجہ ہوسکتی ہے جن میں عصبی انخفاض موام ہو اسلامی کے ایری میں مورید کمن ہے جن میں عصبی انخفاض موام ہو اسلامی کا نتیجہ ہوسکتی دیا ہے کہ الیخولیا، نہاکت اعساب (neurasthenia) دغیرہ دمقامی طور پر کمن ہے یہ دیمی تمدد کی اورغضار مفاطی کی نازلت کا نتیجہ ہو۔

معارکو بہتج الخصوص غذاہے عاصل ہوتاہے اور مکن ہے کہ یہ تقداری

نا كافى بو كا از مدخت بو كا إس مي ميكانى بهيمات كى قلت بو جن مي نباتى الشياء كا الدخت بو جن مي نباتى الشياء كالله المراب كالله كالله المراب كالله كالله المراب كالله كالله كالله كالله كالله المراب كالله كال

می آنتوں میں غیرممولی قوتِ بہنم و حذب کے باعث اس قدار کم تفل باقی رستا کے کہ افراغات لازمی طور پر بہت کم مرتبہ ہوتے ہیں۔ اِس عالت کو معربی قولون

ان greedy colon") کے نام سے تعبر کیا جا آہے۔ معدے کی بہت سی خرا بول میں

الخصوص جهال قئے بار بار ہوتی ہو قبض ہواکر تاہے۔مزید براس حوص یاست کے

الہما ہی یا صربی نوعیت کے درد ناک مقامی عوار من سے آنت کا معکوس منل برا ہ

راست متنع ہوسکتاہے۔

ورن رکودکی تشخیص مرف اسی وقت بوسکتی ہے جب کدایک غیر شفاف فراک دینے کے بعد امعاء کا استحال کیا جائے۔ معمولی حالات بین جار گھنٹوں کے اخت تمام پر معدہ خالی ہو آ ہے اور غذا لفا کنی کے انہمائی سرے پرجمع ہوتی ہے۔ ورسم ی فوراک لینے سے لفا کنی کی انہما پر اور قولوں کے اندر خاص خلیت بیدا ہوجاتی ہے جس کی وجرسے معائی ا نیہ بہ سرعت آگے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ موجاتی ہے جس کی وجرسے معائی ا فیہ بہ سرعت آگے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ (هعدل ی لفا کفی ا و د معدل ی قولویی معکوسا میں) (50)۔ غیر شفاف غذا معت سے کی طور پر غائب ہو جائے ہو اولی معکوسا میں) وجہ کے برق ہے۔ یک سے کی طور پر غائب ہو جائے کے عمر آ جار گھنٹے بعد لفائنی کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ یک ان فائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کے کھانے کے جائے گھنٹے بعد کہ اس کا حفیف ساحمہ بھی اعور کے اندر داخل نہوا ہو کیا جب کہ اس کا خفیف ساحمہ بھی اعور کے اندر داخل نہوا ہو کیا جب کہ اس خدا کے نو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کا بیشتر حصہ غذا کھانے کے نو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کا بیشتر حصہ غذا کہ کو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کا بیشتر حصہ غذا کے نو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کے نو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کے نو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کا بیشتر حصہ غذا کہ کے نو گھنٹے بعد بھی لفائنی کی انہما ہی سرو اور یہ معلوم غذا کیا۔

موج کا بوکہ سدے نے خودکو تین یا جار گفتوں میں خالی کردیا ہے۔ طبی طور پر فیرشا خاند جربیس گفتے ہیں معا دستقیم میں بہنچ جاتی ہے۔ قولونی سے دو اور بی سے وی اسوقت موج و بوگا جب کہ اس مدت کے اختیا مروہ اب می بکلہ اس مرا تو اون صاعدی ہو یا جب کہ جربیس گفتے ہیں وہ طی لی تعریب کی سرتبہ بہنی برفولیکن فیرشفا ف ارب کہ جو بیس گفتے ہیں وہ طی لی تعریب کھنے بعد میں قولون مناحر من موجود اگر قولونی رکود شدید درجہ کا ہے تو لفائنی اعودی مصراع کے بار معائی ما فیب موجود کے گذر سے میں میں تا خیر ہوگی (لفائنی سکود) یفائنی رکود تولونی دکود کے بخیر می واقع موسکتا ہے الخصوص تحت المحاد التهاب زائدہ کی اسانتوں میں اندا کا فیا خطا بط

ا چ بیس کمنظ کے دوران میں جوبراز حرضی قولون کے اندرجم ہوجا آہے اسکے معام تعقیم کے ان رو اخل مولئ سے معام تعقیم کے معام تعقیم کے اندر براز کا یہ داخلہ ناست تہ کھا ان کے بیتی یا اعمد کرکھڑے مولئے کے بیتی یا کسی اور روزان و الله کا بینے کی بیتی یا کہ کہ کہ کے بیتی یا کہ کہ دوزان و الله کے بیتی کی سے معکوس طور پرواقع ہوجا تا ہے۔

م رسوں میں عبوثی شرم بڑھ و فائز میں جگہ کا کا فی نبونا اور بہت سے لوگواں برمون کا لئی يہس کا سبب ہوتے ہیں جانج اس عل ولمتوی کر زیاجا آہے بیاں تک کہ یا بندی قت کی عادت اِلکل محیوٹ جاتی ہے، برا زوہ یا تین دن لکہ ایک ہفتہ تک محبوس شامح، اور پیر صرف لمین ادو به یا حقید کے انتعال سے افراغ مال کیا جا سکتا ہے۔

رتبرز کا ایک دومیراسب اُن ارا دی عضلات کی کمزوری ہے جوا فیہ ٹ کم کو تھینے ہی اور قولون سے معا رُ تقیم کے اند؛ اور معامِ تتیم سے مرزی گذرگا كے آرا ربراز كے گذر ہے میں ممد ہوتے ہیں۔ پنٹہنتی عفلات بٹ كم ڈایا فرام عضلہُ

را فع المبرز اور حومنی فرش کے دو سرے عفیلات ہیں۔

ا گرخیر تنفاف خوراک کا بینیتر حصر بسک کے کھائے کے چوبیں گھنٹے مددوخی قولون اور معا ،متعتبم میں بہنچ گیا ہے' اور اگر باوحود اس کے تیرز کی خواش بنوتو

عُسرتبرز كى سنغيف قائم كى جائلتى ہے۔

برا زکے گذرنے میں میکانی رو کا وظمیل جیسے کہ قولون کا ضغطہ ہا تنہٰ اُرادگی سخت كلمليال باليدكي وحرسة تفنيق عضله عاصرة المبرز كالشيخ اور قولون كالشيخ 358 (مینے وہ حالت جیسے شنیج الاجمعاء: entrospasm کیتے ہیں) ٹری آنت کے ئسي بعي حصه ميت اخيرواقع أرسكني ميں ۔ان مي بعض حالتيں مبند تر درجه ميں كمل تب ديبيدا کروتتی ہیں۔

علامات - اگرة نتول كوابيفه حال برجيور ديا عاسے توان كاعمل مني امات دؤتین جاریا زیاوہ دنوں کے وقفہ سے ہوتی ہے۔ قولون یامعار متعتبم ہرازی اف ک سخت گول منایوں (سُکْ وِں)سے یُر ہوماتی ہے جو کستقدر تھیکے آبگ کی مونی ہیں' اور باہم پیویستہ ہوکر تو دے بنا دیتی ہیں۔ یا خانہ تھرنے کی خوامش کا يتَّجه يبلَك شايد سي مُوتاب كه كالنصف كى كوتستيل مِوتى بين جوغيرموز شابت موتى بن لكن بالأمركي سنت كلتي مي اوركن ب كدچند كلفارك كاندركي اور دوياتين بار مکرر تکلیں کہ بہا ل تک کہ نیجے والی است خالی موجائے۔ اس کے بغہ کئی رو بے دوسرے عرصے تک آنت غیر فعال دہتی ہے بعنی اجابت نہیں ہوتی ۔ اِس احتبال كه دوران مي مكن جه كه مريض مختلف الا قنام كي جه راميا ل محوسس كرس -

مقامی طور پرکن ہے کہ عیان ہیں ہُری یا بھاری ہیں کا احماس ہو' یا اُسے مبزی خارشی کی شکا بیت ہو۔ اور کمن ہے کہ اُ ور دہ اِصوری میول جا بُری اور بواہر پیدا ہوجا کہ بعض اوقات اعصاب حوض پر برازی تو دول کے دباو کی وجہ سے نیچرانوں کہ درا ہوجا تاہے ۔ اگر سف ہی ہول ۔ زبان اکثر فردار' بیبیدی اگل یا میلی مجوری ہوتی رسیجیت اور فرکار ہی جی ہول ۔ زبان اکثر فردار' بیبیدی اگل یا میلی مجوری ہوتی ہے اور فرکار ہی جی کہ موتا ہے ۔ اور میل نے کہ این ایک مفقو د ہوجاتی ہے اور میر نیا نی کا جا ل ہوتا ہے کہ بہت زیا دہ ذبی انحفاض ہوتا ہے ۔ بعض اصحاب اِن علامتوں کو او بہت سی دوسری علامتوں کو اموار کے افیجا کی ست رفتادی یا معوی س کو د بہت سی دوسری علامتوں کو اموار کے افیجا کی ست رفتادی یا معوی س کو د بہت سی دوسری علامتوں کو اموار کے افیجا کی ست رفتادی یا معوی س کو د بہت سی دوسری علامتوں کو اموار کے افیجا کی ست رفتادی یا معوی س کو د بہت سی دوسری علامتوں کو اموار کے افیجا کی ست رفتادی یا معوی س کو د بہت سی دوسری علامتوں کو اموار کے افیجا کی ست رفتادی یا معوی س کو د بہت سے دوگوں میں با وجود برمی کی تو ایم کی تفریع بہت دون ہی ہوئی تھی خو دس کسی خرا ہی کا اصال نہیں ہوتا ہ

جہاں برازمائی تعقیم میں مجبوس ہوجا آہے آخرالذکرا سے جگہ دیے کیا ہے۔ انہا مع ہوجا تی ہے۔ برازی وہ حالت کہ جبکہ اس کے سدے بن جاتے ہی اس طرح بیدا ہوتی ہے کہ وہ قولون میں مجبوس ہوجا آہے اور اس احتباس کے دوران میں اس کے اندر جو کچھ یا نی موجو دہوتا ہے اس میں سے زیادہ ترکے مذب ہوجا ہے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ معا وشقیم شدوں مذب ہوجا ہے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ معا وشقیم شدوں کے تودوں سے پُر ہوکرتی ہوئی ہو مرزے کسیقدر برازی سیال خاج موکسا ہے یا مخاط کے افراز کی تحریک موسین نازلتی التہا ہے قولون اور برازی قرن وسیم نازلتی التہا ہے قولون اور برازی قرن جی جب کے قبین ہے میدا ہوسکتے ہیں۔

حومنی قولون کے آنگر برازی ماقدے کا اجماع کمن ہے ایسا موکہ و ڈیکم کے حصر زیری میں ایک بڑی رہوں کی اقتصاری میں ا حصر زیری میں ایک بڑی رسولی بنا دے میں کا اقتمازی خاصتہ یہ امر ہے کہ انگلی کے سخت د باؤسکی آگئی کے سخت د باؤسکی اسٹ سے ۔ عسلاج - مجلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ قولونی رکودکا علاج غذا کے ذریعہ سے
اور سندید ترور جرل میں وکک سنگری ورزشوں اور اور یہ سے کرنا جا ہے ' اور محرتبرنر کا علاج ترخیب اور ورزشوں ہے ' اور شدید تر درجوں میں درمبر وار حقول سے ۔ یہا در کھنا جا ہے کہ بعض مریض مبردو سرے یا تمیسرے روز یا خانہ جاسے کی صورت یں
میلے جنگے رہتے ہیں ۔

مریف کوروزان پابندی وقت کے ساتھ اور بلامجلت کے پاخانہ جانا کیا فراہ اسے اس وقت حاجت معلوم مو یا بنو اور اس طریقہ کو بقید زندگی جرایک عادت کے طور پرجاری رکھنا جا ہے انگین مکن ہے کہ اس طریقہ کو بقید زندگی جرایک کا بورا اظهار مہنیوں کے بعد بو عشر تبرزی حالت میں اگرا و دصع اختیار کرنی جا جہ فار این میں اگرا و دصع اختیار کرنی جا جہ فاری ترمیم اس بنج برکرنی جا ہے کہ اس میں کا فی سنر یاں ترکاریاں فارہ یا معسون مجل ایس کا فی سنر یاں ترکاریاں کا دمعہ سالاء کے تیل کے سن ل ہول ۔ لال روقی از واصلہ اوقات کی دوئی یا بھے کے دکھیں جوئی جا ہے اور میض اوقات ایک مطلوبہ بہنچ حال موجہ آئے کی دوئی یا بھے بھی مونی جا ہے اور میض اوقات میں نامشتہ سے بہلے ایک گلاس مخت اپنی جانے یا ایک میب کھا گئے ہے دوزان ایک ایس بوجا تی ہے ۔ حریص قولوں کی اصابتوں میں دکئے ' الوواں یا وم بھی کے ایک میب کا دوجہ کا لینا مفد ہونا ہے ۔ حریص قولوں کی اصابتوں میں دکئے ' الوواں یا وم بھی ورٹ کے دوئی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دوجہ کے لیک ایک ایک ایک دوجہ کے لیک ایک ایک ایک دوجہ کو لینا مفد ہونا ہے ۔ حریص قولوں کی اصابت کا دوجہ کا لینا مفد ہونا ہے ۔ حریص قولوں کی اصابت کو دہ مجلوں میں جانب نا پذیر بیسے ہوئے اگادا کار (agar agar) کے ایک دوجہ کو کے کا لینا مفد ہونا ہے ۔ حریص قولوں کی اصابت کو کار کار ایک ایک دوجہ کے کار کیا گئی ایک دولی کے دوجہ کو کی کار کیا گئی ایک دوجہ کو کار کیا کہ دوجہ کو کار کیا کہ کار کیا کہ دوجہ کو کار کیا کہ دوجہ کو کار کیا کہ دوجہ کو کیا گئی کی دو کار کیا کہ دوجہ کیا گئی کار کیا کہ دوجہ کو کار کیا کہ دوجہ کیا گئی کیا کہ دوجہ کیا گئی کیا کہ دوجہ کی کار کیا کیا کیا کہ دوجہ کی کی دوجہ کی کیا کہ دوجہ کی کیا گئی کیا کہ دوجہ کیا گئی کیا کہ دوجہ کی کار کیا کہ دوجہ کی کیا گئی کیا کہ دوجہ کو کار کیا کیا کہ دوجہ کی کی دوئی کی کی دو کیا کی دو کیا کیا کہ دوجہ کی کیا کیا کہ دوجہ کی کی دوئی کیا کہ دوجہ کی کی دوئی کی دوئ

کیکن بایں ہمدیکن ہے کہ تھر بھی اوویہ کے استعال کی ضرورت بڑے ا

اوران كا بخاب مي احتياط اورغوركى مرورت ب عام طور ينها يت تيزيا شديدالمنس مبدلات سے پربر کی جائے کیونکہ اُن سے بہت سے سیلے وست ہوجاتے ہیں ا ون كم الرسط سوى عفد كل طور برخسته بوطأ سب اور بيتم يه بواسك كر بعد بى ئى دن كەكۇئى تفرىغ نېپ موقى ـ نىكن يەپىلىم،ى نىلايا كىيا جەكەقب**ىغ كالخمىب**ار ترکت دودی کی قلت پر ہو اے اسپواسطے حدسے زائد تیسیج اور **مسئلگی سے خام کوری**ر اختراز لازمب - اس نقط نظرسے اس سے بہت فائدہ ماس ہو اب کممولی لمینان کے ماتھ الیبی دوائس مجی سندر کم کردی جائیں جرمعومی معنیا برمغوی اثر رکمتی ہوں۔ یہ الحضوص کیکا اور لو ہا ہیں۔سناکی بیلیا ن جنسیں جیند کھنٹے مسلاے يا ني من عبلور كما او يجر بيا جا إسك ايك مفيد لمين من - كاسكر استيريدا (cascara sagrada) کا ما نع خلاصه ۴۰ یا به قطرون کی معتادون میں شربب ر بخبیل (syrup of ginger) کے ساتھ شرکے کرکنے یا اس کا خشک خلاصہ او یا اور گرین کی معتادول برب گولی کی مورت میں روز اند شب کے وقت ویا جا سکتا ہے۔ خالِق لکوڈ بیرافین کالت مرض کی ضروریات کے لحاظ سے لی اون تا اون کی مِعْتَادُول مِن رَوْزَارْهُ الكِب إِ وَو إِرد إِجَاسَكَمَا ہے۔ اَلائنِ (aloin) إِيالَةِ الكِمِينُ اوُ كيك كافلامد للم يال كرين ايك كاركرا متزاج ب عن كاستعال صبح كمه وقست تا شة ست يبلي كرنا يا بيت . بعض اقطات إس كه ساته فلاصد لفاح اextract of) belladonna) لم رين إعق الذبب (ipecacuanha) لم كرين إعق الذبب منید موالم مندیث و ف آیرن (sulphate of iron) داگرین) الاین ورکید كميساته بمي بنايت مفيد مو آب أگروزان ايك كولي ناكاني بوتود والكرتين كوليال لى جاسكتى بين ولكن ببرمورت أمل علاج برب كدفهال ابهال سع بربيز كرفا جائ اور جيسے بي كدا س كے بديا بوسے كا إمكان معلوم بؤروزان مين كولي كو كلفاكردوالي دو سے ایک کروینا ما ایک اور آخر کار آنتوں کا فعل مین اص بلاکسی قسم کی فادجی مدو کے خود ہوئے فیالی مادست کمی التوں میں یا شکی علیات کے بعد إيسيزن المانية (eserine salicylate) بالبيج شرين (pituitrin) كاتحت الجلعاشة كَيْ الْمُعْنَاتِ عَدْنَى مُكِينِ إِنَى (natural saline waters) حيسے كدرُوبناط

قنال غذائي سمالهم

(alimentary toxemia)

منال غذائی سے افذ ہوتے ہیں۔ اب یہ یقین ذیادہ سنکی ہوتا جار کے اندائی سے افذ ہوتے ہیں۔ اب یہ یقین ذیادہ سنکی ہوتا جار کے ہے کہ کٹیرالتداوط آن افزائی سے افذ ہوتے ہیں۔ اس یہ یقین ذیادہ سنکی ہوتا جار کے ہے کہ کٹیرالتداوط آن امراض بھی اسی سے اور یہ قائم کر دیاجا سکے بہت سی مشکلوں برغالب آنا بڑے گا۔ نی افعال ہم اس سے اور یہ زیادہ نہیں کہد سکتے کہ وہ علاج جوال مفروض پر بنی رکھا گیا اکثر کا میاب اس بوا۔ ظاہرے کہ سبب اور میتج کی ورمیانی کو یول کا پہت کے لیے ہوئیں ہوتا۔

اولاً مکن ہے کہ ان موم کا منع وہ عصویات موں جو باہر سے داخل ہوجاتے ہیں۔

ہیسے کہ عنونت وہن (oral sepsis) کی ورت ہیں کوس کا ذکرہ سلے ہو جیکا سب
(الما خطہ ہو صفحہ 231) اور اسی صورت ہیں جرئے خون کے اندر بقات سبحیہ وافل ہو ہے۔

ہیں یا وہ نر وعضو یا ن جو دا نول کے خانول (sockets) ہے آتے ہیں متوا تر سبکے جاتے ہیں اور وہل مرانتیں بیدا کو ویتے ہیں۔ بیند انی خطے کے مختلف معمول میں جا گر بی سک جا کہ بی سین اور وہل مرانتیں بیدا کو ویتے ہیں۔ والم ہی ہیں رشیت نما التبا سب مفاصل ہی ہیں رشیت نما التبا سب مفاصل اسی سبب کی طرف منوب کی گئی ہیں۔ وقریح ممن ہے کہ در اسل خو وغذا ہی ہیں نہر موجود ہوں بی کی طرف موجود وہوں جو حکیل ہوجا ہیں یا کاربو اکی گذر تیس مقد ارکشہ موجود ہوں جن میں ترکی میں نے دور نوکی مکن سے کہ عادتی قبض کے نیتے کے طور بر موجود ہوں جن میں ترکی ویک کہ برا زمہت مرصد تک مجموس رہنے یہاں تک کہ ناری برائی یا گیسیا کی تعیرات موزار ہوگر سموم یا نہری کیمیائی است یا و پیدا ہوجائی اسی برائی یا گیسیا کی تعیرات موزار ہوگر سموم یا نہری کیمیائی است یا و پیدا ہوجائی (معجودی سرکود)۔

(معجودی سرکود)۔

معلوم ہوتا ہے کہ مضم کے بیمیبیدہ اعال جو قنال غذائی ہیں معدے سے معار معقیم تک رابضہ ل ہروں واقع ہوئے رہتے ہیں اور تاخیروا خنال کے وہ امکانا جو ایک الیے کو بل کہ خیر معروں کا ہمیوں کے لئے اور جو ایک الیے کو بل کہ خیر کہ فیر میں موج وہیں کیمیائی زمروں یا سموم کی بحوین کے لئے اور دور ان خون کے اندران کے وافلہ کے لئے وافر موقع بہم بہنچاتے ہیں لیکن تبدیر شاید یہ صوف جدید زہروں یا سموم کی بیدائش کا ہی موال نہیں ہوتا بلکہ اس میکا نہت ، منافل میں موال نہیں ہوتا بلکہ اس میکا نہت ، فوٹ حاسف کا بھی موال ہوتا ہے جو غذائی قنال یا دو سرے مقامات کے زہروں کو خون کے اندروانی ہوسے خیار وکئی ہے۔ یہ میکا نیت مضی افراز است موالی اغشیاد ان کا مفاط کو اندروانی ہوسے خیار اور کئی ہے۔ یہ میکا نیت موسی افراز است موالی اغشیاد ان کا مفاط کو بی تا میں موسلے میں افراز است موالی اغشیاد ان کا مفاط کو بی تا میں موسلے میں کہ مفدہ ور تی کا فول ہے۔

کمین بیغیربقینی معلوم ہوتا ہے کہ آیا وہ جرا ٹیم جو تمواً آت نت کے اندر پائے کی ایس کے اندر پائے کی میں کوئی ختی نقصان کرتے ہیں ۔ اور کیمیا پی اسلامی معلق بیار ہے کہ ایس کے متعلق بیار ہے کہ انجی بہت کچھ جانیا باقی ہے کیوں کہ مبعض اصحاب تو ایس کے متعلق بیار کی متعلق میں اور فیزال (phenol) کی مکوین اور ایتعلیم کی سکنیں (skatol) کی مکوین اور ایتعلیم کی سکنیں کے متعلق میں کا میں کا میں کا میں کی مکوین کا مدا میتعلیم کی مکوین کا مدا کی مکوین کا محمد کی مکوین کا محمد کی مکوین کا مدا کی مکوین کا مدا کی مکوین کا مدا کی کا محمد کی کا محمد کی مکوین کا مدا کی مکوین کا مدا کی مکوین کا مدا کی مکوین کا مدا کی مکوین کا کی مکوین کا محمد کی مکوین کا مدا کی مکوین کا کی مکوین کا محمد کی مکوین کا محمد کی مکوین کا کی کا کی مکوین کا کی مکوین کا کی کا کی مکوین کا کی کا ک

(ethereal sulphates) کی زائد کوین کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے امی ا جیسے کہ میلان بی (Mellanby) امین (amines) میں بہت خطرہ و کھتے ہیں ، جو کہ اس وقت بیدا ہوتے ہیں جب کہ معوی جراثیم کی و ماطت سے پروٹین پاش آ مینوا بیڈن سے ان کی کاربن ڈائی آگسا ئیڈ الگ ہوجاتی ہے۔

غذائی شمر کی ان اصابتوں پر رائے زنی کی چنداں ضورت نہیں ۔ جن بیں نوعی عصیتے موجو در کھنے والی تحلیل پنر برغذاکا او خال ہوجا آ ہے ' اور ہش کے اثر سے علامات

پیدا ہوجائے ہیں۔

نفرس (gout) اوراس سے مال مالیں اسی غذا کے طوی استمال کی طرف منبوب کی جاتی ہیں جس میں پروٹینز کی مقدار بہت زیادہ ہو کیکن یدا مراجی کک معرض بحث میں ہے کہ آیا ایساس وجہ سے کیا جا آ ہے کہ پروٹیز کی معانی ہوجاتے ہیں گاآیا خود معنویے پروٹیز کے سانھ کوئی تعلق رکھتے ہیں ہی یا آیا جرائیمی سموم یا دوسرے کیمیائی مرابات جیسے کہ پئور نیس (purms) میضا و پیدا کروستے ہیں ۔ اسی طرح مکن ہے کہ کاربو ہائیڈرمیس کی زیادتی بچوں میں ایک سمی حالت بیدا کروے جبیں تپ متنی ہری کا رہ بائیرں کے ساتھ اسمال اور تمدوستی موجو و ہوتے ہیں۔ معلوم ہو آ ہے کہ سفی ہری تورانات کا انتصار معدی موی ہے قاعد کیوں پر ہوتا ہے ' شکا سیپ دار مجبی کے اعمام بوری کے معنی ہو یا جبی کہ معنوں کا بیدا ہونا خواہ یہ راست ستم کے باعث ہو یا جبیا کہ معنوں کا بعض ہو یا جبیا کہ معنوں کا بعض ہو یا جبیا کہ معنوں کا یعین ہے ' است بداف کی ایک شال ہو۔

تھوڑے عرصہ سے تیمرا جروعائل و مجیبی کا مرکزین گیا ہے ' بینے مرمن قبض یا معدی رکو دُجوافتہاں براز بداکر دیا ہے ' مرکزین گیا ہے ' بینے مرمن قبض یا معدی رکو دُجوافتہاں براز بداکر دیا ہے ' مرکزین اسٹی خواب نمائج منوب کئے ہیں۔ اسس کا کہناہے کہ ابتدائی زندگی میں نا مناسب غذا دیئے سے اور انتقابی وضع قایم دکھنے سے آنتوں ہیں لئک پڑنے کا رجمان پیدا ہوجاتا ہے ' اور یہ کہ آن کو سہارا دینے کے گئے مختلف معمول ہیں بادیطونی انفیا مات بن جاتے ہیں ' اور یہ کہ ازاں بعد سل احتبال کی وجہ سے اور مرموس برازی ما قدے کے زائد ہوجھ کی وجہ سے لفائعیٰ کے آخری سے ہو کے اور انتقابی کی وجہ سے اور محبول میں برازی ما قدے کے زائد ہوجھ کی وجہ سے لفائعیٰ کے آخری سے ہو کے اور انتقابی کے اخری سے اور یکی مرحبے کی دوجہ سے اور مرموس برازی ما قدے کے زائد ہوجھ کی وجہ سے لفائعیٰ کے آخری سے اور یہ کے اور انتقابی کی دوجہ سے اور انتقابی کے آخری سے اور یکی کے انتقابی سے اور یہ کی برطاکر اس سے اور یک کے انتقابی کے انتقابی کے انتی بن جاتے ہیں ' جو احتباس کو اور بھی بڑھاکر اس سے اور یک

مصوب كالتساع بداكرد ميقين اورماقدى تمام احث كاعموى مقوط بحي بوتاب يسس معون رکود کونینم بسید طویرج برازی اوه اِس طراح محبوسس موحاً اسب اس سے ستمیات بيدا موطات بي جومتا مي اور مموى دونول طرح سيدمعنرا ازر كفتر بي . مقامي تمامج سب فرال کی جائے ہیں :۔ البتاب زائدہ دودیہ (appendicitis) 'اتناعشر قرح مسری تواب (spasm of the pylorus) مسدی تاع (gastric dilatation) معدى قرص معديكا سرفان ملعه اورجونسية ى سيلان ريم pyorrhoea alveolaris)

مریض کی طام حالست می سس موی رکودست برستم پیدا بوط آسید وه است جمم كى مرافت يم موس بواجه إ - الته تفندك دوران لون اقعل عيرك رنگ السياني أي أل جهرے اور بدن كى لونيت ملب كا وُصند لاين اور المتحمد كائتينج ، وْمِنْ سَتَى الْمُخَاصُ وروسرُ مِنْ حِوانِي جسانی یا داغی مخت کی ناقا بلیت وج العمب وہ بیان کرتے ہیں کہ سس کے اثرات مورتوں میں بالمفسوس متلف ہوتے ہیں : ۔ چ بی کم بوجاتی ہے، گروے اٹک پڑتے ہیں رہم ایس حمیدہ بوماہے ایستان کا دوری 361 مرض (cystic disease) اور مرطان بيدا بوطات بيدا بوطات من اور تناسلي بولي خطر كي سايت آمانی واقع ہوجاتی ہے۔

لیکِن یہاں مس کا اعتراف ضروری ہے کہ دو سرے مثابہ بن پینیپر نہرے گھتے كى مرن موى ركود در الله ال قدر خراب تمائج بهداكر ديا ب. وه يعقيده ركهن بي اليه مريض مِن علا ات كي شكايت ركھتے ہيں وہ ورائل اس نهاكت اعصاب كهامت يدا موجات بين جواسمطان كى عادت كے إحث منويات موجاتى ہے اور بالحصول في آنتول کے حرکات برہمیشہ مبالغہ کے سانھ توجہ دینے ہے۔

یروفیبر ایم ایم (Prof. Arthur Kerth) معاری رکود کے مبدار کے متعلن سر ار تم تحد ناف سے مختلف دائے رکھتے ہیں۔ معان ورمعدے کے مرکات. لا شعاعول کے ذرمیمث بدات اور آ وربیک کے ضغرب (Auerbach's plexus) اور شلازم موی سن ختول کی خرد بینی تحقیقات کی بنا پرُوه یه نظر بر مین کرنے ہیں لاَ حرکات وادین موی قال بی جُداجُدا نقطوں سے شروع موتے بی جوان حرکات

ملاج نہایت کال فور براور قبی اصول کے مطابق غذا مہلات اور دوری آ بیروں کے ذر بعد سے اسی طرح پر کرنا چاہئے جیباک '' قبض' کے عنوا ن کے تخت بیان کی گیاہے۔

اسبهال

· (DIARRHŒA)

ابهال سے به مراد ہے کہ ا جا بتی معول کے تنبت زیا وہ باربار اور زیا دہ تیلے فرام کی ہوں۔ یہ زائد حرکت و مودیئ اور زائد موی افرازیا قلیل جذب کا نیخہ ہو آئے۔
اس کے اسباب کی جاعت بندی حب ذیل ہو سکتی ہے: ۔ (۱) معدل کا ذاہ -اکثر منگر شکی ہوتی ہے اور کمن ہے کہ ۲۰ یا ۳۰ قطرے مرقق ترشد نمک دن میں بن باردینے اسمال ٹرک جائے۔ معدی صامی تفوید کے بعد اسہمال ہو سکن ہے۔ (۲) جیموی آنا نہ نیک

سرایت بیسی کدازلتی التهاب امعا ، سپ محرقد اور تدرن میں بوتی ہے اسمال کامب بوسکتی ہے تدرن میں با فانول کی نابشگی اور غیر بضم سند و نوعیت کمی جذب کی وجر و برسکتی ہے۔ مرس شکی بر انتظام اور غیر بضم سند و نوعیت کمی جذب کی وجر و برسکتی ہے۔ مرس شکی بر انتظام (coeliac disease) و روس جو بیشی (pancreatitis) اجمال بھی ہوتا ہے۔ روس و اور معام مستقدوی اسمال کے اسماب المعالی میں ہوتا ہے۔ روس المعالی کے اسماب کر انتظام بھی ہوتا ہے۔ روس المعالی کے اسمال کے اسماب کر انتظام بھی ہوتا ہے واون المعال بھی انتظام بھی ہوتا ہے مرس المتحاب کروہ کا قراون التها ب خریت مرض و و خراص کے مسابحہ مسلات اور صنوں کے بیجا انتظام کے بعد بید ابوجاتی ہے۔ رہم) معد کو میں وہ خراص معملات اور صنوں کے بیجا انتظام کے بعد بید ابوجاتی ہے۔ رہم) معد کو میں انتظام کی دور یہ کے ذریعہ سے اسمال پیدا کر سالت اور التب سب زائدہ و و و یہ کے ذریعہ سے اسمال پیدا کر سال بیدا کر سال کی ایک شنو قسم ہے جو مزال نجا می کے ذریعہ سے اسمال پیدا کر سال کی ایک شنو قسم ہے جو مزال نجا می کو طاح کر وہ ہے جو مزال نجا می کو طاح کر وہ ہے جو مزال نجا می کو طاح کر وہ ہے تو میں مرض کر ہو طاح کر وہ ہے تو میں مرض کر ہو طاح کے دالا اسمال سے اللہ المال اور انتوالین (insulin) کی زیادتی سے بیدا ہو طاح دور انتوالین (insulin) کی زیادتی سے بیدا ہو طاح کے دالا اسمال سے اللہ کی ایک میں انتخام کر وہ کے تو میں اسمال سے اللہ کی ایک میں کر انتہ کی دور کے بیکا کا اسمال اور انتوالین (insulin) کی زیادتی سے بیدا ہو طاح کے دالا اسمال سے اللہ کی دور کے انتہاں سے بیدا ہو طاح کے دالا اسمال سے اللہ کی دور کے دور

یه اور کمنا چا سے کہ تفوری تو بی مقداروں میں ا مُعات کا باربار خارج بونا نداتہ بدظا ہر نہیں کرا کہ اس کی تفال کھی ہے۔ شلاً اننا و معوی کے ساتھ جو ہمت میں ایک جزئی تسد و پیدا کر ؟ ہے خاط اور خون کا اِخراج بوط آ ہے۔ فاط آ میز برازی سال ' مغروز براز کے نہایت بڑے بڑے تو دوں میں سے رستنا بوانیج جا مکتا ہے۔ اور سب سے آخریں مکمن ہے کہ ایک واضح طور پر نقبض آنت بھی اس بیلے اس میں سے ہوا تسدد کے اوبرجی ہوجا ہے 'کیفدر مقدار تسدد کے وار پارگذر سے وے اور سطی اسمال کا استارہ بیدا ہوجا ہو اِن کو اسمال کا اسمال کا اسمال کا ایک میں ۔

اقسام- اُن اورں کی نوعیت کے لی ظاسے جوفاج ہوئے ہیں اس اس مخلف نام رکھے گئے ہیں۔ شلا ایک اسھال ھیضوی (moieraic diarrhora) رہو آئے بی میں دست بڑے بڑے اور پانی جیسے پاچانول کی بیچ جیسے ہیں ہے۔

کی طرح ہوتے ہیں۔ یا نہ حیوی اسھال (dysenteric stools) جس میں مخاطئری مقدار میں اور سٹایہ نون می موجود ہو تا ہے۔ اسھال خلق (hienteric diarrhæa) جس ہیں معدے میں فادا بینجے ہی یا فاد ہوجا ہے۔ یہ فالبًا طبعی معدی تولون محوسہ بی اور اسھال صفوا تی کی وجہ سے ہوتا ہے (50) ۔ اور اسھال صفوا تی کی وجہ سے ہوتا ہے (50) ۔ اور اسھال صفوا تی کی وجہ سے کہ نون مول جو سفوا می کہ مقدار میں کوئی زیادتی ہوئے اسپر نے مائل مجودے رائل سے کہ مؤن مول ہوتے ہیں کہ انتخاص کے افری موسے اور صفوا کے ہوئے ہیں فادائی مقال ہی سے جو سفوا می کہ مقدار میں کوئی زیادتی ہوئے اس بی سے موست کے ساتھ گذر گئے ہیں اور صفوا کے ہوئے سے اور والے سوست کے ساتھ گذر گئے ہیں اور صفوا کے ہوئے سے اسٹر ال فی والے سوست کے ساتھ گذر گئے ہیں اور صفوا کے ہوئے اس کہ اور والے والے اسٹر اور دوالے موسل کے لئے اور اور اللے کے اسٹر اور کی کہ آخری ورجول کے ہوئے ہیں۔ اور اسٹال کے لئے ہی جو ذات الرب کے ایسے اور تا ہے اختتام کے ساتھ مواکر تا ہے جو بحوال کے اسٹر اللے کے ایسے ورد اسٹال کے لئے ہی جو ذات الرب کے ایسے اور اسٹر کے سے ہو۔ یہ اسہال کے لئے ہی جو ذات الرب کے ایسے اور تا موسی تولونی النتاب کے سب سے دریوں سے ہو۔ یہ اسہال نا ابنا ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال نا ابنا ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال بی ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال بی ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال بی ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال بیا این ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال بیا این ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور یہ اسہال بیا این ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور اسٹر الی ایک متلازم موسی تولونی النتاب کے سب سے دور اسٹر النتاب کے دور اسٹر ال

مسلاج - اس کا محصار بیا متلازم مالت پر بونا باسی سیستر است بر بونا باسی سیستر اسابتوں بی جو نوعی نبول وہی علاج اختیار کیا جاسکتا ہے جو التهاب امعا ، کے تحت بیان کیا گیا ہے ۔ اسہال خلفی کا علاج بوٹا سیکر بروائڈ (potassium bromide) کی بوری مقا دوں سے کیا جائے ، کیونکہ اسس کا انتہار ایک سیالغہ میز معری معکوسہ پر ہوتا ہے ۔

نزف معومی

(HEMORRHAGE FROM THE BOWEL)

بيط مذكره كياكيا ب كدموا متعتم كى راه سے خون كا خلنا تب معويدي اور

معدی اور اشناعنته ی قرص بی د کمیا جا اُ ہے۔ یہ و دسرے تقرّمات (مثلاً زحیراور تعرّی التباب قولون ، إنغادا لامعام سكما تراورمعا رستنيم كي سرطان شعريا مثلا كي صابم اساریقی عروق کی سدا دین یاعلقیت بر پیورا اور دموی مون کی دومری اصابتول کا جی نتیجہ ہوسکتا ہے مکن ہے کہ اِس امرے کہ نون نس طورے <mark>آ آ ہے اِس کا کمج</mark>ے بیتہ لگ جائے کہ وہ کہاں ہے ارباہے۔ معدی اور اثنا عزری قریح کے اومارس فون إفرازات سيد بهنت كيح متغربوجا آب، اور ابك سباه "كولتار كاسانيم الع ألاب جببا توده بنا و بتاہے (مرآ زُده الاسود) باکیفائٹی قرم سے **جائز ف** موّا ہے سابق الذكرمالت كى طرح أس ميں بھي خون براز كے ساتھ غير مخلوط موتا ہے ، گر وه نسبتهٔ زیا ده متوخ سرخ رنگ کا اور قلوی افیه کے فعل کی وجہ ہے زیا وہ سیال ہو آہے۔ زخیریں تون دھار ہیں ما جیوٹے تھکوں کی صورت میں مخاکھ بار کوکسیاتی اِرْقِيقِ رَازِي اِدِ م كَهِ مَا يَوْمُحُلُوطُ بِوَيَاتِ الرَّحِيمُن بِ كَهُ وقَتْ أَفُوقَتا فَانْعَلَ هُون كى تتور كى تقورى مقدارى مجى خاج بول دخون كى برى مقدارى بواسيرست، إ موا متنتیم کے قرصہ سے ضائع موتی میں۔ یہاں ادما رعموماً تترزِ کے فعل سے واقع جوحا آسیے ۔ ادر بیون پاتو تقوس برازی تودہ کی ایک جانب بر دھاریاں منا و تیاہے ا یا نانه خارج موجاسے کے بعد کم ومشی خانص قطروں یا دمعار کی صورت میں کلیا تو دار الحفري (scorbutic) مريمولي أورنز في حالة آن (إسكروي نز في بريورا مرکے ماوزروز بول: acute yellow atrophy؛ خبیشتی بی malignant: variola) مِن فون معارِ مُنتقيم سے اس طرح آ آ ہے کہ وہ (سعاء کے اس صعے کے محاظ سے جہاں سے کہ وہ شکے یا آس آزادی کے لیاظ سے جس سے کہ وہ خارج ہو) مز مِش مرا ذکے ما تھ مخلوط با فالص حالت میں ہوتا ہے۔ خون کی فلیل مقداروں یی نخبص کے متعلق پہلے مورکیا گیا ہے (الاخط موصفحہ 330) نیز **ن کا علاج** المجلفہ امران كيماته ديا كماية وأسه بداكرسكة، بي .

فولنج

(OOLIC)

اگرچه قولنج کی اصطلاح لفظ قولون سے مائود دہے ' اسس سے مراد واسیخ دروشکہ ہے جو حشائی مبدار رکھتا ہے۔ وہ اس زبردست دووی الح کست انقباس سے کیا ہو آہے ' جس کو اس وقست جب کہ وہ نذا پرسے گذر رالی ہو کوئی مز احمت دوک دے۔ تو لنج طالب میں ہوسکتا ہے (تونیخ کوئا = renal colic) یا صغراوی قنا تول میں (صفراوی یا کبدی قولنج = biliary or hepatic colic) یا دمیا دمیں (معوی قولنج = intestinal colic)۔

برعث المسلم المورد المحت المسلم المورد المالية عامب خراش آورا ورناما الفلا يدين مجت كدلم خزير بنير مرن ني كائد وغره جيئ تسكارى جانورون كالفلا يربي مين المربيل مشروات وغره و جيئ تسكارى جانورون كالمحت المعلى كرفت مين والمجمل برين مين كائه وغره و بحوسين ولنج غير خير بريا المحت المحت

جب ریج موجود ہوتی ہے تو اُس وقت جب که اختلاف پنر پرموی شیخ اُسے آگے و مکیلیا کڑ اُس کی حرکتِ سے قراقر پیدا ہوجاتے ہیں۔

مکن ہے کہ یہ دروائ قدارت یہ ہوکہ بہت بہوط پیدا کردے میں کے ما تھ

جیج یا بسینہ مکیئرت آئے اور نبض منے وضعیف ہو۔ بعض اوقات قلے موج و موتی ہے۔
اکٹر فیض ہوا کرآ ہے۔ اس کے برعکس تعبن اغذیہ جو قولنج پیدا کردتی ہی استداراً
فاعلی سمال پیدا کردیتی ہی میں دست مجودے اور پانی جیسے بیلے ہوتے ہیں اولا
کچر عرصہ کے بعد مناطق تی ہے۔ یہاں قولنج ایک تعین گوضیف الہتاب امعاد کے ساتھ
مملازم ہوتا ہے۔ زیادہ تیزم ہملات مجی مرور اور "قولنج ما" درد پیدا کردیے ہی جومولی مرور اور "قولنج ما" درد پیدا کردیے ہی جومولی مرور اور "قرائے ما" ورد پیدا کردیے ہی جومولی مرادر اور "قرائے ما" ورد پیدا کردیے ہی جومولی مردد بیدا کردیے ہی جومولی میں ۔

پرسری سے جدم مربوب ہے۔ اس تشخیص - قولنج کی کوئی ایک قسم سے کے کرد دل کے رائق خط ملط ہوسکتی ہے مین کا مصوفی تسدد کے دار درل کے رائق خلط لمط ہوسکتی ہے ممیز خصو ملیات یہ ہیں : ۔ مریض کی بے مینی جس کی وجہ سے مکن ہے کہ وہ اپنے انحہ اوسو اُدھ مجبنیک رائج ہو۔ اس کی خمیدہ وضع ، کیونکہ سے مربوبا کو بڑھے سے درویں عمواً تخفیف ہوجاتی ہے۔ در آنخالیکہ دوران دردیں استواری کا ہونا عام ہے ' درمیانی وقفوں میں طسیلاین ہو آ ہے کمن ہے کہ دردیں استواری کا ہونا عام ہے ' درمیانی وقفوں میں طسیلاین ہو آ ہے کمن ہے کہ دردیں استواری کا ہونا عام ہے ' درمیانی وقفوں میں طسیلاین ہو آ ہے کی معوارت میں ۔ علاج ۔ نا ہر ہے کہ سے دروشکم کی اصابتوں کا علاج نہا بت احتیا ط

کے ساتھ کرنا جا ہے۔ اگر در دیفینی طور برخرات آور اندیدی وجہ ہوتو جہا ایسے مہلات کے استعال سے افاقہ ہو مباتا ہے کہ جیسے کہ ایک اونس ارندی کا تحییل مہلات کے استعال سے افاقہ ہو مباتا ہے کہ جیسے کہ ایک اونس ارندی کا تحییل (castor oil) کے ساتھ یا نصف اونس میکنیہ رسلفیٹ (tr. hyoscyani) کے در اصب کی ایک اونس (calomel) کا جی آئی کی ساتھ ۔ یا ہ گردین کیکومیل (lead colic) اور تو لیج رصاصی)۔ گرم یا بی یا کہ ٹر آئیل کا حذی اصول پر علاج کیا جاتا ہے در ملاحظہ ہوتسر رصاصی)۔ گرم یا بی یا کہ ٹر آئیل کا حذی اصول پر علاج کیا جاتا ہے در کی در کی تاریخ کی سے میں ہوستا ہے کہ اور گرم کی بیدات یا گرم کی خیرین کی تاریخ کی جاتا ہے ۔ نیز لیا تا میں ہوستا ہے کا در گرم کی جاتا ہے دائے ۔ نیز لیا تا کہ بیدات یا گرم کی خیرین کا میں ہوستا ہے ۔ اور گرم کی میں کی خور کر در اور در میں اور کی کی تاریخ کی جاتا ہے دائے ۔ اگر ایسان کی شد کی ساتھ ک

التهابِ زائدهٔ التهابِ إربطون ما تسدو موجود ب تومسهلات سے احتراز كرنا جا ہے ۔ اور علاج بالعمليد كئے مسئلہ كے متعلق غور كرنا جا ہے ۔

معوى لنهاب

(enteritis)

قال غذائی کے مختف عموں کوا وف کرنے والی ایسی کئی حالتیں ہیں جن کو المقیت موی التهاب یا انتہاب کہا جا بکتا ہے۔ شکا وہ نا زاتی علی جن المحقیقت موی التهاب با انتہاب کہا جا بکتا ہے۔ شکا وہ نا زاتی علی جن سے اسهال کے بعض اتسام پیدا ہو تے ہیں۔ لفائعی کے ندرنی اور کا نفائدی تقرآ ۔ تولون کا وہ نقر می النہاب بھے زحیر کہتے ہیں۔ اور وہ حا د تغییات جوا نعادا لامعاء اور تخفیقات کی وجہ سے شروع ہوجاتے ہیں کی اسمیت میں ہو موں التهاب کے سیامی می ممیز نام لی بھیے ہیں۔ دوسری التهاب میں بین الاسی وہ ہیں جو محفی تا نوی ہیں اور چند ہی علایات ایسی پیدا کرتی ہیں جو بین موں تا نوی ہیں التهاب کے ساتھ ہی التهاب بار بطون بدا موبانا ہیں ہی ہی التهاب کے علایات کو بالکل وہشدہ کر دیتا ہے۔ لیڈا اس بی مون التهاب کے علایات کو بالکل وہشدہ کہ دیتا ہے۔ لیڈا اس خالوں کی تعداد و جنمیس موی التهاب کی حیثیت سے جداگا نہ بیان کرنے کی خودرت حالوں کی تعداد و جنمیس موی التهاب کی حیثیت سے جداگا نہ بیان کرنے کی خودرت خالوں کی تعداد و جنمیس موی التهاب کی حیثیت سے جداگا نہ بیان کرنے کی خودرت کے مور می خودری جا لیوں کی تعداد کی مور سے مور کو میا ہے کہ الگر بہاری بہت سی موی حالتوں کی میا میں التهاب کی حیثیت سے جداگا نہ ہی کی کے امراضیاتی بہلو پر صبح طور پر غور کیا جائے نے قوظ ہر ہوگا کہ موی التهاب کا مراضیاتی بہلو پر صبح طور پر غور کیا جائے نے قوظ ہر ہوگا کہ موی التهاب کا مراضیاتی بیا کہ امراضیاتی بیا کی امراضیاتی بیا کہ امراضیاتی بیا کہ امراضیاتی بیا کہ امراضیاتی بیا کہ کیا کہ کی جائے ہوئی کیا گریہا کی کہ کا کہ مور کیا گریہا کی کو میا کیا گریہا کیا گریہا کی کی کہ کی کہ کی کو کریہا کیا گریہا کی کو مور کیا گریہا کی کو کی کی کی کا کہ کی کی کی کریہا کی کو کریہا کی کو کریہا کی کی کی کی کی کی کی کریہا کی کو کریہا کی کو کریہا کی کریہا کی کو کریہا کی کو کریہا کی کو کریہا کی کریہا کی کریہا کریہا کی کو کریہا کی کریہا کی کریہا کریہا کی کریہا ک

ينان موى التهاب كى مندرجُ وَلِي تَعْيِل بِيان كَى جَامِنَكَى إِلَى الْمَالِيَةِ وَلِي تَعْيِل بِيان كَى جَامِنَكَى إِلَى الْمَالِيَةِ وَالْمَالِينَ الْمَالِينَ اللّهَا وَ (food poisoning) السيور و (sprue) مَنْ اللّهَا مِنْ اللّها مِنْ اللّها مِنْ اللّها مِنْ اللّها مِنْ (diphtheritic enteritis) والمُمْ واللّها مِنْ اللّها مِنْ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه ال

نازلتي موى التهاب

(catarrhal enteritis)

(intestinal catarrh = رمعوى) ازلت

سروہ پیزیوہ تن کی غشائے مفاطی میں فرائش پیدا کرے 'نا دلت پیدا کرکھی ہے 'مثلا نا مناسب غذا' بعض زہر'ا ورسہل ادویہ۔ نا ذلت بعض اوقات سے کی اگلہ بالے کی طرف می منوب کی ماتی ہے ۔ لیکن اس کی بیدائش میں نسبۂ مہست نیا وہ کارگر عال سند یرحرارت ہے جینے نیز الت گرا اور خزال کے گرم موسم میں اس سے زیا وہ ٹیسلی ہے کہ جنی سال کے بقیہ صفے میں۔ گرا بی اس کی کھڑن وقوع اس سے معمد کے اشخاص متافز موتے ہیں' لیکن شرخواروں پر الخصوص حملہ موتا ہے میں کہ میں انتخابی منوبی انتخابی مناز موتے ہیں' لیکن شرخواروں پر الخصوص حملہ موتا ہے میں کہ انتخابی اور حب کرے مرض میں انتخابی میں انتخابی انتخابی انتخابی کے مرض میں انتخابی انتخابی انتخابی کے مرض میں انتخابی انتخابی کے مرض میں انتخابی انتخابی کی نازلت بیداروں۔۔

ن کو توما وُف کر دیتا ہے گرغٹ کے مخاطی کی مفتلی تہ کو' مورتحت المفاطی بافت کو میج و سالم مجبور دیتا ہے ۔

المجاسة علاات موی التهابی فاص علامت اسهال به بین پافان کاباراً این من کاقوام تبلایا النم بو اسس علامت کاسب و مرف ان افرانات کانفرو اید بین بلکه بری حذاک ان فرانات کانفرو اید اید بین بلکه بری حذاک ان حرکات دود یکی زیاد تی می به جوعت ای مخاطی کی حراش سے بیدا بوجاتے ہیں۔ برازی حالت بہت مختلف ہوتی ہے : وہ عمواً ابتداء کنیر المقدالا الیم اور مجورے سے دنگ کا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس بی است کا مواتے ہیں۔ برازی حالت بین مبدری وہ نسبتہ میں بی است تا کہ موات است کے کالے یا ڈلے ہوتے ہیں۔ میں میکن مبدری وہ نسبتہ میں کا بوجا آ ہے ایمکن ہے کہ زردی الی الی بین مبدا ایک بیا میا ایک الی این مبدا ایک بیا بوآ ہے ایک این مبدا کی خراصت کا دیشہ کا موجو د ہوتے ہیں۔ خرد بین کے بینے غیر مبند سے ایک موجو د ہوتے ہیں۔ خرد بین کے بینے غیر مبند سے امام نیم کی خراست کا دیشہ کا شاستہ کے ذراست اور میر بی معدامونیم کیکئی کا مندا کے دیز ہے کو شات کا دیشہ کا شاستہ کے ذراست اور میر بی معدامونیم کیکئی کا معدامونیم کیکئی کا میشہ کی فلموں سرحلی اور دی بی میکنی ہے۔ اجا بیوں کی فلموں سرحلی اور دی ایک بیا نیادہ بیوسکتی ہے۔ اجا بیوں کی فلموں سے کے کردس اور بیا کی دیا ہی ہی تا میا تھی ہی جو سے۔ اجا بیوں کی فلموں سرحلی اور دی این کی اور دی ایک کی دی بیا کی دیا ہی جو ایک کی فلموں سے کے کردس اور می کی کی در زرانہ دویا تین سے لی کردس اور می کی کو در ایک کی سے۔ اجا بیوں کی فلموں سے کی فلموں سے کے کردس اور در اور در ان کی در زرانہ دویا تین سے لیکردس اور می کی کی در زرانہ دویا تین سے لیکردس اور در اور در ایک کی در زرانہ دویا تین سے لیکروں اور در اور در ایک کی در زرانہ دویا تین سے لیکردس اور کی در کی در زرانہ دویا تین سے لیکروں کاروں کی در کرائی کرائی کی در کرائی کی در کرائی کی در کرائی کی در کرائی کرائی کرائی کی در کرائی کی در کرائی کرائی کی در کرائی کرائی کی در کرائی کرائی کی کرائی کرا

قولبنی ورداکر موجود ہوتا ہے جو اجا بت ہوئے سے پہلے مواکر تا ہے جینی الیمیت بعض ورداکر موجود ہوتا ہے ۔ زیادہ فاعلی حوی حرکات کے سافوسا فقد و قتا فوقا قرار سنائی دیتے ہیں۔ بیش مختلف ہوتی ہے ۔ بجوک اکثر اوقات جاتی رہتی ہے کہ مریض کو بیاس کی شکا بت موتی ہے کا اسٹس کا مندخشک ہوتا ہے کا ان سیقال مریض کو بیاس کی شکا بت موتی ہے کا اسٹس کا مندخشک ہوتا ہے کا ان سیقال فردار ہوتی ہے کا اور جب اسہال بہت زیادہ ہوتو صد درج کی جمانی کم دور ی ہوجاتی فردار ہوتی ہے کا اور جب اسہال بہت زیادہ ہوتو صد درج کی جمانی کم دور ی ہوجاتی

ے۔ایک نہایت ناگہانی اور حاوج لم قبے کے سائفہ شروع ہوں کتا ہے۔ میں مغید درات کی میں درارہ جنری من کی کرمی ہوں فوجود

بیشتراصا تبول بی علامات جندی روز کے عرصہ بی رفع بوجائے ہیں کین ہے کہ ہمال و فوتہ موقوت بوجائے اور پھر ایک لویل و قف کے بعد اجا بت ہوئ یا اجا بتیں بتدریج کم ہوتی جائیں اور اُن کا قوام بتدریج سخت تر ہے جائے جب یہ شکایت مزمن ہوجاتی ہے تو ، ابنس کو، وزان بین اِیارا طاقیں اُن کے ساما کی اُتی میں اور ساتھ ہی کمبی مروز کے ور وہوتے ہیں۔ غذا کے نالم ای تر می جند بیسے مکن ہے تغذیہ میں بہت کمی واقع بوجائے۔

معوی التهاب کے اختلالات اکر اوقان بڑی ہنت کک پیل جائے ہیں ہیں التہ اس کے اختلالات اکر اوقان بڑی ہنت کک پیل جائے ہیں ہی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقیق فولونی التهاب بیدا ہوجا تا ہے ۔ جب ان ویون میں اخلی زمکن ہوتو چھوٹی ہنت کی نازلت کا سے باس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کہ سعدہ میں ساتھ ساتھ ما تھ اکوف ہو۔ اس کے ساتھ اسبال کی موجو دگی کا امکا کہ ہوتا ہے ہی کہ سعدہ میں ساتھ ساتھ ما تھ اولور ہوتی ہے ۔ اور اگر منا طموج و ہوتا ہے میں اکثر صفدار اور خرجہ میں کے امکا میں اور اگر منا طموج و ہوتا ہے میں اکثر صفدار اور خرجہ میں نے اندامو ہو رہوتی ہے ۔ اور اگر منا طموج و ہوتا ہے قودہ براز کے ساتھ سندنئ زیادہ منا طہوتا ہے ۔ بیلی آنت کی نازلت میں منا طرح میں ہوتا ہے ۔ بیلی آنت کی نازلت میں منا اس ساتھ ہوتا ہے ۔ مناطی رہم یا خودر ہم بھی سہا ناجا سکتا ہے جوں جوں نازلت معاء مستقدم سے قریب تر ہوتی ہے تا سیر سی طامت موجود ہوستہ کا اس نادلت معاء مستقدم سے قریب تر ہوتی ہے تا سیر سی طامت موجود ہوستہ کا امکان زیادہ ہوتا جا تا ہے۔

کتا 'نیانی بن (tannigen) (ه گرین برستا مدکه اندر) ایرومینک بیاک با ودر (dilute sulphuric) یا مرق سلفیورک اید (aromatic chalk powder) معند کاربونیط (bismuth carbonate) اور سیمتم کاربونیط (bismuth salicylate) اور سیمتم کسی مندیس اورا فیون کے ساتھ دیے جاسکتے ہیں۔ اگر مطور نہا مت سندید بئوتو ما دفیا کا تحت العبلہ می امتراب کیا جاسکتا ہے۔ اگر اسہال موالمب اوز منتکی بدا کرف والا ہے تو م اونس نشاستہ کا حسن سر میں لا دُنیم موالمب اوز منتکی بدا کرف والا ہے تو م اونس نشاستہ کا حسن سر میں لا دُنیم اللہ اللہ کا میابی کے ماتھ استمال کیا جاسکتا ہے۔

صبياني معوى البهاب

شیخواد نیکی کی اسباب سے اسہالی میں مبلا ہوتے ہیں (۱) وا را العقبی کیہ
میں جوکہ تمام ہتیجات کے لئے غیر طبی طور پرخواش نید پر ہوتا ہے، بڑھی ہونی حرکت دودی
آمانی پیدا ہوجاتی ہے اور اس سے اسہال واقع ہوتے ہیں جواکٹر اوقات ال وافر
ہیں (۲) ایسے بچول سے قطع نظر بیش خورائی سور الہضم بداکرتی ہے جوکد کیجیت
اور قو لینے کے ساتھ متلازم ہونا ہے۔ طوا سہال کے حلاسے پہلے عدم استہما اور جینی
ائی جاتی ہے۔ یہ بیش خورائی موسم کرایں جب کہ بچہ کی بیاس بھائے کے لئے دودھ
پائی جاتی ہے۔ یہ بیش خورائی موسم کرایں جب کہ بچہ کی بیاس بھائے کے لئے دودھ
دیا جاتی ہے۔ یہ بیٹس خورائی موسم کرایں جب کہ بچہ کی بیاس بھائے کے لئے دودھ
کی جہ ۔ حلاسے پہلے اکثر او قات وزن میں غیر طبی طور پر سرمیع اضافہ کیا یا جاتا
کرتی ہے۔ حلاسے پہلے اکثر او قات وزن میں غیر طبی طور پر سرمیع اضافہ کیا یا جاتا
گوکہ والوت کے فور اُ بعد ایسا اسہال جس میں ترسشنی سبز پاخانہ ہو کا عام طور پر الت کیا۔
اور اس میں ذائہ پروٹی دین دینے سے شغا ہو جاتی ہے۔ (۲) اکثر اوقات اسہال
کی عربی مرایت کی طامت ہوتا ہے۔ (ھی باسی اور طوت دودھ امعار ہیں شخیر
پیداکر کا ہے جس سے اسمال ہوسک ہے۔ نوعی عصنویات سے غذائی خطر کا سازی خیر

بونا فالباً کی شا ذسبب او کو کھیوٹی حمیوٹی وبائیں بلاسٹ بوقت فوقت میوٹی وبائیں بلاسٹ بوقت فوقت میں میں۔ رہتی ہیں۔

ر ۲) نام نبا د صیفی ا سهال (وبائی *صبیا*نی اسمال) کاحدوث کره مو**آ** کی بش کے ماتھ قریبی تعلق رکھتا ہے۔ لویل ارتفاع تیش کے حالات کے تحت اكثر بيون مِن غذا كانتحل كم موحاً ما بيئ اور غذا أي قنا لي معكوسات مبالغة أمي موجاً نتے ہمیں ۔ بیاس کی طالب کو بورا کرنے کے لئے دودھ کی در ہم مغلطی سے ٹرمعادی باتی ہے' بجائے اس کے کہ اس کو ایسے وقت میں جب کر حبیر کم غذا ما متاہے أن المائك - غذا السي عفوات سي لوت موصاف كا جوكه الدار ميش رينوونا عاص كرته بي اور كهيول كه دربيه اس تك بإنا ني بنيج عاضه بي زاوه زجان ركمتى بديم من جوك غذا ليني سے بيلے شروع موكى موتى ب "ا وقتيك عنذاكى محمّا ما تمتنی کے ذرکعی عصنویات کو ہلاک نہ کیا جائے ؟ ہم نت میں بھی جاری رمتی ہے۔ به جبنی اورا بیات نیندشترخوا ربحه کی قوت مرافعت کو گلها دیتے ہیں۔ بالعمرم کی ایک بسيتان بروروه بيج متائز موتدبي الأن صنوعي غذالين والع بجوب بياسكا صوش اور بھی زیادہ ہے' اور مرض بہت زیا وہ شدید موسے کا رحجا ن رکھتا ہے۔ یہ کس سے آمانی میں تمجھ میں آسکتا ہے جوکہ اوپر بیان کیا جا جیائے مصنوع غذا لینے والے اکٹر بھے پہلے ہی سے مورسفم یں بتلا ہو سے رہی ان بچون میں مثل يبكے ہی كم ہوتا ہے ' اور ابتدائی إمته اوسے ایتوں سے ان كی قوت ملافعت

شجى ذات الربيعام ہے۔

عُسلاج - اگر ایهال سندید نه بو تو از دی که ای خوداک بینا فاکده مندسه کیونکه اس سه انت کرخمیر ندیرا فیها فارج بوجاتے بین - غذا ۱۱ سے لے کرم الحفظ کک روک رکھنی جائے ، لیکن بوش و اموا پائی آزاد نه دیا جا سکتا ہے - اسس مت کے مبد اگر متلازم نے موقوف ہوگئی ہو تو فت داکو تدریج برمایا جا مکتا ہے لیکن صرف اس وقت جب کرکئی ون گزرجا مُیں پوری فلا تدریج برمایا جا مکتا ہے لیکن صرف اس وقت جب کرکئی ون گزرجا مُیں پوری فلا تر اجب اسمالی خرمائی سرائت کی علامت موقو فذاکی مقدار گھٹا و نی جا ہے ، وو دور ور اور العسبی بول یہ بیتونیده کر دنیا جا ہے اور پائی ازدانه و نیاجا ہے ۔ اسمال میں افاقہ ہو ۔ وا دا العسبی بول یہ موف اس وقت کر نی جا ہے جب کرساری علی میں افاقہ ہو ۔ وا دا العسبی بول یہ کلورل کی حجوثی تھوٹی نور اکیں جو صبنیہ نیاج (tiucture of belladonna) کے ایک دو قطرات کے ساتھ مروج ہوں ' بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہیں ۔ بوکے

ا حواً كَيْ مَثِّرِ حِنْيِ الإمْمَانِ مُستِّمِرِ كَمِنِي ما بِيعُ - والدينِ اورممرِّضاً ت اور وو معرب بیار بیور سے تقاطمی سرایت (cross-infection) کے نظرہ کو اقل کر دینے میں کوئی ۔ سرنہ اٹھارکھنی جاہئے ۔ تُحنیف اصاتبوں میں حکن ہے اس کے علاوہ کسی دو مسرے علاج كى فرورت نه يراع ليكن اكر اسهال جارى رساح تومكن ي رسخر (Ringer) ر بی ارم محلول کے ذریعہ معدہ اور آنت کو ملکے سے وصونا بہت مفید ہو۔ اگر معدہ کو مِلِکے کے دامعو با مائے اور ایک فٹ (foot) سے زیادہ کے دباؤ سیے انتہا ہے لباجائة بعل زياده تكليف وه نبس موتا اور كجدمدت ك بعديد وكمعامات كا سیال بواب کی لا وسے آزادانہ گزرجا ناہے کیس طرز پر نفیف یا نفٹ گزر سے د با حاسکتا ہے۔ اس کے بعد بجد کوکلورل کی ایک خوراک دینی جا ہے اور اسے سونے دینا جاہیئے۔ اس کے بعد مکن ہے کہ مرقق کردہ غذایج جائے۔ زیادہ شدیداما ترب مي اورتسم من اگر خكوره ما لاندابيرنا كام ابت مول توغالباً بيترين يرسيه كه سو در کی کلورا کید کے میں رفی صدی محلول میں یہ فی صدی گلوکوس کے مسلسل دروں وريدى تقاطر كوريد غذاوي كانتام كيامائ - بالعموم اس علاج كام غاز نقل الدم كے مایچھ كرنا اجماس جوكداس قنوليدى دا ، سے كيا جاسكتا ہے مباؤكى نفرح مرويمي كمنه من في كلويشروزن جيمال لأوسط تفريبًا. ١٣ سي موني مايء تہر کا مفود ار ہونا بالعموم دلیل ہے آس امرکی کہ بہا کو بہت سرعت سے مواہدے۔ امران گرانی قطعاً صروری ہے اور جب مک ایسے حالات میہ بند موں ہرگرز اس علاجا اقدام نكرنا عاسية - اگر كفر برعلاج كرد كى صرورت بوتوسال كا نقصان زيرطدى یا درون باربطونی اشرابات کے در میر بورا کرنا جا ہے۔ مبوط کی علامات کی جارہ جوئی براندی (۱۰ قطرات) سے جوکہ ترقیق کرکے برا و دمن دی جاتی سیے کیا سٹرکنین (strychnine) (المباركة كرين) كما شرابات سه كي ما تي ب-

> عدالی ستم (food poisoning)

انگلتنان ميں طوغذائي تستر كا عام ترين سب عصيات كه كروو مالمونيلا

(salmonella) کی سرایت سدے اور ان می سے عصد موٹر اُکلی (B. ærtryche) (*جارق مع کا*) مین ج*ی بختانی اما تبول کا باعث ہو! ہے۔ پیعصتیہ ایک کیبت شرع موت '* مِعْنَ تَقْرِيبًا الك في صدى غالبًا اس وجهس ببداكرًا بع مداس كالما ورقوتي پت موتی ہیں۔ تواتر و قوع کے لیافاسے دوسرے در ہے برگیب ملئولاعصیل التهاب الدمعاء (B. enteritidis of Gaertner) بحرستيزناوه توليفاكتر کا باعیث بوتا ہے۔عصبہ طاعون خنز بربی (B. suipestifer) انیان کے لئے ببت فشبت ركمتنا بيع اورتستم كالبك مث ذسب مؤتاب اگرجه وهُ مورو سمي عام طور بريايا جاتا ہے ۔ يەزندە كىفىتىكى كرم وسم ميراسى غذاؤں جىسے كەنبناك موت گوشنت (made up'' meat) · بنیبر مجیلی کنیر ون ام انحلول اور دوده -بنائی ہوئی غذادُن بکہ اواوربطنے کے انڈوں (54) بکٹی واض موجاتے ہیں۔ لکین سالمونیلا کے سموم بھی زمبری ہونتے ہیں اور مین کے ڈیوں میں بٹ کی مہونی ً غذاوٌں میں موجو د ہو کئتے ہیں' حتیٰ کہ اسٹس وقت میں جب کہ خووعصیتے آلمف ِ ر مے کیے میوں . یسموم یا تو مدینس (ptomains) افی صدی اصل بتول کی توجيه كرنے بخے عصبيات محرف نما (paratyphoid bacılli)غالباً غذائي سمرنييں پیداکرتے ٔ لیکن عصبیات زحیر(dysentery bacilli) م فی صدی اصابتو ل کی پر کرتے تھے ۔ زحیر (سانی: Sonne) کی ایک و باطال ی میں موئی ہے (55)-سه کلگذنه (B. botulinus) جوالت*تاب ا*لامعا دیےعلامات نہیں بیدا کرما' برمنی میں الحفوص مگر اور نون سے بنے ہو کے کلموں میں یا یا کیا ہے' اور آیا سے آ متحدہ امریحہ میں ٹین میں بند کئے ہوئے کھلوں اور سبزیوں میں ۔ اسس کے بذربے قدرت میں وسسیع طور پر بھیلے ہوئے ہونتے ہیں' اور به عصیّہ نا ہوا باشی طور پر البدکی مال کرکے ایک الیاسم بیا اکردیتاہے جو نہا بہت توی زہرہے، گرجو ، ۸ درجبہ سنى كريد كى ميش سے إلى ان كف موما ما ب (53)-

و کی سر اور اور ایر ٹرائکی گئے علامات بالیموم غذا کھانے کے معد حمیہ ما بارہ گفنٹوں کے اندر پیدا ہوماتے ہیں اور یہ موتے ہیں : نفخ اسہال قولنجی در د ' سُن بِن اور کمزوری اور ساتھ ہی تناید اکبیُومن لولیت کا زلتی ذات الریہ ،

بعصید کلمگینه سے پدا موجانے والے علایات کیکھی (botulism)
کہتے ہیں افراد ہیں : قوت توفیق کا شال کیتے ہیں اور بہیں : قوت توفیق کا شال کی دونظری استرفار الجفن عرالبلغ مصوبی اور بہیں : اور اللین موست نہا بنت کرب و تکلیف کے ساتھ واقع موتی ہے ، کیو کمہ مرایش کو ورا بوشس ر نہا ہے گروہ نہ دیکھ ساتھ واقع مولی سکتا ہے اور نہ نگل سکتا ہے اور دنگل سکتا ہے دنگل سکتا ہے اور دنگل سکتا ہے اور دنگل سکتا ہے دیگر سکتا ہے دار دنگل سکتا ہے در دیکھا ہے دیکھا ہے در دیکھا ہے در

عسلاج - معدی معوی النهاب کی اصابتوں میں مزید رابت کورو کئے کے لئے معدے کو دھوڈ النا چاہئے اور بہت بہوط کی اصابتوں کے سوائے دوسری اصابتوں میں آنتوں کوصاف کرنے کے لئے ایک طبتن دے وینا چاہئے ۔ مہیجا ن جیسے کہ برانڈی ایتھ اور آیمونیا کی اکت ر مزورت ہوتی ہے اور اگر اسہال ایک نمایاں علامت ہوتو افیون فلیل تغلاق میں وینا چاہئے ' مثلاً اُس کے ویدی کے ہا ، اقطرے ۔ نہایت بہوط کی اصابتوں میں تخصص الحجلہ ہافت کے اندر طبعی مالے کا انتراب کرنا چاہئے ۔

شكمى مض

(cœliac disease)

یہ نام کی (Gee) نے بچوں کے ایک غیر مسولی مض کا رکھ اے جو انسيرو (sprue) سيوكسي فدر مث بهنت رمكتنا سبع . بجيكو، بس كي عمر ایک اور پانج سال کے درمیان ہونی ہے، سناحب یا تعة بہاہے رنگ نيم مسال كثيرا لمقدارا أسش يا وليه جنس يا خاس بوت بيريم من مس نهایک ناگوار بُوآتی ہے۔ ان یا فا توں تیں چر بی بہت ہوتی ہے آ اور سنتمی اور سنتمی تراثی ہوتی ہے آ اور سنتمی ترا تراشے کے ساتھ کیلیئر کا نقصان ہوتا ہے۔ سنکم بر ہوا ہے لیکن تناہوا نہیں ہوتا۔ ریحیت موجود ہوتی ہے گرفے نہیں ہوتی۔ سرینوں کی لاغری ایک ممیز خانعه ہے یہ بی کا رنگ مشاحب ہوما تا ہے اور وہ و کم بلااور ہے یرو ا ہوتا کہا ا ہے۔ نے قاعدہ تب موسکتی ہے بچہ کی بالسید گی میں نما کی ماً خیر مونی ہے' اگر جه اُس کے واعنی یا ذمنہیٰ جمالُص طبعی عالت ہیں موسے آمیں۔ في الحقيقة إس مرض كو بعض او قات شكري تصبي (cœliac infantilism) كيتية بي-یہ حالت کا ہے گاہے ! لغوں میں بمبی لمتی ہے م اورخودر وسب بلان الدمن (idiopathic steatorrhæa) كبلاتي سے - إلىموم مركذ نت كا سراغ بحين ك لكا إجاسكتا ، مرز تعين يدي : - تولوك الساع مرز تعين العظم عدم دمویت اور جاری اصرار مصلی فاسغورس اور کمایشر می فی موسع ، ب مِس کی و جہ سے نکز زیمو تا ہے ' اور یا خانوں بیاان کی اُرا یہ ٹرھ طاتی ہی (51) -شخموں کا انجذاب گھٹ ماہے تی وجہسے \ اور دحیا نینوں کی قلب کی علامات میشموجود موتی میں گوک کساحتی منطام رمرف بالید کی کے زانسی تنکیف ہوتے ہیں ۔ ایک اور دائے یہ ہے کہ آنوں کے اندرشنم کا ایراز ہو، ہے کیونکراگر بهى روغن براه و من و يا حائے تووه يا خاسند ميں مودارسلي مو أحس نے معلوم موما ہے کہ انجذابِ تسلی مجش ہے (سنیس Snapper) - ومگر قلتی علامات عداوسی کی شکلا سے پیدا ہوسکتے ہیں۔ شدیدعدم وموین علم ہے۔ انتدائی ورجوں میں یہ العموم

فلغموني النهاب لامعاء

(phlegmonous enteritis)

ال معملى طبغه ما باربطون كه معملى طبغه ما باربطون كه ما فرف موجات موجات من موجات موجات من المناطى الموجات من المناطى طبقات الس سن با ده و بيز زيا و و زم الورزيا و و يجر عجر عمر موجات بين كر منت طبي السب من بوست بين اور باربطون عروق جيب يا لمف سه بين كر منت طبي المباب الامعاء مقامى النهاب كے طور بر بيدا موجات فرح منطله حصول سے يحيلنے كا نتيجه بوما ب كا انتحاد الامعاء ما فتى محكوق سے بدا موجات ب معمله منطله حصول سے يحيلنے كا نتيجه بوما ب كا انتحاد الامعاء ما فتى محكوق سے بدا موجات ب كا منظم المرب المباب باربطون كا نتيج بين جو س كے ساتھ موجود به معمله معمله المباب الامعان كا بنيج بين جو المباب المباب باربطون كا نتيج بين جو المباب المباب المباب كا تدارك لمحوظ د كمنا جاست الله بيون المباب ا

التهاب لقولون

(COLITIS)

قولون كا التباب على ومى اقدا مبني كرا حدود ري والحى الخشري الجيال التولون اكر عومي وي قولون التراب التولون اكر عومي وي قولون التباب كا ايم برنا نجد وه فا زلتى بوسكا بهدا به التباب التولون اكر عومي وي قولون التباب كا ايم برن المياب ما شهر المياب ما شهر المياب من المراب المياب من المراب المياب من المراب المياب من المواب المياب من المياب المي

فحاطئ غشائي التهاب القولون

(muco-membranous colitis)

(عناطی قولسیج =mucous colic) (عناطی التمالِلقونون = mucous colitis) منافی خشائی التمالِلقولون کی اقیازی تصوصیت یہ ہے کہ اُمی میں خشار کے

كى صورت بن سكمائيد مين كا مستعمال كذا جا جئه ـ الآك مارسف مُترى Lockhart)
(المستحدث المراسف كالمراسف كالمراسف من التول شلا كرو قولونى الهما ب (Mummery) من المراسف و (visceroptosis) احديث في وضعيت وغيره كا نافرى نني موسكما هير -

مالكيامائي وضي تولون كارطان وكراس من كويداكرسكت ، بهذا إسكى موم دگ

ان میں معض اصابتول میں سگمائیڈ بین کے ذریعی فٹا و مخالی کا اشراب و ذماء اور تقیع دیکھا گیا ہے۔

واب تربنا دیکے دوفن برا بخرسب سے نیا دہ موزول ہوتا ہے ۔ کو ڈیرافین بی سال کی جاستی ہے ۔ لفاح در دکھ لئے مفید ہوتا ہے ۔ ایک کم بند کے ذریعت کی کور می دکھنا چاہئے یعض ا وقات ایسی غذا مغید ثابت ہوتی ہے بھی یہ بی ا ورسبز ان موں کو دیا دہ تربے کائی ہوئی ہوں ، ا ورجن کے ساقہ موٹی ہیلیاں ا ورجیلئے می شامل ہوں کو دیا دہ تربی کائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے مغید ہوتی ہے کہ یاس قیمن کو دفع کر بی ہوس میں مریض مبتلا ہوتا ہے ۔ ذہمی علامات کی طف توجہ کہ کا جائی اور مریف کے دیا کہ اور مریف کے دیا کہ اور مریف کی طف توجہ کہ کہ اس کے لئے دور مریف کی اس کے موٹی کی طرف توجہ کہ کہ گائی ہے کہ اور اسطرح بنائے ہوئے فتحہ کی راہ سے میں کی گئی ہے ۔ دور اسطرح بنائے ہوئے فتحہ کی راہ سے میں کی گئی ہے ۔ دور اسطرح بنائے ہوئے فتحہ کی راہ سے میں کی گئی ہے ۔ دور اسطرح بنائے ہوئے فتحہ کی راہ سے سل کی گئی ہے ۔

تقرحى التهار شحيلون

(ulcerative colitis)

(خطی مالط التهاب قولون ، خطی فاق تقریمی الته اب قولون) مزمن تقری التهاب قولون ، ایک غیر معلوم مبدا ، رکھنے والامر میں ہے جس کا اتبازی خاصہ برازی مادہ کا باربار خارج ہونا جہ جس کے ساتھ رہم ، مخاط اور فون طابولا تبیمان ہے موجود ہویا نہ ہو، اور مرض کی حاد اور مزمن اشکال پائی مباسکتی ہیں۔ خود مجود فتر د موجانا شاذ نہیں ہے۔

مرور برا برا اور دونول منفول کوم انتهاب تو بون بورب امرید اور دیگر گریی به اور دیگر گریی به اور دونول منفول کوم انترا به ایکن بانغ زندگی می سب سے زیا دو مام به مکن بها سے تبل خوابی صحت کی کوئی مالت موجود نه بو ایکن بعض اصابتی مرمن عفونی فیادات مثلاً مرابیت زود دانتول اور اجواف کے بعد بنودار ابولی مرمن عفونی فیادات مثلاً مرابیت زود دانتول اور اجواف کے بعد بنودار ابولی اس سے اس نظریہ کی تا شد بوتی به کدایک نوی اس نوی بند (diplo-streptococcus) آمیم عفوریہ نوی دور سے وک ایک ایکن اس مرک دور دار بیمی مال مجمعة ایس ایکن اس مرک دور دار بیمی مال مجمعة ایس ایکن اس مرک شمه است کوان دونول فی عفورات میں سے کوئی ایک ذور دار بی انها بیت کی تا بیمی مالی مجمعة ایس ایکن اس مرک شمه است کون ایکن در دار بی انها بیت کی تا بیمی مالی مون ایک دور دار بی انها بیت کی تا بیمی تا بیمی می تا بیمی دار بی انها بیت کی تا بیمی تا بیمی

ہے۔ یہ اُکے دیگئ ہے کہ غذا فی قلتوں یا کسی دیگرسب کے بعد جوکہ قولونی مدافعت کو مناقی مذافعت کو مناقی منامی طور پر گھٹا دیتا ہے، طبعی جراثی نیا تبات (flora) 'بالخصوص نبقہ سبحیہ ' مرضیا تی نصائص الفتیا رکر لیستے ہیں ،

ا مراضیات مادخاطف اصابئی عصبوی زجر به مثنا بهت رکستی بی منا رخاطی کا عام شدید التهاب اوراس کے ساخ ارتفاح ، غشا کا بخر اور وسیع کوریر بسیلا بوا تقرح با با جا به معمولی مزمن اصابت بی معارسته یم عشا، مخاطی بین بخو به به بی اور دختی تقرح کل برکرتی به اور آله که متعمال سے ایجار نفریز اس ساوه ، بنتج اور دختی تقرح کل برکرتی به الست ترقی کرماتی به اتوقولون بندر یج ه گوف بوجا آب به اور اس کی سطح فواتی دا می منتهب بوجاتی به اتنت کی دیواری دبیرا ورشیف بوجاتی به بوجاتی به اور اس کی سطح فواتی دا می منتهب بوجاتی به انتمان کی دیواری دبیرا ورشیف بر بوجاتی بی مترزی میان التماب زده یا دبیر نشتی بی اور اس کا درونه تنگ بوجاتا به تا نیر پذیرا صابتول بی امتحان لاش پر دیمان ده یا معربی آب نه بروسی بوجی می است برید قرصات مندل می درسی بوجی به می بوتی به یکی در میان التماب زده یا بوسی بوجی به یکی در میان التماب نادها به در بری بوتی به یکی در میان وران کرم مرحله کی باز تکوین به ورسی بوتی به یکی اندمال میربی اور اس کی می در می بوتی به یکی در میان (polyposis) بیما به جواتی به یکی در میان (polyposis) بیما به جواتی به عمی در می می می در در می بوتی به یکی در می با ادامال می با ادامال می می می می در می می در می بوتی به یکی در می با ادامال می با ادامال می با ادامال می با ادامال می با در این کرد می بوتی به یکی در می با در این کرد می بوتی به یکی در می بوتی به یکی در می با در این کرد می بوتی به یکی در می با در این کرد در می بوتی به یکی در می با در این کرد برای با در این کرد با با در این کرد با در با



الف تقرى التهاب قولون - سلح كي جيو في حيو في بية قاعدًي ل طاحظه مول - (مصنف بذاك ايك مريض سے)



ب بزی آنت بیریم سے بھری ہوئی ہے اور قولون نازل بی عطفات ظاہر کرتی ہے۔ (پیشعاع میکا تنت مساؤلم بولند کا اسلامی کا کا تنت مساؤلم بولند کی ہے۔ (پیشعاع میکا تنت مساؤلم بولند کی گئے کا کہ انت مساؤلم بولند کی ہے۔ انتخاب کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ انتخاب کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ

بوبتدیج وضی صاعد اور ستون قولون مین میل مبائا ہے۔ آخر میں اسور ماؤف موما آہے۔ تاز لور پر بڑی آنت کے فلتی رقبہ مبات معارستنتیم ماؤف ہوئے بغیرتنا تر ہوما تے ہیں۔ بیمید گیاں انزف انتقاب تضیق النت کی سعدانیت اسر لیان اور الہّا ہ مفاتیہ مشتل ہوتی ہیں۔ ان اصابتوں ہیں کہن میں سعدانے پائے جاتے ہیں ، ۲۰ فیصدی میں معدمیں ماکر خوافت نموما ہے ہوماتی ہے۔

تشخيص بركزشة اورباخانول كيمنظر يسدمض كى نوميت كاشه ريلا مواليا

ایکن براسابت می سکانگرمنی (sigmoidoscopy) اور لاشعای امتحان سے خیس کی توثین کرنے کی ضرورت ہے جی سے تیم امتحان سے جی شراف اور مکن ہے معلی خوان سے بینش عاصرہ ظامر ہو اور مکن ہے معلی خوان سے لیم ایک ہے سکمانیڈ مین سے ایک ہواں سے لیم ایک ہے سکمانیڈ مین سے ایک ہورا انہا ہے دو فرز آئی سطح دریا فت ہوتی ہے ، بس سے بچار نے با آلہ کے استعمال سے بارانی اور اور کو گئی ہوئی ہو تا ہے ، اور اس کی دلواریں بے لیک درونہ تنگ ہوگیا ہوتا ہے ، اور اس کی دلواریں بے لیک ورستوار ہوتی ہیں خواری ورونہ تنگ ہوگیا ہوتا ہے ، اور اس کی دلواریں بے لیک عربی صورت نہیں بڑتی ، اور مربی کا امتحال رکبی صدری یا بھری عمومی عدم صدرت کی میں ضورت نہیں بڑتی ، اور مربی کا امتحال رکبی صدری یا بھری وضعات ہیں کیا جا سکا تیا ہوتی ہو است نہیں لانتعا عیہ سے انبونی تمری مود ہو تو وقولوں بڑنما اور کو کردہ منطر طاہر کرنا ہے (معقد اما ست بین لانتعا عیہ سے انبونی تمری مود ہو تو تولوں بڑنما اور کر مونہ و مردہ منطر طاہر کرنا ہے (معقد 14 الف) ۔

انگرار نا طف اسانتین مکن بے اپنے پورے مرمی حموی رہیں۔ اور آغار سے اسے بورے مرمی حموی رہیں۔ اور آغار سے اسے میں مرمی مرمی مرمی دران ہیں کی جمینو بلکے میں اور ان ہیں کی جمینو بلکی میں اور ان ہیں کی جمینو بلکی میں اور ان ہیں کا میں میں اور التربینی اور لانتواع بر آنت طبعی منظر طا امر کے۔ بعدا زال کھا تا مام کور مربب سالوں کی اور لانتواع بر آنت طبعی منظر طا امر کے۔ بعدا زال کھا ت عام کور واقع بوت بیں ۔ مربب سالوں کے بھیل جاتا ہے اور معنی امرا بتول میں عام صحت بربب کرا تربیاتا ہے۔

التماب زائده (appendicitis)

محث اسمال و براها به کفت اسمال و به من ادمیر عمر با براها به کفیست اوا کن ندگی میں اور انان کی نسبت ذکور میں بہت زیادہ کنے الوقوع ہے۔ اس شکایت کا گذشتہ چند سالوں میں زیادہ براس جانا گومام فورزیسلیم کرلیا گیا ہے اس کی توجیہ باکل

سنېس موني -

ا مراضبات ، الهاب الدهموا عموی عصبه قولونی کی دایت بوجاند
کراحث بوتاید و کرانت کا قدرتی باشده جابیض اوقات نبقات سجیه نبفات حنبه
عصد ریم نیکون ا مددور در بریم ما زعفوید و عصد در نی عصبه محقی اور شعاع فطراس معتقلی بوقی بریا در ایت کی توکی کیف از اکده مین ایک جسم نویب کی موجودگی سے بیدا بوکتی ہے ، بواس کے درون کومدودکر دیتا ہے ۔ یہ ایک شاه دانه کی شلی انادگی کا نیج کوئی دورائح اکوابال ایا ایسی می کوئی چرز بوسکتی ہے ۔ بہت سی اصابتوں میں ایک زویا نوان کی دورائح اکوابال ایا ایسی می کوئی چرز بوسکتی ہے ۔ بہت سی اصابتوں میں ایک زویا موران اور بالن ما وی دیک کوابل اور بالن اور کی اور بالن کے بعد بنجاتی ہے۔

مُرضَى كُنْ الْهُوكَ عَلَيْهُ الْهُ وَكُولِيَا الْهُ اللّهُ الل

لیکن آگرا ختات یا تقیم نہیں واقع ہوا تو اس کے رصط مرکز نہیں کہ الہماب بظا ہر رفع ہوجا نے ہو مالت کائنس واقع ہو مکتا ہے ،

ا اراس على في بين المحالية المعدة الماروويا بين سال بعد تك ما والتهاب بير ويوكر الممتابية الوريديا تو مندرج بالأكبيمية وابي سطسى اكي مين مختز الوجانا جدا بيا التهاب بين بيرافا الألا بين الكهاب بين بيرافا الإدارة الله المرابية المورود الكيران المورود الكيران المورود اللها المواجد الأكل وليوارون كل وبازت اور ورريوش المعنى اصابتون من المنه بي المن كه ورسط مين اكثر المحتظى اور بعدى مرت براتساع مواجد الماران ما المرابع في المناس كدور وقد من اور خار جا المرابع في المناسات المحتل المناسات المحتل المناسات الم

علا مات - حاً د حمله، على ابتدار اكثركسيقدر ناكباني بوتى بيد. مریض کویول ہی ' یا کچہ عرصہ سے سور ہمنے کے بعد جس کے سابقہ کچے قبض یا اسہال معی ہوتا به كمين إونا اختديد در ركت كركاحل بوجاتا ب، ويبله ساري مكم ريميلا بوا موتاب کیکن طلای وامی مرتفی حفر مرآز ادہ نمایاں ہوجا تا ہے۔! م سے کیا تھ ہی کسلندی متلی تھے 'ا وکرسیقدر حموی تعال ہونا ہے ۔ زبان فردار ہوئی ہے است تہا جاتی رمتی ہے ' تشنگی موجود ہوتی ہے، اور آنتوں می قبض ہوتا ہے۔ مکن سے کہ شکر سنفدر متمدد ہو، لیکن وہ وامیں دقعی نحفرہ میں موما استوار اوراکیم ہوتا ہے۔ اگرزائدہ حوض سے اندرواقع ہے تومکن ہے کہ بیائستواری نیروج دہو۔ الیمیات اکثر متعین لوریراس نقطے يروافع بوتى ب جودانين ائط بالائي شوكي زائرے سندنقرياً ٣ انجة فاصل براس خط يرمونامي جواس زائده سانا في كال كينيانا (القطة مبكن = Mc Burney's point ممکن شده کدید علامات چندروز تک جاری رہیں اور نقط اور تمدد علاج کے اِرْ سے کم رہمائیں اور شکایت وور ہوجائے۔ یہ ہمینہ نہیں ہوماکہ دروابتداؤ مارے ريمبلا بوايا زائده كي خطي بن محدود المقام بويمن سيركه وو تراسيفي موما بائين بِرِمْو - وه بار بائتری بوتا ہے ، اور تکن ہے کہ بائیں جانب پر تیرون ہوکر دائیں مِأْسُ كُومِا مَعْ مِوتَعَى مُصَرى عَدَا مِن درو موسكما جه عب كا المارمريض كوباليس رو ير بطاكرا وردائيس كوله كوميش بسط كريكيا جاسكاند ويا أسوقت مبكزا مده ومن متتى مَن بو معندل مادنه روني من درد ، بركتا به اور اس كا الهار كمينية كونميد و ركم والمي وال باہری طرف کملے سے کیا جاسکتا ہے (احاب سن عصلہ سیادٌ ہ) کیج کمی قنید

میں من در د ہوتاہے۔

جب بچوٹرابنانے دالا ہنقاب داقع ہو**ما** تا ہے، اور زایدہ حوض تفنفی کی کئر<u>ے او</u>ر واقع ہوتا ہے ، توبیہ استواری اور مزاحمین نسبیتہ زیا دہ تعیّن طور پرمحدود المقام ہوجاتے ہیں اورمکن ہے کہ آیک عتین رسولی بنا دین حکی حد نبلا کبر وِنی جانب پراً ور بن**یے علم ر**قفی کے وف اور رباط بربارت کے ذریعہ ہوتی ہے اور جوڑاط توبارٹ سے ناف کا کا کے فاصلہ ك نصف يا دوللت معول ك معليتي مولى اكب محدب كناره بناتى بد قرع كرفير وه أكثر بالكل عموس يا أصم يا في مباتى شهر إ وربعض ا مِقائت أس بي ابك تزميم شده لمبلی آواز ہوتی ہے'ا وربطیتہ شکر طائم اور گمک دار موناہے تمیش بلند ہوکر ۱۰ ایا ۱۰ اورم فارن السُن آك، اورنب . المالكا كالميني سكتي الدوريقاعد كي كيسا تعربا وورك ك لورير بوسكت هي اوراكترنيج والنبي الكُ تك ما بينجيات موافق اصابنول من الر عليه مَين مَا خير بوجائے تومَلن ہے كہ بررسولى بتدريج كم شغين اور جيو تى ہو بوكر بيلمه جائے ، چنانچ وه ظاہر بونے کے بعد سے دس ما بیس بوم میں غائب موماتی ہے ، اور نب اور دورسے ناموا فق امارات مبی کم موجاتے ہیں - اِس کے برعکس اُ موقت جبکہ زائدہ خفیقی وض کے اند ہو، مکن ہے کہ انتقاب کا نتیجہ یہ ہوکہ وَرد موقوف ہوجائے ، ا ورسٹ کم کی استواريې نوبوتى بىنېيى - اميى مالت بىئ با وجوداس كے كەمۇمىي التباب بارىيلان مۇجۇ^د ہونا جے جھنے نہیں ہونے یاتی - علاوہ اہارتِ عضار ساقہ دکے، بس کا تذکرہ اور کہا گیا ے عمیق الوقوع مجوزا براہ معامِستنتیم ما براہ مہل محسوس یا جاسکتا ہے ' یا وہ (۱) مثانہ ك قريب واقع مون كى وجه مع تواتر تبول الدب عضار منتقيمه ك قريم فع موف کے ماعث اسہال اور تاسبے بیدا کرسکتا ہے۔

زائده کا إغتات جلدواقع بومان کی اصابول بر مکن ہے کہ مقت می دلانتیں بالکن عائب بول ، با استدر خنیف بول که مریض کے دلانتیں بالکن عائب بول کا با استدر خلیاں المدت بول کا مُرضی مالت ابتدائی سے ، یا جلدی ، عام التباب باریلون کی توعیت رکمتی ہے (حلاحظیہ ہو التہاب باریطون) ۔

ں ریسے وی مسر صف ملک ہو ہا ہا ہوں ہیں۔ حیاسیت در دیعنی دُکمن کا اصاس کیا مض مِش صیت پیھنے بڑھی ہوئی سی میتت و تشخیص سے لیئے کا رآ مدموسکتی ہے۔ اگر ایک البیین کومستمرزا ویہ پر رکھکر ' بالد پر کینی مار ، با اگر مبلد کو اُنگی اور انگوشے کے درمیان آ جستہ سے جنگی میں ایا مائے آ یا کا ہر دوماتے ہیں ۔ ما دالہاب زائدہ میں برا الات نقریباً ، ۹ فیعسدی اصابوں ہیں با ماتے ہیں ، اور نقریباً ہمینہ دائیں مرقفی مغرب ہیں ہوتے ہیں آگرم مکن ہے کہ شیعیے اور باہیں مانب ہمی ابید مزید رقب ہوں (58) ۔ مما سیست درد ایک بعیدالبعد ب دے اور یہ امر کرکسی نندر سنت متنا وکی دیواروں کو تا ہے سے وہ مصنوی کور پر بیداکیا ماسکتانج اور اس ننا ؤکے موقوف ہو مانے کے بعد تقریباً ایک مسئر تک ماری د مکتا ہے ، کا ہر کرتا ہے کہ البتاب کے ساتھ اِس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ، بلکہ وہ ذائدہ کی یا شامیر لغانع فی اور سات کے دیاروں کے تا نوی اسلام اور ننا ؤکا نتیجہ ہے۔

البهاب لأمُد دَكِيك من كى صورت مِن ، جن كا بِسِلْ تَذَكَر وَكِياكِيا ہِدِ ، طلا است بائل وبست بى بوغدى مربعيف كدا قولى حلول مِن يكن عام النهاب بارسلون كا انداب م غالبا كمة بولائي ، كيونك فررسك كرد انتفالات بن يكي بولتے ہيں ۔

کی طرف نمبوب کیا جاسعا ہے جوزائدی نظے سے معکوس کورد پرا ہوما ہے۔

ہوجائے تفریباً ہمیشہ التهاب زائدہ کا میتجہ ہوتا ہے۔ نسبۃ زیا دہ عروالے مربینوں بس

ہوجائے تفریباً ہمیشہ التهاب زائدہ کا میتجہ ہوتا ہے۔ نسبۃ زیا دہ عروالے مربینوں بس

ہمت سے مررات النهاب زائدہ کے ساقہ خلط ملط کے جاسے ہیں بشکر ما دیمن تقریباً تمام

امباب پرمنتف اوقات میں اُسی کا غلط گمان ہوا ہے رملاحظ ما کھومنی 200 ۔

امباب پرمنتف اوقات میں اُسی کا غلط گمان ہوا ہے رملاحظ ما کھومنی مالات یر جو

گذرت تدروا ور الیمیت کے مل وقیع پرا اور ان مقامی حالات یر جو

میرونی امتحان اور باہ معام ترمند ہم اسمالی میں ہو اِسے برا زی اجتماعات اور کی جورکی ایک بیو اِسے برا زی اجتماعات اور کی جورکی ہو اِسے برا زی اجتماعات اور کی جورکی حصلی انتاء کے التہاب اور خصری بھورکی حصلی خورکی التہاب اور خصری بھورکی حصلی انتاء کے التہاب اور خصری بھورکی سے متمین کرنا پڑتا ہے۔

ریا دہ اہم یا امور ہیں: مقائی الیمیت اعور اور اختیا می لف نفی کی بوطبی تثبیت ا اور افائفی قولونی عاصرہ کی راہ سے غذا گذرنے میں آ خیز بعنی معدی لفائغی معکومہ ا کی کمی سس کا امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ بیریٹم مل ہواکھا یا دہنے کے چار گھندا بعد ایک کھانا دیا جائے اور اس کے ایک گھندٹہ بعد اعور کا معا سند کیا جائے۔ (36,35).

ا نذار نے خانا نہ لندن کے تا زہ اعداد و نتمار کی رُونے التها بزائدہ کی ان تمام اصابتوں میں جن ہیں حمل نتروع ہونے کے بعد پہلے چوبیں گھنٹوں کے اندر علیہ کیا تعداد اموات ۲۰۱ فیصدی نعی ۔ یہ دورے دن بڑھ کر ۲۰۱ فیصد ہوگئی اور میرے دن بڑھ کر ۲۰۱ فیصدی ہوگئی ۔ علیہ حسقدر جلد کیا جائے اندار اسیفدر بدا ہر

عطفيت

(DIVERTICULOSIS)

ری آنت کے متعد و مطع المجون الدر ایم آنت کے متعد و مطع المجون الدر ایم آنت کے متعد و الدیم آن استان المدر ایم آنت کا ایم آنت کی بھی مقد میں ال منطح ہیں الدیمان و الدیم المقالیم المقالیمی المقالیم

التهابعطفه

(diverticulitis)

عطفیت بلاکسی علامت کے سالہاسال ماری روکتی ہے کہ کن التهاب السال ماری روکتی ہے کہ کن التهاب اسلی میں موقت می نودار موسکتا ہے ۔ اِس کی اولین لا شعای الرت عطف کی گردن برطا ہر ایونی ہے ۔ تاجیک مزید اِکتہا ف طاہر

کرتی ہے' اور ماہتر ہی زا ویہ متداخلہ کنگہ ہوجا تاہے (سس) پرب سے زیود مرّ يه وا فعديداً م عِلول كي لمبعى وكت كا ، بوسلسله وارفلول سعظا مربوتى سية ا إلكل المناع بوم إمّا من يعض اصابتول مين بيطف النهابي دبازت كي وم ست تعلق بوجائے ہیں (ع) - إ أن كي ونس إسقىدر چورى بوجانى ہی كتيبس م كَيْ كَانُ وَمِا نَي بِي (مِنْ إِلَى اورف كيم قام براكب انتهائي انظماسي ورجه وكملاا نّبا بنه جونینی میش محوین کی وجه سے واقع ہوگیا گھے۔ دوسرے تغیر است جوعظفول کو ا وُفَ كُرِيكُتُهُ إِن يهمِن إله (ل) نقيع - (عب) أنتعاب اور التهاب باريفير (سب) قرب وجواركة اعضا ركه ساخة ناسوري ارتباط - (۵) عيطف كا مروزاها ما جس سے اُس کی تخنیق واقع ہوجائے ۔ (س) مرطان کا نا نوی طورر نمو ایب ہوجا ، . النهاب عطف كے علامات فليف قسم كم الها - كے موتے إلى او بری منتبس ا ورعمه فا بائی طرف شکم <u>م</u>ے زیرین چھکے میں **بوتا اور متعملے سا م**نوں مين ميل ما آج- اكثر شكومان لجارامي اوراس معالمز باردروموات بالعموم نيذا كمه سائفة فيمتعلق بوتا ہے اور ناف كمه قربيب يا أس كم نيحيُّ بيكن الخصوص ائم برحرتني تحفرے میں واقع ہمواہدے اور بار با وقط دار موتاہے عکن یم و كمنها توكيه احماس اور در ديشت كي شكل اختبار كرك . عام رسميت اورته . ١٥ ا حساس عموةً برال كن حاتي إن اوركن المي علادات صرف لبي بول- في مقيمة ير مجمكن هيك التهاب عطف كي ايك نرتى يا فته حاليت موجود موا ورأس كرا و نسی تسم کی شکابت نہو۔ قبض ا جابتوں کی بینیا مدگی اسہال کیا نا تمام بعری م ا حماس اكة موجود موتا ب مثانه كى ما وُفِيت كى شالون مِ مَن ب ك تنبول م هي اوربعض اوقات وه بإخانه بوجا في كه بعدُ درد كه سأ تصربو . يا يبيي نبول ا ہوا وربعدمیں دردہو۔ ہانتانا ، بہت موئے انتخاص کے ' بائیں رفعیٰ مغرے ' الكر كليكل مسولي مُسول كا مائن به الموسعة المعض ا وقات اليم بوتى المايكر الم بہیں مکن ہے کہ اِس میں حا دالتہاب بیلا ہو، اور اُس سے مرکبن کونتیا و موجائ يبض ا وقات البهاب عطف قولون ك دور عصول من بوماتا -نزف براه معارستقتم عموماً نهيل بوتا - إنعوم المتبابي ضرعشائ مغالمي سيعه

- هـــــــيمي ا صابحت مهم ال يم بعد ترقي اخته مظلمي وج معن -علمغه کی گردن برزا ویرمتداخو کا کند مجرجانا - حص بهوی وفوار کی مهایت وبا زمت المركة عرائنادد اوراك بالآعلان التدداده والبال على المركة سكل ٩٧ - أو من نيج فبعى تاجكين من اورا ور ميش علنى حالت كي مير في حج في عكتيا ـ بسيش علنى حاليت كر رقبة آنت ترميم طكورتا تركرت بن وزام ميلة في ظلى پراكرتيكية ج -آنت كا وبي كوا (جوك مبيس ب) علاج كم بعد تنكى بالكل بيسب بنا مدكيان وكديش طلق مالت كاما بتي بدين توفي جوفي ميوني كوين. - براحساة البرازبردارعطف منقطه دارخط وران اربخايس سي وضع كوظام كَنْ الْجِيلِ مَاكُمُ (بُوكُهُ أَيْكِ كِنْدُ بِعِدْ أَيْسِلِيلُ وَارْفُلُم بِهِمَّا لَ كِياكُم) أيك يَّ بِكُ كَالْعَبْاضُ لِلْمِرْزَا بِي مِ يەمىلىك دارغلول برنى گئىسىدا در تامىك ظامركرتى ب -

واقع ہوتا ہے۔

بیمی آیوں کے باعث میں علامات برا ہوسکتے ہیں۔ بب تقیع واقع ہوجا ما ہے تو با میں رقعی تحفرے میں منب شکم کے بائیں جا نب پر التھاب زائدہ جبیبا ما دامتها فی ختال ہوسکتا ہے۔ التھاب عطفہ موی تعدد پر اکرسکتا ہے ۔ ناموروں کے بننے یا انتقاب ہو نبیکے ماعت علامات پر ایموسکتے ہیں

ا ندائر عطفیت اورالتها بعطفدونوں کے ابتدائی مولوں میں انداراجما مونا ہے ابتدائی مولوں میں انداراجما

علاج يعفونى مراكز كوخارج كردينا جائية - غذا ما ده بمونى جائية اوراس ي بسل او ربه مال بحرث موجد بول - كهانا باقاعدگى اور با بندى اوقات كرسا نظما نا چاہئے - با مازماف بونے كے لئے برافين استعمال كى جاتى ہے ، اور با خان كے لئے بابدى اوقات كى عادت ۋالنى جائئے - برتريرے دن طبعى مالے سے تولون كى تغييل فى چاہئے - روفن زيتون (olive oil) كے حقين مى منيد بوتے ہيں - بہترين يم سبت ك مسبولات سے احرار كيا جائے ، اور دكك كرانے كى بدايت بركر نه ديني جاہئے يا مختلف بيجيد كيوں كا علاج برتا جى سے كرنا جائے ۔

376

آنت كاتدن نوباليديل ورأنشك

(TUBERCLE, NEW GROWTHS AND SYPHILIS OF INTESTINE)

الرف - آنت کا مدتن آلر دو ده منظم الوی این بوف کے علاوہ علی الا محدوق الله موروں المخصوص بجرات آلر دو ده منظم الله موروں الله موروں میں مرابت آلر دو ده منظم الله ما در قولوں کی مغروب الوں میں صرات بالخصوص لفائنی کی تجدیر کی میکیوں ہیں اور لفائنی اور قولوں کی مغروب الوں میں دو اتر مقامات میں الله میں واقع ہوتے ہیں ۔ تھے میں الا دو تقریح - اور لفائنی کے قرعے بہت وسیع ہوسکتے ہیں مالوی کا تربیخ بین ہوتا ہے ہیں مدلا اوقات آنت کے کرد و منا ماتے ہیں مدلا اور و مول یا بیضوی ہوتے ہیں اور لبا اوقات آنت کے کرد و منا ماتے ہیں مدلا اسلام سے مول ہیں ۔ آئی سطح ہوت الا اور الور الوروں و بیزوری ہیں اسلام سے متا الم مسل

سلم عموماً چند جھوٹے حیو کھے سیدر دَر نے بیش کرتی ہے مملا زم علامات نب اور اسہال مي - ياخاف عموماً كيرالمقدار ، توليس جيه اورجي بي دار موت اين اور أب كارتك زرد بوِّنَا ہے بعض اوقات ووزیادہ مائع وربیریمی زرد ہوتے ہیں ۱ وراگر شکم متمد د ہو توهمن هيئه كالنفا 'لمر بحار سے قريبي مشابهت بييدا هوجا ئے۔ نز ف او إنتفاب شا ذ معتقب علاج بيان كياجا فيكافي (الما خط موصف 175) - الم مورمبرري fistula) (in-ano) بلامشهبعض اوقات درنی ٔ الاصل ہوتاہے۔

نوبالبيدس - آنت كى يوليال بالفوس به بونى بين . ـ غترى سلعه اور مس طان اورشا في لم في لحمى سلع عا مرطان مب عزيا و مكررالوقوع

اوراہم ہے . اثناعشری کے سرطان کوئٹیرن (Sherron) نے ماؤنشدہ حصد کے لحاظ انتخاب میں انتخاب کا نیاز نازنی مسب ذبل تشبيم كيا ہے : _ وہ جوسفراوی مليمه سے اوبروا قع ہون اپسے فوق الانتفانی (supra-ampullary) كيت بي - وه جو خور صليم من واقع مؤليتها (ampullary) ب ـ اوروه جونيج واقع مو ايس تحت الأنتاخي (infra ampullary) كيته مي ـ برمالت میں بداکیسٹا و مرض ہے لیکن انتفاخی قسم اہم ہوتی ہے ، کیوکہ اِس صورت میں رسولی مشنزک صفاوی قنات کو مسدو دکر دینی ہے اور آگرجہ در رنہیں پیارکر تی نا ہم گہرا پرقان اور لانوی پیدا کردہتی ہے۔ تحت الانتفاخی سرطان تعیہ ہے تحقیہ میں زیا دومام ہے۔ ان اِصابنول میں تعظیمی ہمینته سعرا ور با نقراسی رسس موجود برنا ہے۔ آ نرالذكر كى موجودگى إس طرح ظاہر بوسكتى كِ كَا أَرْمُعَلَّمِ فِيْتُ مِنْ جِنِد كُرِينَ سود يئم بانى كاربونبيك ملادير تواس بي فائبري بضم اوجائي كى وصائم اوران انفى س فتا ذہبی رسولیا ب یائی جاتی ہیں۔ غیر خبیث رسولیا ل اکثر کو فری دار ہولتی این ادر اِن سے انعا والامعابید ہوسک ہے۔ بل ندسٹن (Bland Sutton) بتلا آہے كالفائي اعورى انصال كيم مقام كى بعض رسولها وينميس رطا في سمحاكيا در بهل بمنسس يحوين أرنى تودى تابليت ركهن بريار دين كالميت ركهن بريار كرين كالبيت ركهن بريي اكيب سرطان - دونول سورتون سي خروري على استيصال ي ج مرطان جونی آنت کی نسبت برمی آنت میں نبت زیادہ عام ہے'اور

ن**مامئزاً بور ·** حضى قولون اورمعا يمنعتم كوما وُفكرتاب اوراس ہے كمة **نولواج** د ومریے حصتوں کو۔مہریری لما ظ سے تولونی ^امرلیا ن دولمر*ٹ کا ہو*تا ہے' جس کا انحصار اِس ير موتا ہے كہ آيا وہ آب ملقه نما بالبدہ جوابيرائي درههي ميں نسد دبيدا كردي ا یا ایک متعظر بالبید جوند در دیرسے برباکرتی ہے۔ ابتدائی دربول می مکن ہے کرمریش مها نا کھانے کے بعد شکرس بے آرا می اور قولنجی : رو تحسیس کرے اور **ساتھ ہی قرا قریمی** ہو۔اجا بنوں میں بیفا عدگی ہوتی ہے الیکن احری بالبیدوں کا کسیفدر ممیز ضافیہ اسهال **دنوناسهه · اور** حُوضی اور قولونی مالبیدو*ل کا ممترخا مدفیض -* آخرالنگرکمس مکمن بِحُكراسهال كا ذب (spurious diarrhæa) مو بين اليدي فواش كي وسي باربار حيث ميون ترارمي وربت اكانكف بالأبيرك ما فه الني برارمي نوام ور ہوتا ہے، جس کا بڑی مقدار میں ہونا ضروری نہیں ۔ ہیا مین (hæmatin) کی موجو د گ ا ورمیما تو با رفرین (hæmato-porphyrin) کی غیرموبودگی سے طا برابوتا ہے کہ قوارن كة زَرِين مُصِّين إرِما ہواہد (طا خط ہوصغیہ 330) - غنا بی ہا وُن دارتسم من ط عمدًا إنى جانى بالارتكان بيك كرفورى بيديمي بويشكي فبس مع من بهاكم الكيسفة مدوريا كريكي دُلاظا مربو، ا وَمُكِّن بِ كُمُ أَنْكِلَ جِهِم نوباليَّدَ كِهِ أَبِكِ تِودِ عَرَيْهِما يَكُنْ بِ جومبررسے قربیب ہی معام^عنعنیم کے داممہنتہ کوروک اربا ہو۔ تا ہم ہرمشتنبہ اصابت یہ سكما ئيڈبن سنعال كرنى عاہلے كيونكه اس سے وضى قولون كى بالبيدشنا خت كيماسمي ہے (لاطابومنی 370) - تشخیص کے لیے لاشعاعیں سی استعمال کی ماسکتی ہیں بہریم سلفيك كونكوند كونويدياني بن متق كرك أس كاغير شفاف مشدم مأبستنتيم مستع إبدا داخل کیا جا تہے - اگر مقند کے بیف کومبرزسے دوفیدے اوپر رکھا مائے تو بہا میرو **کرکھار** ا ورتك يني جانا اور قولول كوباكل يركردتيا بد الشرطيك مريض كرى ما نس الم وركي كي ا بنی وضیع کو بدلتالیہے ۔ امتمان سے نیبلے بہ ضر*وری ہے کہ تو*لون خانی ہو ' اس کے لیے' چنتیں مخفطے پہلے روغن مبدا بخر دیا ماسکتا ہے · اور امنیان کی مبیح کو اور اسعی شام کو ا فی محتقد محدر بعد مزید مفاتی کی ماسمی ہے۔ درون کی تکی یا خاکدی بے قام مکی سرطان کامشبرپداکرتی ہے (الا خطر بوسمنہ ۲ العن اورب) بغرشناف مناجبکا تولول كى لاه سنتيج و تعاقب كياباك الشخيس سنته بهت كم مُوتوق ها -



مستعرض قولون کا ۱ الف) اور دوخی قولون کا (ب) سرطان جس بیر نعف بری نظر آنا به در به شعاع بکاشت مسٹرلنڈ سے لاک نے لی ہے)

ملاج برامی ہوتا ہے' اور اِندار ابتدائی درجوں میں اچھا ہوتا ہے 'اِقالِمِلیہ اصابنوں سے میں لا اے اور اِندار ابتدائی درجوں میں اچھا ہوتا ہے۔ اصابنوں سے میں لا شعامی ملاج (deep X-ray therapy) آزا اماستا ہے۔

تولون اورمعام ستقيم كى سعدانه نما باليدين بعيى غدى كليمى سلعات شستوسوسية

من واقع ہوتے ہیں۔ معانستنقیر کے التہائی تضینهائ منائے وہائی منائی وہوم اور مارستنے کے دریان کٹا ذہی اوف کرتی ہے، لین بعض اوفات وہ آخرالذریعا پرتفیق پراکردیتی ہے ہے ست المخالی بافت میں صمیفیے بن ماتے اور ٹانوی التہابی تغیر آ کے باعث ندبی انتباض پیدا کردیتے ہیں ۔ نیز سولاک سے، اور نبیتہ ٹنا ذاصابتوں ہیں تدرّن سے جی تفیق بیدا ہوسکا ہے (48) - یہ دونوں صنول میں مساوی فردر ہوتے ہیں، اور مکن ہے کہ ان کا کوئی علم نہوستی کہ تفییق کے ملامات مٹنا پرے بی آئیں اور انگی ہے امتحان کرنے پرینگی ٹنا خت ہیں آجائے ۔

معوی تسترد

(INTESTINAL OBSTRUCTION)

آنت کئی طریقول سے مسدو دہوسکتی ہے جویہ ہیں: - (۱) اجمام غربی۔ (۲) انغاد الامعا ۔ (۳) معری دیواری تغیرات ہوا م (۲) انغاد الامعا ۔ (۳) معری دیواری تغیرات ہوا مجیسے کے تفییق ہونا بندول کے قروح سے میا فہیت بالیدول سے ۔ (۳) فعل کے کا کھٹ جانا آنت پر مَرت کی وج سے میا مناف خرج کے بیرونی ضغطہ کے باعث ۔ إحساه عن بيل المحالي المناول الوسدودكر في والحاجمام غربيه من المعلى المراب المونيال البينين المحالي المونيال البينين المونيال المونيال البينين المحالي المحالي المراب المونيات المحالي المحالية المحا

إِنْ فَهَا دَ الأمعا (intussusception) - بِيخْصُوصَ مِعْمَات بِينَ كَرْمَا سِعُ جِنَاكِمَّةُ إِس رِعَلَى دَوْرَكُونَا مَنَامِبِ مِنْ وَلَا مُطْهِ مُوسَعِهِ 380) -

تضبقاً من المعرف (strictures) - بیجونی اور بڑی دونوں آنوں میں واقع ہو جو ہے۔ بیس یہ یا تو تو ہو استے ہیں المعرف کے ندلوں کے انقباض سے ایا نوبالبدول سے بیدا ہوجا سنے ہیں اور کا ہے ماہے معوی دیوا روں میں دریزش کی وجہ ہے جم کی کم کی میں ایسی سادہ رسولیاں بی ، جیسے کہ خات می مسولی یا لیغی می سولی ، معوی تد دبیدا کردہتی ہیں ۔ وسولیاں بی ، جیسے کہ خات می مسولی یا لیغی می سولی ، معوی تد دبیدا کردہتی ہیں ۔ فتل ہی مسولی یا لیغی می سولی ، معوی تد دبیدا کردہتی ہیں ۔ فتل ہی مسولی المعالم سے بی مراد ہے کہ آنت فود لین

ا وبراسطرع مرور کی جائے کوس سے وہ معنوق موجائے 'بالفاظ دیر مردور کی وجہ سے جو دباؤیر آم ہور کئے کے لئے نوکا فی مونا موجائے کا وہ سے جو دباؤیر آم ہو کا جو دباؤیر آم ہو کا جو گرائیں کی تربی کی تربی کورو کھنے کے لئے کا فی نہیں ہوتا للندا اِ متلا ' نزف اور گنگرین سدا ہو جا تھ ہوتا للندا اِ متلا ' نزف اور گنگرین سدا ہو جا تھ ہے۔

كيمنعدد كيون كابابم حيك حالا

ا مراضیات - ما و تددموی کی مبلک اسابت میں مقام ند دسے
اور کی آن بہت متحدد اور اس سے نیچ کی آن بہبوط اور مالی یا ئی جاتی ہے۔
یہ نمدد انگر کے عین اوپر تروع ہونا ہے اور آنت کو تددی شدت یا بہت کے
لواظ سے کم و بین فاصلہ ک ما وُف کر دیتا ہے - مثلاً سگا بٹر کے تددین جوئی آ
اور می فی آنت کا بہت سا صدما وُف ہوجا تا ہے - لفائنی کے تددین جوئی آ
مقد داور قولون می کیا ہوا ہوتا ہے ۔ متمد داوپر والے بقیم میں برانی ما قدے کی کچھ
مقد اربوتی ہے ، مس کا رنگ ملکا بحولایا زردی مائل بحوا اور قوام کیال لور اور قوام کیال لور اور تا میں اس بیال ہوتا ہے ۔ مزمن اصا بتوں میں ہویا بری ہونہ تدریح بیش بروروہ محولات مالات یا ہو ہوں تدد کو دفع کرنے کے لئے کرتی دہتی ہے ، تدریح بیش بروروہ اور نام نہا دہی اور کی متمد وقعے میں آنت کی دیا قت جوب دیدے ، اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا قت جوب دیدے ، اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا قت جوب دیدے ، اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا قت جوب دیدے ، اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا قت جوب دیدے ، اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا قت جوب دیا ہی سے اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا تت جوب دیا ہوں ہے کہ دیا ہی بار میں اور نام نہا دہی ازی قرمی ہے کہ اوپر کے متمد وقعے میں آنت کی دیا تا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی کیا تو بار کو کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے کہ کو کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوگی کیا ہوں کیا تو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا تو کیا ہوں کیا ہوں کی

بعض انتقاب بيداً كردير عا تخييق بن دوران ون بن راست ما فلت بوسف كه اعث " تنكى ك مقام براغثاث وافع بوسكيا بهد -

ما د تسدد دردشكم بوجاتا به بوعمونا ناف ك قرب وجائي موبات كى صورت بى مريض كو يكايك شديد دردشكم بوجاتا به بوعمونا ناف ك قرب وجائي بوباته مكن به كد وه جلتا بهرتا بوا يا كهانا كها را بو با بنيد سے بيدار بوجائے - يعر مريض في كرتا به - مرزى راه سے ناتو بإنمانا كها را بو بات خارج بوتى ہے - قيم مريض يو اس في كرتا ہے - مريض پر إس كا جو پہلے معدى بوقى ہے - اور پيرصفراوى الآخر برازى بوجاتى ہے - مريض پر إس كا اثر بهت الديث ناك بوتا ہے - بهوط مبلدى ثروع بوجاتا ہو ان ہو است جاتا ہو بات كھيں سے وہ تو بات كا بال ختاك بوجاتى ہو ان بات كو بال ختاك بوجاتى ہو اور شائل سك بوتى ہے اور بيش منت منتا موجاتى ہو اور شائل سك بوتى ہے اور بيش منتا ہو يا اور شائل منتا كو بالائى حصر بن اور شائل منتا كو بالائى حصر بن اور شائل منتا كو بالائى حصر بن ہو تو مكن ہو يا اور تسدد كو مكن بالائی حصر بن ہو تو مكن ہو يا اور تسدد كو مكن بوتا بويا ان سے اور صرف اس كا بالائى حصر متمدد ہو - اگر لفائعى كا زريس حسريا الرئى آن ا

مزمن نسدو کے علامات ۔ مزمن نسدو می اکرونی قولون یا قولو

ازل کے مرض خبیث کے باعث ہوجا یا ہے ابتدائ علامات مدف مراز کے گذر نے میں متوسط درجہ کی رکا وٹ پر دلالت کرنے ہیں کے بیقدر مقامی دردا درگائی گاہ فی ہونی ہے و بوالی خواسے کوئی خاص تعلی نہیں رکھنی قبض بنا عدی گاہ فی ان ہونی ہے ایکن وہ مفقات سے رفع کیا جاسی ہے جنس وقتا فوقتا نہا تعلیف دہ ہونا ہے وفق نہا دہ باربار ہونے لگئی ہے گریم بھی برازی نہیں ہوتی بھی تعلیف دہ ہونا ہے اور آئت کے مبش بروردہ لیقے حرکان دودیہ کے وقت شکم بہت متعدد ہوجا آف لگتے ہیں ۔ حرکت دودی کے ساتھ کو گرام سے کی آوازی کیا قوا قرابی کی مسلم پرسے نظر آف لگتے ہیں ۔ حرکت دودی کے ساتھ کو گرام سے کی آوازی کیا قوا قرابی میں دوری کے ساتھ کو گرام سے کی آوازی کیا قوا قرابی کی دوری کے ساتھ کو گرام سے کی آوازی کیا قوا قرابی کی دوری کے ساتھ کو کریم ہیں۔

مکن ہے کہ وقاً فوقاً چندستال دست آ مایں اور ائع برازی کئی بری تغریفیں ہوماً میں ، جس سے شکم کی گنجائش حلد ہی کم ہو کر لمبھی ہوجاتی ہے ، اور تمام علامات میں آرام ہوما یا ہے مکن ہے کہ واقعات کا یہ ساسلہ ایک سے زائد بار رونما ہو الکین جوابیے ہی کسی حد میں تسدد کامل ہوجا آسے اوروہ حا وحلا ماسے ، جواور بہان کئے گئے ہیں المودار ہوجاتے ہیں۔

معر تعنین بیونی آنت اور بری آنت کوتفتینات کے درمیان ذیل کے فوق نوٹ کوٹ کوٹ کے فابل ہوتے ہیں، اول الذکر میں فنے ملد شروع ہوجاتی ہے اور لیا دو تر ادفال نظامے پیا ہوتی ہے۔ آخوالذکر میں مجیباکہ پہلے بیان کیا ما حکات تمدد نبیتہ زبا دو ہوتا ہے۔ اور ممن ہونے کی تمدد نبیتہ زبا دو ہوتا ہے۔ اور ممن ہونے کی وجہ سے با فانوں کی شکل میں تفیۃ ات بیدا ہومائیں ، اور وہ فیبتہ نما ہوں۔ تا میر ہی بارا موجود ہوتی ہے۔ برب تدربالخصوص قولون کو اوف کرتا ہے تو سمدد قولون صاحد و اور وہ سے بازل اور قولون ستم من کی وجہ سے (جوربیان میں سے نیچے کی طرف جھکتا ہے اور دوس نازل اور قولون ستم من کی وجہ سے (جوربیان میں سے نیچے کی طرف جھکتا ہے اور دوس ناور اسطے میں برب جوئی آنت ناوں طور پر متمرد ہوتی ہے اور قولون ہوط ہوتا ہے تو یہ متمدد تجھیت کم میں عرف پڑے ناوں طور پر متمرد ہوتی ہے اور قولون ہوط ہوتا ہے تو یہ متمدد تجھیت کم میں عرف پڑے ناور اسطے میڈوس کا نمور (ladder pattern) بنا دیتے ہیں۔

تسدد کی شخیص - تمدوانع ہونے سے پہلے ما دموی ترکدکو استواری کی غیرم جودگا ورنستہ زیادہ ار اربونے والی قئے کی وجسے بوبرازی ہوجا نے کا رجمان رفتی ہے م مخلف ما دشکی آفول (جیسے کہ هضی قرحہ کے انتقاب النها ب نما شکا ب نا مقاب اور المتماب هراس اور المتماب معوی تبدد کو ما دالتهاب بار ملون کے آئی درجہ سے (جو کسی سبب سے ہو) تمیز کرا جاستی ہے ۔ ما درکودکی موجود کی کی دربا فت دومار مینی مقت چند کمنشوں کے وقف سے دیرکی جاسکتی ہے ۔ بہلا حقد نیج کی آئی کو مناف کردیا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیج تاب کردیا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیج تاب کردیا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیج تاب کردیا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیج تاب کردیا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیج تاب کردیا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیا ہو ۔ استان کرتا ہے ۔ دو مراحقد قبض کی دیج تاب کردیا ہے ۔ ندد کی اصابوں بی وہ اکرنے خالی اور تمسع کی خارتی یا جہ ہوتی ہے ۔

ووسری مالتین بنیس ترق ق کرنا چا بئے ماساریقی سدادیت اور علقیت اور هینوی کا برینوم (Henoch's purpura) میں اور مینب ایسے ہی علامات بیدا کردیتی میں۔ تیکن حقن سے عموم کھے نون مال ہوگا۔ ما د تردی

علاج جب ما دموی تددی تا کو برائی او باک توست کو من کا کی بوائی ملائی علاق کا بیت کو بوائے تو ست کموندگا فی ما بیٹ کو کو لدین کا علیہ بلا آخرا نوام دینا جاہئے۔ اور سب تددی کا علیہ بلا آخرا نوام دینا جاہئے۔ اور سب تددی کوش کرنی جا ہے ' یا اگر مزورت ہوتو آست کو تعدد دے او برامس کے معدی کوش کرنی جا ہے ۔
می سے زیادہ متدد حصے میں سے صرف کو کو ایک برازی نامور قائم کردینا جا ہے۔ مارلخ تصنی اثرابات دئے جا سکتے ہیں اور ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فیدو کچے مصل (anti-Welch serum) (مکمب منی مرفر درواع فی را دسے ، جو حسب فرورت روز اندو می مائیں) سے اور مسؤا ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فیدو بیلے کیا ما چیکا ہے۔ درد و فع کرنے کے لئے افیون یا مارفیا کا دینا تما ذہی قرین مسلمت ہے۔ اس سے درد ہیں کمی ہوتی ہے اور افیون یا مارفیا کا دینا تما ذہی قرین مسلمت ہے۔ اس سے درد ہیں کمی ہوتی ہے اور افیون یا مارفیا کا دینا تما ذہی قرین مسلمت ہے۔ اس سے درد ہیں کمی ہوتی ہے اور بین اور مربین کی مالت کے تعلق ایک افیان کا ذب بیلیا ہوما نا ہے مالانکور من ہیں اور مربین کی مالت کے تعلق ایک افیان کا ذب بیلیا ہوما نا ہے مالانکور من

رقی پذیر و اید مقامی لوریت ارسی کمادات یا ظالبن کے کو ول کوگرم یانی میت بخورکرا ور اور استعمار بانی میت بخورکرا ور ان پر صبغید لفاح (tincture of belladonna) یا مبغید لفاح (tincture of opium) جھوک کر کا یہ بوتی اسی کی گرم بولیسیس استعمال کرفے سے مزید آرام مال بوسکتا ہے ۔

رازی اجماعات کے لئے عموماً حقد بھے براے اور بار بار دینا کافی ہونگے ایک ایسے دریف کا فی ہونگے کی ایسے دریف کے دریعہ کی ایکن ایسے دریف کے ذریعہ لئے احتباط کے دریعہ لول عرصت کے زریعہ لول عرصت کے زریعہ دریا نہ دری ہے ' تاکہ آنت کو اس کی ماسبق قوت و بارہ حاسل ہوجائے ۔

انغما دالامعياء

(intussusception)

آگرآنت کا ایک فلقہ یا یوں کہنے کا سکے جند اِنچہ اُس کے فوری متصاریصے کے اندرمیسل کرداخل ہوجا ہیں ' تووہ اِ انعاد الامعاء کہلا ہ ہے ۔ یہ فی النور سمجھ ہیں آجائے گاکہ اس ہی باہرے اندر کی طرف آنت کے مرکز کو جا ہوئے موں ویواری بین ہیں یا ہی جا ہیں ' جن میں سے سب اندروالی تہ کو دخوالی تاکہ دخوالی دخوالی میں است ما ہروالی کو گرفتہ ہوئے کی ست ما اور اِن دونوں کو جوڑنے والی تہ کو دس میا نی ست ما ایک دس میا نی ست ما ایک دی میا نی ست ما ایک دونوں کو جوڑنے والی تہ کو دس میا نی ست ما

(middle layer) کہ سکتے ہیں۔ یہ طاہرہ کہ آنت کا کوئی می حصد اپنے اور والے فلقہ کے اندروا فل ہوکر ایک انتخاص (ascending intussusception) فلقہ کے اندروا فل ہوکر انجا و ضاء کی انتخاص اندروا فل ہوکرا نغا و فازل (descending intussusception) ما سکت ہے۔ ہمیں ملا ہمیشہ آخرالذکرسے ہی واسط پڑتا ہے۔

إنفادات أن كيم مي عدي من واقع بوجائي اوران كام مى اس لوالله المعلى المران كام مى الما والله المعلى المران المعلى المحدد المعلى الموقع المعدد المران المعالي المعلى المورة ولون ما مدكه المروا مل بوجاتي المائفي المورى مورى مورى المعالى المران المائني المران والمورم الموري المعالى المران المائني المران المورى مورى المورى المو

اکسانه دواقع بونے پر نہایت اہم تغرات رونما ہوجائے ہیں ' جن کا اسمعار آنوں کی تشری مجا ورتوں پر ہوتاہے۔ آگری انتخار کچے بھی وسیع ہوتو ایک و بیر اسطانی ورم بنا دیتاہے ' کچھ تو اس وجہ سے کہ آنت کی پوری گولائی ہیں ایک و بیر اسطانی ورم بنا دیتا ہے ' کچھ تو اس وجہ سے کہ آنت کی پوری گولائی ہیں ایک ہمیں کہ توجہ ابھی کی جائے گی ۔ آنت کی اساریقی مجا ورتوں کی وجہ سے یہ اسطوا نخمیدہ میں توجہ ابھی کی جائے گی ۔ آنت کی اساریقی مجا ورتوں کی وجہ سے یہ اسطوا نخمیدہ شکل کا ہوتا ہے ' کیونکہ اس کی اندرونی اور درمیانی نہوں کورسد بنہجانے والے عود ق اور اور ورسیانی نہوں کورسد بنہجانے والے عود آندرون یہ اندرونی اور درمیانی نہوں کے درمیان بھی جانا پڑتا ہے ' جلکہ اس کے اندرون یہ اندرونی اور درمیانی نہوں کے درمیان بھی جانا پڑتا ہے ' جلکہ اس کے اندرون یہ اندرونی اور درمیانی نہوں کے درمیان بھی جانا پڑتا ہے ' جس سے آنت کے اُس

بعض افات إنعاد النهاب وتعدى النهاب إنعاد الامعاء كاعام زن بعب مُعِدَّ عبد المعاد كاعام زن بعب مُعِدَّ عبد المعاد المعاد كالمعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعلى المعلى المعنى المعنى

نوعبت ركمتنا بصرنشير خوادعيمين إس كأأخا زنجي تحيين أشحف سيخطا هرورنا بي متلى ور نے می ہوتی ہے الیکن قبص ابتدا اللہ نہیں موجود ہوتا ۔ اِس کے بغنس موٹا اِ ماہت موالی ہے ، اور ہا تورقتی برا زبا (جیساکہ نغار کا مہز خامند ہے)خون مخاط سے ہمراہ مااس إله كمصر بغير خارح موقا ہے۔ في المفيفت ملے حاد اصابتوں من خون براه معارفتنيم فعالرج ۱۰ بوما ہے۔ اور اکٹرا وقات بلاارادہ کا نکھنا اور کا بسر موجود ہوئی ہے بیٹ کم بھنیا زیا رہ موّرمنبس ہوتا ·گیکن امتحان کرنے پرعموماً ایک دومرا ممنز خاصہ انتظارا ہمجا آہے' یعے اُس سلعیں کی موجودگی جوانغاد کی وجہ سے پیدا توماً ناہے۔ اُسکام آق قوع قدرتاً مقام ضرر برمنحصر بونا ہے۔ نسبتہ معمولی اغائفی اعوری قسم میں وہ ابتدارُ دائمیں پہلومیں واقلع ہوتاہے 'تنیکن جوں وں انتعا رزیا دہ ہوتیا جاتاہے وہ نا ف کے حکمے میں مسیس ہونے مختاہے' اور عموماً ہیسری ' استواتی ' یا محکمہ شکل ہوتا ہے'اور نافشے اوریث کم میںء نسا بڑار متاہیے ۔ازاں بعدوہ بائمیں میلومیں بائمیں برقفیٰ حفوہ کے اندرملا أما تاہے' اور بالآخر کسے اسکی معامستنیم کے ایدرمحسب کرستنی ہے کہ یا وه مقيقنة مرزه بابرا بحرآتا ب يعض ا وقات كل في نس بوتات ا ورساعيي بہت تمدد اور رازی قط ہوتی ہے۔ اور مبی ہوط برعت شروع ہور جیسیں كعنسول بي الموسيريان يا جيد دنول كب مِن موت واقع بعرصان سع مالكلف كم ئىرنوارمارىي موسنە بالخصوص مربيع الوقوع بوقى ہے -

· كيكن علامات جمينه استدر ما دنهين بوت الور درعنبقت انغاد كامفتو

بکر جہدنوں موجود رہنامکن ہے۔ اِن زیا دو مرزمی اصابتوں ہی آئت کی ماؤف شکر وسعت عموماً کم ہوتی ہے' اور اُس کی قنال کا مل طور برسدود نہیں ہوتی ۔ اِسطرح پا خانہ ہونامکن ہوتاہے' اگرجہ اُس مےساتھ ہی تنقر با تصف اسا، تول میں ون بی خارج ہوتاہے' مریض کو دورے کے ساخة مراور جیسے در دبوتے ہیں' کو یہ لازی ہیں کم

غارج ہوناہے ، مربض کو دورے کے ساعہ مڑوڑ جلیے در دبولے ہیں ، کو یہ لاڑ جاہم م یہ مرمی شدت کے ہول شکم رُخوہو تاہے ، اور اِ نغا دی سلعہ ایک اہم ممیز خاصیش

ی برن کارف کے برن کی ایک تغیر پذیر کتا فیت ، جنانچہ وہ مردور کے در دول کے میا تخد ہمز کان کرتاہے ، بیعنے ایک تغیر پذیر کتا فیت ، جنانچہ وہ مردور کے در دول کے مما تخد ہمز کان کل میڈن میں مات کالیکی مرسم ، فیرین از اس میں اور میر زبران کے مرسم

کور پہنخت ہوجا تا ہے لیکن ان کے رفع ہوجانے کے بعد جلد ہی زم برکو نو کے سوس بوجا تا ہے۔

تعت الى داورمزمن اصابنول كداختا مات مختف بوت بي مكن كم أن ان مختف بوت بي مكن كم أن ان المن بنوستاً كى وجد عد بالآخر موت بو ، يا كال تسدد معتق ، قبض تمدر هم المح الا ورمرنى نجول سد و يا مكال تسدد معتق ، قبض تمدر هم اي الراب بار المحان بيدا كردس ، وسكم المراب بار المحان بيدا كردس ، وسكم بعد محول المتاب بار المحان ، بوجائ و يا من فد حصد بدرا لي فتا الماكد و بوجائ و المراب المراب الماكن و المراب المر

بیریئم کے حقبہ کے بعد المشعاعی امتحان سے کا م لیا جاسکتا ہے ۔ علل جے ۔ حاح انغا دیمے تدارک سمے لیئے جسنندر جلد کمن ہو ترجیع کی گوش کرنی جا بیٹے ' اور اگر جیعنس اصابتوں کا ملاج سنتیم اور قولون سکے اندر سیالا ہے کے

كروسه السنة زياده طويل المدت الها بتول مين مكن به المنها مات كي وجه ---ترجيع المكن بور اليئ صورت بين تودي كركي وصد كا بالورت توده كا استعمال كي عدد الماستوده كا استعمال كي

ں بریاں پا ہے ۔ *نامن تسموں میں جبکہ اِسس ضار کی نوعیت تتنا نعت ہوجائے مرویڈا چا ہیئے۔

بَهِرْشُ بُرُوبِ كُلُّ مُرْضُ

(Hirschsprung's disease)

(کلانی قولون - megacolon)

یه ایک نا درمرض ہے ، جس کا خا میہ قولون کا اِنساع ا ورمنش پر وُرشس ہے، ست سی امه بنون من اس کے علا مان زندگی کے ابندانی جند مفتول می نمری ہوتا بس، دورمری اصابنوں میں ابندائی کمفلی میں اور باقی اسب بتول میں اس سے مجی بعد بوغيرس قيض مخت تسركا ورمتواتر بوتاب، حسس اك وقت من واس بغتون تك يا خارز بس بونا يكشكر ب انتهامتد د بواب وينانج اس سيسينه بر جو دبا ویر تاہد وہ ندان خورایب خطرہ ہوسکتا ہے نشکم کی دیوا رون میں سے قولون کے منمدد لحِق نظراً سكتے ہی، اِن کھول میں مرکات دور بہ نظراً کتے ہیں ۔ بجہ دُبل موجا تا ہے۔ ا ورنسبتهٔ زبا ده عمرولیه مربینول من ناقص نغذیها ورهیهیکه زردر بنگ کی جلید دکھیج تی ہے ۔ یہ مرض مربع کوریر دہلک میزنہیں طے کرتا 'لیکن بین رومرض اورستمرال دم کی وجھ موت واقع ہوجا نے کا خطرہ ہوتا ہے۔موت کے بعد قولون ایض معمولی افط کی سب ذُكَّنَ ﴾ بيمحنا غشيم اوراكيز بهيئة مُطَّوِّل يا يا حا بالبيد - اورلواب المدينة اصابتون مُصِّلي ربشه، بالمعوص مدورته كع، برت بين يرورده بعق أي على ظاس امرك كرتشاع كا أ فازم زسے عین اوپر ہوتا ہے یا وہنی سنتی عوجہ سے عین اوپر واس مرض كی اصابنوں كى دۇسىي بونى بىر، ھوتغريباً مسا وى كورىرعام بى ـ امراضيات كى كى كارىيات كى نهابیت فرین مقل رائے یہ ہے کہ اِس مرض کو مُری کے مزین اُ تَساع سے مشا بسسیم كت بوك، إعد مرزيا وضي ستقيمي موج كم تسدد (عدم انتخام) كانما نوى منيج

سَبِحِها مِلیُّے (64)-تُشخیص - کلانی قولون آتی فیرمام نہیں ۔ لاشعاعوں کے زریعہ آئٹ ہیں گیس کی بہت بڑی مقداریں دیمی جاتی ہیں' جوکہ بائیں ڈایا فرام کوا وپر دسکیل دیتی ا در مگرت اور اُرائد سن می این بین اس انی سے داخل کی باسکتی ہے ' اور ایک تیسے تولون دیکھا ما آئے ۔ یہ آیک سریم نلے ہوئے مقند سے بھی نظر آنا ہے ۔ مال میں میں سی سن منطب دنیا ہوئی قیل بیان میں زال میں مساور م

علاج - اس امری تونی ماسید و تون برازسه فالی رسیم اله و بندان کارآمدنهی مرزی تسم می ایک تقیمی کی ورا لمت سے قولون کوروزار برا الله الله الله و دونمی تعیمی در سیمت بی کی ورا لمت سے قولون کوروزار برا الله و دونمی تعیمی در سیمت بی می میں علاج استدر اس ان بی بوا ایکن تیل یا گلیسترین سے کی نظر مفید موسکته بی ممکن سے کو بیٹو ٹرین اور دَلک بھی میدموں ممکن سے کو بیٹو ٹرین و ایک معیم بدر بعد افراب کر برق اور دَلک بھی میدموں مبرزی ما مرد کو نسیم کیا جا سکتا ہے مکن ہے کہ جراحی عملیہ کی ندورت پڑے ہو او کو اور فی تفوید کی فولون کے قسم سے کا استیصال کا آل اللہ مورد تا بی مالی کا آل اللہ میں تاریخ کا استیصال کا آل اللہ میں تاریخ کا استیصال کا آل اللہ میں تاریخ کا استیصال کا آل اللہ میں تاریخ کی تاریخ کا استیصال کا آل اللہ میں تاریخ کی تا

جگر کا امتحان

جگردای مراقی خطی استی سے نیچ واقع بے اور تراسیف کے
بالائی حقہ کے وار بار سیات ہے طبعی مالت میں وہ آخرالذکر مقام برنتا ذبی سول کیا ماسکناہ و اور دہاں جی عرف اسبوقت حبر شکی جداری بہت بہلی ہوں۔
کیا ماسکناہ و اور دہاں جی عرف اسبوقت حبر شکی جداری بہت بہلی ہوں۔
قرع کرنے سے لیستانی خطی اصمیت (کہلای احتجہ بیت) جبی لیسنی کے بالائی
کنارے سے لیکو ضلعی ماسٹ یہ کے بائی جائی ہے ۔ بعلی خطی کر بری اسپیت انور عرف میں دروی یا گیار بور بری سیت افراس و
لیسلی سے ، جب بیعند ورا ہوجا آج تو و فیلی ماشیہ سے نے کہلا ہوا ہو اسبار بوا جو اسب و
ندین ماسٹ وار ابوجا آج تو و فیلی ماشیہ کے وار بار جبلا ہوا جو اسب و
ندین ماسٹ وہ دوی ہیں البذایہ استی ماشیہ کے وار بار جبلا ہوا جو کہ اس ک
نیسی موجود ہوتی ہیں البذایہ استی ماشیہ کے وار بار حبلا ہوا ہو کہ اسب سے میک کا الماض مرف میں وقت
میں کہ اس سے نبیدا ور سید کے مدود کے اندر جگر کا الماض مرف میں وقت
میں کراس سے نبیدا اور اسبد کے مدود کے اندر جگر کا الماض مرف میں وقت
ہوتا ہے جبکہ اس کی کلانی (۱) عموی کی نبست زیاد در ترمی ورا لمقام ہو، جبیک کرا

اس كم نيچ كى كوئى چيزا وركى طرف رهكيل دے .

آلماً بری کافی مجرکو تنگ کسند سے اسید میں سلعات یا بلیورائی النها بی سیال کی وجسے پیدا ہوجائی ہے ۔ اول الذر مجرکو انتصاباً لنباکر دیتا ہے ، آخوالذکر میں پورا جگرا پنی جگرست آبا با اس کا سقوط هرض کی نظینا رقی (Glenard's disease) کے ایک جزوک طور برصی واقع بول کے (طاخط ہوسند 339) - مکن جدکہ متمدد مرارہ کبدی آسمیت کے درین کنار سے پر ایک مگوسی نما آبھار کے لوریخط لیستانی میں صوس ہو۔

کندی نریان جرکوبہنے والے خون کا ۱۰ -- ۱۰ نیصدی ہم ہنچاتی جا اور بابی وربداس کا بقیہ صدے کے کا جرقی منٹ اپنے وزن کے ہے مصدے برابر نون وصول کرتا ہے ۔ مگر کی مقیقی تشریح تقسیم دومما وی لختوں ہیں ہوتی ہے ، اور یہ مارہ کے قورے نیکر تحقیقی تشریح تقسیم دومما وی لختوں ہیں ہوتی ہے ، اور یہ مارہ کے قورے نیکر تحقیقی ان وربد اجوف والے میزاب کک کینے ہوئے نظمے واضح موتے ہیں ذکہ نجی انتخال رباط ہے ۔ بابی وربد میں دوکہ و بیش جلاگانہ دموی روئیں ہمانو بائی جا تی میں ۔ بہاؤکا درخ ما ما ربعی رقبہ سے دائیں لختہ کی طرف ہے ، اور طحال سے بائیں لختہ کی طرف (65) - طحال اور مگرکو لا شعاعوں کے لئے غیر شفا ف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تحوریم (thorotrast) کی ایک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تحوریم (thorotrast) کی ایک بنانے کا دروں وربدی اشراب کیا جائے ، میں کوشبکی درطمی نظام ا فذکر لبتا ہے بہیز کا دروں وربدی اشراب کیا جائے ، میں کوشبکی درطمی نظام ا فذکر لبتا ہے ۔ ووق

كبدى وظبفها ورويفي كانتفا

مگر کے وظیفہ کا سیم علی اس ایریج سے تروع ہو ا بے بکہ آن (Mann) نے کتوں کے میرکر آن (Mann) نے کتوں کے میرکر وال کے استیصال کاعلیہ ابجا دکیا (67) ۔ اس علیہ کے بعد حیوان تمن کو نیاز وہ تک طبی معلوم ہو تا بحکی عضلی کرزوری کی شدید علامات کسیند در فعقہ نمودار ہوجاتی ہیں اور بعد انداں جھکہ اور تشنیات میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فلیل شکر دمویت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور شکر دیران کو توقیف کیا جاسمتا ہے ، جنا نمی حیوان کھے مدت کے آئے دوبارہ طبی ہوجانا ہے۔ لیکن بھرعلاج سے اوجود ہے اوجود

زیا ده شدیملامات نمودار بوجانے *بی ا ورج*وان قوماکی حالت می**ں مرحا تا ہے ق**لیل فرد رویت اس نئے بیدا ہوتی ہے کہ مسلسل شکر جلائے ماتا ہے اور اسکے لیا جو واحد منبع رب ہے ، یعنی مبر او مفقود ابو آہے ۔ دوسرے حیاتی کیمیا وی تغر^{ان} دموی بور با کی کمی اور مشاب من انیونیاا وربوریا کی کمی من اور ایمینو اگیب فرز (amino-acida) من زيا دتى بوجانى مي - اس كى وجه يد جه كم مرامينورودكى ہوکر بوریا کی تکوین قدرتی فور پر ہوتی ہے ' اور اس بور یا کا کچے حصہ گردوں تھے ذریعیہ ا بمونیا میں تبدیل ہوناہے۔ دموی بورک ایسڈیس زیا دتی ہوجاتی ہے، کیونکہ مِگر تَدُرِنَّى طُورِيرِ اسْ كُورِ بِادْكِرْ مَاہِمِ الَّرْحِيرَ وَي مِن ابِيا بُونے مِن كِيرِمِشْمِدِ ہِم ـ نيزرِ فا ہوتا ہے ، کیوٹر طحال اور لُب کے سنبکی در علی خلیات از نیز جگر کے کوفری خلیات = Kupffer cells) دموی صبغست اس کا صدید بردار حصد الگ کرد کر با گلی مومن (bilirubin) بناتے ہیں۔ کبدی خلیات اس بائلی روبین کو اینے اندر خمع کر اور اس کا فراز صفراوی قنالبول میں اور بھرصفراوی قناتوں میں کہتے ہیں (68) - یہ تمام تغيات ننديد كبدي مرض يعني حادثنخ أوربر لهان بي وفتاً فوقاً مشابره كي كمان بن اس کے علاوہ ' مگرسم رُبا نواص رکھتاہے ' اور دموی فائبرنو بن جس کو مگرمیدا کرتاہے ، (69) مرض كى مالت بركسك كرزف واقع بوماسكتا ہے اسبطرح مصلى يكت يم بعي گسٹ سکتا ہے مکن ہے بورو بائلن بولہت (urobilin-uria) موجود ہو مکمیونک للبعی حالت میں بائلی روہن قنائی غذائی کے اندر پوروبائلن (urobilin) میں تبدیل **بوجاتی** ^{بن} جس کا کنید حصہ براز کی مٹر کو بائلن (stercobilin) کی حیثیت سے ضارح ہوجا اسے لیکن بغنيه صعد قنالی غذا ميں دوبارہ جذب ہوجاتا اور مگرميں واپس **بوجاتا ہے جہاں وصفراف** سندس دوباره تبديل بوجاتا ب- أكركبدى وطيفين خرابي واقع بوتو وه دوران ون بن کل جاتا ہے اور گردول کی را وسے بورو بالمنومن (urobilinogen) کی میٹیت سے

طبعی مبرا نکوین کی بہت بڑی طاقت رکھتاہے۔ جنانچ اگراسکا ، انہد حصہ و ورکر دیا جائے ، توطبعی مقداً رخیدی منتوں میں پائی جاتی ہے۔ مبرکی بہت تھوڑی مقدار اُس کی تمام فعالیتوں سے لئے کافی ہوتی ہے ، چنانچ نمایاں تغیرات

میسے کے قلیل شکر دمویت ، مرض کے نہایت ہی شدید درجے میں پائے جاتے ہیں ، اور خفیف اقسام میں نام نہاد وطینی کا شفات کے زربعہ ، کرمکی کی بہت بڑی تعداد بیان کی گئی ہے ، کسیفکررفریقینی نیا بج مثال ہونے کا اسکان ہے ۔ ان میں سے جواہم آئیل دہ نیچے بیان کئے گئے ہیں ۔

كاشغه بان يعم ليويتولون (Levulose test)-اس كاشف كا انحصار اس تنیقت پرہے کہ جب لیو پئولوز عذائی ننال سے جذب ہوکر ہابی دون ناہ ين پنجيتي ڪُتومِر اُسے بعلم اخد کرليبا ہے اور اسى واسطے وہ نظامى دوران خولن میں نہیں پینچینے یاتی ۔اگر مکر منی ہوتز لیو یولوز اُس پی اِسطرح محبور نہیں رَبّی مَلِّه وه مگرکے اندرسے گذرتی ہوئی نظامی دوران خوان کے اندر جنیج جاتی بندا ور دُموی شکریں زیا دِتی پریداکردیتی ہے (الا صلہ ہو صغیر 462)- اِس کا شفہ کے عمل ہی لا نے میں لیو بیولور کی محرام کی معتاد دہن کی راہ سے لی جاتی ہے۔ دُ موی شکر کی تخین س سع پہلے 'اور بچراس کے نعمف کھنٹے 'ایک کھنٹے 'اور دو کھنٹ بعد کی جاتی ہے۔ لبعی **مالات میں کُن ہے کہ نہایت خفیف زیا** دتی ہو' جو ۲۰۶۰ سے کم ہوتی ہے۔ جنافیم اگردموی شکر ۱۰ د فیصدی بے تواک کھنٹے کے بعد ود ۱۱ رو فیصد کی سے زائر نولی لیکن اگر مکرکے وظیفہ میں خوا بی واقع ہوگئی ہے، جیسا کہ نا زلنی پر قان میں یا آرسینو بنيزال كتمتم مي بونامكن بي اتومكن بيكدر موى شكر نصف كينية من ١٥٠٠ فيصدي كب إلداكي كمنشك اختام ير ١٩ د. فيعدي كب برميماك، اجر بعروه بتدریج کم ہوکرمعولی درجہ پر آ ماتی ہے (70) - دُموی شکر کی زیادتی کے ساتھ سکا اكثريمويولوزمينابيمي ممودار بوجاتى بع اكيوكر كرده أسعب بالمداع كردتنا ہے ۔ اِس کا شفہ کا مقا الخصیف ذیا بیطس سے کن (diabetes mellitus) کے كاشف سيركنا جابت رطا مط بوصني 464)-ليو يؤلوركيطي كل كشوش (galactose) بمِي (.ماگرام ..م سي سي ـ پاني مين) ايك كاشغه كه طربر كام مي لائي جا تي ہے' يونو ملبي مالت مي إس معدرُ نوى شفر مي كوئي زيا دتى نبيل بوتى [،] يا زيا ده سعزيادُ ٣٠ و. فيعدى موتى الرجي بجول من إس سع لمندريا دتى ا و تك يان كئ سع (71)-اس کے استعال کے بعد کے مین مفنٹوں کے دوران میں بتاب سے اندر

ایک گرام سے کم کلکور موجد ہوتی ہے (72) کیا جد گھنٹوں کے دولان این اگرام ۔
میں ہے کہ کلکور موجد ہوتی ہے الفص کا کردگی برقان یا استسقا مرشکی ہے وقوع سے فل ہر ہوجائے ' جس کا بیان اب درج ہوگا ۔ اِستعنی مرمعض مخصوص کا شفا ' (Van den Bergh's tests) معذا ہی موجود ہیں ' پیصف وآل ڈن بُرگ کے کا شفات (Hay's test) 'موزائی طحات کے لئے تھے کا کا شفہ (urobilin) ' اور یورو بائلین (urobilin) کے لئے پیشاب کا امتحان (ملاحظہ حور صفحات 386, 386) -

يزقاك

(jaundice)

میں قائے سے نون کے اندرا براء صفراء کا دوران کرنام اورے ۔ زمانہ منی جمیں یہ اصطلاح صف بلدا ور مخالی اغتبہ کی اس زر دلوین کے لیے مستعلی تمی جو صبغہ صفرا ویہ سے بوباتی ہے ایکن اب یہ وسیح ترمعنوں بی تعمل ہے اور اِسکا الملاق اُن اصابتوں پرجی کیا جا آہے جن یہ تون کے اندر صفرا وی لمحات توموجود ہوتے ہی گرمبغہ صفرا ویہ ہیں قان صفتی تی ایک قسم ہے) علا وہ ازیران اصابتوں پرجی جن میں صبغہ صفرا ویہ اِنی خفیف مقدار میں موجود ہوتا ہے کہ اسکا رہی نہیں بیبا ہوتا (یں قان صفی)۔

علا مات مسبغه معفرا وید که رنگ کی وجسے جلد کی رنگت که وجیس کمری زرد ہوجاتی ہے 'کمنخات جشم زر د ہوجاتے ہیں 'اور مُر ٹی افشیہ مخاطب کا قدرتی رنگ زرد رنگ کی وجہ سے صریحی طور پر زمیم یا فقہ ہوجاتا ہے۔ کہنداصابوں میں جلد کا رنگ زیادہ گہرا ہوکہ بالافراس ہیں ایک سلسبزی اس یا بجوری زیری مجالک آجاتی ہے۔ اِسے پہلے سبنی یا سبیا کا یوف ان (green or black jaundice) کے نام سے تیز کرتے تھے 'اور اِس کی وجہ یہ ہے کہ مزمن اصابتوں میں باللی روبین بیعفہ صفرا دکا زرد صبفہ جلدیں تحدیدواقع ہوکہ بتدریج بائلی وردین (biliverdin)

کے اِنگرزی لاظ jaune 'jaundice سے افوذ ہے مس کے معف زروہے۔

عن طب - جلدروم

می تبدیل بوجات ہے۔ اِس زردانگ کواکن دورے لونی تغیر است میرزک اجامیے جو مالت مرض میں واقع بوجائے ہیں ، جیسے کا متلف عدم د موسیت (pernicious) مالت مرض میں واقع بوجائے ہیں ، جیسے کا متلف عدم د موسیت (malarial cachexia) کا بھیکا رنگ اکی خالتول کا ترکجی زرد رجگ ، طیر فی فی سعط (Addison) کے مرض کا جورا رنگ اور ورز در انگ جو ایک صباط کا بھیکا رنگ اور بیان اور گابریں ایک مسیفہ کمیار و بیان (carrotin) کے باعث ہوتا ہے ۔ موالمت بھیلات نوب ہوسکی بیرونی بیرونی میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں میں میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں میں دیگ کی شامند تو بیرونی میں میں میں دیگ کی میں دیگ کی میں دیگ کے دیا ہوتی ہے۔

یرقان کی بینی اصابتون بر براز کا رجگ برائر سیبری مائل یا ممیا ہے رجگ کا ہوجاتا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ برقان کی اُن اصابتوں بی بن بی مبغراء اثنا عشری کے نہیں بینچنے مایا برازم برجر بی کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے ورلوز ہائین نهیں ہوتی ۔ عال ہی میں یہ تبلایا گیاہے کہ معوی ما فیہا کسیفدر رُرشنی ہوتے ہیں او چر نی کا انجذاب آیب ایسے مرکب کی کل میں ہوتا ہے جو آزاد تھی ترمشہ اور صغوا وی ترشول سے بنتا ہے۔ نیز صفراء کی موجود گی خالبا گندیدگی کو روکتی اور معوی دیوار کے منطی پڑول کومہینی کرتی ہے۔ جنا بد نبض اکثر موجود ہوتا ہے اگرچہ یہ ضوری نہیں کہ وہ ہمیش موجود ہو۔ سب اسہال واقع بوتو اُسے گند بدگی دار براز کی فراش سے مسوب کیا گیا ہے۔

یر قان میں اکثر دو سرے علامات بھی موجود ہوتے ہیں ' جو نون سکے اندر صفاوی لمحات بدہیں ' جو نون سکے اندر صفاوی لمحات بدہیں ؛ (۱) بطوالقله مسفر اوی لمحات بدہیں ؛ (۱) بطوالقله نسم آہستہ ہوکر فی منٹ بچاس یا چالیس ہوجاتی ہے ۔ (۲) تھجلی ۔ یہ اِستدر شدید ہوگئی ہے کہ سونا نوم کون ہوجاتا ہے ' اور لگانا کر معبلانے سے ون کی پیر پیاں ' بتور ' یا سنت پی

بعض مرتضول میں مندکا مزاکر وا آبوجا آب اوراکہ اختلالات اضمہ واقع ہوتے ہیں ، ورخمول سے ہوجاتے ہیں ۔ مِلدے نیچ یا مفاطی اغشید سے در فات واقع ہوتے ہیں ، اورزخمول سے اوراء سانی سے نہیں رکتا ۔ فوان کا عمد ترویب لول ہوجا آب ۔ بعض مرتضول میں خطرا داخی علا مات بیدا ہوجاتے ہیں ، شکل نہ یا ن استخبات ، اور قوما لیکن فائ یہ ہمیث خوان سے ملا وہ ہوتے ہیں بوض کو رو در کھا فون سے ملا وہ ہوتے ہیں بعض اوقات مشاہدے میں آ آ ہے کہ مریض کو زرو دکھا فی دیمی کو رو دکھا فی در میں ایک مریض کو زرو دکھا فی دیمی کو رو در کھا فی میں ایک مریض کو زرو دکھا فی دیمی کر میں ایک میں را طاف میں مومیا آ ہے میں ایک میں دیا ہے میں ایک میں دیا ہے میں میں دیا ہے میں میں دیا ہے میں دیا ہے

به المن که اور اس معلی کا شفا مهدل که اندرصبغه مهفهاوید که این وان که ن برقال که که ندر بریاتی کا شفا مهدل که اندر صبغه مهفها وید که وجد کی ظام که اندر مبغه مفرا وی کی موجد کی ظام که اندر مبغه مفرا وی راستون که تسدد کی وجد سع فون که اندر محبوس بو اور اس مبغمی جو صغرا وی راستون که تسدد کی وجد سع فون که اندر محبوس بو اور اس مبغمی جو کم پاشیدگی کی وجد سع بو اتفریق کردتیا ہے ۔ اندر محبوس بو اور اس مبغمی جو کم پاشیدگی کی وجد سے بو اتفریق کردتیا ہے ۔ آبر لک کا ڈایا روکاشف اسمام منافع کی مبار ایس که ابزاری بین در (الف) سلف انگلک ایسٹر (Ehrlich's diazo reagent) گرام اس که ابزاری بین در (الف) سلف انگلک ایسٹر (sulphanilic acid)

ریخز با مڈروکلورک آئیسٹر (couc. HCl) ۱۵ سی سی آب کشیدہ ۱۰۰۰سی سی ۔ اور ر مب اسوۋينم نائمرائث (sodium nitrite) د مرام اسكشيده ١٠٠ اسي سي لان دونوں کو کہ متعال ہے ذاہی پیلے اِس تناسب میں کہ را لف عجد ۲۵ سی سی تھے سے تع (ب) کے ده و و مسى سى بول ، با بم طالبا ما آجے - راست تعمامل direct) (reaction) واليعانون سعام جيد مُعلم اركمكر تعكر عمر العائد اليام عبين عمر معسل عمل کیا جا تاہیے اوراً سے مندرجُ 'الا کا شف کے ایک سی سی س طار را مباتا ہے۔ اكيه مَلِكُون مُفعَىٰ رنگ كا تعالى فى الغور تَروِع بوكر دس ما تيس سكندُ تي التينے اعظم درجة كك بينيع ما آجے - إس سے تسددى كبدى يرقان ظام ربوتا ہے - أكر استقام ماصل نبوتوممَن بِرِكاكِ تعالمِي آجل (delayed reaction) كل هر بو مس كا آغاز ایک منٹ کے بعد بُوتا ہے۔ یہ دُم پاکشیدہ پائٹی اورساری برقان کے باعث برتا ہے۔ دو بہیتے تعالی کے باعث برتا (biphasic reaction) شروع توفی الفور بوجا آ کے نکی محض المهتة مته تموياب بوتاب اوراس مع مغلوط تسم كعيرقان كي موجود كي ظا مربع تيج بالواسطة تعامل (indirect reaction)، - أكراست يا لا واسطرتعال مال نهؤتدا كياسى سى معىل بي 41 فيصدى المحل كهراسى سى سنا ل كركم اس ميزوكا إمغاض عن ميں لايا جاتا ہے۔ إس معاف اليم كه اسى يسى ميں ه^{وء} سى سى الكحل *ور* ۵۷ و . سی یسی کانتف کے ملا دیسے جاتے ہیں ۔ ایک بنفشنی سرخ رنگ ماسل ہوتا ہے' جوتغريباً في الغورا منكم شدسه كا بوجا ما يه، اوراس سعدم بالشبيده ياسمي يا سارى يرقان طا ہر ہوتا ہے ۔ يركاشفات كمي طور يريمي كئے ماسكتے ہيں (73) . لمبعي جولائی ٢ و٠ -۵ د. اکائی بوتی ہے ، اور اکائی یہ ہے کہ بائلی رومین ایک جیسہ ۲۰۰۰۰ جصے یں ہوتے ہے قاروة مين صبغه صفراوميه كم لاكاشفات والكاشفا ی مقیقی خصوصیت به سے کررو با لی روین (bilirubin) کی تحسید بو کرمبز با کی وردین (biliverdin) بنجاتی ہے اور ایک برزیک بیدا موجا آ ہے یعبن اعمال من ورب رگوں کی جسک بھی ما رضی فرر رنمودار موجاتی ہے - میلکا کاشفہ (Gmelins test) مب ذیل انجام دیا مالک و ایک سید معند برقار دره سے دید قطرے رکھ کو اس قریب بنی قدر مصطافتورنا تیرکوک آیید کر کمیکا دیا جا تیا ہے ' ا ور میران دونوں سسیا لا ست کو

آبسته سے ایک دورے کی طف بڑھایا جاتا ہے۔ اِن کے فیط تماس برقارورہ کا وی گئی۔

سیار بڑی نیلا پیمنفٹی پر برخ اور بالا فرزر دیا بھورا ، بوجا اُجے۔ وافغل (Ryffel)

فی اس کا شف کی ایک ترقیم دربا فٹ کرلی ہے جس سے مبغط صغرا ویہ کی نہا بیلین مقداروں کی مشنا عت ہو گئی ہے۔ فارور ہ کو آئونیم طورا ٹھ سے سیرشد و بنا کر میر امونیا ہے اُسے قلوی بنا لیا جاتا ہے ۔ اسطرح ہے آئونیم بوریٹ مرسوب ہوجاتا ہے اور اگر کوئی مبغہ نسخ اور موجود ہے نواسے می ساتھ لیکر وانشین ہوجاتا ہے۔ اِس کی کا تو تقطیر کرلیا جاتا ہے اور تقطیری کا مذیر یا تیما ندونفل میں نا کرک ایس کے طا یا جاتا ہے۔ ہرازی پر ایوجامی نواس سے صبغہ صفرا ویہ کی موجود کی فلا ہر بونی ہے۔

قارور المار ملات صفاء كى شناخت كے لئے ہے كاكاشِعا (Hay's test)اسطرے عل میں لایا جا آسپے کہ آبیہ جیوتی سی مخروطی مراحی می کہ حبکو ما نب سے منور کیا گیا ہو' تاز و فارورہ کی سفح پریسی ہونی گندهک جمر کے جماتی ہے۔ الرملى ب صفرا موجود ہيں توسطي ننا وُكم ہونا ہے اور گندھك ڈوس مانى جے جب محند ممک یا بنج منٹ کے اندر ڈویب جائے تو برکا نتفہ فٹبت بھیا جاتا ہے (71) ۔ کاپشنہ يبلن فابل اعتاد مجها جاماتها اليكن اب قابل وتون مجها جاما يدا عمر بأسوقت . معى ماس بوما ما جد جبكر وغن جينبك ل (sandal wood oil) كوبيريا (copaiba) كباب عيني (cubabs) اور تارين (turpentine)ك بري مقداري براه وين فيكي ہوں ۔ آئن کے اندر محاب صغرائی موجود گی کے لیے آئی کا شفہ بیان کیا گیا ج (74) ، من كا الحسار إس نتبقت يسهدك وه جربي كم مندب من آساني بدا كردسين بي -ا مراضياً بيرفان بأبي دوم في شكلول مي موجود موتى هه : - يعينه (1) أيك قلوی نمک کے کوریر، جو صفرادی ریگذروں کے اندرخارج ہوتا ہے۔ اِسس سے وآن ڈن بڑک کا داست تعالی حاصل ہوتا ہے۔ (۲) آزاد ترشہ مے کور پرج تون میں دوران کرتا ہے، جس سے وان ڈن برگ کا بالواسطة تعالی ماصل موتا ہے (77)-یہ امریبلے بتا یا جا جکا ہے کہ با کی روہین کی پیدائش کے بلتے مگر کی ضرورت بنیں اور يه إس واقعيسيے بي ظل مربوما ہے كہ برعبغه مقامي طور پر آخو كئے تعلول سے مبرم ميں مرجگہ بنها مَا ہے۔ میش بکی درول مکی نظام حرکہ مانلی رو بین کو بنا ماہیے ، اگر اسکے ذریعہ اکتس سکے

(۱) دُم پاشید کامیر فان (hæmolytic jaundice) وه گروه می جسم مین این ام کا دموی مرض می شامل ہے کیونکہ اس مین نول کے بہت زائد اللف کی وجہ سے اللی رو بین مسل کے اندر موجد ہوتی ہے۔ اس گروہ میں ہوتان شامل ہے وکہ دوری ہی گورن بولیت (paroxysmal hæmoglobinuria) مناقف فول کے انتقال مین کو بین کو بین اور مین اللی کے انتقال کو فینائل بائیرازین (phenyl hydrasine) کے تسمی مناقف فول کے انتقال کونی فات الرمیم کو بیا اور برقان نوزائید (icterus) رم پاش هفونت بائے دموی کونی فات الرمیم کو بیا اور برقان نوزائید (pernicious anæmia) کو می بعض اوقات شامل کیا جانا ہے کہ بیکی اس میں بائی رو بین کے جسم ہونے کا سب فالما میں بین اس میں بائی رو بین کے جسم ہونے کا سب فالما میں بین اس کی بین کو بین کے جسم ہونے کا سب فالما میں بین کو بین کے بین کو بین کی کوئین کم ہوتی ہے۔

رغیب دراب بحرایتی سموم بسید کتب راجد (relapting fever) علمواً گروو می محوقه (enteric group) المائنس (typhus) اذات الرسد انفلوئنزا المنظوئنزا المنظوئنزا المنظوئنزا المنظوئنزا (leptospiral نجیف هرغولی برقا (yellow fever) معفونت الدم شجیف هرغولی برقا jaundice)

(r) تستندى كىلى خان (chetructive hepatic jaundice)-

اس گروه میں صفراوی قنا توں کا کوئی صریح تسدد موجود ہوتا ہے: - (۱) منگہا ہے معفراً اورمغلنط صغرا انهايت شازاصا بتونس كييب (hydatid) اكبدى فلوك liver) (flukes) اورمعوى فنال سے آنے والے اجسام غربین جن حراطینی محتف الا (Ascaris Lumbricoides) المي شامل إن - (٢) قنات كاتضبق ما انطاكس پيدائشي عيب باينه نُفتي كه با عسة، يا اثنا عشري يا خود قناتِ صفرا دي**مه ما قبل تغرير ح** كى وجهسه - قنامت مىفرادكى دايواركانا زلبنى يا التها بى ورم ما يعرامان - قنات كاتسنج -(۳) با برسے دبا و بلنے کی وحدسے بچکاؤ ۔ برشق یا بی میں سکے خدد کے وہا وُسے ۔ لبلبه كيمور ومعدف ولون كردول الركب بينين الأح كصلعات كعدوا وسي جرك بورك إكيسه كدوا وسيشكى أنورسا المجتمع بإزاا إحا لدرم ميا إوسة واتحع ہوسکنا ہے۔ زیددی کبدی برخان کی ہہت سی اسا بنول میں صفرا دامرارہ اور صفراوی قنانول کومنمدد کردیا ہے، اور پیرمون لمفائید اور عوق دمویہ محاندا دا خل ہوکر آخرال کرکے اندر دوران کر اسے اور مبلد اور دو سرے حصول کو میفراء کے معصوص وميزرنك سے ملون كردتيا ہے - غالباكا ال تسدد بونا ترونبي جيكور يە ركىپىپ دانغە جەكەمىغرادكا افرا زىها بىت ا دنىٰ د با ئوكىتىت بوتا جە، جو ا ننا كم بوتا ب كيني برمب ياني كم ٢٠ ميني مبركا دباؤمفرزه صفراء كودوران خون واب بمیجدیگا - کال تسدد کی مالت می (جیسی کمشترک قنات کے اندرابک منگر میزاد سے یا اُس بردماؤڈ النے والے ملعہ سے پیدا ہوجاتی ہے) صغراء آسوں کے میس میں اورراز عباكريه بانكياكيا به سيدامي كورك كابوام بمباكريه بوجانا بي توملامات غائب بوجاني ب

اگرچ يرقان كى إلى قسمول يركس سع بېلى اور تيسري مداف طور يرمتغرف مجملى

پی (کیوکو اِن سے فان ڈن برگ کے بالواسلہ اور است تعالی کی الرتیب ماسل ہوجاتے ہیں) میکن معامرے کردو کے افرا دسے عمر کا دوہ نی تعالی کا کی ہوتا ہے۔ گرمشتہ نما نہ عربی اسی اصابتہ کے برقان کا سبب نسبتہ جموئی معاوی تناتوں کا البتهاب مجمعا جاتا نخا 'اور اسواسلے ایسے برقان کو تسروی جمعة تھے لیکن بُرونے والبتها کا اس رائے پر اعراض کر اسدا اور تلا آب کہ بعض اوقات مرف کمی البیم اور الله کا البته کا البته کا معاقب مرف کمی البته کا دوران خون میں میں اوران خون میں ہوتے ہیں 'اور میں حف میں اور الله کا میں موقان کی دوسیس ہیں کا بدالیتنا خود کر بدی ملآ ہے۔ اور الله کا میں موقان کی دوسیس ہیں کا بدالیتنا خود کر بدی ملآ ہے۔ اور الله کا میں موقان کی دوسیس ہیں کا وف شدہ ہوتے ہیں (۲۹) ۔ وہ 'س برقان کی دوسیس ہیں کا در یہ اور الله کا میں موقان ہیں دوران خون میں اور یہ اور الله میں میں دوری فاسفوی ہیں گروہ سے کا در اور استرازی میں میں دوری فاسفوی ہیں (۲۶) ۔ وہ 'اور یہ اور یہ اور استرازی کے درسیس ہیں کا در میں کا در استرازی کا در کا کہ کا در کیون کا دوری فاسفوی ہیں کہ در کیون کیا در کا در کا در کیون کا در کا در کیون کا در کا در کا در کیون کیا ہوئی کا در کیون کا در کا در کیون کا کو کا کون کیون کیون کی کا در کیون کی کا در کیون کا کون کیون کی کا در کیون کا کون کیون کی کا در کیون کی کیون کی کا کون کی کا کون کیون کی کا کون کی کیون کی کیون کی کا کون کی کا کون کی کون کی کا کون کی کون کی کون کی کا کون کی کا کون کی کا کون کی کا کون کون کی کا کون کی کا کون کی کا کون کی کا کی کون کی کی کی کی کی کی کی کا کون کی کا کون کی کا کون کی کی کی کی کی کا کون کی کا کون کی کی کی کی کی کی کی کون کی کا کون کی کا کون کا کون کی کا کون کی کا کون کی کی کی کا کون کی کی کی کا کون کا کون کا کی کا کون کی کا کون کی کا کون کی کا کی کا کون کا کون کا کون کا

فعنی پرقان (latent jaundice) کے یہ بعض کے اور میں کہ اور میں کا فرائی روہ ین کا فرائی کا فی بہیں کہ تنہیں زرور تک بدا کرسکے یا گردوں سے بائی روہ ین کا افراج کواسکے۔اسی اصابتوں میں قاروں سے مائی روہ ین کی تنبدل بیئے۔ تو جو خالب با فتوں کے ذریعہ سے بائی روہ ین کی تنبدل بیئے۔ تو جو خالب با فتوں کے ذریعہ سے بائی روہ ین کی تنبدل بیئے۔ تو جو مائی ہوتو مائی ہوتوں ہے۔ تا ہم یہ امریا ورکھنا چاہئے کہ جب بائی روہ بن بولیت نمسایاں ہوتو یورو الملین بولیت نمسایاں ہوتو یورو الملین بولیت مام طور پر مفقود ہوتی ہے مضی پرقان مرض قلب بی موجود کی تناف عدم دیو تو اور اس سے فشل قلب کے آغاز پر دلالت ہو کئی ہے۔ اس کی موجود کی تناف عدم دیو تو کو اس تا نوی عدم دیو تا بیٹ سے جو نزف کے باعث ہو اور می ہے۔ اس کی موجود کی ہے سینو بندال کو اس تا نوی عدم دیو تو بندال اس امری امراض بی کھنی برقان اسس امری دلالت ہو کہ کو نقصان مہنوا ہے کہ بہت میں وہ بندایت مام فور پر ہوجود کی است میں ہو دو بندایت مام فور پر ہوجود کی است میں ہو دو بندایت مام فور پر ہوجود کی است میں ہو دو بندایت مام فور پر ہوجود کی دوروں کی

كونى علا الت نبلين بوقع . مبغة سفراءيه عياك وأن ون رك كدبالواسط المخالف

(intective jaundice) ، جس مب ایک مدیح خبع رابیت موجد دموتا میدا ورتیش بند درجه پر میدتی ہے .

إستسقائه سمى

(ascites)

اس مطلوم سے كهفة ماريطونى كاندرمسلى سيال كى موجودكى مرادي . تصلی کہنوں س کے دوسرے انسابات کی لحرج یمنی عموماً قلوی ہوتا ہے' اسکارنگ يميكا كيوال كير بنك مبيها ' اوركتا فت اضا في ها ١٠١٠ موتي ہے ' برنها بيت البيومني بوتاب اورسيس كلورائدزموجود بوئه بير - يه اساب فربل كي وجر مست يداً بعوصا كاب و . (١) ما بي دوران نون ك تستدريد . جوور بدالهاب كه نعد مِن مونا مِرك اندراس كى توزيع مي مو- (٢) امراض بارسطون تعنيع محم طورید۔ اور (۳) مرض کردہ کیا مرض قلب سے استعقائے کی کے جن و کے اورید۔ وربدالیاب کاتنه ، شق بابی می رسولیول اور برسص بوئے فد د کے زبار سے ، خود جگرتے اندر کے مرطان ، چوڑے ، پاکسیہ سے ، یا وریدالباب کے اندر نون كى ترويب (علقيت، النهاب وريد الباب) سيمستدر وسكا مد. جُرُمِيں بابی تستدد کا خام سبب کہست کی تینی بیش البید کی سے بین نفتکی اُ وردو کا انضغاط ع يعضول كاخيال حدك بالى تسدد استسقاء شكى كاكافى سبب بين بوسكتان اور وه استسفامشكي كوان سميات مصنسوب كرنے بيں جوم^ن وگرمي بيدا بوملتے بن ا نت سے مِذب بور مِر من لف نہیں ہوئے - بابی سرد کا آب دومراسب النهاب خلاف كبد ب نسددى اكب تسرى فسم فلب اورس ك امراض كى منتف قسمول مصيبالم موجاتى ہے، جن من قلب كى دائيں مانب مسع ہوجاتی ہے اور نون کے سینہ میں سے بورگزر نے میں مزاحمت ہوتی ہے (ملاحظ ہو منغ 146)-

استنتائشكى بيداكرنه والد بارمطونى امراض يه بي ،-ما ، اورمسنرى التهاب بارمطون الرماد المرطون - المرسندي التهاب بارمطون المرسال المرسلون التهاب بارمطون المرساد المرساد

مرض برائبيث بين د ومريح مسلى كهنون تحدسا تقدسا تفه با ربيلجون ممح آل فصيا

مِععی ا ماراستهٔ شکم طابوها تا ہے، اور زیادہ استناشکی ک**ے ابتا ئی دیو** مِن وه ممواً نماره مِوَلِه إِنهُ اوراً لَى كُنْ كُلُ مُلومِيهُما أَمِد فِي كَا رَجُوان رَضِي بِهِهِ مِس مِن سامنے کی سمت آیک قطعی اُ بھار ہونا ہے۔ ازان بھکٹکم کی دیوار پر لیٹنچکر عیبل جاتی ہم، اورجب مریف *بستریں لیٹا ہے توسیّال توتِ جا ذبا*کے اٹریسے بی**تھے کی طرف ر**کم مرتبلوم مع موماتا ہے، جس سے بیٹ کی شکل زیادہ پوڑی اورزیادہ جیمی ہو ماتی ہے۔ اِسوقت جومائع ببدا ہوتا ہے اُس کی مقدار سو 'مم' یا ھکیلن ہوسکتی ہے' اور راسی تناسب سے بڑا ہوما تا ہے بینانچہ اُس کا محیط ہم تا ۲۲ ایجہ ما زائد بوسکتا ہے کیسٹال کی موجود گی امتحان کے میں طریقوں سے معلوم ہوسکتی ہے' جو قسرع'

ا ورا ننوں میں ہوا موجود ہوتی ہے لیکن مبہستیال پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلے پہلو**ول و**ر ختلی عظمیں مع بوما اے اپنانجران صول کے قرع کرنے پر ایک امتم اُ واز مکلق ہے، ورآنحالیک شکم کامرزی حصاکمی رہاہے ۔اگر میض کوئنی آیک کروک میمراکر علوم ہوگا کہ ایکے اور مرکزی خطّہ اصم ہو گئے ہیں' اوروہ ہیلیو' جو ب ہے اوپرہے گلگار ہے ۔ اِس کا سبب یہ ہے کرستال قوت ما ذہ کی وہ سے اسفل ترین مصدی به ما تا ہے اور ہوا سے بھری ہوئی آئنت بلند ترین مصمین تیریح لگتیہے اورایسا ہونا بار لیون کے اندرستال کی موجودگی کا س ۔ سے زرا دہ محتوت ہے، اور استسقار شکی کے لئے نہایت ہی نا زک کاشغد ہم بہنجا آ ہے

تمق عامل كفاك طريقه يرب كشكم كي الك مانب را ما اِوردور ِ رَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَي اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي شكرير ركف بوئ الفكوشكم كواريارا تقال موج كاأمياس بواجد بدامارت متذكره صدرا ارت كي نبت كم يقيني به نهايت وبلي شكى ديواريسيال كى

موجود كى كد بغرجى أنتقال موج واقع كرسكتى بين بنائي اس كوروكف كدا تموج كى

آزائش کرتے وقت ہا تھ کی ایسی کتاب یا دفتی کی کوٹ کم محد مرز میں دکھدنی چاہئے۔

(نتقالِ موضع کے طریقہ کا استعالٰ میں محدود ہوتا ہے الیج بعضائی استعالٰ میں اس سے استسقاء شکمی کی شہا دہ اُس سے بہت مبدر طبی ہی ہوا ہوتو وہ یا تھوج کے ذریعے لئی کی شہا دہ اُس سے بہت مبدر طبی ہوا ہوتو وہ یا تھوج کے ذریعے لئی ہے۔ اگر اِستسقائی کی کمی اساست میں جگر فرعم ا ہوا ہوتو وہ استسقاء شکمی ستیال میں دوس جانا ہے اور سیال کی تعول کی مقارراً میں کا گلی سلم محسوں ہوسکے اور دیوا رشکم کے دریان واقع ہونی ہے شکم کے اِس مقام براُ نگلی ان رکھکو اُن محسوں ہوسکے اور سیال کی موجود کی کا ایک تبوت ہے کہ کرکی سلم محسوں ہوسکے سے ایک موجود کی کا ایک تبوت ہے کہ کرکی اُن کی کوئی سیال ہوتا تو جگرا گی دیوا۔

میسیال کی موجود کی کا ایک تبوت ہے کیونکہ اگر وہ ل کوئی سیال نبوتا تو جگرا گی دیوا۔
میسیال کی موجود کی کا ایک تبوت ہے کیونکہ اگر وہ ل کوئی سیال نبوتا تو جگرا گی دیوا۔

کیکونیم او قامت منگف لاقسام دُورون میں سے کسی ایک تیسم سے ہوشکی
یا حوسی احشاد کے ساتھ نعلق رکعتی ہو'یا حال رحم ہے'یا متمد دمثائہ بولی ہے۔
استہ قام بھی کا تشابہ ہوجا آہے۔ یہ دُورے مبضی' رمیضی (مبضی (parovarial) کیسین اور کلوی دویرے ہوتے ہیں۔ اگر قری کا شفہ کا میاب ہے تو یہ خارج از بحث ہوجاتے ہیں۔ اس کے ملاف مکن ہے وہ تموجی کا شفہ کا میاب ہے تو یہ خارج از بحث ہوجاتے میں۔ اس کے ملاف مکن ہے وہ تموجی کا شفہ کا میاب ہے تو یہ خارج از بحث ہوجاتے میں ہوگا ہوگا ہوں ہے کہ ان اس کے ملاف مکن ہے وہ تموجی کا شفہ کا میاب ہو کہ ان اس کے ملاق میں ایک میں اور ایسے استہ میں کہ ان ایس کے میاب کی میاب کے میں ایک میاب کے میں میں ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے بیالے ہونے والا ورم دبار میں میا دیتا ہے کو بعد میں مرکزی ہو بال میں ہوگا ہے کہ بعد میں میں ہوئی دیتا ہے (یہ ورم ایک میا نب پر شروع ہوتا ہے کو بعد میں مرکزی ہو بال ہے)۔ نیز یہ جی شاف نہیں کہ دُورے کا خاکمی سے اوپر والے حصد میں شناخت میں ہما ہے۔ بانحصوص جبکہ اس کی جستجو مرکات بندس کے دوران میں کی جائے۔ آما تا ہے کو بالحق میں جبکہ اس کی جستجو مرکات بندس کے دوران میں کی جائے۔ آما تا ہے کو بالدی میں کی جستجو مرکات بندس کے دوران میں کی جائے۔ آما تا ہے۔ بانحصوص جبکہ اس کی جستجو مرکات بندس کے دوران میں کی جائے۔ آما تا ہے۔ بانحصوص جبکہ اس کی جستجو مرکات بندس کے دوران میں کی جائے۔ آما تا ہے۔ بانحصوص جبکہ اس کی جستجو مرکات بندس کے دوران میں کی جائے۔

میلوسی اورکیلوسی الشکل استسقاء مشکمی chylous)-

(and chyliform ascites استشائی اصابتوں میں کہند با رکطونی کے ندکا سیال بچائے صاف مسل مجے دصند لا دو دھیے رنگ کا ہوتا ہے۔

بعض اوقات بیاربطون میں قفات صدری یا لبنی عودق سے کیلوسس کی وعا بدری عودق کے انتقاق کی وجہ سے

بوتی ہے، ان کے تسدد کی وجہ سے بوتی ہے جوکہ مرض یا طفیلیات کی موجد کی (طاخطیم فلاربت =filarinsis) کا بیتجہ بوتا ہے یہ بیت نیک کیا وسی استسفاء شکی ہے ۔
ایسی حالت بین سیال کا رنگ زردی مائل سید ہوتا ہے 'اس کی کٹا فت اضافی ایسی حالت بین سیال کا رنگ زردی مائل سید ہوتا ہے جولی جارہی ہو ربیال ممرار ہے تو اس کی بربی جدا بورسطح برایک طائی جیسی ته بنا دی ہے۔ خورد بین کے ممرا بورسطح برایک طائی جیسی ته بنا دی ہے۔ خورد بین کے مسلم سے میں میں خور میں کی ایسی میں میں میں خور میں کا ایک تعلی بنجائے۔ میں جسم سے میں کو اس میں فائین بن کا ایک تعلی بنجائے۔ میں میں فائین بن کا ایک تعلی بنجائے۔

ان اصابتوں کے ایک دوسرے گروہ 'بیسے کیدوسئی النکل سنسقائی کیا ذہ کیا دہ سی استسقاء شکی (pseudo-chylous ascites) میں سیال خاص دود سی سید ہوتا ہے اور اس کی کا فت اضافی ۱۰۱۲ سے کم ہوتی ہے۔ بربی کی مقدار نفلف ہوتی ہے اور اس کی کا فت اضافی ۱۰۱۲ سے کم ہوتی ہے۔ بربی کی مقدار نفلف ہوتی ہے اور اس کی کرد مسلم پرائیس کا دود صیابی تربی کے بعیب سیسے معنی اس کے خفیف سے آثار ہوں لیکن ہرمال اس کا دود صیابی جربی کے دقیق نہیں بربی اور کا بولین (globulin) کے آب مرکب کے دقیق ذرات کی وجہ سے ہوتا ہے نہیں ارضوی عنا صرعو ہو دل کھے ہیں۔ لیسی قیبین کی موجود کی کی وجہ سے بیسستیال جربی دارضوی عنا صرعو ہو دل کھے ہیں۔ لیسی قیبین کی موجود کی کی وجہ سے بیسستیال گند درکی سے عرصہ دراز تک متنا ، ٹرنہیں ہوتا ۔

مزین التهاب پایگیا ہے۔ اور مام طور پر انگر رُبُرا ہوتا ہے۔ مکن ہے کہ کیلوسی اور کیلوسی الشکل مائع دونوں دوسرے مسلی کہفوں میں جی ہزمال طور پر ببدا ہوجائیں۔ اور جب کک کہ ایک یا دوسرے کہف پر بزل کاعل ذکیا جائے یہ معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعے نہیں کہ آیا انصاب اسی قسم کا ہے حوز رسمت ہے۔

ليكن إن اصابتول كي أكثر بيت بي يا توجير كا مرطان ، يا مدرن اكسيت ويوروسه كا

لیلوسیٔ انشکل انصبا بلیت کسی ایک مراضیاتی حالت سے ممتز نہیں ہوتے '

حکرکے امراض خراج

امراضیات عمرک بود کسی من عامل که داخله کی دجه سے پیدا ہوجائے ایس ' جومندرج فرقی راستوں میں سے کسی ایک کی راوسے داخل ہوجائے: یرشوان کرد ورید الب اب 'یاتفتی التہاب قناتِ صفرا (suppurative cholangitis) (جو ملاحظہ ہو) میں صفرا دی قناتیں ۔

بہلی حالت میں وہ ابیعام تعبیج الدم کا ایک بزوہوتے ہیں ، جسا کرمسے کے اسی حقے میں زخم یا تصدیر الله سے بدا ہوجا آ کہے ۔ کسی حقے میں زخم یا تصدر لکھنے سے بدیکن بالخصوص مرکم تضرات سے بدا ہوجا آ کہے ۔ وہ جوئی جسامت والے اور بے شار کی یا کم از کم متعدد ہوتے ہیں اُنکو تفقے المد کی خی اب راب (pyæmic abscesses) کہتے ہیں۔

وربدالباب إس سے می زیادہ تعداد کی اصابنوں میں خراج ببدا ہونے کا اعتبہ وتی ہے اورجیسا کہ تنبی الہا اب وریدالبا سب وریدالبا سب میں (جو طافطہ ہو) اور مدارینی زمید میں (pylephlebitis) کے بیان میں درج کیا گیا ہے 'عفن ما طات وریدالباب کے رقبہ میں کے ضرات سے نتال ہوجاتے ہیں۔ یہ بجورے منفرد 'چند' یا متعدد ہوتے ہیں۔ میں کے ضرات سے نتال ہوجاتے ہیں۔ یہ بجورے منفرد 'چند' یا متعدد ہوت ہیں۔ جب یہ متعدد ہوں تو اس حالت کو جابی نقیقے اللہ میں احتاج ہوں تو اس حالت کو جابی نتائی تا میں نکستہ وربخہ دی تھے سے پر ہوتی ہیں اور وربد کی دیواری طرب ہوتی تعقیمی التہاب وربد کی دیواری طرب ہوتی تعقیمی التہاب وربد کی دیواری طرب ہوتی تعقیمی التہاب وربد کی دیواری طرب بہدا

النهاب وربدالباب سے ہوتی ہے اُن میں یہ دکھلانا آسان ہوسکتا ہے کہ تنتیجے زما وہ تر ور بدالباب کی توزیع کے مریس واقع ہے ۔ جہال بچوٹرے مگر کی سطح کے قریب بہنجا ہے تہ ہیں، مگر کا کیسہ اکثر المتہب ہوتا ہے ۔

تشخیص و اِس کا اِنصار اِس مَقیقت بِرَبُونا مِا جِن کر برُصا بوا مجر ایس مقیقت بِرِبُونا مِا جِن کر برُصا بوا مجر ایس ما دعل سے ما دعل سے ما وُف ہونا ہے ' بالنعوم اس کے سانے شد برغمو می الدم ہوتا ہے ' بالنعوم اسوفت جبکہ اِن علامات کے ساتھ کوئی ایسا ضرر سی بوجو بطولا قل برنیا خت کر بیا ہے ۔ مشنز علاماتی بونا جا ہئے ۔ تغذیب کوئین اور مہتیات کے ذریعہ سیے عام صالت کی اصلاح کی کوشش کرنی جا ہئے شخفیف در دکے لئے افیون ورمتا می لاستا ایون ورمتا می لاستا ایون میں میں میں میں کردہ ہوگی ۔ پولٹسوں سیکیدات ' وغیرہ کی ضرورت ہوگی ۔

معمولى سارى كبدى رقيان

(common infective hepatic jaundice)

[نازلتی یوفا (catarrhal jaundice) خاد التهاج کر (catarrhal jaundice) یا دانتی یوفا نازلتی یوفان می ایک شکلول مین ایک شکل به که جن مین برفسان واقع

ہوتا ہے۔ نا زلتی برقان کا نام اس احتقادے بیدا ہواکہ برصغراوی حلیمہ کے مقام برستور پیدا ہوجا نے کا نیتو ہے جو کو کو رصی مخاطریا غشاء مخاطی کے ورم سے واقع ہوتا ہے۔ یہ نامکن نہیں کہ بعض اصابتیں اسی مسم کے سبب سے ہوں ۔ بعض اسباب ۔ ساری کبدی برقان الخصوص اوال زندگی میکٹر لوقو

معت اسباب مساری کبدی برقان الخصوص اواک زندگی میکنیلوقد هم مکن هدک اس که ساخه معدی اثنا عشی نا زلت که ملامات موجود لمیس ساری کبدی بیقان که ساته اکثر برقان کی ائت مورث لول کوجی شال کرمیا جا آجه جوفوف کی وجه سه بومانی میں ان که خاص مظام تو بهرطال ساری کبدی برقان سه ماثل کی وجه سه بومانی میں ان که خاص مظام تو بهرطال ساری کبدی برقان سه ماثل

ہوتے ہیں۔

معولی ماری کبری برفان اکترو باوس کی صورت میں دکھاگیا ہے جبکہ اس کو ای کی سورت میں دکھاگیا ہے جبکہ اس کو ای کی سورت میں دیا تا است میں وہاؤل میں سو بہت می وہاؤل میں صوب بحوں پر بالے است اس وہاؤل میں مرف بحوں پر بالے است اس میں مرف بحوں پر بالے است اس میں بالغ است اس میں مرف بحوں پر بالے است اس میں برفیوا ہے۔ تسبید کر کہ میں اور اس اس میں برفیوا وی گذرگا ہو معلی نہ کرنے کا موقع اللہ وہائی اس میں کی وجوادا لہما بالے کہ اور اس میں کہ وجوادا لہما با میکوس طور پر صفرا و کر باک ہوئے ہیں کہ وجوادا لہما باکہ کو میں کہ وجوادا لہما ہے کہ کہ دی افراز سند ہوگیا ہے کہ میں کی وجوادا لہما با میکوس طور پر صفرا و کے بہاؤ کو دو کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور اسطرح چندا صا بتول بی سبب موض ہوسکتا ہے اور اسطرح چندا صا بتول بی سبب موض ہوسکتا ہے اور اسطرح چندا صا بتول بی سبب موض ہوسکتا ہے کہ کوروک سکتا ہے کوروک سکتا ہے کہ کوروک سکتا ہوتا ہے کہ پہلے میان کیا گیا ہے ۔

وبانی شمل می مت حفیانت بن سے لیکر پاننج بهفتہ کک ہے۔

د کا کی حکمی کی بھی رقان نروع ، دونے سے پیلے شخیص کمن ہوتی ہے ، کیو کمان ہوئی کا دکر د کی کا تفا ہے کہ کا لفا ہے کہ کا رک کا تفا ہے کہ کا رک خیال بیدا کرے اور إن کا شفات سے وطیفی قلت پائی جائے۔ ایک فور شخص میں جو پیلے تندرست تھا ، یا جسے زیادہ سے وطیفی قلت پائی جائے۔ ایک فور میں معدی اختلال کی شکا تھی ، یرقان کا طرور یا تغریباً بلادرد حملہ ہونا ، بالعموم اسے اس برقان سے ممیز کرتا ہے جو دمن کہ اسے معالی ، اور کہ بہت ، یا دوسرے نہا بہت حام ہا کہ کہ باحث ہو۔ اگر برقان بانچ یا ججہ م ختول سے زائد جاری رہے تو مندرجہ بالا بمن کے باعث ہوں کے باعث ہوں کے اس کے باعث ہوں کے اس کے اس کے اس کے اسے میں کے باعث ہوں کے اس کے اس کے مرص کے اس کا ک توریف مرفولی برقان سے متعرف کرا گیا ہے۔ وہائی شکل کو تحدیف مرفولی برقان سے متعرف کرا گیا ہے۔ وہائی شکل کو تحدیف مرفولی برقان سے متعرف کرا گیا ہے۔

جو ما خطر ہو) ۔ خون شماری سے مدول سکتی ہے ۔ اول الذکر میں مثاید پیلے دین دنول کے جو ما خطر ہو) ۔ خون شماری سے مدول سکتی ہے ۔ اول الذکر میں کشر فواتی جو درکر ہاقی مدت میں میک نوائی خال کا درک کا دیا دنی ہوجاتی ہے ۔ امارت ابیض کی کرت ہوتی ہے ۔ اسلام کا درک کا در

ا بنار ما د تنخر کے آغاز کی نتا ذاستہ او کے سوامے باقی صور تعل میں اندار

بالكل اميدا فراي ـ

من المنظر جو اگر بخار نہ ہوتو مریض کو بہتر پر لٹائے رکھنے کی ضرورت نہیں لیکن اُسے اسی غذا دینی جا ہے جس میں کہ ہت سے کا ربو ہائٹر بیٹ اور خاصر کلوکوس ہواور شحوم اور جہیجات سے بر بہزکرا نا چاہئے۔ اور اگرف درست ہوتو اکیب الح ملبن دبدینا چاہئے۔

(acute necrosis of the liver)

حاداصفی ذبول (acute yellow atrophy)

إس مبيب من مير مكركى بافتون كا مربيع انحطاط واقع موجا أبط ورأسكا طبعي محركه من مرجا من مير ووليت بكر نصف روجا ما جد -

(arsenobenzol derivatives) (طاحظہ ہوسند 117) 'اورفینا کل بہنکوئیک آبید فرول (Phenyl-cinehoninic acid) کو سے اورخیف مرفول (phenyl-cinehoninic acid) کے ستم سے اورخیف مرفول یا ہے میں ہے جا دین اور کہبت کیا ہوجا تا ہے میکن ہے جا دین اور کہبت کیا ہوجا تا ہے میکن ہے جا دین اور اور دوس ایک میں کا بدی خلیات کے نسر کی مختلف ہیمنتیں ہول ہو ہما کی صورت میں حاد اور دوسری میں نہا ہے مرمن ہوتا ہے ۔ مزید برآن ان دونول کو دیائی میلی کو دین اور دوسری میں نہا ہے مرب میں ہوتا ہے ۔ مزید برآن ان دونول کی دربانی ملیج کو سخت اسما و دبول (subacute atrophy) کی دوبان کو گوئی تی تو ہوئی دربانی میں اس کا داری میں اس کا داری میں میں اس کا داری میں اس کا داری میں اس کا داری کی معمولی ساری برقان ہوتا ہے ۔ بہت بیان کیا جا ہے ۔ جیاتی تبدیا ئی تغیرات کبدی و ظبیفہ کے عنوان کے شخت بیان کیا جا جہ جیاتی تبدیا ئی تغیرات کبدی و ظبیفہ کے عنوان کے شخت بیان کیا دیا ہو دوبان کے شخت بیان کیا دیا ہو دوبان کے سال کیا دوبان کے بیان کیا دوبان کے دوبان کے دوبان کے دوبان کر دوبان کو دوبان کے دوبان کی دوبان کیا دوبان کی دوبان کیا دوبان کو دوبان کے دوبان کر دوبان کیا دوبان کیا دیا ہیں دوبان کیا دوبان کے دوبان کر دوبان کر دوبان کر دوبان کیا دوبان کے دوبان کر دوبان کی دوبان کیا دوبان کیا دوبان کے دوبان کر دوبان کر دوبان کیا دوبان کیا دوبان کیا دوبان کیا دوبان کے دوبان کر دوبان کر دوبان کر دوبان کر دوبان کیا دوبان کے دوبان کر دوبان

سبغة صغاسے رکمبن ہونی ہیں۔ مارہ بھی خالی ہوتاہے ، یا اُس کے اندر اَزج راد اُ مخاط کی تعولی سی مقدار موجود ہوتی ہے۔

ا تنحسوالحاد دبول اکتابرگرهکی بیش تکوین برگراست می انتاکم نبین ہوا ، اورکبدی با فت کی باز توین ایس منازی تنه ہوا ہے دردر تاب کی مدی سلعے نما گر کمیں نیفی بافت کے بہلل میں جی بوئی دکھائی دہتی ہیں ۔ ان کاچوا یا باز ایون باز توین ایس جی بوئی دکھائی دہتی ہیں اگرچون کے باز ایون باز توین کی مقدار پر منصوبول ایس کی میں اگرچون کے کہدی فیلیے اور منوا وی فنائیں موجود ملتی ہیں اگرچون خری فیلیے می بکرت موجود ہوتے ہیں ۔ خالی آنکھ کو مگری ایس عمر میں ایس میں ما قسم سے ترتیب کہ بت سے متنا بہ ہوتی ہے ، اور درد گر کمیں منظرین اسی مرض کی ما دقسم سے متنا بہ ہوتی ہے ، اور درد گر کمیں منظرین اسی مرض کی ما دقسم سے متنا بہ ہوتی ہے ، اور درد گر کمیں منظرین اسی مرض کی ما دقسم سے متنا بہ ہوتی ہیں ۔

اب تىز ہوماتى ہے ۔ زبان ختك اور بجورى ہوتى ہے اور جول جول علا است ين ترتى ہوتی ہے دانتوں اورلبوں کے قربب وسخ جمع ہوجاتا ہے علاوہ ازیر كبدى خطے ميں درد اور خطعی البیت موجود ہوتی ہے، جو قوما کے درج کا میں ' اِس مقام پر دبانے سے شاخت کی ماسکتی ہے۔ اَصمیت وسعت ہی بہت رون کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے جِنانِجِ اللَّحْرِينِ كَا انتقابي ماب صرف أيك انجه ما إس سرم كرره حاماً النه -شكرى مالت قدرتى بوتى ب، يا خاته ك قري وه ما كريشيده بوتا جه طحال مِشِيرَ بِرُمعلی ہونی ہوتی ہے ۔ قا رورے میں صفرا موجود ہومًا ہے اور البیور^{کی} موج^د بوناشا دَنْهِسُ المنسوس فاتم ك فربب اورك الك بمي موجود موت بي يون مي موجود ہوسکتا ہے، جواکب عام نزفی حالت کی دلالت سے ملاوہ ازیں دُر دِ فہوہ ہی قئے برازیں (جو مینہ محصک رنگ کا نظراتا ہے اور سرمیں صغرای کمی یائی مباتی ہے) نون كى موجود كى ار epistaxis) ازف رحى (metrorrhagia) الما صلىك نیجینمشی نزفات کی موجودگی [،] برسب ای*ب مام ن*ز فی مالت پر دلالت کرنے ہیں ۔ بڑھتے موئے قوماً لی وج سے بالا نرموت واقع بوجاتی ہے ، گوکرز بادہ شدیدعلامات صرف دوسے چارون تک جاری رہتے ہیں۔ بالعموم حالا عورتوں کوار تعاطر ہوجا تا ہے۔ بعض ا وقات بيمرضي ماكت نهايت لمويل عرصة يك ^{بر}يمي نهينوں يا دوال تک ماری رمتی ہے۔ ایسی امیابتوں کو نفعت الحاً د ذبول کہتے ہیں یعض وور ی ا صابنول میں حلام ص خفیف ہوتا ہے اور مریض شفایا ب ہوجا آ۔۔۔ ۔ واقعہ بہ ہے کہ مرائی نائر ولولومن (T. N. T.) اور آرسبینه بینزال کیسم مرم فض فراب ترین اصابتون من الأكت واقع ، و تى ہے۔ پہلے یقین کیا ماً اتھا کہ ماأدا مدفر دبول نقر بباً معينه ملك بونا به اليكن شفاياني كي إن مثالول سفرًا بت موما ي كراس من ى اَيْك بْكَيْشَكُلْ عِي ہُوتی ہے ۔ ٹرا ئی نائیز وٹولؤین کےتستمری مثالوں پیاکٹر تجیفے ہویے خِفا یا یا جا ناہے، کیونکہ میکن ہے کہ برقان اِس زہر میں تحفظ، ہونے کے چند سال بغد

ظاہر ہو۔ زننخیص - اِس کا انحصار نمواً دائی علامات کے وقوع اورکہ دی مسیت کی رہے تعلیل ہر ہترا ہے ، جو ایک برقانی مریض مں واقع ہوجائے - امتحان بندیع لانتعاع شخیص کا آیک قابل قدر طریقه به (Strathy and Gilchrist) انتها بی و منع میں دیکھنے برسایہ کی بلندی کم بائی جاتی ہے۔ بالائی سطح آکیسہ کے ارتخاء اور چیں ہوئے سے مرتزین کن روطبعی مالت کی بت نبید من دوانتها بی نظر آتی ہے اور زیرین کن روطبعی مالت کی بت زیادہ انتها بی نظر آتا ہے۔

إِنْدَاْرِهُ مَا دَنْخُ اِبِحْبِ علامات نمو افته مول انها بت مهلك، بوّا بهدنيكِن بعض اعدا بتول مي عارضي اصلاح موجاتي بيه كوكدا زال بعدتكس در بالآخر موت انع موثى هيد يتحت الحاد احدا بنين من يخفيف تراصا بنين مكن شهركا ل لحرر برشفا يا ب مدراند

مربی میں علاج یہ خری درجہ بی مشیل کھی کیا ماست ہے لیکن اندا فی درجول ہیں ستی جز وعامل سے ازالہ یا نغدیل کی کشیس کرسے مرض کی مزید ترقی کوروکنا جائے۔
بہتر برترا م م کلوکوس کا سنعمال براہ دمن (۱۰ فیصدی) اور دروں وریدی خور پر (۲ فیصدی) نیز افیصدی کیلیشیر گلوکونیٹ کا درون دریدی طویر (۱ سیسی روزانہ)اور سوڑیم خوابسلنیٹ کا دروں درید کا طور پر (۲ درگرام) کٹیر المنعار نیال کے مراق دروال درید کا طور پر (۲ درگرام) کٹیر المنعار نیال کے مراق دروال درید کی مربی کی کھی کی مربی کی مربی کی مربی کا کردیا کی کا کردیا کی کا کردیا کی کوروں کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کی کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کی کردیا ک

(cirrhosis of the liver)

کہرسکانام مگرکے اُن امراض کوریا گیا ہے جن برلیفی بافت کی در بربش بوتی ہے۔ کہست کا نام (جس بی زردی کے معنے پائے مبائے ہیں) اِس وجہ سے استعمال کیا گیا کہ بابی کہت میں مگر کا عام رہائے زرد ہوتا ہے ' نذک لیفی بافست کی زیاد نی کی موجودگی کی وجہ سے تاہم اِس نام کا اِطلاق اَکْتر دو مہے جسمانی اصفعاکے مزمن لیفی تغیرات برجمی کیا جا تاہے ' مثلا کہ بسنی شش اور کہبت گردہ کیا الی فضا کے گئے لیفیت کی اصطلاح کو بہت ترجیح دینی جا ہے ۔

یر بیست کی تان خاص میں ہیں :۔ (۱) ما بی کہبت ' جس میں مزئن فراش ہیں۔ ما لات ورید بال کی لا مصر عکر میں ہنچ ماتے ہیں' اور میں یں دوران خون کے خلالا ہ جو معدی نزف اور استسقائے کی پیلا کرد بیتے ہیں ' نمایاں تریری منطا ہوئے ہیں۔ (۲) صفاری کہبت ' جس میں یرقان نمایال منظم ہوتا ہے' اور استسقار شکی ممض ایک اختیامی حالت کے طویر واقع ہوتا ہے۔ (۳) گردِ خلوی کہبت' جو پیدائش آئٹک میں ہواکرتی ہے (لا منظم ہو صفی 397) -

بانجي كهبت

(portal cirrhosis)

(multilobular, alcoholic cirrhosis = کندرلختکی الکولی کهبت المحلی (hobnailed liver = کارمینی جگر =

بسحت اسباب - اصابتول کی نهاست غالب تعدادی با بی کبست کا استحصار جودی یا کلی فورد الکول کی کرت استعال پر ہوا ہے ، جو بر (beer) کی شکل میں ہو کیا تراب (spirits) کے فور ر - اس کے تعلق پر المحز ہیں گرکہ بت برا کرنے کے لئے کہتنی مقدار کی ضرورت ہے کیو کو انفادی اضلاف تعمیل مقرب بیسته ریول ورا نمیس کبست به وسیع ترین بین مکن ہے کہ بعض اشخاص ساری عمر فوب بیسته ریول ورا نمیس کبست به کور وردوں میں چند میں استحال میں کہت برا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے بعنی الیسے بچول میں جو اس مرض کے نقینی کہت برا کرل بعض اصابتی ایسی بھی برا برا مالکول کو بھیشت بسب مرض کے نقینی کل میں مور اس مرض کے نقینی قدمیں میدا کردی بھی اسبال ایسی بھی برا برا برا موسی کی بیش فور اس مرض کی تعینی قدمیں میدا کردی ہے کہت برا بوسکتی ہے کہت کے مسبب سے ہونے والی کبست پر بوبدا میں فور کیا گیا ہے کہ موسین کو برا برسکتی ہے کہت کے کہ بست بہیں جیسا کہ مام فور پر اس کا مغم مرض موسیت کا بیان) مگر کی کہت کے کہت بہیں جیسا کہ مام فور پر اس کا مغم موسیت کا بیان) مگر کی کہت کے میں برا براس صورت میں بان اصبابول کو ایک میں بدر نہی بیا ہوسکتی ہے کہت اور اس صورت میں بان اصبابول کو ایک میں بدر نہی بیا کہ کہت بھی بھی بروان کا مسابتول کو ایک میں بدر نہی بیا کہ کر برواقع ہوسکتی ہے کہت اور اس صورت میں بان اصبابول کو ایک میں بدر نہی بیا کہ کر برواقع ہوسکتی ہے کہت اور اس صورت میں بان اصبابول کو ایک میں بدر نہی کی کور کر کیا گریا کہ کہت ہیں ۔

برمے باروالی کہبت (large-livered cirrhosis) آن صابتوں یں لونیت کے ساتھ بھی مثلازم ہوتی ہے ، جن میں سے مصل کو خون لونیت

کالا آزار کے ساتھ 'جوایک ساری مداری مرض ہے ' معتدل درجہ کی کہست موجد ہوتی ہے ۔ کہست مراحی ہوئی طحال ' اورمغر استخوان کے تغیر ات کا ایک کسیقدر ماکل اجتماع (کیکن النیمان ڈونوونی اجمام کے) مصرکا ایک معامی مرض ہے (Day and Ferguson) ورا کے مجیب طرح کی معدودالمقام بالی ہمت رض ہے (bilharzia) کی ترا

معمول کی نسبت نها بت زبا د الوجدار ا ورسخت بوجا تاسهه : زا سنته پر وه منعدوزرد · بككه بموريدا ورزردا يا جهرت رفيه بيش كرا خضبي را دى نيخ تفاف لبغي بافت سے چوٹرے خطے گیے ہے دینتے اور ایک دوں سے سے جلا کینتے ہیں ۔ اگرا بیسے مگر کا کہرست ئے۔ بندائی درجول اس امتحال کیا حاسکے تو بابی قنالول (کمینکلین = Glisson's capsule کے رویش کٹرانتہ اوگول خلیتے اِس ما فنن کی در ریزش کر تھ ہوئے ' ا وربعض بنالول س نختُدًا ، تُصدر ميان بلكه أن كه اندر داخل ہونے موسم يائے جاُ مِن تَكِيدٍ ۦ ١ زالَ بعدسيب لِيفي ومنت نموما ب بوجا بي ہے ' جو ایک ترقی یا فتداخیا'' مِن ترانش كا أبيب برا صله بنا تى ب عنى كا ندر دور في والى مفى با فت كين است كبدى با فننه شرح را رم نفت بيم روسينرس اجن مي سيه بهر جزيره منتعب مدو الفتكول مِسْمَا سِيتُ إَمَا الْمِسْمَا سِيتُ إَمَا الْمِسْمَا اللَّهِ الْمُسْلِمَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الم لَيكن بار فإايبا الّغانق بموّابُ أبه يلنني بافت أيك لُختُك كوآ ريارِ جرتي بوفي أسكه بھی کڑے کردمنی ہے ' اوربعض او فائٹ منفر لختک اس معے کمیرے ہوئے ہونے ہیں۔ براتنوع موجوز ہوا ہے فلیات مربول او نقین اور ذرات صبغدی وب سے منة ولوّن بوكرزر دبا بحدرسة بوجائية من ليفي افستام كثرالنغا ونوساخنة عوق دمويه بوت بن جنس كبدى نه إن من مع منه بكر باسكتان أورباز تكون في كبدي علية بهي ديكه مباقة إلى - في العقيفة كهبت كي بدائس كوبسم كي طرف سے مرمن كي سمى مجمنا جا يبيئه والفك ئه وسطى اوربروني منطقول كانتخر كے بعد بوتى ہے۔ نوسانعته نهابيت مروفی تعلی بافت مي ايك فانده ہے أبيونکه وه باز كوين يا فست كبدى صليول كوتغذبه بهم پنهجاتي ہے (78)-ا زاں بعده ه بركار موكر سكر هاتي سبع اوراسطرح كبدى خليانك وريالهاب كى نتاخول اورن برصفراوى فاتوك وزيامه رباده مضغوط كرتى جاتى بيره - اتصالى بافت كى بيش بالبدى كى وجهت مكرابندارْ یڑا ہوجا تاہے' اور معض بڑے اکہب جگروں میں برنی کی کچید مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ مكن ب كركبدى فليات اوريرني بالآخر عائب بور مكرا بين معولي وزن سي مى بہت کم ہوجائے۔ خِنائجہ مگرکی تغیر پذیر جبامت کا انحصار مکم از کم جسند و موس درجه بربولتا ہے کہ جس تک مل ترقی کر خیاہے۔

فأسكه امامن

مسوط بی کمبت (cirrhosis carcinomatosa) اُن اسابتوں کا نام ہے جن میں اکہب مگرمیں ایک اقلی مرفیان نودار ہوجا تاہے (طاعظہ معمد 400) ۔ قرین قیاس ہے کہ بیر مزمن تراش سے اسی طرح بیدا ہوجا تا ہے حس طرح من انتشکی التہا ب زبان (chronie syphilitic glossitis) کے بعد زبان کا مرطمی سلعہ (epithelioma) ہوجا تا ہے۔

701

علامات . بانى كست كما مات بالخصوص بابى دوران فون كم برصة ہوئے تسدد کی وجہ سے بیپا ہوجا تے ہیں ' پرفان اور کبدی قلت کے دیگرا مارات اکثر مفقود ہونتے ہیں 'یا ممرم ض میں ان کا ظہور دیر سے ہوتا ہے میں ہے کہ مصل سے وآن ڈن برگ کا روہ میتی تعالی حاصل ہو مائے ۔ کہ ت ترا بخواری کا بہ منجہ ہوا کھ اكثرالتهاب المعده موجود بوتا ہے، جس سے مجوك جانى رمتی ہے، ربان فردار ہوتی ہے · اور قئے ، واکرتی ہے ، الخصوص صبح کے وقت لیکن اس درج بی م کے مخال سے مکن ہے کہ مگر کی نہا بت بڑی کلانی یا ٹی مائے ' جس کا مریض کو بالکل اعلم نہیں ہوتا۔اس کے بعد دورری علامت جواکٹریائی جاتی ہے قطے الل م ہے، جس کی وم یہ ہے کہ بانی روران فون میں تسدد نروع ہوگیا ہے ۔ چو کہ وربد الباب سکے نون کو مگرس سے ہوکر گذر نے میں دقت محسس ہونی ہے، اس نظام کے جدرات ' بيعيفها ساريقي معدى اورطمالي وريريهي بلاشبهمتلي بعجاني بي اوران مصفالي سطيل يراوماء بونے كا رجى ان بوجاتا ہے۔ ليكن عفى ا وقات يہ فون مرى كے زبرين مرے پر کی اکن وریدوں کے انتقاق سے آتہے' جو ور بدالباب کی نناخول ور تختانی وریدا جوف یا ورید مودکی نشانوں سے درمیان آزا دانہ ارتباط قایم کرنے کے ووران میں دوالی نما بنگئی میں ۔ تعنے الدم کے بعد برازدم الاسود ہوسکن ہے۔ اس کے ساته بى بواسىرى موجودگى نا درالوقوع نهيس اوردوران كبست بي دومرسے حصوں (مسور صول على اور عصيم ون سيزف واقع بوف كا امكان مي بواجه -بالى تعلدىكا ابهم ترين اورمستم نيتجه تيال كاقده انصباب ہے جوميولي ہوئي وريدون عدكم فد بارملي في عداندر بوتا اوراستسفاء كي وه تسم بداكرد با ب وإل سے پہلے استسقاعے شکمی کے نام سے بیان کی گئے ہے۔ بہائے شی اسابتون بی

استسفائت کمی محنویاب ہوجانے کے بعدیمی جگر بڑھا ہوا ہو اے اور سلیول سعا اَبْ یا را ندانچه نیچه محسوس کیا ماسکتا ہے۔ اُس کی کورسخت اور نہا بین نیز یا گول **م تی ہ** نتيلن اگر گرو سندي النهاب زياده سي تو جركي سطي جيئي بوني سيد تا جموه موادار داريا كروكي بعنی ہے ۔ طمال اکٹر بڑی بوجاتی ہے اور مکن ایک مسکس ہوسکے۔ اس کا وزن اکٹر ٢٠ تا ٣٠ اونس بوتا ہے سبتکم کی سلح بڑی وربدوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے ، جو مرفقی اور صدری تنول کے درمیان ادورتی ہیں۔ اِس مجانب دوران خون کے ذربعب، بابی دوران فون كوسبكبارى ماصل بوجاتى ہدي ايك بهم امرے كيوكريد يادر كھنا فيا كربابي نظام عام دوران ون يدركله بي تعلق نبيب بكرما مت محت بي مي ابيه ذرائع ارتباط موجود اس، جوكهبت كي مالت من بهت برعه ماني بين اورجوبا في وريد مے جدرات میں کا مجد خون قلب کی وائیں جانب پہنچا دینے ہیں بغیراس کے کہ اس کو عِكْرِمي سے گذاریں - ان *ذرائع إرتباط ميں ہے حسب ذیل بيان کے دعے ہيں* : - (1) معدى اورمرلوى اورده ك درميان ارتباطات، فتخذ دايا فرامي كممقام يور ٢) تخالى ماساریتی کے اور اندرونی حرقفی وربدلی لوابیری شاخوں کے درمیان ارتبالهات. (٣) معدے کی اکلیلی وریدوں کے اور جابی وریدوں کی ننا نوں کے درمیان ارتبالهات - (۴) ما ساریقی وربه ول کی شاخول کے، اورمنوی وربیر' یا دیوار پشکم کی دومه ی وربد ول کے درمیان ارتباطات - فِرے رشِ (Frerichs) نے (۵) ان عروق كا تذكره كيا ب جومرًا وردًا إفرام كدررميان إنضا ان ك اندربيدا معجات ہیں' اور بعض اوقات (۱) عِرك رباط متدبر كے طول ميں دوڑتی ہوئی آيہ بری وربد (سیآیی کی معین بانی ورید: accessory portal of Sappey) یا کی تا جس كى وسأطت سے بابى وريد شراسينى اوراندرونى بهنانى كى شاخول سے براورا

بڑے استینقائے کی کے دربعہ مجیبے ول کے قاعدے اکثر نہا بت دَہدکر کیک جاتے ہیں۔ استینفا رابصدرا ورمیبیے ول کا تہیج بھی اکثر ہوجا یا کرنے ہیں۔ استیسقائے کئی کے خوب نمو یا فتہ ہو جانے تک مریض دو سرمے لحاظ ہے بھی اکثر خطر ناک لور پر بیمار ہو تاہے۔ وہ و بلاا ورکمز ور ہو تاہے ' اس کی انتخبیل نرمیجی کی ہوتی ہیں میں میں اسکو خلک موجود ہوتی ہے اور جرو پر جو ٹی سارہ ما ور کیریں ہوتی ہیں۔ اور جرو پر جو ٹی سارہ ما ور کیری ہوتی ہے۔ اور جرو پر جو کی سازہ ہوتا ہے۔ است قائے کی کے طاہر ہونے کے جند ہی جہدنی کے اندر موت اکثر یا تو فشر کلب کے مادر موت اکثر یا تو فشر کلب کے مادر موت اکثر یا تو فشر کلب کے مادر بوجاتی ہوجاتی ہے اور بید دما می ملا مات (بندیا میں اسکو کی میں کیم کی میں کیم کی ہی فی الدم مہلک ہوجاتی ہے ۔ اور بید دما نوی مرایت میں اسکو کی ہیں کیم کی ہی فی الدم مہلک ہوجاتی ہے ۔ اور بیل میں کیم کی موال لاکت پر مارکردہتی ہیں۔

نشخیص کرست اکثر معنی رمتی ہے یہ نتک کہ فٹے الدم استسقائے کمی ا یا خفیف سابرتان اس کے را رکوا فشاکر دیسے ۔ یا انکیلی عا دات کی وجہ سے اس کم ۔ آغاز کا منٹ برکیا جا آہیے' اورلبولوس ہاگینگڈوس کے قبل کے نتبت کا شغہ ا یں کا نبوت متاہے ۔ یہ بیلے ہی بیان آیا گیا ہے کہ مکن ہے کہ ایک ثمرا بی من جے و بی یقین تحلیف نہیں، امنی ن کرنے پر ایک بڑھا ہوا تا ہموار مگریا یا جائے۔ نہا عام لحربيبه ہونا ہے كەشخىص ا سوقت كرنى يۇ تى ہے جبكدا سنسفا ئے شكمي بيلے ہى تھے مو دار ہو تیکا ہے' اور بھوٹیہ ابخداری کی کمڑنت اور قبے الدم کی مرگذ مثنت' بڑھے ہو جگر' ہ^می ہوئی طحال اور خفیف <u>سے بر</u>قان کی موجودگی ' بیرس<mark>ا ت</mark>صنیف*ی مرض ک*ے كافى بويته بن يكبدى وطبفى كاشفات بحن شخيف مي مفيد بويته بن عجرا وربار بلو كى ان دورى مالتول مي سفه جواستسقائيت كمي تيداكر ديتي ہي، ايم ترين به ہن إ سرطان، جومکن ہے کہ وریدا اس بی اس کی سب سے بڑی شاخوں کو مستدد کرد اور ماربطون كى هن من حبائرت كيساته كردكبارى النهاب كالبماع (ملاحظه موگرد کبدی الهاب، - سی طمان اور درمنه ، جب وه جگرسه دور مول ، تُومِي النَّهَابِ بِارْلُون بِيدا كردبيعٌ بِنِ مِس كا بيتجه استسفائيت كمي بومًا ہے -ا ول الذكر كي نتنا خت بالبيد كي أن كر بكور يرسع بوسكني سه جو شكم كم مختلف معمول میں بیدا ہوماتی ہیں۔ آخرالذكراكثر نرب كى ابب دبارت بیش كرا ليے بصفللى سے برطه البوا عَكُر سَمِها عَاسَمَا ہے۔ قبئے الدم اکٹر کہبت کا بتیجہ ہوتی ہے اور تعمیم لفے ببت كارآ مربع ليكن وه ما دم مدى قرصه (acute gastric ulcer) اورطمالي عدم دموسیت (splenic anæmia) میں بھی عام طور پر ہوا کرتی ہے ۔

اندار ابتدائی درجن من المخصوص اسوقت جبکہ بر مالت وللمبنی کاشفہ کے ذریعہ دریا فت ہوگئی ہو، آگرالکھل کو بندکرد یا جائے تواندار اچا ہوتا ہے ۔ جب استسقا کے نمویل بنویل ہوتو مریض کر درزل علی بن لاکر حنید سال کان بدور کہ تا ہوتا ہے ۔ بجول کی بعض اصابتوں میں استسقا کے شکی اولین علامت کے طور پر نمودار ہوا ہے ۔ بول ہو اس کے یا وجدم ریض مریا یا با سال کس زندہ رہا ہے ۔

علاج _ خوداکہب مگر محمت علق کچه یعنی نہیں کیا ماسکتا۔ اور ملاج بہی بافى ره جاتا ہے كەمزىد فسادكاستداب كرديا جائے اور جو كجيد نفصان ابتك بوليكا ہے اس کے اثرات کے ازالہ کی کوشش کی جائے ۔ الکحلی کہبت مل ولین ضرورت یہ ہے کہ شراب کا اذعال قطعاً روکدیا جائے ۔ اور ابتدائی ورجوں ہی جبکا معجار سكوا ببوانهبي بيا وراستسقائ شكى انتك نمودانس وايه مكن ب كرمكرا ني طبعي جهام*ت بعرطامیل کر*لے: تاہم انسی اصابت میں بیرکہنا کہ کبفیبت کس مدینی*ہ* ترقی کیجی ہے نامکن ہے ۔ غذا میں کیڑے سے کا ربوہا ٹیڈریٹ ہونے حیامین اور يرونمنون كى مفدار مىدودكردىنى ما بئد - أمعاء كوفعال ركمنا ما بهد اورمنتلى اور سورمضم کے کوئی علامات ہوں تو اُن کا علاج ا س طرح کرنا میاہئے کہ مبر طمرح بیلیے بان كياكيا ب عب استسفائي كمي موجائ تو مدات بول كے دربعه اسكودوركرنا نیر معنوظ سیمهاکی ہے، مثلات بارگان (salyrgan) کے ذریعہ کردس میں سموم ایک ماتے ہیں، تاہم یہ مرات بول اکثر استعمال کئے گئے ہیں۔مسہلات میضمندرہ فزل استعال كشعا تلكة بي اليلفبيط أف يتينيسيُم النظار فربيط أف يؤام بمُم مرا سغوف ملايه (compound jalap powder) أيا الإلمبيرُم (elaterium)-الرَّتُمْ بہت تغیدہ ہومائے تو بُزل کی ضررت ہے، اورجب سنیال پیرجمع ہوجا سے تو بعض اوقات اِس بزل کو مُرر کرنے سے کا میابی حاصل ہوتی ہے۔ اِس رائے كى بناءيركه استسقائي مشكى الخصوص ميكاني مبدأء ركمتا ہے، ايك مجايز فيران خون كونموياب كرف كي مسب زنل كونشيس كي كئي بن ١- (١) شكر كوكولنا ، اور مجر اور وُا إِ فَرَام كَيْ مَقَا بِلَ مُحُونَ كُوكُونِ كُرُا تُعِينِ الْبَيْبِ رُوسِيهِ عَلَمُ مَاكِسِينَ بِسِ لا نا (Drummond and Morison Talma) اور (۲) ثرب بركوشكم كي سامنے

کی دیوارہ ہورنا (تنبیت الش ب معنی و epiplopexy)-س کے نعلق بار نتک ہوئے کیاگیا ہے کہ اِن عملیوں بیں سے ۳۰ فیص کی میں مجبد کا میابی مال ہوتی ہے ۔

صفراوی کهبیت

(biliary circhosis)

اهینوی کی برت (hypertrophic biliary cirrhosis) اس من کی تسبب انبک بهم ہے۔

یا معلوم ب کد اولا جگری بعی بافت ما وف ہوتی ہے ، صفرا وی تنایس برایا بی مرض ہے ، جوعورنوں کی نسبت مردوں ہیں زیا دہ ہو ، صفرا وی تنایس برایا بی مرض ہے ، جوعورنوں کی نسبت مردوں ہیں زیا دہ ہو ، ہے اور اکثر بچوں ہی جائے ہی جگری کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی کا نی اس سے صی زیا دہ ہوئی بالی کی سے معلوں کے سے معلوں کے سے کہ یوموں کو بالی کی مایاں ما سہ ہوتا ہے ، اور بیتا ہی بی با یا جانامین موجود ہوتا ہے ، ایکن است قائے کی عین اختا م کے وفت کے ہی با یا جانامین موجود ہوتا ہے ، میش اوقات نہا ہیت تندی اور وختی کے ساتھ ، اور بچروہ قوما زدہ ہوجا، ہے ۔ بعض اوقات نہا ہیت تندی اور وختی کے ساتھ ، اور بچروہ قوما زدہ ہوجا، ہے ۔ بعض اوقات نہا ہیت تندی اور وختی کے ساتھ ، اور بخروہ قوما زدہ ہوجا، ہے ۔ بعض اوقات نہا ہیت تندی اور وختی کے ساتھ ، اور میا طی اخشیہ سے ترف ہوتا ہے ، ویلد کے نیچے اور منا طی اخشیہ سے ترف ہوتا ہے ، ویلد کے نیچے اور منا طی اخشیہ سے ترف ہوتا ہے ، ویلد کے نیچے اور منا طی اخشیہ سے ترف ہوتا ہے ۔ بیا دون ہی موجان ہے ۔ بیا یا بیا میا ہوتا ہے ، ویلد کے نیچے اور منا طی اخشیہ سے ترف ہوتا ہے ۔ بیا دون ہی موجان ہے ۔ بیا بیا ہوتا ہے ، بیا دون ہی موجان ہے ۔ بیا ہوتا ہے ، بیا دون ہی موجان ہے ۔ بیا ہوتا ہے ، بیا دون ہی موجان ہے ۔ بیا ہوتا ہے ، بیا ہوتا ہیا ہے ، بیا ہوتا ہے ، بیا ہوت

بای کمبت کی نب سے اس مالت میں لیفی بافت نہا بت زیا دہ نازک طور مرتب بوتی ہے اور برا ابو نے معلاوہ انزائشنے برصفراد سے گہرا ملون ہوناہ بوتی ہے اور برلختک لیفی بافت سے گھرا ہوا ہوتا ہے (میک کے تبکی کی مہت سے گھرا ہوا ہوتا ہے (میک کے تنگی کی مہت مات سے کہ تجہ لیفی بافت نختک کے اندراور کباری خلیات کے کردیمی موجود ہو۔ صفراوی قناتوں کا نمایاں نکائز ہوتا ہے ۔ اسس کی شہادت موجود ہو ۔ صفراوی قناتوں کا نمایاں نکائز ہوتا ہے ۔ اسس کی شہادت موجود ہے کہ ایک بڑا اکہ ب مگر میفی کے زمانہ حیا ہے جس میں مگر باف سے یہ جے ۔ تمر فر فجر کرکٹ میرا نے ایک اصابت کا اندراج کیا ہے 'جس میں مگر باف سے یہ جے ۔ تمر فر فجر کرکٹ میرا نے ایک اصابت کا اندراج کیا ہے 'جس میں مگر باف سے یہ جے ۔

پہنچ کیا تھا 'اورمریف کونہایت نوب مایاں پرقان توضا گرکوئی استنعائشے کمی ذقا۔ پندرہ جیپنے بعد پرچگر شکو کر کہ بنیچ اور بائٹل قربب آگیا ۔علاج ! بی کہت کے تحت بیان کیا گیا ہے ۔

ا رسور (Rous) فروس (obstructive form) فروس (Rous) اور الرسور والمسترد (Iarimore) فراس (Rous) اور الرسور (Iarimore) في المرسور (المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المسترد المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المسترد المرسور المرسو

برون بیمراس کی بجائے وربدالب کی دور بی شاخوں میں بندش تھا کہمام بابی خون کو مجارے اُس رقبہ کی طرف منوف کردیا کیا جباں صغراوی رکودتھا میں خواکی نسبة زیادہ مقدار پیدا ہوئی اور اُس نے بین گئتی صغراوی قنالچوں سے صابع ہوکر ایک

مودهلوی کبست پیداکردی ـ

ی نتائج بنتنوی کہت کی ا مراضیات پر قدرتی طور پر بہت روشنی ڈالنے
ہیں' اور اِس امری طف نارہ کرتے ہیں کہ من ہے کہ وہ در اس نبستہ چونی صفراوی گذرگاہو
کے تسدد کے باعث ہو۔ لیکن صریح اُ تسددی صفرا وی کہبت کی ایک ہیں قسم می ہے
ہو ہمیشنہ ہیں گرکا ہے گا ہے ہریری طور پر اُسوقت پائی جاتی ہے مبکہ المحفرا
یا سرطان ویوہ کے باحث معفراوی قناتوں کا لویں سرصد سے سلسل تسدد ہو۔ معفراوی
قناتیں بہت تسع نظراتی ہیں' اور مکن ہے کہ جراحی تدابیر سے متی یا بعض اوقات کئیر لختی کے
کہبت طاہر کرے۔ ملاج یہ ہے کہ جراحی تدابیر سے متی الامکان سبب کو دور کیا جائے۔

تحكركي أتشك افترتدرن

آتشک بید انشی ہوسکتی ہے یا اکتسابی ۔ بیدائشی آتشک اولا گر خلوی کہدست (Pericellular) د cirrhosis کے طور پر ہوتی ہے 'اور 'نانیا صمغیر سے طور پر اول الذکر تغیر آگیہ

خلوی در رہزش کے طور پرنٹروع ہوتا ہے' جونموباب موکرا بک لیف آسانصلب نجاتی ہے۔ وہ تفتکوں پر حلیاً ور بوکر مرحلیّہ کولینی یا فت کی ایک ناسے کیے لینتی اور مگر کی بڑی الله في يبدأ كرويتي بيع يمكن بيه كرخرد بين امتحان مصحسب دبل امور نظر آبي و-(١) با بی قنالوں کے گردلیفی مافت کی ریا رتی (گردیا تی ہے =periportal cirrhosis --(٢) كثيرالتعلاد مضغني مرخ غلية البنود كر عبر أبيط مدّ تمي ا فعال بارى ركمت بيه ا جس سے اُس إلاف جبيمات كى كافي بوسكتى ہے، جو آنتكى سم كى وجه سے واقع بوجانا ہے۔ (٣) دختی معنی (80) انصال بافت میں بیج مواع موجود ہوتے میں ساتھ ی الحال اكثر برصى معنى بعتى جديرة الكبي من النين النستعائظ كي شاذي-<u>عض اوقات آن انتخاص من جو پہلے بین علوی کہست کا موضوع رہ جیکے تہوں کثیر</u> نتكى كېست نموباب بوماتى ہے۔

علاج - ملاحظه هو بدائشي آتشك صفه 117-

اکتسانی آنشک بریقان (جوآنشک کے ابتدائی درجوں ہیں اکثر مواكراب اورة رسينو بنزال كوركبات كرواج مد ببلي معلوم نها الطامركرا ہے کہ یہ مرایت ایک مادالبتاب مگر پداکرسکتی ہے۔ آخری درول میں آتشک جگر کا صمغید بیدا کردیتی ہے۔ اِس کے عام خصائف وہی ہونتے ہی جودور ، مقالات كصمنييس يك ماتيس اورأس بن بيج موث بحى إك ماتيم م وبتس رُوی زر د تودسه بس جولو جدار ۱ ور بیکدار بوت بس ا ور ر ۱ دی لیفی با فت کے ایک منطقہ سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے کنرالتعلاد سند نككر منعسل كبدى جرم كاندرجاني براس ليفي ما فت ك انقباض سے جگركى یب یاستن بدا ہوجا تا ہے، جس کی تہ میں اُسعد بدا کرنے والا واقع بومات - اور اِس طرح سے مكر نا بھوار فوربر لختكدار اور اِس طرح سے مكر نا بھوار فوربر لختكدار اور اِس طرح ہے۔ اکثر اوقات صحفیے مرکز میں توٹ میوٹ کرایک رہم نماریخت بنجاتے ہیں۔ إس كے برعكس مكن شركہ وہ بالكل تبغي بنجاميں اور إس كانبنبه به بوكه البيخففانية مسوائ اور كيم باتى ندرس يامكن بكران من كلسى ذرات كاجاد موا مند-غیتی جگراکٹر پربشی موجانے ہیں، اور اس کانتیجہ یہ بہوسکتا ہے کہ وہ باوجودندنی

انقیانسات کے بڑی جسامت کے بول ۔ آٹٹک کی وجہ سے بونے والااکے وہ ا تغیر محرد کبدی التہاب ہے ۔ اغلب بے کہ کیر گفتگی کہبت کی بعض اصابتوں میں بسب آٹٹک ہی ہو۔

علی ج ۔ ابتدائی اصابتوں ہے آپوڈائڈ آف بولماسیم صمغیبہ کو برمت گھٹاکر اُس سے ساتھ کے بخار کوروک دیگا ۔ سالور سان (salvarsan) بھی احتیاط کے ساتھ آزمایا جاسکتا ہے 'اور اِس صورت میں مربض کو کا ربوہا سکتا ہے 'اور اِس صورت میں مربض کو کا ربوہا نوفائد ہے ک دئے جائیں لیکن جب کہذ ندبات اور کوسیع جربشی مرض موجود ہوں توفائد ہے ک

توقع بہت کم ہوستی ہے۔ مندرن میرت بی تفریراً ہمیشہ مام مرزن کا جزوہوا ہے۔ (ملاحظ ملمو

وختی تدکرن منتخه 163)-

گرمی**ن نوبالیدی**

(new growths in the liver)

ت جگر کا واحد سلعہ جو کچے بھی عام ہے' سرطان ہے۔ دورے اکثر الو تو ہم احا میں سے سب ذیل ہیں: کہفکی عروقی سلعہ (cavernous angeioma)' سادہ دوریہ (lymphadenomatous)' اور وہ کمفی غدّی سلعی مطووحات (simple cysts)

مرقوم ہیں ۔

deposits) جرمض آو جن كرما تقد مثلازم موت بي بي أذبي كوئي معين طلات بيداكرت بي أذبي كوئي معين طلات (spindle-cell sarcoma) و أويري محمى سلعه (cysto-مديدالانيني لحي سلعه (melano-sarcoma) وويري محمى سلعه (adenoma) بمي اور عدى سلعه (adenoma) بمي

ر منتخیم (fatty liver)

شحمی در رومنه ش (fatty infiltration) یکبدی خلیات یط بی طویر شخر کی تفوزی مقدار موج در رستی ہے۔ اجس حالات میں یہ تعدیلی شمر ہے : متمازیادہ موج ا ہے۔ یشک سی الخطاط (fatty degeneration) - اس است میل شمر کے طب بیری خواص میں تبدیلی ہوجاتی ہے۔ لئیجیاتی طور پر است خلیات کے اندر گلی بجول کے طور پر و بکھاجا سکتا ہے اور اسی وجہ سے خلیات انمطاط یا فنٹر ہوجا ہے ہیں ۔

مجت اسببی و برای اور انحطاط که به شهار اسببی و ان می مندرجه ذبل شامل میں: _حل اور رسا عنت _عموی فر بهی _ فاق کشی ـ حگرکا اسلافتل قلب میں ۔ ابیا فریا بیطس ب کاعلاج نه کیا جائے انتیاج (eclampsia) محموی حالتی کہ جن میں سموم اور ملبی میش خطر کو نقصال رسیده کردیتے ہیں ۔ شدید عمر و موتیس ۔ حگر کاما و ننو اور دوسرے المون ۔ فاسفور ک شکمیا کاربن اناکسائیڈ عیم و موتیس ۔ حگر کاما و ننو اور دوسرے المون ۔ فاسفور ک شکمیا کاربن اناکسائیڈ (chloroform) نینائل المشید در از بن طراکلورائیڈ (chloroform) مینائل المشید در از بن میراکلورائیڈ (phenyl hydrazine)

و هجبره کا سمی است سنتی مگر بهت برا بروجانا ہے۔ اس کی سطح حکنی موتی ہے ' اس کے کنا رے کسیقدرگول موتے ہیں اور تراشے براس کا رنگ خدی مانل زرد اور منظر کیسال ہو تاہی اور مکن ہے یہ فی الحقیقت یا نی میں نیرے ۔ علا مات ۔ شیم مگر میں در دبائل نہیں ہوتا۔ اس کو میں کرنا وشوار موتا ہے' کیونکہ یہ نرم کنا فت کا جو آہے گو کہ بڑا اور جکنا جو آہے ۔ نیز مکن ہے مشکمی دیوا ا فرم جو۔ فی الجملہ س کے علامات تعبیبی حالت کے علامات ہوتتے ہیں ۔ فربسی پرجو فسل ہے خاص کراں کو طاحظہ کیا جائے ۔

تری طور بریم الم آم کیا گیا کہ البلب ربودہ کتوں میں فر پابیلس میں مرور مت کے ساتھ اکٹر اوقات بظاہر اسلاح ہوگئی۔ کم مشکر خارج مہدئی واس کے باوج و یہ میوان بالا خرم گیا اور اس میں ایک شجیم مگر پایا گیا۔ جب ان حیوا نول کولب لبہ براہ دمن ویا گیا تو وہ صحت مندر ہے لیلبہ ایس جوما وہ نیفا کاسب ہے مکن ہے وہ کولس (choline) ہو (79)۔

يئر بشم رض

(LARDACEOUS DISEASE)

نشأ آستامرض (amyloid disease)

تقیق الصدر اور آبر رہی کے تعلق میں چر بیشی انحطاط کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہو۔

اور جو کا جگران اعضامیں سے ایک عضوب 'جر بیشیز او قات ما و من ہو جاتے ہیں المہذا بیال اس انحطاط کا ایک مختصر بیان درج کر دینا ضروری ہے ۔ ان بی افتو کے اندر آب سخت ' بے رنگ ' نیم شفاف' پروٹمنی او ہے کا جاؤ ہوجا آہے ، جن کی بہت سی ٹائروسین (tyrosine) (لارڈ لیمن انشانسا = lardacein or amyloid) ہوجوں کا بروسی کو دیتے ہیں۔ مثلا آبی وٹون کا موجوں موتی ہے ' اور بعض کو آب کہ رہے مجبور سے شرخ مہاکنی دنگ کا کرو تنا ہے۔

از می محلول اس کا رنگ بدل کراسے گہرے مجبور سے شرخ مہاکنی دنگ کا کرو تنا ہے۔

از و مگر کی ایک ترامش پر (مس کو بہلے وصور خون سے متر اکر دیا گیا ہو) آبی وٹون کا کہ وہا تا ہے۔

از ان بعد ہلکا سفیورک آبید شائل کروینے سے یہ رنگ بدل کرسیا وارغوانی موجا آب از ان بعد ہلکا سفیورک آبید شائل کروینے سے یہ رنگ بدل کرسیا وارغوانی موجا آب شرخ اور ایسانس کی تعدرت بافت کا جریشی یا نشا آسا او تے کو مرخ بنا و تی ہے ' لیکن گروہ پیشس کی تعدرت بافت کا جریشی یا نشا آسا او تے کو مرخ بنا و تی ہے ' لیکن گروہ پیشس کی تعدرت بافت کا حریت بافت کا حریب کو میں کا تعدرت بافت کا حریب کیا تو دیسیش کی تعدرت بافت کا حریب بافت کا میں کی تعدرت بافت کا حریب کر دیسیش کی تعدرت بافت کا حریب کا کو تا ہو گئی کیا گروہ پر کریش کی تعدرت بافت کا دیس کو بیک گروہ پر کسی کی تعدرت بافت کا حریب کی کی کر دیسیشن کی تعدرت بافت کا حریب کی کر دیسیشن کی تعدرت بافت کا دیسی کی تعدرت بافت کا دیسی کی تعدرت بافت کا دیسی کر دیسیشن کی کی تعدرت بافت کا دیسی کر دیسیشن کی کر دیسیشن کو کو کر کیسی کی تعدرت بافت کا دیسی کا کر دیسیشن کی کر دیسیشن کر دیسیشن کی کر دیسیشن کر دیسیشن کی کر دیسیشن کی کر دیسیشن کی کر دیسیشن کر دیسیشن کی کر دیسیشن ک

رنگ نیلاہومآ ہے۔

من با **فتوں میں بیرے بشی ا** وہ یا یاجا آ ہے۔ وہ بہ ترتبب ز مانی *م* عروق ومويد كي ويواري ' دويم مختلف أقصالي بانتين اور بالآخر عفنو كے غدی نيايیا مِی (بشر کمیکدان میں یہ ما دہ یا ایمائے)۔ورختیفت یہ مارہ و ایسے محلّ و توع کے لماظ معن زیادہ تر بین خلوی ہوتا ہے۔ بیاسنچ جیوٹی شرائمین میں اس کا جسک کو درمیانی طبقه کے عفلی ریشوں کے خلیات کے درمیان ہوتا ہے اور اُن کو ایک دورسے سے علیدہ کرتا ہے۔ طحال میں برگودے کے خلیات کے درمیان وهار بوں اور حکمتیوں کی طرح موجود رہنا ہے۔ اور حکریں بیعروق شعریہ اور مادی فلبات کے درمیان مانک ریزوں کی صورت میں ٹرا ہوا ہوتا ہے۔ درحقیقت یه اتنا انحطاط نبیس که ختنا ساخت میں ایک قسم کا اضافہ ہے اوروہ عثوسس ا معناجواس سے اُوف ہوجاتے ہیں عمواً بہت بڑے ہوجاتے ہیں عروق اس کا جوتعلق ہے اس سے ظاہر ہو تاہے کہ اس کا جا وُخون یں سے ہو آہے۔ بداکتر و بنشتر ملی ل گردون حگر' ا معامز ا ورمعدے میں واقع ہوتاہے' اور کھیٹتے موئة واترك ساته فوق الكليدكيول عدولمفائية ورقبه أوريل مبيضين واور رخم میں بَیرَ بیشی جا رُجیم کے کسی تمبی حصتے ہیں طومل تقیع موسے کے باعث ہوتا ہے' اور کسبل رہیں' ہو تشک التی' ہر ہوں اور مفاصل کے دَر نی مرضِ اور تقبیح الصدّ م بالنفوص مام الم إن تشك مي بلا تبتيح كے بھى -

جگویل بر بیان عرق تغیرانبدار افت کورمانی منطقه مین دیکیا با ا ب به بهان عرق شعریه شریان کبدی که انقدا ات کے ساتھ نها بت قریبی طور بر والبته ہوتے ہیں۔ جون جون بیجا و بڑ بتا جا آہے کبدی خلیات مضغوط بوکر خدول ہوتے جانے ہیں لیکن خود ان کے اندرجر بشی جا و کسرت کبی کبی ہی ہوتا ہے۔ حگر ہے انتہا بڑا ہوجا آہے اس کی سطح بجنی اور کورکیتیات گول ہوجاتی ہے اور اس میں دَرویا آلیمیت مطلق نہیں ہوتی۔ یہ مرض برقان نہیں بیداکر تا۔ اس کے ساتھ تبیبی مرض کے علامات موجود ہوتے ہیں ' اور ساتھ ہی اکثر محمال کی کلانی ' البیومن ہولیت اور اسہال می ' جودو محرب مل طب مجلده وم

اعضاکے اندر کس کے جاو کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جریشی مگر جوساتھ ہی ہ تشکی صمغیہ یا نُد م کامِل و توع ہو' قدر تا اپنی ہموار جگنی مطم کو کھو دیتا ہے' گروہ اپنے دور س ملازه ت کی و مبه سیدسشنا خت کیاجاسکنتا ہے۔ بابی دوران خون ننها یَربشی تغیریسے متسد دنہیں ہوتا' اور کو انتشقا ہشکمی اکثر اوقات موجود م**وتاہے وہ بشت**ر استشقائے کئی کے ساتھ متبلازم ہو تاہے' اور اٹن دونوں کو گردوں کے میمزمال مثب سے مسوب کرا جا ہے' یا مکن ہے کہ وہ دو سری بیجیب یا گیول مشلاً کہیت صعفیہ یا مزمن التهاب باربطون کے باعث موں ۔ گرد ہ کا چربشی مرض اکثر کلا*ل مف*ید گروه کاما منظر پیداکر دیتا ہے ۔خرد مینی امتحان برتعنبای مجھا بسا او فات سَب سے یہلے تبدیل موتاہے اور اس کے بعد کیے بعد وگرے عروق ور سرندہ عروق متعتبمہ ا عروق برآدنده الاين انبوني عرق - تايم بعض اصابتول مي يه تبد لي عسروق تعقیمہ میں اس وقت سے پہلے ہا ئی جاتی کیے جب کہ بیمنبلی مجھے میں ویکی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کلال سفید گردے کے التہا بی تغیرات موجود مو تے میں پریتی طَعَال براهي بوئي مخسط اور حكيني بوتي ب ينبدي ملي اي عوق كو إورميليكيا في جميمول (Malpighian corpuscles) كومتنا تركرتي ب اورمليكيا في جميم مطع برسفیدوا فول کے طور پر نظر آتے ہیں (صابوطمال = sago spleen)-دوسری اصا تبول میں جربشی آوہ گودے کے خلیات کے درمیان مطسر وج توا ہے اورعینوزیا دہ کیاں طور برمشاحب ہوتاہے۔

مور ایک ایک استان موروک کے خور ایک ایک اسکا ما بہا ہیں کہ جسے۔ ایک ایسی اما بہا ہیں کہ جس بی طویل المدت تقیی ضرر یا تا گئی ہ تشک ہو البیون لولیت کی موجو دگی ہی موض کے امکا ن کا استارہ کرے گئی الفعوس اگر طمال یا تکر بہت فرسے ہوئے ہوں۔ ہوں۔ بیشاب میں جند زجاجی یا خداتی سبا کک موجود ہوتے ہیں اور گا ہے ایسی سبت تعلل ایسے سبا کک جرکر پر بشی تعالی دیتے ہیں۔ اگر گورے کے وظا لف میں بہت تعلل واقع ہوگئی ہوئے موض برائٹ کے معالم تعدمتا یہ بوشکتی ہے اور آنت کے متلازم جربشی مرض کی وج سے امہمال موجود ہومکتی ہے۔ اور آنت کے متلازم جربشی مرض کی وج سے امہمال موجود ہومکتی ہے۔ اور آنت کے متلازم جربشی مرض کی وج سے امہمال موجود ہومکتی ہے۔ اور آنت کے متلازم جربشی مرض کی وج سے امہمال موجود ہومکتی ہے۔ اور آنت کے متلازم جربشی مرض کی وج سے امہمال موجود ہومکتی ہے۔ اور آنت کے متلازم جربشی مرض کی وج سے امہمال موجود ہومکتی ہے۔

على بليد دوم على الما

تخنیف بوجانا مرقوم ہے ۔ ترقی پذیراستقسالاً پوریا دمویت خندکن اسمال مصلی التہابات اور کبدی عدم کفایت سے موت واقع بوجاتی ہے ۔
علاج ۔ اگر مکن بوتو سب دور کردینا چاہئے ۔ یہ لِ ربوی میں تو نامکن کُر کیکن سٹ ید فقیج کے دوسرے اسباب کا جراحی طریفہ سے علاج کر احمکن مو اور پڑائیم آوڈ اُکٹر کا ڈکیور آک ایکن (لولئ) کومین اور وہ مقویات دینے جا ہمئیں۔ آوڈ اکٹر کا ڈکیور آک ایرن و لولئ مشنیم آیو ڈائیڈ استعمال کرنے چاہئیں۔

جگرکاسطان

(carcinoma of the liver)

ا ترطان مگری جو اصابتی ملتی ہیں اُن میں سے ایک نہایت بڑی تعداد ان کی سے جو دو سرے احث اور بالخصوص معدے آ نت مرارہ شق با بی یں کے خدد کر جم یا لیستان) میں کے سرطانی مطورهات کے بعد پیدا ہوجاتی ہے۔ سرطانی خطیے وریدا مباب کی شاخوں کے ذرابیہ سے مگریس بہنچ کخت کی عرف شعریہ میں جاگزیں ہوجاتے ہیں۔ اُنا فری مسرطان کی فوعیت اس سے ضعریہ میں جاگزیں ہوجاتے ہیں۔ اُنا فری مسرطان کی فوعیت ہے میں اسے مرم اسخت یا سیاہ موسے کا وارو مدار اور لی سلومی فوعیت ہے موتا ہے۔

أكريه سرطان منتشرب توحكر محض لرا بوجأ اليكين جب يركر كمول إجهاكان ر وليول كي شكل من موجود مِوْ تُوصُّر مِي أن كه ساتمه نهايت منتلف تتكليب اختياد كوليّ ہے۔ ہر گر بک مرسمت میں کمیا ک طور پر ٹر سے اور اس طرح اپنی مل کو کلو بھے نما ركھنے كا رجمان ركھنى ہے اور جب وہ سطح بر بہنچ ماتى ہيے تووہ ايك سخبر محتب' یا نیمرکروی ٹروں بالبدگی کے طور پر آنجھز آتی ہے ۔لیکن جب گرمکس منعبتہ بڑی' شلاً فظریں لے اتا ہ ایج' ہوجاتی ہیں تومرکز میں وہ اکٹر ذراتی ماشحی تھی۔ کی مورت میں لؤٹ مجبوٹ ماتی ہیں اور اس کا متبعہ یہ موتا ہو کہ وہ کر ہمیں وسطح یراً بھری ہوئی ہوتی ہیں' ایک مانٹ پر بلاسہارا ہونے کی وجہ ہے' اندر دھنا جاتی ہں اور ایک مرکزی تشب یا نا فیغی (umbilication) پیدا کردیتی ہیر براتسي مالت ہے جو تبعض او قات اگلی د بوارست کم کی راہ ہے محبوس موسکتی ہے۔ حَرِ كَي زَيرِسِ كُورِ بِي بِي قاعده اوركر كم وارموتى عِياً - ترامش لين يراليا مَرَّ سپیدسرطانی بالیدگی کے بے قاعدہ رقبے بیش کر ناہے ہیں کے خاکے کم وہمیش مدور موتے ہیں۔ کنب نہ بڑے رفنے مرکز میں زم ہورہے ہیں اور اکن میں سے نبیت سے رنفے تز فان کی وجہ سے دیعتے دار ہو گئے ہیں۔ وہ کبدی بافنت جو اُک کے درمیبال ماٹل ہے اُ اکٹز گرے بعورے مازر درنگ کی ہوتی ہے جب سرطان کا آغاز مرارہ ' بافنات صفراسے ہُو' یا دوشق بابی سے اندر کو بڑھ گیا ہو' تو اسکی بالبید کی اسی خطے میں وسیعے زین بوتی بيه ٔ مامکن سے کُه اُسی مِن مالکل محدو د مویعض او قات خالی مراره ٬ یا امیها مرار حسیس كي حصاة موجود مول اكب سرطاني نودي مفروت بالرا موا موا موا الله - شقّ ما نی کے قریب کی سرطانی گرمگیس قنات صفرایا وریدالباب کو دیا کر*پیچکامگتی چر* اورْمکن ہے کہ آخرا لذکراس مو البیدسے الکل بُر ہوجائے۔

ە فاكىئىك زى تصويرس مى دىكەلائى دىتا بىھ كلانى زيا دە ترسىنچەكى تی ہے الیکن مکن ہے کہ محدّب سطح سے بھی بڑے بڑے تو دے بڑھدکر ڈ ایا فرام کوا و برکے طرف دھکیل دیں اور اس طرح قاعدہُ شش کو دیا کہ پیچکا دیں۔ مِ مركا ني تودے كى سطح تعريباً بچركى سى شخىٰ ركھتى ہے، جو كربت يا چربشى , طور بر خن تربوتی ہے اور سخت سرطان سے نرم طبعی ررمی تغیراکهٔ مشناخت که جا مکتاب بیرقان تقریبا م جو اب اور مروا يه و كلا يا حاسكتاب كدوه صفرار كي فاف نة مروبا وُطرحا ہے کا متبحہ ہے' الخصوص اُن اصابتوں میں حہاں س قِ إِ فِي مِهِ مِنْ مِو مِ وأَنْ دُن مَرِكَ كَا راست كاننفه طاصلُ مِوّا -اسي طرح استنقاء من كر اكثر موجود برقائب ليكن بهيشد نهين اوريه سال ثافهي أس قدر وا فربوتا ہے حن فَدر کہبت میں۔ ہیں کا انصیار مشترور بالبار یا اُس کی بڑی شاخوں برراست و اِ و بڑنے بر مواسے اور کبھی کمبھی ایک تمران التهاب إربطون بير - نيز لاغرئ شحوب اورا نبطاح جوحبيث بيعيغ سرطاني رطان مگر کی بہت سی اساتوں ا مرائن کا عام خاصہ ہیں' موجود ہوتے ہیں۔ ہ میں ارتفاع مرارت ہوتا ہے اور کہج کہی اس کے استندادات اور فترات وَ نِسِهِ بِي بُوسِتِهِ بِي جِسِهِ كَدُمُونِ إِحْبَنَ مِن -

تشخیص ایک بورسے شخص میں بڑھا ہوا طراور یر قان جوکئی او مسے ہو مربعنوں کی اکثریت میں طرکے سرطان الب لبہ کے سرطان کے مامٹ ہو آہے 'اگر جہ کمی کہی یہ بھی مکن ہے کہ منا ت صفرا ایک سنگ صفرا وی سے متعدد بوگئی ہو۔ اگر طرکی سطح برسخت اور ناہموار گر ہمیں محسوس موتی موں تو سے متعدد بوگئی شخیص نہایت اغلب ہے ۔ وہ آ بھار جسمند یہ اور وہ نرم یا سے ہو عمر آ منفرد بو واج 'اس کا قطرا کی اینج یا زائد مو ناہے 'اور وہ نرم یا کی کھر اور مواج 'اور وہ نرم یا کی کھر اور مونا ہے ۔ اگر طرکی شختی کیساں طور بر ہواور بہت زیا وہ نہو تو مرطان کا بوفامحن قرین قیاس ہے ۔ جن اصا تبول میں برقان نہو گرکا برھا موا نامموار کی مونا موا نامموار کی مونا مونا ناموار کی مونا مونا ناموار کی مونا مونا ناموار کی مونا مونا ناموار کی مونا مونا کی مونا مونا ناموار کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا مونا نامور کی مونا مونا کی مونا کی مونا کی مونا کی مونا کی کانا کی مونا کی مونا کی مونا کی کانا کی مونا کی کی مونا کی

اورگومڑے وار مہونا اور مریض میں لا غری کاموج و مہونا عموفاً منیز علامات ہوتے ہیں۔
جُر بشی اور اکہب حگر نبیتہ کی سخت اور زیا وہ بموار موتے ہیں۔ ان دونوں کالوں
میں طمال بھی اکثر او قات ٹرسی مہوئی موتی ہے' پہلی حالت میں جُر بشی جا کہ ہے اور دومہ می حالت میں جُر بشی جا کہ ہے اور دومہ می حالت میں وریدی رکو دکی وجہ ہے' ور انحا لیکہ طمال کی سرطانی کلانی
نبیشہ غیرعام موتی ہے۔ ہم تشکی حگر نا مجواد اور در دناک موسکتے ہیں' لیکن یہ اکثر
نسبتہ نوع اسخاص میں موتے ہیں' اور اپنی مخصوص سرگذشت رکھتے ہیں۔ شکہ اسکان کوناہے ہنیں کہ تی مسلم کی ماکمان کوناہے ہنیں کہ تی مسلم کی گائی ہے۔

إندار أيه نهايت إس الكيزاور برا بوقائد -مدت مض شاذى باره مبينوں سدزائد بوتى ہے الكينِ كبي كبي دويا تين سال بمي بوسكتى ہے - است

زم نم کی نوبالیدیں ایک یا دُوا ہِ کے اندرسی الاکت پیدا کرسکتی ہیں۔ پر مسلل عسلل ہے۔ بیمض مختِف ہوسکتا ہے' امداس بیشتل ہے کہ وَرو کِی

تنگین اور دوسرے علامات کا تدارک کرویا جائے، بیٹٹر اُن علامات کا جواعبہ اُ مضم سے متعلق مول مثلاً تھے، ریجیت اور قبض فند اہلی مگر مغذی مونی جائے۔

ژ*وبری مثن*

(cystic disease)

اس اور حالت بی کثیرالتعداد دو برے کم و بیش مجمع طور برواتم ہو جو بھی جن کی جساست آب اپنے یا زائد قطری موتی ہے اور من میں ایک صاحب یا دروی کا بل اسمر آبی کا بیا جھا جو اجو ہے ۔ یہ مرض بنیتر اوقات کردوں اور دوسر ایک صاحب یا مشاکے دو بری مرض کے ساتھ متلازم مو آہے۔ حکمن ہے کہ حکم بڑھا موا جو کا مشاکے دو بری مرض کے ساتھ متلازم مو آہے۔ حکمن ہے کہ حکم بڑھا موا ایک کو شخص اندا کی مشخص اندا کے علاوہ اور کوئی علامات موجود نہیں موقے اور اس کی تشخیص اندا اور علاج کا انحصار گردوں کے مثال تغیر بر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ مواکرتا ہے (ملاحظہ بھو گردے کا دو بری مرض)۔

كروكبدى النهاب

(PERIHEPATITIS)

امراضیات ۔ گرد کبدی التهاب یضے کرکے کید کا التهاب مادیا مزمن محدود المقام یا زیادہ عام طور پرشنشر موسکتاہے ۔ بیکسی ایسے ضرر سے بیدا ہوجاتا ہے جر کریس یا اس کے قرب وجوار میں ہو کا لخصوص کہنا آتشکی من التہابِ مرارہ 'مرطان کلیسیہ اور زیر ڈایا فرامی عیونے (subphreme abscess) سے اور مکن ہے کہ یہ ایک عمومی البتاب بار لطون کا جزو ہو۔

علا ات - نیسهٔ طرک المهاب ما دیس مقامی الیمیت اور در و موتے بس بالخصوص نفس کے علی من اور در و موتے بس بالخصوص نفس کے علی من اور مکن ہے کہ ایک رگڑ کی آواز سنائی دے کو ایک رکڑ تھ رکھنے پر ایک رکڑ محموس ہو۔ مزمن اصا بنول میں حکر شخت موتا ہے اور مکن ہے کہ منوالی استسقا کے شکمی جمی و مکھا جائے۔ بنیا دی سب کا علائے کرنا چاہئے۔

التهاب وريدالباب

(PYLEPHLEBITIS)

یه و دُسکلول کی کیفے اِ نضامی اور تقیتی ہو تا ہے، جن کا تذکرہ بیلے کیا گیا گ^ک کیکا تو استقاقیکی کے ایک سبب کی حیثیت سے، اور دو سرے کا مگرکے متعارفراقا کے تعلق میں (لملاحظہ ہو انگر بزی صفحہ 390)۔

انضامي التهاب وربدالباب

(adhesive pylephlebitis)

زیاده عام طور بر وریدالباب کی علیمت بوتی ہے جس میں خون کا تعملاً

وور یہ بی جیک کر بالآخراسی طرح متعفیٰ ہوجا آہے جس طرح کہ ایک علقہ کسی
وور یہ بی امام برمتعفیٰ مو آہے ۔ اسس کے اسباب وہ تغیرات ہیں جور بدا لمباب
باکس کی توزیع میں جوک خون کا ابطار پیدا کردیتے ہیں مثلاً کہت اسکی مون وریدی تنہ پر رسولیوں کا دباؤیا گر دکہ بی التہاب میں اسس کا بھی مبلا موجا ان یا
متن کر بدی کے قریب مزمن بار مطوبی التہاب ۔ وریدالباب کا یہ تسدو مون بینی (Banti's disease) کی ایک سکل پیدا کردیتا ہے سینے کمی کی عدم ومویت بسین کے ساتھ کہبت محمور موریت

تقيم التهاب وربدالباب

(suppurative pylephlebitis)

یہ تفریباً بہشہ سے کے صررات کی سرایت کے سبب سے واقع مواا سے ' (شکروہ رقبہ ہے کہ مس سے ورید الباب کو خون کی رسد بہنچی ہے)۔ فرات کی شالیس البہاب زائدہ دوریہ (جومام ترین سب ہے) معامستقیم قولون ما جھوٹی آنتوں کے قروت معدی قرص اور شکم یا حض کا کوئی تقیے ہیں۔ مکن مجکم نوزائیدہ بچیمیں وریدئر تری کے عفن التهاب وریدی سے ویدالباب کو تراپیت بہنچ جائے ۔ شافراصا تبول ہیں راست تصریب بھی وریدالباب کا تعتبی البتا بشروع ہوسکتا ہے۔

یفادعموا وربدالبابی محیطی شاخون می آغازید پر مواجه وربد کی دیوار مترب موکر متنج موصلی ہے آبی علقہ بن طاقہ وروہ بیب بن کر نوٹ مجیوٹ میا آہے اور حگر کے اندر کی دکن بی سشاخوں میں اس کے نتقل موسے سے علقبت التہاب و یدی اور تقیم کے تا زہ مرکز بیدا ہوجاتے ہیں ۔ یا لا فریم سی اصا نبول میں 'حگر میں متعدد حیو شے حیو سے میبوڈے بن ماتے ہیں ۔ حگر بڑا اور نرم ہوجا آہ ہے ۔ ورید الباب کی شاخیں توشنے میجو نے والے علقوں' یا بیب 'یا من منتقر سیال سے محد طِ تی ہیں ۔ ملی ل بڑی موجا تی ہے ' اور کہی کم می التہاب بار لیلون می بیدا ہوجا آہے ۔

علامات میره بسید کرد و عادتی بخار تشعریرهٔ بسید که مدم دمویت اور انبطاح موتاج میکن می کدوریدالباب کا تعد دکسیقد راستما می بید اور انبطاح موتاج میکن می کدوریدالباب کا تعد دکسیقد راستما می بید اکر دین کا نی بو اور طحال بره ما تی ہے ۔ برقان اکثر موجود موتا ہے لیکن بمیشہ نہیں ۔ اگر عبور کے کثیر التعدا و بین نومکن ب کد مگر کی کلانی او در اور اکیمیت موجود موت برازمین عموا اسٹر کو اکمین (stercolulm) موجود موتا ہے ۔ ایک کما نفائدی حالت طاری بوجاتی ہے میں فرجول اور ندیان موتا ہے ۔ ایک کما نفائدی حالت طاری بوجاتی ہے میں مرض عمواً ترتی یا کرفائد مہملک ہے۔ ایک اور ایک سے سات یا آئے می موقع دس میں مرض عمواً ترتی یا کرفائد مہملک میں مرض عمواً ترتی یا کرفائد کا تعدا کی میں مرض عمواً ترتی یا کرفائد کیں میں مرض عمواً ترتی کا کو کا کو کا کہ کی کی کو کو کو کی کو کی کرفائد کی کو کی کرفائد کی کو کو کو کرفائد کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کرفائد کی کو کو کرفائد کی کو کرفائد کی کو کو کو کو کو کرفائد کی کو کو کو کرفائد کرفائد کی کو کرفائد کرفائد کی کو کرفائد کی کو کرفائد کو کرفائد کی کو کرفائد کو کرفائد کی کو کرفائد کو کرفائد کی کو کرفائد کی کو کرفائد کی کو کرفائد کو کرفائد کی کو کرفائد کو کرفائد کو کرفائد کرفائد کو کرفائد کرفائد کو کرفائد کو کرفائد کو کرفائد کو کرفائد کرفائد کرفائد

موما سبط می منظی بر مرض آمانی نظرانداز موجا آئے۔ تغییج الدیم عفر نشالیم میں ملیر یا بی بخاروں کا مادان موجول کے نظرانداز موجا آئے۔ تغییج الدیم عفراً مدار بی حضرائی کروڑا کا فاری خواج کی التہاب قنائت صغراً مدار بی حضرائی کروڑا کا فاریڈ کی مقامی شہاوت کور با بی رقبہ میں سرایت کے مقامی شہاوت کا در با بی رقبہ میں سرایت کے مقامی سرمیاں کی کلانی پیرسب تغییل کا در بدالیاب بردلالت کرتے ہیں۔ جب مقامی امارات غیر موجود موہاں کو

اس واقعہ سے کرمن کے تقیم الدم بلاکسی فارجی زخم کے اور بلاالتہا ب دروں قلبہ
(endocarditus) کے موجود ہے کسی سے کمفنو کے سرچنی عفونت ہونے کا
انتادہ بوا ہے ۔ تقیم الدم کے علامات منایاں برفان اور التہا ہے مرارہ یا
سنگہا کے صفر ای شہا دن تفنی التہابِ فنات صفرا بردلالت کریں گے۔
سنگہا کے صفر ای شہا دن تفنی التہابِ فنات صفرا بردلالت کریں گے۔
کمسلاج کا طاصل ہے کی است شنائے اس کے کہ جو تخفیف ورو کے خوابی اور
وگر علامات کے لئے اختیار کی طائے ۔

معيرفيا بست صفاومي الدكاامني



الد مرار برگاری طبعی مراره (شعاع بنگاشت مسار ملی لنڈسے لاک نے لیے)



ب مراره نگاری مراره می صبنی سنگ موجودی و (شعاع نگاشت مسئر دُلبولندس لاک فے لی ہے) بالفابل سفر موجودی و شعاع نگاشت مسئر دُلبولند سے لاک فیل سے ا

وظيفي المتحانا

مراره نگاری (cholecystography) - طراتیدار آنام (Graham's مراره نگاری (cholecystography) - طراتیدار آنامی method) مرا شامی سخت که بین خصارات (dyes) مرا شامی سخت که بیدان کاجر سے صفراء کے لئے غیر شفاف موتے ہیں جوئے نون ہیں بنینے کے بیدان کاجر سے صفراء کے اندا فراز موبا آپ ورین منا توں ہی کہوں کے بعد بیصفوا معداس خفاب کے مرارہ کے اندیکر کر بوجا آپ (لیکن منا توں ہی مرکز نہیں موتا) کہ در اشعاع کا استان کی جاسکتی ہے۔ بھر ایک شمی غذا و کر مرازہ کے و ظبیفہ تنفی کا استحان کیا جاسکتا ہے و جانبی طالت میں سا بدن بیتہ جو اللہ موجونا ہے (صحفات اس اور ۲۰ سور ۲۰ سے) -

مُنيرُّلًا يورُوفينال محسالين (tetra-iodo-phenol phthalein)

موسوع کی جمامت کے کھا فرسے ہو ہے گرام کی متادول ہیں ، بہتی سی مقیم آب
کشیدہ کے اندر حل کرکے ہو بھے شب کے وقت وسطی قیفالی وربد کے اندر شارب سے
کردی جاتی ہے (احتیا طول کے متعلق طاخطہ مو نوار مینو بینزال اور شراب سے
چو ہیں کمنٹے پہلے ملٹی کاسفوف (liquorice powder) دے کرمواری خطے کا
صحفہ لے لیا گیا تھا۔ دن بھر بھی غذا میں دی جاتی ہیں کیک ہو بھی اور میں شعاع
می غذا نہیں وی جاتی ۔ دوسرے ون نو بھے سے کے وقت کا بلاغذا و کئے شعاع
کرئی غذا نہیں وی جاتی ہیں اور اثناعشری کے ساتھ سا بدی جاورت کی تعیین ہیر ہے
گاشتیں لی جاتی ہیں اور اثناعشری کے ساتھ سا بدی جاورت کی تعیین ہیر ہے
گفتے بعد دوسری لا شخاعی تصویر لی جاتی ہے ۔ مندر جالا اشراب سے بعض
اوقات متلی تھے اور جانم گرام) کے متعدوجھوٹے گو ہوجوئے کرا ہی خلائی کیسے بناکر
اوقات متلی تھے ہیں کلیسکن اس صورت میں این کا استجذا ہے کہ یقینی
ہوا ہے۔

مرارے کے ساید کی غیرموج دگی مراری قنا ق کی صدودی کے إحسف؟

اس واقعہ کے سبب سے ہوسکتی ہے کہ مرارہ سکھائے صفرات پورا بھرا مواہد۔ خفیف ساسا یہ خضا ہے کا ارتکاز نہ ہونے کی وج سے موسکتا ہے 'جوالتہاہ مراوہ پر ولالت کرتا ہے مکن ہے کہ مرارہ نظر آئے اور مراری سایہ میں شکہائے صغرار

پردوں سے رہا ہے۔ من ہے کہ مراراں طراعے اور در مرادی ماید کی طراق کی ہیں۔ نبی یا توکیلیئر کے لمحات کی وجہے زیادہ کہرے ساید کے طور بر نظر آئیں کا کالرفتر کی وجہ سے منفی سب ایوں کے طور بڑ کیو کمہ کا لیسٹر بن ان شعاعوں کے لیے

ی وب کے میں کی کی اس کے مور پر میں میں ہیں ہیں۔ اس موس کے سے شاف ہوتی ہے۔ مکن ہے کہ مرارہ کاسایہ قرب وجوار کی بالدوں کیسیہ وغیرہ کے سبب ہے اپنی مگاہ ہے ہٹا ہوا یا ملق ہو۔

ا تناعت ريم (duodenal intubation) اين ا

(Enhorn) کے اتناعث کی انبوبہ سے مرارہ کے مرض کی شخیص کا ایک مفید طریقہ حاصل ہونا ہے اگر جب سے التہا ہے مرارہ اور سنگہا کے صفر اور کی موجود گی کی تفریق نہ ہوگی۔ فاقد کش معدے کے اندر ایک انبوبہ داخل کرد نے بعد اور معدہ کو بہا حتیاط آ ہے عقیم سے وصوک مریض المیں کروٹ پر لیٹنا ہے ، پہال کک کہوہ آنبو بہ اشناعش کے اندر واخل موجائے ، جواس لیٹنا ہے ، پہال کک کہوہ آنبو بہ اشناعش کے اندر واخل موجائے ، بحراس واقعہ سے ظامر ہو جائے ہے کہ آنبوبہ سے استصاص کرنے پر ایک باری جماگ ار سبال حاصل ہو جانا ہے ، جوفدر سے صفراآ کو داور لہمس کے لئے تعدیلی اقلوی سبال حاصل ہو جانا ہے ، جوفدر سے صفراآ کو دور لہمس کے لئے تعدیلی انتراب ہوتا ہو ہے ۔ اثناعث کی دعوہ کا می فی صدی محلول کے ۔ اثا ، سی سی کا انتراب کر دیا جانا ہے ۔ صفرار کا بہ کشت سبلان موتا ہے ، جے با ہم ریحال کر امتحان کر بیا جانا ہے ۔ کالیٹ بین کی ظمول کو دور انسی ہوالت ہی بل سکتا ہے جس کی موجود گی فل ہر ہو ، معدی ہوالت ہی بل سکتا ہے جس میں معدی کر بہ جنداں متر بنیں موتی کہ دور انسی ہوالت ہی بل سکتا ہے جس ہی معدی کر بر جنداں متر بنیں موتی کہونکہ وہ انسی ہوالت ہی بل سکتا ہے جس ہی معدی کا بی معدی کر بہ جنداں میں ہوالت ہی بل سکتا ہے جس ہوالت ہی بل سکتا ہے جس ہوالت ہی بل سکتا ہے جس ہی معدی کی موتود گی فل ہر ہو بی میں ہوالت ہی بل سکتا ہے جس ہور ہو کی موتود گی فل ہر بیتا ہو تو ہور ہوگی ہوالت ہی بل سکتا ہے جس کی دور آن میں ہوالت ہی بل سکتا ہے جس کی دور آن ہو کہ ہور ان ہور ہور کی موتود گی فل ہور ہور کی موتود گی فل موتود گی فل موتود گی فل موتود گی فل موتود گی موتود گی فل موتود گی فل موتود گی موتود گی موتود گی فل موتود گی موتود گی فل موتود گی موتود گی موتود گی فل موتود گی فل موتود گی ک

اس امری شهادت موجوده کشفیقه (migraine) کی معض استین مراره کی غیرطبعی مخلی کے سابخه متلازم موتی میں (83) ـ رُصُفراوی میتیم "bıhary" = migraine" -

صفراوى اله كيمامراض

التهاب مراره

(cholecystitis)

التہاب مرارہ کی عام ترین قسم وہ ستحت الحادیا مزمن سرایت ہے جو نبقا نیے سبح بیہ ہے پیدا ہو جاتی ہے' جومرارے کی دیوار کی ساخت کے اندر سسے على و كيُ كي بي (27) مكن بي كه يه ايك محمولاً خون مدايت مو ينكن البهاب مراره بمیشه التهاب غلاف تماة صفرا (pericholangitis) كے ساتھ مواكراً سبخ جرای امر کی دلالت ہے کہ مرارے میں سرایت کا واحل مگرسے لمفائی عروق کی را ہ سے موسکتا ہے۔ البتہا ب مارد عمواً البنائے اندہ ورویہ (appendicitis) اور سمنی قرمه (peptic ulcer) کے سانحد متلازم مواکر اسب اور بیمکن ہے کہ سات وریا^ا لباب *کی راه سعے جگر میں اور بھرمرارے میں داخل موجا* تی م**یو**۔صف نبقات سبحيد كى باليد كى كالتمناع كراب يبي وجرب كدصفراء عمواً عقيم موا ہے۔التباب کی ایک ابتدائی شکل جوغالباً اس قسم کی مرایت سے پہلاً بوط تی شیاد ا سائوا باری صوافع (strawberry gall bladder) ہے۔ چیوٹے زردی ماکل سبید واسے خلان سے ابھرے ہوئے دکھلائی وسیتے ہیں ۔ خرد مین سے یہ واسے کالبیٹرین کے جاؤ د کھلائی دستے ہیں جونشار مخالی ى سطى تدك يني موتق من سيغ موارك كى كالسائد ملبت (cholestrosis) بدا موجاتی ہے۔ بررائے فامرکی گئی ہے كد طبعی حالات ميں صفسدا ميس كی کا کیمیٹرول (cholestrol) کومرارہ جذب کرلیتا ہیں' اور بیرکہ جب مرارے کی د بوارسرايت زده موجاتي ۽ تديم و بيدا موجاتے ہيں۔ بالآخران مي سيعض لدے موٹ ملیمات مرادے کے اندر جمر جاتے ہیں اور مس طرح مکن ہے کہ بد السيد مركز بن ما مُن من كر ومتعدو تنهم وت مناسكر زيد بن جات بي - به

نگریز میسن اقات اس مض بی بائے جاتے ہیں۔ اسی واسطے التہاب مراو کی ۱۵ فی صدی الکہائے صفراکا اولی سبب ہے' اور بہ نگہائے صفرال التہاب مرارہ کی ۱۵ فی صدی اصابتوں ہیں علیہ کے وقت بائے گئے ہیں بہتی سبی سرایت کے اب بعد نہتا کی دیار ارم ارم کی دازت اور انقباض ہیں اور گردو نیش کے مصول کے ساتھ انفنا اس سبی ہوجاتے ہیں۔ علاوہ نگہائے صفراء کی موجود گی کے سرایت زوہ مارہ سے مزمن التہاب لبلیہ' مگر کی کہبت 'اور قلب' عضلہ' مفصلات رداول اور گردوں بربعید ہمی انترات بیدا ہو نکتے ہیں' اور ایک مزمن طور پر التہاب زوہ مرارہ کے استیمال کے بعدیہ ضررات عائب ہوگئے ہیں' اور ایک مزمن طور پر التہاب زوہ مرارہ کے استیمال کے بعدیہ ضررات عائب ہوگئے ہیں۔

علا آت - نبقی سبی مبداء کا تحت العاداور مزمن التهاب مراره جو اور بیان کیا گیاہ اس کے علامات اپ آغاز میں عمواً غیر محبول موقع میں - فی گفت اس واقعہ کی بنا برکہ التها ب مرارہ کی اصافول کی اکثریت الآخر سنگہائے صغرا میں منہی موتی ہے ' اخیس سنگہائے صغرا کی اتبدائی طلا اس سمیا جا آئے ۔ یہ علامات یہ جی اس مرمنا میں موزش سینہ 'اور ترافی میں موزش سینہ 'اور ترافی کی سنتم درداوردا کی صندی حاست یہ کے نیجا ور دامی علم الکتف کے خطر میں دبائے سے الیمیت می موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی علم الکتف کے خطر میں دبائے سے الیمیت می موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی علم الکتف کے خطر میں دبائے سے الیمیت می موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی علم الکتف کے خطر میں دبائے سے الیمیت می موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی علم الکتف کے خطر میں دبائے سے الیمیت می موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی موتی ہے ۔ سور مضم افتاعش کی

قرعه سے مٹ به موسکتا ہے، گرفذ اکے سانھ کس کا تعلق اتنا نمایاں نہیں ہوتا۔ گیا رھویں اور بارھویں دائمیں سبلیوں اور اَسفل ظهری فقرات کو دبانے سے عمواً در د موباہ ہے۔ نیزاو سرچو ہجیب کیاں بیان کی گئی ہیں ان کے متا طرعلامات پیدا ہوسکتی ہیں بینی سائنس کا بھولنا، قلبی بے قاعد گیاں اور ذسجہ صدریہ ، نیز ژمیت نما التاب مفاصل التہاب لیفی' اور مرض برائٹ کے علامات۔

ماوت دی التها ب مراره کی حالت میں حلکا آغا زماد ہو آ ہے اور
اُس کے سانھ مرارے کے خطے ہیں مواظب یا دَوری ورد ہو آئے 'اورعف لله مشقیمہ کے بالائی حصے ہیں بڑی الیمیت اور استواری محسوس ہوتی ہے۔ مثلیٰ عدم استہا' میلی زبان' تب شا پرفتخریرہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور برقان تقریب ایک تہائی اصا تبول میں۔ بائی قاعدہ شش برا کا رات بالحصوص ممیز موتے ہیں' ایک تہائی اصا تبول میں۔ بائی قاعدہ شش برا کا رات بالحصوص ممیز موتے ہیں' مینے گک کی کمی مکت کات اور بلیکورائی دکرا۔ وایاں ڈایا فرا مفریخ کے موسد کے میں مکن ہے کہ متمد دمرارہ ایک متعین رسولی بناوے اُتغینی برا اور اُتھی میں میں بناوے اُتغینی میں میں بناوے اُتغینی میں میں بناوے اُتغینی بناوے اُتغین بناوے کیا بناوے اُتغین بناوے کیا بناوے اُتغین بناوے کیا ہے بناوے کیا ہے بناوے کیا ہے بناوے کیا ہو بناوے کیا ہے بناوے کیا ہو بناوے کیا ہو بناوے کیا ہو بناوے کیا ہے بناوے کیا ہو بناوے کیا

اصا تول من سپید خلیدل کی کثرت موتی ہے۔ مستخص الت بنیں اور اسس کی تشخص اس وقت کی ماسکتی ہے جب کہ دامیں خیرعام حالت بنیں اور اسس کی تشخیص اس وقت کی ماسکتی ہے جب کہ دامیں ضلعی حالت بنیں شدید در دا در الیمیت اور کسی قدرسو رہضی موجود ہو' اور جبکہ براختیا طامتی ن سے اثنا عشری قرصہ اور التہاب زائدہ وو وید کوفا ہے ادمیث کردیا گیا مو۔ مرارہ برکاری اور مرارہ کی مسلمی کشیل جوصفی 403 پر بیان کی کئی ہے نتیجہ میں مفید موکنی ہے۔

إنذار بيقيفنوا صابتب طبي معالجه سي شغاياب بموجاتي بي

تحسلاً جے۔ طبی علاج الحفوص مرارہ کی تخلی میں ہولت پداکرنے برشتل ہے۔ مفتدس کی ارطبی سکی علی میں لائی جاسکتی ہے۔ بلکہ سکندی تطفیف براہ و ہن بھی دیاجا سکتا ہے، گریہ اسٹ قدر کارگرنہیں موتا تیسی عندائی اور بالحضوص رومن زنیون ' آنا م اونس' ون میں کی بار (84) مجئ فعت بیش میں۔ فراور مرارے کے خطے میں بولسسی اور خلابی اغلبہ لگائے سے التہاب یضیف موسکتی ہے۔ صغراکی سرایت کا ازالہ سوڈیٹم کیل سلیٹ ، آنا ۲۰ گرین ون میں بین اُ وکی یارات کے وقت بمگرزامین (hexamine) د باگرین سے شروع کر کے ۴۰ یا ۔ مرتک برطاکر) دے کر کیا جاسکتا ہے ۔ بسگرزامین کے ہمراہ کا فی فلی مملاً ۴۰ گر من پواسیئم سائٹریٹ وی جاتی ہے ' ساکہ بول قلوی ہوجائے اور بولی خطے کی خرائش بیسکر امین سے واقع نہ ہو' [کیونکہ بسگرزامین ترشی محلول کے اندر لوٹ کر فارالین (formalin) بن جاتی ہے] (64) ہم درگیٹ وشی اور کا الزبار کے پانی خال طور پر ذکر کے قابل ہیں ۔ فندیدا صافتوں میں مرارہ براری مناسب می اوراگر تعبیم موجود ہو تو کل یکی ضوورت ہے۔

(gall stones)

رحصا سي صفراء (cholelithiasis)

الخصوس كليسيم كاربونيث برشتل مول أس وقت إئے جاتے ہيں مبكة مغراوى وناة تسدو بوك كيليم كاربورنيك كے سخت سنرى ائل سنگ انج برشتل بوقت ہيں۔ بوقت ہيں۔

بُرُ سَبِحث اسباب عَلَها عُصفرا اس رسيدگی کی طالت میں زیادہ عام ہوتے ہیں اور مردوں کے نسبت عور توں میں زیادہ کثیر الونوع ہیں فیعود پیشنے اور اب یارخودی الحضوص کالبیڈین شامل رکھنے والی غذا میں اساب

مُعِدّه مِنِ ' اورمتٰ يرخل اور بب مو فه بھی ۔ مُعِدّه مِنِ ' اورمتٰ يرخل اور بب مو فه بھی ۔

، النهاب مراره ہے۔ بیثا بنت کیا جا جیکائے کہ اگر کو ٹی ما دوُغریب ایک نوا ہ کے طور برغل کرنے کے لئے موجود موتونٹ کہا ئے صفرا بن جاتے ہیں خواہ مفراعِقیم ہی کیوں نہ بوریہ ، انی صدی لاشوں کے امتحان میں یا کے گئے ہیں' اورمكن بي كريست بده ربيس (81) ' اگرجيدان كي موجود گي التهاب مرازه بيس زیا وتی پیدا کردیتی ہے۔ بہر کیف مکن ہے کہ التباب کی وجہ سئے مرارے ہی خرامش موراکی یا زیا وہ سنگ اس کے کہفہ سے اِ ہر بحل آئیں یا مرازی فنات م م فروز بومائمیں ۔ اِس کا فوری اثر قنان کا نہاست در درانگیز مشیخ (قولینج صفراوی = biliary colic) مرة ب حس كے ساتھ برقان نبيل موسا ا نغراز کی حالت میں صفراء مرارے کیے اندر نہیں داخل موسکتا ' اور مرازہ تھا يا فعاطى رَيمُ يارِيم ه يُربُوكُ متمد و مَوجاً المحرب الرُسنگ مراري فنات مِن سع كزرجا -تووه مشتركية تمنات ميس وانول بوجا آجئه اوريبال تعبى قولنج صفراوى سبيدا رویتاہیے، لیکن اس قولنج کے ساتھ سریع الزوال بیرفان موجود ہوتا ہے جس کی وجریہ ہے کہ سنگ کی موجود کی کے باعث حکرت صفرا و کے بہاؤیں رکاو طے بیش آتی ہے۔ اگرنگ قنات کے اندر مغروز موتو تدائی برق ان obstructive) (jaundice بيدا بوجاتا معد بيدا نغرانا عام طورير انتقناخ وآلير ampulla of) (Vater میں واقع بوتا ہے جہان قنات کا تطریب سے زیادہ کم موتا ہے۔ یہ ل قیددمندرجہ ذیل اخرات رکھتا ہے۔

د مب) توقع ہوسکتی ہے کہ اِ نغرازِ نگ کا اُٹرمرارے پر یہ موکہ وہ تمد^و ہو ماے ۔ گرعمواً اییا نہیں ہوتا تا دفتیکہ مرارے میں بھی میز ال طور پر حسا د التہاب موجود نہ مو کیو نکہ مزمن التہاب تومرارے کی لیفیٹ پید اکر کے اُسے تسکر او شاہے۔

(ج) جب نگ صفرارانتفاخ والبیرین عنبوطی کے ماتھ شبت ہوجاتا ہے۔ تو بنقراسی فنات جو بہال کھلتی ہے 'اس کے تعلقات اہمیت رکھنے ہیں' اس کی وج یہ ہے کہ وہ بھی غالباً متسد و ہوجائے گی اور منقراسی ہیں کا احتبال موجائے گا اور منقراسی ہیں کا احتبال موجائے گا ۔ خروع صفو ہے فنا ہے معفرار کی ولواروں میں ہے آ سانی گذر کر منقراس میں بہنچ جائیں گے اور محبوس افرازا ہے کے ساتھ حادیا مزمن التہاب بنقراس میں بہنچ جائیں گے (جو اللہ خطر ہو)۔

سنگ معفوار کامرارے کی دیوار کو متقرح کر کے براہ راست اثناعتی با قولون متعوض کے اندر طلاحا او بنداں غیرعام حادثہ نہیں عمر آوہ ایک بڑا ساگ صغرا ہی ہو اسے 'جو قطر میں ایک اپنے یا زائد کا ہوتا ہے ' اور اگر یہ اثنا عشری کے اندر وامل ہوجائے تو مکن ہے کہ لفائنی کے زیریں حصے میں مغروز ہوجائے ' یا اگر یہ قولون کے اندرواخل ہوتو تولون مین (sig moid) یا ممبرز کا دیج ہوجائے میٹ ا سے کی و بیشس ورواور دو تت پیلا ہوئے کے بعد براہ ممبرز خادج ہوجائے میٹ ا معدد تول میں ایک بڑا سنگ قیے سے می خارج مواہے۔

مرارے کے اندرسنگہائے صفراکی موجودگی اور انتقرار کا ایک دورہرا تیجمرادے یا صفرادی تناتوں کامیان ہے اور بیصا ہ صفراء کی تقریب

كل طبر حليروم

ه فی صدی اصابتوں میں یا ایگیا ہے۔ تجربتاً یدو کھلا ایگیا ہے کداگر کینی گیب کے مرارے میں سنگہا کے صغراء اور وہ مرے اجمام غریب و اصل کے ما میں تو فرمزان مرارے میں سنگہا کے صغراء اور وہ مرے اجمام غریب و اصل کے ما میں تو فرمزان یدا ہوکر مرطان پیدا ہوجا آہے (85) .

علاً ات مین بے کرسنگہانے مفرارسالہا سال تک مرا رہے کے اندر را اوركو كى علامات نه بيداكريس مالين دوسري اصا نبول مي علامات تحت اتحاواورمزمن التهاب مراره كه موتيرس اور إن كرماته ساتدح التهاب مراره موناب أس كي سداكره وسوء مضم كوعموة سنك صفواء كالهوم (gall stone dyspepsia) كنته بيب بعض اولمات ننگهائي صغرار ديواژگر میں سے محوس کئے جاسکتے ہیں اور انتیں استے لگانے سے پیٹھنے کا احاس موتا ہے۔ تو لنج معراوی کے عملہ میں مریض کو اکثر ناگیا نی طور پر دائیں مراق اور سبینہ كحه زيرب تصفي مين إشراسيف اور زيري تفتى خصه بي سخت در ومحوس موين مُلَّا ہے' اور بیموماً وائیں سٹانے مک تنشع ہوتا ہے۔ یہ ور داکٹر اس قد بٹ رید ہوتا ہے کہ مریف اکثر دومرا ہوجا اسے کیا فرش یا ستر سر ہیج واب کھانے لگیا ہے۔ مكن ب كر قشعريره بو أور مريض كاربك شاحب موما بأب وهم بوط بوياب اورسا تحدیمی کمبترت کیسینہ آ کرنبض صغیر صعیف اور عمواً سریع ہوجا تی ہے۔ کہیم عرصہ کے بعد ور و وصیما اورستمہ ہوجا آہے ' یہاں تک کہ ایک زیادہ حادقسم کا 'ازہ حلہ ہو۔ یا وروجاری رمناہے اور اس کے آغاز کے جند کھنٹوں ما ایک باووون بعد ببیّا ب میں صبغهٔ صفرانمودار ہوآ ہے اور مریض برّق فی ہوجا آ ہے۔ مکن ہے کر کس کا خاتمہ اس طرح موکد ننگ اٹنا عشری کے اندر جلا جائے اور اسی موت میں صفرار کا سیان بھرآ زادی کے ساتھ موسے لگتا ہے ورور فع ہوجاتا ہے اور یرقان بھی زیادہ تدریحی طور پرصاف ہوجا آ ہے۔جب ابیا ہو توسنگ صفرارکومرا میں تلائش کرنا جا ہئے ' جرائس وقت ماتا ہے جب کہ ہرا زکویا نی میں وصوکراس دصووَن كواكِ حِيلني مِن حِيانا جائے . جب مَنگ مشتر كِية ، فنات مِن مغروز موحائے توعلاه ت انتملاف يذير موت من كيكن مب سازيادة مثيلي علامية " عِلْاكَ كُنَّ منوالي قوليخ مَنْغريرات برقان أورنقصان وزن ہے۔ يونكدسنگهائے صفاء كےسئانھ

ب مراره (ملاحظه مو) متلازم مو آب لهذا مسس کے منا فرطلا اس بھی موجود پیچے مر ، - تولنج ميفراوي كادا دِسندهٔ سعوى تولنج ، كلوى قولنج وغيرو ك ما ته خلط لمط مبوع! نا مکن ہے۔ تیکن سنگہا کے صفائے گذر کے سانعہ در و ہمیشہ تنہیں ہوا اورمکن ہے کہ اِس علامت کی غیرہ جو دگی کے سب سے اُن اصا تبوں کے شمینے میر غلط فبمي ہوجائے من میں انغراز کے ساتھ برقان مو آہے ۔مشترک فیات کے تعد ببا تنده بزفان كى احاً متول بن اگرمراره تحوس مُزِيبا باسكة توتسد وسكراك صفرارك ا عن ہے۔ اگرایک وصیلاموج دیؤنو تسد دغالباً کسی دوررے سب سے ہے، جوعموماً ایک الید موقی ہے (قانون کوروا مُزیم اس Courvoisier's law)-مزاولت ميب يه تفريباً ، و في صدى اصا تبول مين صيح مواب يستبكها مي معفراء لا شعاعوں کے سترراہ ہونے میں اوراس طرح اپنے سابہ سے اپنی موجو د کی ظاہر كرية ميں بُرى مويك اختلاف ظا مركرتے ہيں۔ خالص كالينٹرين كے تأكماك منفرار لاشعاعوں کے لئے شفاف ہونے ہن اور ایک منفی سایہ پیدا کرتے ہیں يعني مراره بحاسّت ميس ايك صاف رتمبر (متحفر ٣٣ مب) - بأكلي رو بين اوكيليب کے ملی نن ہوجو د ہونتے ہیں تووہ لاشعا عول کے گذرمیں سبترراہ ہوتے ہیں (صحفه ۱۱)-ایک نهایت ممنز منظرگول متمت بی حس کا مرکز غرشفاف مترا سيداوراس مركز كوابك صاف ترته تمصور كرتى ہدے ۔ اثنا عشري ميں انبو ہر كا دخال

(duodenal intubation) سے کام لینا جائے۔ اِنڈار۔ تولیج کے پہلے طے میں اندار کا اموافق ہونا ضروری نہیں بہتے اشخاص متعدد حمول کے بعد شغایاب ہو جاتے ہیں۔ کیکن سرطان ہو جانے کے اسکا کوفراموشس مذکرا جاہئے۔

عسلاج - التاب مراره كاعلاج للعظ كزاما بيء

قولنج صفراوی کے حکمہ کے لئے مریض کو گرم خل میں رکھنا جا ہے ' یا گرم کمیدات اور پولٹسیں وائیں جا نب برلگانی جا میں ۔ سب سے زیا وہ آرام ارفیا کے لئے لئے اللہ کا نہ جا مل ہوگا مجمع ورت موتولت یا گرین کے تحت الحباد اشراب سے حاصل ہوگا مجمع ورت موتولت یا جارکھنا ہوگا مجمع مارون کے استنظاق سے عارفی جارکھنا ہوگا ہوگا کی استنظاق سے عارفی





ما

انف شعاع نکاشت اتصابی وضع می تاکه مشفق بیشی ذرصه کی اصات می نگرا ور دانین ڈایا فرام کے درمیان کیسس کی موجود گنگانی جائے۔ انکواڈس) موجود گنگانی جائے۔ ناکواڈس)



ب. مراره تکاری کولسرال کے سگوں کے قریب منفی سابے (شعار کا کاشت مسٹر لنڈسے لاک نے لی م) با مان غر 407

آرام موسكت بي درين لائدر وكلورائد (papaverine hydrochloride) ر الله الرين على براه ومن أزائي جائه م جب نگہائے مفرامیسل تحلیف کا ماعث ہوں ایب خطرہ ہؤتوم ارہ برآری (cholecystictomy) کاعلیکرکے سنگ استگیا ک مفراء كومرارك إتنا تول سے نكال لينا عاہيئه مكن ہے كەمراك كا

(suppurative cholangitis)

يه بمينه خر دعفنو بول مثلاً نبقات بسبحيه نبقات منبيه نبقات رأور ۔محرقہ' اور عصبیۃ ولونی متمولی کی سرا بیت کے باعث پیدا ہو جا آہے۔اورتفامی مِنْ جِينَ كَهُ مُلِكُ الْسِيصِ هُوادِ سِيرِ (جواس كاعام ترين سِبب ہِنہ) سطان سے مینه کی زباده عمومی سرا بتول سے مدا بوط آہے۔ سامے سگر کی ادی منا توں کا وُرم اور وہا زہت پیدا مرجاتی ہے اور مگر شرا ہوجا آ ہے ۔ یہ یں متسع ہوماتی ہمل' تنہی کے کشراکتعداومرکز پیدا ہوماتے ہیں جھیوتے منقراس بداردے اسطوے قریب کے میورے مقای اعموی 408 التهائب أربلون بيداكروس كمبي تبمي مرايت اليي مصلتي بي كموى تقيم الدم یاساری النتیاب ورون طلبه (infective endocarditis) بیداکروتی ہے۔ علاً ان يه مرتع بين ال حكر برور واور اليمين عدم التحتيم المتلى تے انتخریرہ کئیں جو کمیر کی کی طرح و تعذوار ہوسکتی ہے انبطاح اورا کمٹ برقان کیس جالت کو معض او قات متو قفِ کباری تب کتے ہیں عمراً مرم کی ترتی کے ساتھ مگری جامتِ ٹرمد جانی ہے عکن ہے کہ فخال ٹرمد جائے مرض ا ى دت چند مفتوں سے لے كركئى او ك موتى ب اور يه مون مبلك موالب-

تشخیس۔ مُلاحظہ هوتقیم النہاب وربدالباب۔ بعلاج ۔ یہ سرف مراحی ہوسکتا ہے۔جہاں مکن مومرارے کو کھول کریا' جوتنا تیں اسکی ان کو کھول کڑتنا ت اے صفراکی سئیں کرنی جائے۔

بنقائر كالمتحان

بنقراس می دومختلف طرز کے افرازی خلیات ہوتنے ہیں : 🚅 (۱) عُندِی خِطَیّے جرمنغزا*ی کس کا افراز کرتے ہیں اور (۲)* جزامُس کَنگوهانس كے فلنے ' جوالک ارمون كا فراز كرتے بي جوكار بواكار بيث كے تحول كے لئے صروري منوات - به دونول اقسام الك الكب مناك مرض موسلة من -تا زه مشابرات سے ظاہر بواہے كة مندرست بمضم كے دوران برصفرا اور سنقراسی سس کے درمیان حسب زیل تعلق ہے و فیانگی سکون کے زمایہ کے دوران میں مگرمسلسل صفراکا اسسراز کرناہے جومرارے کے اندر ندخور کرلیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے کے بوا بی مفیلہ عاصرہ سے انتباض کی ا مواج وو د بہنچے انت کے طرف ماتی ہیں۔ انتباض کی ہرموج سے پہلے ایک منفیٰ موج إرشخار (negative wave of relaxation) واقع موتی سبے جیاسنیہ آ ڈی (Oddi) کے مرخی عضائہ عاصرہ کی راہ سے کچھ مغراضا ہے موجا آ ہے۔ یہ صفرا دمعدے سے آئے ہوئے ما فیہ کے ساتھ مخلع ط ہوجا تا ہے ' اور وہ ا سسے ایک ابیا کافی تعال دے دیتے ہن کہ معائی غشا کے مخاطی میں ہے کمحاتِ متعاکا انخذاب يقيني بوما تاہے۔ يه ملحات صفرار خليات ميں سے بوكر گذر سنة ميں اُن کے اندر کی سابق الست کوئین سکریٹین (secretin) کو جبند کرکے ابی ون کے اندر علے ماتے ہیں۔ بیسیکریٹین لبلیدسے افراز بید اکراتی ہے اور ٹازاد شده سفراوی کمی مگریس منفل مرما با به خیس سے صفرای ایک مزید متحدار کا افراز پیدا ہوتا ہے یمسیکریٹین مزید براس مرارے کو ایک ویریا انتابس کی مالت میں لے آتی ہے کہذا اتنا رعشری میں اور زیادہ صفراد اخل مواسے۔

سکریٹین کا بیداکردہ بنقراسی اِ فرازمیم علی کا سوڈ بیم بائی کاربوئیٹ کا ایک مُرقق محلول ہوتا ہے ' جوسابق الستکوین خمیروں کو دھو ڈا آیا ہے۔ خمیہ رول کی بیدا کش کے لئے مختلف ہیجان کی صرورت ہوتی ہے ۔ اثناء عشری کے اندر فرتیپنو جُن کی فقال سندگی اینٹیروکائنیس (enterokinase) سپیدخلیوں جراتیم وغیرہ سے ہوتی ہے (86)۔

نبقراس كے وظیفی كاشفات

بیرونی افراز کی فلت ۔ نشک مرززی (steatorrhoea) کوا تبک بنقر اسی مرض کی ایک ممیز ترین اکارت سمجها جا تاہے اور وہ یہ ہے۔ براز کے اندر مایع شمیر خوارج بو تی ہے۔ ماد دین ہے۔ ماد کے مقدار میں زیادہ کرم یا شاحب موقے ہیں۔ اور اُن میں غیر تبدیل شدہ چربی کے علاوہ شمی ترشے اور ماین موجود موسکتے ہیں۔ جہاں خالی آنکھ سے ماخانے مرسکتے تبدیل سفدہ فطرز آئمیں مکن ہے کہ خرد بین سے اُن میں کثیر التعداد شمی گلو ہے مرسکتے تبدیل سفدہ فطرز آئمیں مکن ہے کہ خرد بین سے اُن میں کثیر التعداد شمی گلو ہے

ر الإ بنقر إس كا استفال على طب - ملد دوم م ري ري ري الم

اور تمی ترشول کی میں فطرائیں۔ کیمیا کی طور برشی برازی کے درجر کی تخین کرنے کے لئے نہ صرف براز کے اندر کی جربی کامعلوم کرنا بلکہ غذا میں لی موئی جربی کادریافت کراہمی اہم اور حذوری ہے۔ نندید اصابتوں ہیں . دیا ۔ ۹ فی صدی شمی درائی مربازیں ضایع ہوجا تی ہے۔ اور شخ حشاب صابح برجا نے ہے۔ اور شخ حشاب کروہ براز کا اللہ ہے ۔ اللہ سے زیا وہ حصہ ہیں موتی اور اسس میں سے ہے۔ اللہ کے دیا ہ

حصد کلسرین اور شحمی ترشه مین مشقوق نهیں موتی۔

اس امرین کشخر برازی عمواً بقراسی الاصل موتی ب سب کرنے کیلئے دو وجوہ ہیں : ۔ (۱) وہ نہا ہے عام طور پر اس وقت ناقص الخذاب سے پیدا ہوجاتی ہے جب کہ سنکی درن یا الب سے لیسنات متعدد موگئے ہوں ۔ ان اصا بنوں میں یافا نے میں کی جربی بڑی صد کا متعوق موتی ہے۔ (۱) اس مرکی ننہا دن بیش موری ہے کہ اسخداب شو کے لئے بنقراسی کس اندا ہوسال ننہا دن بیش کہ متنا معاومی موتو کی اخراب شو کی استی معلوم ہوتا (۲۵)۔ پیدائشی می برازی یا استی مال سے اس اسخداب برائر بڑنا ہنیں معلوم ہوتا (۲۵)۔ پیدائشی می برازی بی بیان کی گئی ہے اور اسہال سے می بیان کی گئی ہے اور اسہال سے می بیان کی گئی ہے اور اسہال سے بی دیا وہ بوجاتی ہے اور یا خاسے برائر بی دیا وہ بوجاتی ہے اور یا خاسے بری جیا مت کے جوتے ہیں۔

تحدو موازی (creatorthæa) ٹرسین (trypsin) کی غیروجودگی کے سبب سے ہوئی ہے۔ غیرمنہضمہ مخطّط عضلہ کے کثیر التعداد رہنے 'جاغذا ہی کھائے ہوئے گوشت سے مال ہوتے ہیں خرد بین سے پافا ہے کے اندر دیکھنے میں آتے ہیں۔ وافر اسہال میں بھی لحم برازی ہوجاتی ہے 'جیا نجہ اس سفالطہ کور فع کرنے کے لئے کمی غذ اکے ساتھ میار کول مینے کو کلہ لیاجا تاہے 'اورسیاہ پافائے کا امتحال صرف اسی معورت میں کیاجا تا ہے جب کہ وہ ادفالِ غذا کے بعد اٹھارہ تا ہیں گھنٹوں کے درمیان نارج ہو (87)۔

ہےکہ برل کی تعبیر $rac{N}{10}$ سوٹو نیم ہا ڈریٹ یا ہا کٹرروکاررک اُ بینڈ کے ساتھ کریں بہانگ كرترث كي ورجه انسب كي بوجائے الينے بول pH عدد مورية حالت أسوقت ہوتی ہے جب کہ بول میں فینال رید (phenol red) کو بطور ایک مظہار کے ملاف سے ایک ضیف سی گلا فی محصلیک بیدا رموحاتی ہے (92)- ۱س بول کے و د، مم ر، م د . ۱ اور ا و . سی سی شیار کمکیون می*ں رکھ ک*ران میں طبعی مالع (9 ر . فی صدی) ملاکر مراکب کوایک سی سی کردیا ما تا ہے۔ بول کوطبعی الح سے دس گنا مرفق کرکے عیریمی طريقة اختيار كباجاً أب أوراً عنه لليوس إبي طاّفتون كا بول بوجاً أج حروم م. أ ۲ و ، ا د ، ۹ و و ، ۲ م و ، ۲ و ، و ، و ، سے نتنا ظر ہوتی ہیں ۔ محصر سر نللی میں اور فی صدی مل نیر برنشا سستہ کے اسی سی ملا و نے ماتے ہیں ۔ عیران المكور كونصف لينيخ كي لي و م ورجسيني كريد ميخنصن كربيام آب، يمنن أل ہونے کے بیدان مکبول سے سلساروار اور طاقت والے بول ی ملی سے شرف رُے' 📉 آپیوڈین قطرہ قطرہ کرکے ملاویا ما آہے، یہاں نک کداُ ن میں رنگ کا و فوف موجائے۔ ایسی سب سے بہلی ملکی کہ جس میں نبلاز بگ نبس مودار موتا' بول کے اندر ڈا یاسٹیس کی مقدار کا ہرکرتی ہے، جو یا کو اس بی کی طاقت سیفتیم . رمنے سے طال ہوتی ہے۔ مثلاً اگر د ، د ِ بلی میں نیلار نگ نه پایا جائے تو ڈا ایسیں کی مقدار ۳ اور بم کوگی۔ و السیس کی طبعی مقدار ۱۰ اور بم کے درمسبان ا مختلاف ید بر بوتی ہے۔ بفراسی مرض میں بول کے اندر ڈ ایائیس کی مقدار انعیٰی و السيس كا نمائنده) زيا وه جوجاتي ب مكن ب كرس كاتعلق ورال معرس کے اندس ونی افراز سے ہو۔ لیج (Cammidge) بقین کرنا ہے کہ اس افراز کی قلت کبدی ڈایاسیس کوخون کے اندر اِکرے بول میں اسس کی مقدار کی زمادتی

اندرو فی افراز کی قلت می نمایاں اصابت میں بیشکر بولیت ہیدا کرد نتی ہے ' اورنسبتہ کم نمایاں اصابتوں میں مکن ہے کہ بیتیل منشکو میں کمی ہومائے۔ اس کے جانبےنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مریض کو ڈیکیٹروس کی ایک مننا و و سکر دموی مشکر کی زیادتی کو و کمیعا مائے 'نیزیہ بھی کہ بول میں کوئی مشکر نماج موئی ہی

يانبيس (المنظم بوسفي 463) _ يتم عن فارسا يُحة (Forsyth) اور أور (Howard) کی تا زه تحقیقات نہا بیت بڑی نُظری دلجیسی رکھتیہے، اور مکن ہے کہ اس سے نقرا^{یں} کے اندرونی اِفراز کی قلت کو اُس کے اتباد آئی مرارج میں دریافت کرمے کے تشیمتی فدا يع مل يومائيں۔ اُن كاخيال ہے كەمگريں ايك نشا يكنفس خميروجود موما ہے ا موكلاتكومن كوتور تا بعاور وكميشرين (dextrin) فيسيداجا م كداي ورجيس كذارتا مواد كميشروسس بناوتيا ب عليى حالت مي منقراس كا اندروني افراز اسس خمیر کی فعالبت کورہ کے رکھنا ہے۔ اگر منقراس کا اندرو نی افراز کم ہے توسب سے بہتے ً ہر ہو آ ہے کہ خون اور بول میں (کہ میں یہ ٹوکسٹرنر خاج ہوئے ہیں) ان و کیسٹر ننس کی زیاوتی ہوجاتی ہے ایکن دموی سٹ کرتقریباً اینے طبعی لیول پر دستی ہے۔ اسس کے ایک نسبتہ بعد کے درجے میں یہ ڈیکیٹرنس بورے طور بر ٹوٹ ک وْكَمِيتْرُوس بن مِاتِے مِن خِيانخِياب مِيْن سُكر ومُو بيت اورمث كربولين پيدا ہوجاتی ہے'اور نون اور بول میں سے ڈکیسٹرنس عائب ہوجاتے ہیں ۔ سی آخری طالت ذیا بیلس سے کی میں یا فی جاتی ہے۔خون کے اندر ڈیکیٹرنٹس کی مقدار کی بیانش کرنے کے لئے اُنڈروکلورک ایسڈ کے ذریعہ اُن کی آپ باسٹ یہ گی عَلَى مَن لا بَي كُنَّى حِسِ سے وہ ڈکمیٹروس میں متغیر ہوگئے ۔ بھیرمجموعی ڈیکیٹروسس کی تخبین کی گئی۔ اِس مقدار میں اور ڈ کمیٹروس کی اُس مقدار میں کرجوا بتدائی خون کے اندراب یا شیدگی سے پہلے موج وعقی جو قدرِ فرق ہے اس سے و کمیشوس کی وہ مقدار ماصل ہوتی ہے جو ڈیکیٹریس کی وجسے تھا۔ بول کے لئے بھی بہی طريقة استعال كيا ماسكتاب ياوه رأيت طريقه كام من الأياماسكتاب مبي ا میر و بن استمال کرنی بڑتی ہے۔ یکٹینی اصلی تعامل کینج کی بجائے ہیں جوکہ غیرمعتبرہے۔

امراص بقراس حادالتهاسب بنقراس

(acute pancreatitis)

امراضيات مترى اورىرىما بات الابركرة بن كهاوالتهاب بنقرامس امها تَبُول کی اکثریت میں اولاً مرا نیمی سرایت کے باعث موآ ہے ' جو مِرْكِ بِنَوْمَنِ (trypsinogen) كُورْكِينِ (trypsin) مِي مَتَغَيْرِكُر كَصَنْقُراتَى رَل کونعاً ل بناوہتی ہے۔مَرضی غدّے کے ممیز مناظ نعال بنقراسی رس سے اس کے عنبم ہومانے کے باعث ہوتے ہیں۔ فربسی سے حاداً کتباب بنقراس کی استعدا دیں۔ ہوماتی ہے، اور بدھلے بار اِر ہوکر اِلآخرا کی آخری حادثہ میں منہی ہو^{کئے} ہیں۔ يه التهاب مموماً ننكبها ك صفرا بإالتهاب مراره كحدما تحد مثلازم بو تاب ليكن حاد التهاب بنقراسس ميں سنگ صفرا کا نتيفاخ و آڻيريس مغروز يا يا جا نا بہت عالم بي اورجب به حالت انغراز موتی ہے توسنگ غالباً اَتناکا فی مُرا مواسے کہ قنانے وَرِسْكَ (Wirsung's duct) كے مخرج كومىدودكر ما اورصفراكو اور نقراس کے اندرجامے سے روک و تیاہے۔ تا ہم پیمن ہے کہ تھیو نے سنگ انتفاخ کے مقام برمغروز بوكر نبقراسي قنانت بب وقفه وار ركو وبيدا كردس اورمستبالا زم را بیت جوصفراوی فناتوں سے تعبلتی ہے حملہ کو نثیر وع کردنی ہے۔ تو انج صفاول كے مُتُوا ترخیف حماول كى روئدا وكا قاصل مونا بالكل عام ہے؛ جواس مغروض کے ماتھ مطابقت کرتاہے۔ حاوالہ پاپ بنقراس مراسب کے دور ہے تصلہ مركزوں سے تروع ہوسكتاہے 'جبیے كُدائنا عشري قرمداور البتاب قنات إلى صغرابست أورمبقب وقانت وه اببيه سارى امراض جيبيه كرتب محرقه تنتيح الدم اور معفونت الدم نیزنکاف (mumps) میں واقع ہوجا تاہیں۔ نبقر اِکسس اور اُ غدور لقید کی با بهی مت بہت ساخت کی وجہ سے آخر الذکر حالت ولیسی سے

خالینہیں۔

حادنزني التها بنقراس (acute hæmorrhagic pancreatitis)

بن بغراس متورم اورخمة بوجا آب اوراس سرخ یا بحورے سے فے کرسیا ہ اسکا مقط مواہ اور اس تعدی سالم برا ورخ کی بافت میں نزفان موت زیر ۔

مکن ہے کہ نون بزریعہ وعابر ری متصار باخوں ایں جلا جائے کا لیفٹہ باریودن کے اندرخون آلودس یال موجود فور خروبین سے بنقراس کی شخیتی بافت شخدی یا فیت شخدی یا فی بائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ عموا التہاب بی مواہ ہے ، جیسا کہ کرڈیالا شکال نواق فیلی دریزش سے ظاہر ہو آہے۔ یہ غالباً نقراسی رس سے انہفام موسے کے میڈالوں کی دریزش سے نظاہر ہو آہے۔ یہ غالباً نقراسی رس سے انہفام موسے کے میڈالوں میں اوقات گردکوئ واسلی اور گرونلی میں اوقات گردکوئ واسلی اور گرونلی میں اندزرویا فیرشفاف سبید ریک کے میوے کے میموے کے میموے کے میموے کے میموے کے میموں نوعی ہوتے ہیں۔ یونلی سے بیٹ بعض اوقات ایک تنگ نری منطقہ سے گھرے ہوئے ہیں۔ یونے ہیں۔ یہ نفاج سے بیٹ بعض اوقات ایک تنگ نری منطقہ سے گھرے ہوئے ہیں۔ یونلی سے بیٹ بوجاتے ہیں جوہ جربی برکر آ ہے۔ دائی شدہ سے می تریتے کیا ہے کے اس می سے بیٹ ہوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی شدہ سے می تریتے کیا ہے کا ساس کے ساتھ بوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی شدہ شمی تریتے کیا ہے کہ اس می سے بیٹ بوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی شدہ شمی تریتے کیا ہے کہ اس می سے سے میں ہوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی شدہ شمی تریتے کیا ہے کہ اس می سے سے میک سے بیٹ ہوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی شدہ شمی تریتے کیا ہے کہ اس می سے سے میں ہوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی شدہ شمی تریتے کیا ہے کہ اس می سے سے میا ہی ہوجاتے ہیں اور کرا ہی کرا ہے۔ دائی شدہ شمی تریتے کیا ہے کہ اس می کے اس می سے سے میں ہوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی میں جوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی میں کرا ہے۔ دائی میں جوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی میں کرا ہے۔ دائی میں جوجاتے ہیں اور کرا ہے۔ دائی میں کرا ہے۔ دائی میں کرا ہے۔ دائی میں کرا ہی کرا ہی کرا ہی کرا ہے۔ دائی میں کرا ہی کرا ہی کرا ہی کرا ہی کرا ہی کرا ہی کرا ہے۔ دائی میں کرا ہی کرا ہے۔ دائی میں کرا ہی کرا

ایک نسبت بورک در جیس یا اگرینگل زیاده مزمن به قوتقی التهاب بنقراس (suppurative pancreatitis) دافع برجا ایسی شرائی بنقراسس برائی منورم اور بیب سے در ریخت بو آئے ۔ یا اس بی شرائیدا مجبور سرم دموج دمونے بین مکن ہے کہ ایک آور می عقیت اور مرابت بھی واقع برسکتی ہے اندر کی ایک تقیت اور مرابت بھی واقع برسکتی ہے کہ سام اور من اور می عقیت اور مرابت بھی واقع برسکتی ہے کہ سام المراب بار بطون سے الآخر ہلاکت واقع برمائے ۔

المہاب بار بطون سے بالآخر ہلاکت واقع برمائے ۔

علا مات جب التہاب بنقراسس نکاف کے دوران میں واقع ہو مائے و

تفئے اور شرامینی درد کے سانھ شرامینی خطے میں درم احدالمیسیت موجود ہوتی ہے۔ منبترز إده شديد نزفى التهاب بنقراس كخصوصيت شمركم الاني تصيمي شديد بكرم ل كداز وروي، جوكيل كركشت تك ببنجاب قرم کے ورو کے تسبیت زبا وہ تکلیف وہ ہوتا ہے اور اکٹر مارف م**تواری عموهٔ زبا وه نبیس مرتی کمیو ک**رسیال می دانع عفونت نوعیت ب بامن مِواً موی التبابِ باربطون بسی موا سا یدیروٹین باش اسیارکے انخذاب كي وجرسے صدما جس كے ساتھ زراق ہوتا ہے، جلدى سبا ہوجا اے۔ سی کی جالت کے دوران میں علامات الکل بکایک میدا ہوجائے ۔ معض اقفات جند گھنٹوں کے مدیش کرکے بالائی جیسے میں آبک محدود المقام (intestinal obstruction) سمجد کراس کے ازالہ کی غرمن سے مشکر جاک کردیا گیاہے۔ یہ اصافتیں عموماً جاریا پینچ دیوں کے انید مہلک ٹا ہر **ہوتی ہیں اُنیکن مبض امیری ہیں ہوسٹکے شکافی کے مبد شفایاب ہوکئیں ۔ تقبیعی** النماب منقوا س كے طلامات بمی اس كے لما تك كتين نسبته كر ناياں اور كرجها و ہوتے ہی اورمکن ہے کہ مَرضی حالت کئی مہینو*ں تک جاری رہے* مريهنون كيايك جوتفائي ميرمحسوس موآبيئه اورية احيهُ إربطوني صغيريس م ہے۔ اکثرا یسے ملامات کا اندراج نہیں ہواہے جربنقرائی ظینوں وبى ماسكين كيكن اس كى دجشابديد موكدان كى الماش مى نبير کی کئی پرٹ کر برلیت اور بولی ڈا پائیس کی زیا دتی ہے تشخیص میں تمیتی امدا د کھے گا۔ بين اوقات يرقال موج وموما مهد ـ

عس لُلج ۔ اُکر ملاات مزدری التوجہ ہوں توشکی شکافی کاعلیہ فولاً انجم دینا ما ہے کی سے کرویا فت شدہ مالت مقامی تدا بیری مُتقامی ہو۔ مشلاً ایک نزفی مزری مالت میں بنتر اسس میں شکاف دے کو اور نزف کو بندشس کے ذرمیدروک کرتسکیل قائم کروی گئی۔ تقیمی انتہا ب بنتر اس کی مالت ہی بجوشے میں شکاف دینا اور کشیل کرنا قطعاً ضروری امور ہیں ۔ علیہ کوئی ہی ہو اُس میں مرارہ اور شیرک قنات سغدار کا امتحان النهاب مراره اور سینگراک مراره کمای کرے مراره کمای کرے مراره کمای کرے مراره کی سیک کرد می کا سیکے ۔

مزمن كتهاب نبقراسس

(chronic pancreatitis)

یەرخنکی افت کومتانز کرکے بہت لیفی البدگی پیدا کردیتاہے مجس سسے متیجةً غذی ساختوں کا ذبول پیدا ہوجا آہے' جوکوبت مگرمیں بائے جائے و ا لے تغیرات سے ماتل ہو آہے۔ اور جبیا کہ اس مرض ہیں موتا ہے کہ مزمن التهاب منقراس من مى مفي عال عنيات كے ٹرے كرد موں كو محصور كرے < بان كختكى ==interlobular) كانسبتُّ بهبت زيا وه شاؤ طور برمنفروَّعنبيات كومصور ارے (باین عُنیری = ioteracinar)-عموماً اس صفوكا مرسب سے زیا وہ اوف مهر - جرم نها بیت کشیف اورسخت موجا آسے اور نسبته قلیل الوقوع مین عنیسی ل میں مکن ہے کہ بہت کلا فی واقع ہوجا کے ۔ مزمن التجاب بنقرال کی تشبید بالكل وبي بيرج كرما دالتهاب منفراسس كي تبيب ہے۔ وہ عمواً متصله التها! ت جیسے کہ بار بطون کے واٹ صفرار کے معدے اور انتوں کے التہاں منشلا التهاب زائدة دوديد كے تھيلنے سے بيدا موجاتا ہے جس سے سارى عصوبيے اويركو مُقراسي فناة من متقل موجات ربي- نيزوه سفراسي فنات مي انجمادات كى موجود كى سن المحبوسس منقراسى افرازات كى موجود كى سے بيدا ہوجا كا ہے-یا مرطان سے قنا سے کےمضنو لم ہوجاسے سے یا مرضِ قلب وسے وربدی امستادہ بوما کے سے پیدا ہوجا آ ہے اورسٹ یرآ تشک کے اور الکما کے اوارالکما سے پیدا موجا آہے۔ نگہا ئے صغرامزمن التباب نبقرانس کا ایک عام سب بہل الخعنوش أس مقت ببكه أبك مثلًا أتنفاخ وآثير مين يامشترك قنالت مير واقع مور ياجب أن كى موجود كى كايد نتيجه موكة تقتيج التهاب قنات إيم مغبرا بيدا ہو گیا ہو۔ تناتی تسدواور مرایت کی ان شالوں میں میشتریں بین مخت کی مکل كا مزمن التهاب بيدا بوط البعد صلابت الشرامين (arterio-sclerosis) بمي مزمن بنقراسى التهاب كالكيسبب ب عراس ورت ببعموا بين تنيب تسمكا

مُرضی تشریح۔ بین فیکن کی بنقداس کنیف اور خت ہوجا ہے ، اس بیل بنی بافت کے جوڑے بند لخت کول اور مرفون رقبول کے ور مسیان ووڑتے ہیں' ان رقبول میں سے بعض تو متلت غدی جرم کے ہونے ہیں اور بفض خوب معمون بافت کے ۔ بالعموم جزائر لنگر انس غیر منا کر رہتے ہیں بہت نمیں شکل میں عنیبات مذبول ہوجاتے ہیں' اور جزائر لنگر انس اکر وقات لمف سا خلیوں می در بزرش سے اور صلابت سے ما وُف ہوجاتے ہیں۔

مزمن التهاب نتقرب کی یہ ہردوسکیں چربی کے بڑے جب و 2 (شعبہ سلعبیت ﷺ (اipomatosis) سے بچیپ و ہوسکتی ہیں الخصوص اُن دشیزہ صدیحہ دیک نیسکی میں مد

المخاص مي من كو فربهي كي شكايت مو-

علا ماست نے راقم الحروف کا ایک مریض ایک ۹ ہمالت کف مقط ا جے الکل اشاعتری قرصے ہے مشابطا مند تھیں اور ساتھ ہی اس کا معدہ میوٹا اور متعرض تھا ، جر بر بر بر بن خالی جو ما آتھا 'لیکن نہ تو کلاہ کا تشوہ تھا اور نہ تھی خون مرجو د تھا ۔ مشتہ بنگہا کے صفرار کے لئے جرای علیہ انجام دیا گیا ، لیکن فاوقی خطہ و غروطیں پائے گئے۔ دوری اصا تبول میں کوئی علامات بہیں ہوتے ' ایروء مضر کے مہم سے علامات ہونے ہیں ' یا مکن ہے کہ نمول کے ساتھ نما بال شفراسی قلت موجو دہو۔ مزید برآل مکن ہے کہ نبقر اس کا متورم سرمشرک صفرادی قات کوجو اس کے اندر مصور ہوتی ہے مضغوط کر دیا اور اس طرح تسددی میان بعد ایک شخت نبقر اس محسوں ہوتا ہے ۔ تفریباً ایک نمان اصا تبول میں یہ دامیک شخت نبقر اس کی وجہ سے ہوتا ہے ' اور دوٹلت اصا تبول میں ایمانیوں میں کے مرکم کے مرطان کے باعث ۔

جہاں مزمن النتهاب بنقر اس کے بعث ذیابطس شکری پدا ہوجا آ بیان کرتا ہے کہ یہ تقریباً بالکل بین عنین شکل سے بیا

ہوتا ہے جس میں بالحنموص حزائر لنگر بائس متصرر ہوتے ہیں۔ بین مختلی سے ذاہر بائس متصرر ہوتے ہیں۔ بین مختلی سے ذاہر بلس سے کرا ہوتا ہے جب کہ انحطالی علی ان جزائر کے رہنے مبا اسے جو کہ گخت کول کے مرکز میں واقع ہیں۔

سنك إلئ بتقاس

(pancreatic calculi)

اِن کا وقوع او هو عرک آومیول بی مکن ہے۔ یہ ہرگز عام نہیں بی ۔

ی قاتم ل کی نازلت سے اور افرازیں تاخیر ہوجا نے سے منسوب کے جاسکتے ہیں اور کیلیے کارونیٹ اور کیلیئ فاسفیٹ بڑاور بعض اوقات کیلیئ آگزیلیٹ پر مشتل ہوئے ہیں۔ یہ رہی کے فرول جیسے کیا اسٹے بڑے کہ ہمیار یا شاخ وار ہوگئے مشتل ہوئے ہیں۔ یہ برائز اور عموا گول یا بھنوی واقات بجودے یا تقریباً بیاہ ہوت ہیں۔ دنگ میں یہ سبید یا برا وی مائل سپید بعض اوقات بجودے یا تقریباً بیاہ ہوت ہیں۔ دنگ میں یہ سبید یا برا وی مائل سپید بعض اوقات بجودے یا تقریباً بیاہ ہوتے ہیں اور بیائل وقات یہ قات یا اس کی مشاخوں کو معد وورکروہے ہیں اور بیائل انساع احتمال کو ویرے ما والہ باب مید تینے یا مزمن تصلب کے بلکہ گروو بیش کے مصول کا میں التہاب بیدا کروہے ہیں۔ یہ شافہی علامات ان کے نافری اثرات سے بیدا ہوجا ہیں 'مثلاً بیدا کردیے ہیں اور میں کے بنے سے بیدا ہوجا ہیں 'مثلاً اس التہاب سے جویہ بیدا کردیے ہیں 'یا وہ ویروں کے بنے سے 'یا فات کے بیدا ہوجا ہیں۔ وزول یا کہ بت کے بیدا ہوجا ہے۔

مین مین مین میلی میلی کاری کے ذریعہ اویسٹگوں کے لئے پانانوں کا امتیان کرکے کی جاتی ہے۔ ان کو کبھی کمبری حراحی علمیہ کے ذریعہ سے نکالنے میں کا میابی موتی ہے بیشترا صابنوں میں تناہیے ورت نگ سے ۔

بنظاس کے نوابے اور دُویرے

سرطان (carcinoma) جوتفریها بیشداولی بوتا به بنقراس کاآنم ترین سلعہ ہے۔ یہ اکثر فقت کے رئم میں محدود ہوتا ہے۔ یہ ایک بے قاعدہ آر بکی سخت سلعہ بوتا ہے، جو مکن ہے کہ آئی کا فی ساست رکھتا ہو کہ موزواں حالات کے تحت اسے جدارت کی میں سے محمول کرنا کمن ہو۔ جول جول پر گر کمیں جاست یں بڑھتی جاتی ہیں نبقہ اسکی قنات کے تعدد مہوجائے کا امکان ہوتا ہے، جوس سے ایک و یرہ بن جاتا ہے۔ کبھی کمبی دبا کوسے یا مزمن التہاہ کے بھیلنے ہے متراب معفراوی فنات معدود ہوجاتی ہے، جس سے برقان پیدا ہوجاتا ہے۔ دوسری اصابوں میں مکن ہے کہ سرطان معدے اثنا عشری بار بولون فقراست کی دور کی ساختوں کو بھی ما و ف کردے۔ علامات مزمن التہاب بنقراس کے علامات سے مشابہ ہوتے ہیں لیکن نحول عمر ما تمایاں ہوجاتا ہے۔

بغقراسی و ورس (pancreatic cysts) به بنیتر اوقات بغراس کی دم اور میم میں منویاب بوطائے ہیں۔ یہ قنات و رَسَنگ کے تسدو کی دج سے رجم سنگ سے پیدا ہوجائے ہیں۔ یہ قنات و رُسَنگ کے تسدو کی دج سے دور سے بول بڑسے داؤ بڑسے کے اندر بنتے ہیں جو نزنی التہاب بنقراس کا نیتجہ بوتے ہیں۔ متصلہ اربطون میں کا ذب دُور سے التہاب بنقراس کا نیتجہ بوتے ہیں۔ متصلہ اربطون میں کا ذب دُور سے اس التہاب بنقراس کا بوجائے ہیں۔ متصلہ الربطون میں کا ذب دُور سے اس می ترقیق کے لئے جامال کا انسکاب ہے اس خواس کے اعمق فرائس آ ورمنعراسی رس کی ترقیق کے لئے جامالولتہا ب بنقراس کے اعمق را جو ہوئے۔

مرا ہوتا ہے۔

ایک کا فی جامت رکھنے والا دور و سنگم کے بالائی جسے ہیں خطور میانی ایک کی خطور میانی

یائی کے ایک طرف ایک کلوبی نمار مولی بنا دیتاہے۔ مکن ہے کہ یہ تو لون
منتون کے نیجے ایورائی بیفی ووریہ سے مثابہ بو گو نیجے سے
جَس کرینے پر ببا و پر کے طرف دَ تعکیلا جاسکتا ہو۔ یہ حدے اور قولون متعرف کے
ورمیان یا جگراور محدے کے ارمیان آگے کی طرف برواز کرسکتاہے۔ اِس کے تعلقات
کی تعیین لا شعاعوں سے (غیر شفاف فذا کے بعد) یا کھو کھلے اختا کے نفوخ کے
بعد قوج کے فردیو سے کی جاسکتی ہے۔ بنقر اِسی سک اکثر گہر ہے جہیتی کے دور اِس میں بسائن رہناہے ایکن اگروہ و ایا فرام سے متماس ہے تو مکن ہے کہ مہد سیسی کے دور اِس میں بسائن رہناہے ایکن اگروہ و ایا فرام سے متماس ہے تو مکن ہے کہ مہد اس کے
این میں بیائی میں ہو کو اور البیو میں ہوتا ہے اور اُس کی کٹن فیت نوعی ۱۰۱ ا برکتے ہیں۔ سخول اور بعض افغات فرد یا برقان موجود ہوتا ہے۔ بیشا ہی بو سکتے ہیں۔ میشا ہی بو سکتے ہیں۔ میشا ہی ب

وه اورام من کا اس کے ساتھ خلط ملط بوجا نا بہت مکن ہے کہ یہ است و اورام من کا اس کے ساتھ خلط ملط بوجا نا بہت مکن ہے کہ یہ و دور کے سی عصنو کا کہ سیتی دو رہ ہ استقبار الکلید (hydronephrosis) می دوالمقام النہاب بار بطون اور مبعنی مرض ۔ اگروہ زیا وہ تر بائیں طرف ہے اور تنہیں سے حرکت کرتا ہے تو وہ ایک کھی کی کا کھوی سلعہ سے مثنا بہ بوسکتا ہے ۔ امتعمام کے ذر معہدے حاصل منونی جا ہے ۔ بنقراب کے بدائشی دور سے امراد حاصل مونی جا ہے ۔ بنقراب کے بدائشی دور سے اور کہ بیتی دور سے شا ذہی مواکر ہتے ہیں ۔

عسلاج - نقراسی و ویرول کا علاج اکر شکاف اورسیل سے کا میں بنا ہے۔ دور بے سلمات کے تدارک میں نعبتہ کم آسانی موتی کا میا بی کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ دور بے سلمات کے تدارک میں نعبتہ کم آسانی موتی ہے۔ اگر سے اور اُن کا علاج یہی ہونا جائے کہ ملا است میں تخییف ماصل ہوجا ہے۔ اگر سلم کا است میں تغییب کم می آرام مال کا ماسکتا ہے ۔ اسم کی جا دام مال کا ماسکتا ہے ۔ اسم کی جا دام مال کا جا سکتا ہے ۔ کما جا سکتا ہے ۔

امراض باربطون حادالهٔماب باربطون

(acute peritonitis)

مأب ۔ ما د البّها سبه باربطون تم لهُ خون سرامیت سے بوسكتابي يعنی نفتی ربوی التباب با ربطون اور نبایت سشا وصور تول می نبقی سبی التهاب بار بطون اکثر الو فوع سب مشکمی اختار کا کوئی صرر مو اے مجیسے کہ مشفوب بمضمی قرصهٔ لفائفی کے مشقوب محرقی یا تدتیر نی قرمے اور قولون کے زحیری قروح 'اعوری زائمہ کا البّہاب اور اغتّاث 'حکّر کے بھپوڑے' مرارے کا تفتیح' مادموی تسدّ دمعتخنق کے طمی ل کا انفعام اورخراج و مکیٹیرالتعدا و التہا بی صررات جوعور توں کے حومنی اعضاء کو اوف کرنے کا دجمان رکھتے ہیں ' سیعنے البّهاب الرحم (metritis) البّهاب نزورحمه (parametritis)، النهاب مبض التِهاب انبول بغلوبي (salpingitis)، حرضي موي قبيله (pelvic hæmatocele) م اور نبعض اوقات وه مهراین جوالنهاب حو*ض التکلیه* (pyelonephritis) مرّرو کلوی الرتهاب (perinephritis) خراج نصری (psoas abscess) حسا و ذات الجنب یا تفیح الصِدر سے بیبیل جاتی ہے۔ لیکن تفیح الصدر کاالتہاب باربطی يداكرنا أننا عام نهي ب كرجنا عام ايك باريطوني خراج كانقيح الصدر بيداكرنا-ان میں سے بہت سی اصابتوں میں کہفہ شکمی کے اندر ما بعات جیسے ل غذا الراز المبیب کے اخراج سے اور ان کے ساتھ ساری خروعصنو ہے منقل برطاي سے البہاب إربطون شروع برط آ ہے معدى اورمعوى قروح كے انتقاب كى حالت من اور التهاب زائدہ وود برمن اور بحوروں كے بعث جائے میں ہی ہوتا ہے۔ دوسری اسابتوں میں التہاب صلی نہ کے جبل جاتا ہے اسفی خرو عضويني بافتول كے اندر بلاكوئي بتين انشقاق بيدا بوئے واعل ہوجاتے ہيں -

باربطون کے زخموں کے بعد ُ خواہ بہ تصرر کی وجہ سے بول یا جراحی کارروا فی میں بیا ہومائیں التہاب بار مطول ہومائے کا امکان ہو آہے۔ کہمی مرمن برآئٹ مخواہ ير ما ديو إ مزمن التباب إربطون كاسبب مُعدّبوماً أب -

تر توميات -التهاب باريلون بداكرين والنخروع فنويد بدموت بس: -عمواً معملى عصب قولوني إس وقت بوقا بي جب كه باربطون مي امعا وسع سرايت بينيخ بمييه كدالتهاب زائدهٔ دوديه يا انتقاب معاري كاجب صفراوي متول مصرايت ينتي منتارم بعداور نقاعنبيدالتهاب باريطون ثل اس وقت بائے ماتے ہیں جب کہ وہ حومنی اعضا دیکے صررات سے یا حکم جربواول 414° سے اخوذ میو - نبقدر بوریمی طراہے۔اس کا بار مطبونی التباب اقربی موسکیا ہے یا مکن ہے کہ وہ ذات اگر بر کے ساتھ متلازم ہو یا مکن ہے کہ وہ نتی رہوی عفونت الدّم كا أيك جزومو وورس جرآتيم حركمتر باك حات بي يوبي ورب عصيدمخرقيد (B. Typhosus) ، عصيدريم ازراق (B. pyocyaneus) محميسر اً ويركنكيس عصيد (B. lactis aerogenes) خرد نبقة جيارزا Micrococcus) (tetragenes اورخرد نبغة سوزاك - ايميا سے ولوني ايماني زجري إ باكيا ے کیمی بی سینهٔ دربیدها داننها ب بداکر ذیاب کیل بین زبا ده عام طویروه ویک فنومی کا انتهاب پیایم تاج مرصنی تشتریج۔ اُرایلون میں ہو تغیرات پیدا ہوماتے ہیں موان نغیرت ۔۔ مال ہیں جوالہّاب لمبرُورا کی حالت میں لمبرُورامی واقع ہوتے ہیں۔ بیلے میل عواليت كى زيادتى كى وجرس مرخى بوتى بيت اوراكر كهف شكم كالمتان التلك ئے میں کیا جائے توعمواً و سکھنے میں آتا ہے کہ امعار کی سرخی آسلی سکے طول میں اس مقام برمتوازی دھاریاں بنا و تبی ہے کہ جہات من اربطوبی تطمیس ممتی رمیں' میعنے آنٹ کے دو پھے اورشکم کی آگی دیواریا آئنت کے نین کھے۔ اِس مقام پر حد سری جگہ کے نبت دِبا و کم ہو آہے ' چنانی امتلا اور ارتشاح پیلے میس واقع ہوتے ہیں اور آنت کے برابر برا برایک نعنا بنا ویتے ہیں جو تراسٹس میں گئی چوتی ہے۔ یہ ارتشاح مبخد ہوکرایک زِرد پُری مناجا دیداکرو تیاہے؛ ہے۔ أئثر ملف كاغير موزول نام ديا جا تأسيع مكين تجوور وشل فأثيرين اورسيطيوك

مشتل ہوآ ہے اور اس کے طاوہ کن ہے کہ ایک مختلف المقدار کدرستال مج موجود ہو۔ یہ ارتشاح نہا بت سرعت کے ساتھ منو دار ہوجا آ ہے 'جیبا کہ بعض منہ ہی اصابتوں میں دیکھا جا نامکن ہے ' جن میں اعمارہ کھنٹوں سے بھی کم میں زرو کمف کی کچے مقدار بَن سکتی ہے۔ بعض نسبتہ کی شدیداور کم وسع اصابتوں میں ایس ارتشاح کی جگر لینی بافت لے لیتی ہے (تعضیف) ۔ اور ان انصابات سے جواس طرح بن جائے ہیں مختلف احشا ایم حراجاتے ہیں ' یا بار لیلونی کیفہ مطموس ہوجا آ ہے۔ وہ مری اصابتوں ہیں سید خلیوں کی مقدار زیا وہ بوجا تی ہے ' یا وہ ابتدا رہی سے کثیر التعداد ہوتے ہیں' اور النہا بی حاصلا ہوجا تی ہے ' یا وہ ابتدا رہی سے کثیر التعداد ہوتے ہیں' اور النہا بی حاصلا

ماد محل و دا لمقام المهاب بالمطوف مواج (peritoneal abscess) مراست کے معدودالتھام ہوما نے سے بیدا ہوما ہے ۔ ناکس ی خراج (peritonitis) معدودالتھام ہوما نے سے بیدا ہوما ہے ۔ ناکس ی خراج (appendix) علی معدودالتھام ہوما نے سے بیدا ہوما ہے ۔ ناکس ی خراج (abscess) علی المطونی خراج المطونی خراج کی عام ترین سے سے المواج المحاج کے نیچ (زیر ڈایا وامی خراج خور کیا گیا ہے ۔ محن ہے کان مجودو کی الم امرے طون منہد بن مائے یا وہ کھو کھلے احت الرب سے کسی ایک کے اند کھل مامی کی ایسید کے اندر مجھ کے کروا ت المجنب یا ذات الرب بید آروی سے کسی اور کی میں اور است ربط موج د ہوئے کہ ایک قرم کے انتقاب کے بعد معد ہے آنوں کے ساتھ راست ربط موج د ہوئے کے سب سے باربطونی خراج میں ہواموجود ہوتی ہے۔

عسلامت - حاد عمومی التهاب بار بطون ورد کے ساتھ شروع ہوآ ہے، جو بیٹیز نہا بہت شدید ہوآ ہے، اور اگر ابتدار ایک مقام برمدود ہوتو جد ہی سالے سے برینتشر ہوجا آ ہے ۔ یہ دروسلس ہوآ ہے، کیکن ہرسم کی حرکت کھانے کا کھنے یا تئے ہوئے سے زیا وہ ہوجا آ ہے ۔ وہا ہے ہے اس کو تکمین نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برکس سارے شکم پر نمایاں الیمیت موج دموتی

ہے۔ سانس لینے پرسار دیے سارے شکم میں حرکت ناپذیری موتی ہے' اور نع بالكل صدرى مِوثانب اورس كرمنه براليتوارى موتى بيه جو تبعي وهيل نهين برتى ب س مندن برون ہے ہیں برت ہے۔ ریدایک نہا بیت اہم اکارت ہے)۔ فائگیں اکثر ببیٹ کی طرف تکنیجی موٹی ہوتی ہں میں کہ حدار مشکم تنکے نہ مائے 'اور مریض مرقبہم کی حرکت سے احتراز کر ماہے <u>ِضِ عمواً سریع' اور تیش مُرتفع ہوتی ہ</u>ے۔لئین بلف اوقات تبیش کر ہوتی ہے سریع ہوتی ہے' اور اِسے سخت سرابیت کی آباریت محصنا جا ایمے' کوزگر شرح نبض شدنت مرض کی اس سے زبا دہ اہم د لالت ہے کہ جتنی در جبیش ہے۔ تعاعدہ ہے کہ تفکے جکد ہی شروع ہوماتی ہے اور بار بار ہوتی ہے 'یا توخو د بخو دیا غذالينے كى كوشتوں كے بعد تنے میں يہلے معدى مافير، اور بعد ميں صفوا خساج موتاب اوراس کے بعد فئے تقریباً برازی نوعیت کی موتی ہے بعض اقات ا بتدا ہی میں قشغریرہ مو تاہے' لیکن ہبوط ہمیشہ بہت زیادہ موتاہے۔ بعد کے در جول میں مریض بیٹیے کے کل لیٹا ہو تاہے' اس کا چیرو مسکر' ا مبوا مو آسیے' أ بحير سياه بوكران من كره على مرجات مين جبرت سي تشويش ظامر موتى ہے' اورز بان خشک اور فردارؑ اوربیض سریع وصغیر ہوتی ہے۔ امعا دیجے عضلی طنقہ کے تتللِ اور اُن کے اندر کسیں کیے اجتماع کی وجہ سے مشکم متمد دِموج^ا ا ہے۔ اُس کی سطح گمیک دار موتی ہے ' نیکن اگرزیا و ہ سال منکب موائٹوتومکن ہے کہ مہلوڈں پڑیا کبھی کمبھی سارے سنگی مر اصمیت بیدا موجائے۔ بینجگی ایک ایسی علاست ہے حواکثر مواکرتی ہے قبض ہمیشہ موتاہے کیکن بعض افتحات مکن ہے کہ ابک یا دو دِ نوٹ کے بعد ایک یا زائد بار یاخانہ مور یامکن ہے کا سمال بیروع موجائیں۔ اور کیمی تمروع ہی سے اسہال موتتے ہیں۔ بول قلیل المقدار

ہو آہے۔ حمن ہے کہ وہ ور دیکے ساتھ خارج مہو یا مجبول ہوجائے۔ منفوب ہضمی قرصہ کی اصابیوں میں انبدا رس عمومی استواری سنگراور صدمہ مو تہے ہیں جس کے ساتھ جہرہ مشوسٹ اور ازرق ہو تاہے جوارج مختلات اور نم موتے ہیں بیش شحت الطبی اور نبیس سریع وضعیف موتی ہے۔ اِلاَخر طوالیتا ب بار مطون کے متاخراً مارات نمووار ہوجاتے ہیں۔ یمکن ہے کہ گیس

کہفہ باربطونی کے اندر فاج ہوکر وسیع گلک کیا م کے سانحہ آمیز ہوکر حکیکا و بیلا کردے۔ باربطون کے اندر گئیس کی وعابدری کی مشناخت بعض اوقات اس سے ہوتی ہے کہ گئیس جگر کے سامنے جمع ہوکر طبعی کبدی اصمیت کے بجائے گمک پیداکر ویتی ہے۔ لیکن یہ یا در کھتا جا ہے کہ اختا کے اندرسے کوئی گئیس فاج ہوئے بغیر بھی یہ مکن ہے کہ ان احشا کے زیا دہ گئیسی تمد دسے حکرصدری واردائے تماس سے دور ہو مائے۔

مے اور دروکی وجہ سے مریض بندریج خستہ ہوجا آہے ' زبان سبتہ ریادہ خشک اور بجوری ہوجا تی ہے ' لبوں اور زبان پر وسیخ جم جاتی ہے۔ نبض صغیر تراور سسر برسی تر ہوجا تی ہے ' بجسپھٹروں کے قاعدے مضنوط ہوجاتے ہیں ' اور دوسے جھ دنوں کک کی بھاری سے بعد موت واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن ایسا ہراصا بت میں نہیں ہوتا کہ یہ تمام ممیز و مخصوص اکارات ملیں یبض اصابوں میں سبخار نہیں ہوتا' دو ہری اصابوں میں تمدد محصن حفیف سا ہو آ سے ' کبھی کبھی مریض اپنی بیشت کے بل منبطے بڑار ہے کے بجائے سخت وردوکرب کی مالت میں ترابیا رہے گا۔

نبقی تر یوی التهاب با مربطون من جوعمواً نبقی ریوی عنونته الدّم کے ایک جزوکے طور پر پیا ہوجاتا ہے ورواور الیمیت شکی اور اسبال ہونے میں مکن ہے کہ استواری موجود ہو گرزیادہ اکثر دیوار شکم دمبلی ہوتی ہے۔ سمی علامات زیادہ نمایاں ہونے ہیں جن کے ساتھ میش لمبند ورجہ پر اور فہ یان ہو آہے اور شرح تنفس زیادہ موجاتی ہے اور مکن ہے کہ شفوی نملہ موجود مویا نمقی ریوی سرایت کا ظہور کسی دو سری جگر ' بیعیپی طول' جوڑوں ' وغیرہ میں ہو۔ کی عرصہ کے بورش کے ایک عصمیں بھوڑا بن جاتا ہے ' اور یہ اس خاص خطے میں ایک ورم منووار کہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔

حاد تعجل و دالمقام الهاب باس بطون میں عام علامات زیادہ تر ماثل ہوتے میں لیکن مقامی حالات کم وبیش ماؤف جھتے تک ہی محدود رہنے ہیں۔ اِس کا عام ترین سب التہابِ زائدہ کی حالت میں انتقاب کا وقوع

ہے اور یہ پہلے بان کیا گیاہے۔

خص عمدةً بيشكل نهس بوتى و شديد دروا اليميت تفيرًا أستواري اور وورا ان مفن س سنکری حرکت نایتری جس کیے بعد تمد و کا بونا اور مبض نبض صغيروره ين أورمبوط كيب المم خصائص من ليكن قوليخ كمه شديد ور و'مشقوق انورسما اسار نقي عميت (mesenteric thrombosis) اورعاد نزنی التباب ىنقراس تعجى النتباب إربطون كالهشتباه بيداكرديته بين يخروالنهاب إربطين لوغلطی سے معوی تندر سمجھا حاسکتا ہے۔ اور مکن ہے کہ تب معوید میں اور و بوار اے ظرر حرامي عليات مثلاً متى شكاني (herniotomy) كي بعدالتهاب بارفطون تشروانے ، بوجائے اور بغیر اس کے کہ اس کی موجود گی کاسٹ، بیو لاکت واقع موما کے قولَخ (colic) اور هستار مانی در دکوالتباب بار مطون سے سس طرح تمیز کیا عامات كه اول الذكرطالت يعنى قولنج مين شكرمنقبض بوماً بيدا وراليمية نهبي ہو تی بککہ دیا نے سے در و میں تخفیف معلوم ہوتی کہنے اور آخرالذکر مالت بعنی ہمٹیر ایک وردمن فض وراسي هيو في اور لمادياك نتمائي صابيت موجود موتى م - بع على dectopie) (gestation کا انشقاق ور داور مبوط بدا کر آب اور مکن بے کہ اس تعلمی ہے سند قرمے کا انتقاب بجہ لیاجائے۔ اس میں قبے اور بے فاعد گی میں کی روملاد ل کتی ہے کثرتِ نزف کے باعث ہونٹوں کا ما کی سبید ہونا ہے شکم کی لیمیت اور ورم ہوتا ہے اور مبض اوقات آوا دستال موجود ہوتا تھی مگر حقیقی استواری نہیں ہوئی اور حوضی اور ستقیمی متحان سے ایک تنا کو دار دھیلا ا باعا تا ہے۔ لیوشرمام شفاخانے (Lewisham Hospital) میں مثقوب مفتی فرجے کی تشخیص کی تصدیق کا ایک مغید در بعث معل ہے۔ اِسْصابی وضع ک ا کے لا تئوا ی فلم جس میں کہفہ بار بطونی میں حکر اور دائیں قوا یا فرام کے درمیان ا یک صاف رفیہ اُمو 'آ زادگیس کی موجود گی ظا ہر کرتی ہے ر ملاحظہ ہوصحفہ ۳۲ الف) يعف اوقات إذ يابيطس كالهملك قواء أنتَقابي البتاب باربطوك أشتا پیدا کردنتا ہے۔ یہ قو اکبھی تبعی د فعتہ کثر وع ہوجا تا ہے' اور اس میں شدید وروشکم کے ساتھ نبض صغیراور خیطی ہوتی ہے ۔ ذیابیطیس کی جرع الہواسے اور بول میر ز ما دہ آلیسیٹو آلیننگ اُلیٹر کی موجودگی اور شکمی استواری کی غیرموجودگی سے

تتخيس سا ف موجاني حاريكه -

جہاں کا کہ النہاب باربطون کی فی یقتی نے فیص کا نعلی ہے، اسبق سوکی کے اندرسب مرس کی سنجو کرنی چاہئے۔ جہاں شدید حاد النہاب باربطون البستہ شخص میں بدیا ہو جائے ہے جہاں شدید حاد النہاب باربطون البستہ شخص میں بدیا ہو جائے ہے جہاں شدید حاد النہاب باربطون البب شخص میں بدیا ہو جائے ہے خوا کے نفر رات اسس کی پدایش کے نہا بیت مکن اسب موسکتے میں یسبن بلوغ کے بہلے اور قریب تر بب اعوری زاکرہ کا نقرح دونو مسنوں میں نیا دہ مکن ہے۔ حرضی ضررات تفریباً بلا استنتاعور تول ہیں ہوتے ہیں اور لوکیوں میں ایک نظر انداز شدہ فرجی بہلی النہاب (vulvo vaginitis) کا بھی خیال کرنا چاہئے جو نمفی سوز اکی النہاب باربطون بیداکر دسینے کا امکان کھی خیال کرنا چاہئے جو نمفی سوز اکی النہاب باربطون کے کا میں واقع ہوئے ہیں۔ میں خصائص بہلے ہی بیان ہو گئے ہیں۔

اندار عمر می النهاب بار بطون ایک نهایت مهلک مرض ہے۔ اغلب نیتجہ کا انداز ہ نبض کی نوعیت 'قیے کے ماری رہنے 'مبوط کی مقدار اوالنهاب کی امکانی وسعت برسے کیا جا سکتا ہے۔ شدید اصانبوں کے تعلق سرف مرروز کی طالت پرسے رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب چند روز گذر جا کمیں توزیا دہ امید مہرتی ہے کہ بیک اسکتی ہے۔ جب چند روز گذر جا کمیں توزیا دہ امید مہرتی ہی کمن ہے کہ بیکے اجتماعات بلا ہر میوں اور مصرف بالا طریقہ سے خطر ناک ثابت ہوں۔ نبتی رہوی اور

نبقى سوزاڭى تىكلىن ئىستىدا سىدا فزا بىوتى بىي-

بی در بی میں سببہ بی رمزان بی اصابتوں کی اکثر بیت میں اور بالخفو اُن اصابتوں میں جرایک معدی اثناعشری یا محرتی قرحے کے انتقاب یا آبود زاکدہ کے اِختاث یا ایسے ہی کسی دومرے حادثہ کی وجہ سے بول شفایی کا اِمکا مرف اُسی وقت ہوتا ہے جب کہ اُن کا علاج بلا آخر منتعدی کے ساتھ حب تراحی طریقوں سے کیا جائے بیٹ کو کھول کر تبیبی ضرر کا تدارک کر نا اور بیب کے اجتماعات کی تسکیل کرنا جائے ۔ اُس التہاب بار بطون میں جو ستم الدم کی وجہ نشروع ہوا ہو 'مثلاً نبقی رہوی التہاب بار بطون میں تا وقت یک بحیور ان نہ بن جائے جراحی علیہ نہیں کرنا جا ہئے 'کیونکہ عملیہ سے اقرابی مرکز مرض کا استیصال کرنا فیرمکن ہوگا۔

اگر بالفون علمه نذكرمن كافيصله كباكباب تواليي صورت من بيسلا ا صولِ علاج یہ ہے کہ آنتوں کو قطعی آرام کی حالت میں رکھنا جا ہے۔ اس غرض کیلئے مريض كوقدريًا بستري لِماك ركمنا لازم لم يا مندمت تيمي حقنول كيف ميدس ويني عائبے میں بن او فی صدی ڈکمیٹروس ہو ۔ اورمُسبِلات سے شختی کے ساتھ احست ما لازم ہے۔ مربین کی بیاس بجھا ہے کے لئے اُسے وقتاً فرقتاً برف کے جھوسے الكراك خِياك مائم ، مُنكِر ، منبه كه راسته سه كوئى غذا د وى ما ك- ا فيون يا مارفیا (morphia) کا استعمال نہیں کرنا جاسٹے کیونکہ مکن ہے کہ ان کے استعمال سے علالات کی البی زیادتی بوشیدہ ہو جائے کہ جس سے علیہ کرنے کی ضرورہت معلوم موتی ہے۔ السی کی گرم مولٹول یا گرم یا نی میں مشکا کر سنے ڑے موسے فلاین الم الكوارك كالم المناس بين برارين إمر أوخ لف الم (liniment of (belladonna جورك دياكيا بوئر مقامي طوريرة رام عال كيا حاسكتا ب - بعض ا وقات برفا نی رفا وات کیا فلالین کی تبول کے درمایان برف کے کرے متعالی کئے جاتے ہیں' لیکن اِن سے عموماً ' منا آرام نہیں صاصل ہوتا جنباکہ گرم لاسفا سے ہوتا ہے۔ مہیجات کی اکٹر صرورت ہوتی ہے ' اور ان کے وینے کی مہات رین شکل برا نڈی ہے' جو تھوڑی تھوڑی مقداروں میں بار بار وی جائے ۔جب تمدو مِوْتُوصْدولِيشْ مِصل (antı-Welch serum) كا إشراب كرنا جا بسبے (ملاخطه پروسغمه 380) پ

ز در ڈ ایا فرام کے نیجے کی نطوی یا فت ہیں واقع ہوسکتا ہے۔ اس کے واقع ہونے کے واقع ہونے کے ایا فرام کے نیجے کی نطوی یا فت ہیں واقع ہوسکتا ہے۔ اس کے واقع ہونے کے نہا یہ اس کے واقع ہونے کے نہا یہ اس کے واقع ہونے کے نہا یہ اس کی نہا ہے: ۔ (۱)
(right anterior intra-peritoneal حرائے وائیں گئی ہے: ۔ (ایاں اگلا دروں بار بطونی خمسراج (falciform ligament) مگرکے دائیں طرف ہوتا ہے۔ بیپ اکثر مگرکے نیجے بیچے کے طرف بمبیل جاتی ہے۔ بیپ اکثر مگرکے نیجے بیچے کے طرف بمبیل جاتی ہے۔

إس كے عام ترین اسساب التہا بِ زائدہ وود ئيمتنوب اثناعشري فرطت اوركبدي خراجات بین ـ (۲) یا یا ساکلادرون بار بطونی حنداج -left anterior intra) peritoneal abscess) جوفاص كرمتقوب معدى قرح كى وجرت بيو آب مجركم ما <u>کس کختے کے اوراور طیال کے گر</u>و واقع ہوتا ہے ۔ (س) وایا *ل خارج* البار بطون راج (right extra-peritoneal abscess) کرکے اوبراور پیچیم کی طوی افت ميں واقع مبو ماہين اور مگر و اكب حلف السار بطون با فتوں (retroperitoneal) (Lissues) اورصدر کے النہاب سے شروع بوزاہے۔ اِئیں جانب کوزیر وایا فرامی طوی ! فت بہت کم ہو تی ہے، خیا نجہ بیال کا النہاب ایک تطفی خراج (lumbar abscess) يبداكرويية كارتجان ركمة بدية أحير إربطوني ب معدی قرعے سے پیدا تبوجا آہے کا کسس قدر عام نہیں مب قدر کہ دور مات کا نقیع (91)۔ زیرڈ ایا فرامی فراج (subphrenic abscess) کی م پہلی علامت وُرو ہے محموی انتلال کے اس عمومی علامات کے علاوہ ہوتقیر کی وجہ بالخفريني عمينو اليمبر براصمیت کی موحود گئ اوراصوات نفس ٔ میونی گمک اورکسی صرتی حنیف کی ۔ لا شغاعی امتحان سے طاہر ہو اے ہے جب کہ وہ کسی حشا و کے انتفاب سے سدا ہوگیا ہوا تو تطلم سُر قدری ںُ فلزی مجنزکارُ اور مُرسی ؓ واز کے وقوع کے سب (pneumo-thorax) كى مث ببت يبدا بوسكنى عد استفضائى كيوكاعل مب لا من كي الله بترون من بي ب ك وه أيك معدم س دوا كي زيرا تركيا حاك اور اگر نتیجہ مثبت ہوتو ایک کھلے علیہ کے ذربعہ کس کہفہ کی نسٹیل عمل آل نی طامحت

(chronic peritonitis)

بيرحا والتهاب باربطون كيفتيجه كحطور يريدا ببوسكتاب بالخصور كأ مَقَاعِ أَسْكُلُولَ مِن _ يَهِ أَكِيرُ مُحْفِولَ اعضاكَ كُرُومِقامي خُرامِنْ كَانْتِيجِهِ مِوْابِ مستُلا عمن ہے کہ گر باطحال ایک و ہنر کمیں۔ سے مصور موجائیں (گر و کمپ بری البھا ہ = perihepatitis كروطي كى البتاب = perisplenitis)- كبغه شكرك الدر تىدرّن اورىرطان كى باڭىدگى مزمن اكتباب بارىل<u>ون كى وەشكىس بىدا كروتى بى</u> جن كا تذكرہ البي كيا جائے گا- بيمون براكن مي سي واقع بوسك ہے-مرمن لبتاب إرمطون كى أيك دوسري شكل احث مك ورميان انضلعات اوربنيك (adhesions and bands) بي جوعاوالتهاب يامزمن التهاب بىدا بوكر كبمي كم وموى تسترو (acute intestinal obstruction) بداكرديتي بن جيهاكه يبلي بان بوجيكاب معوى ركود (intestinal stasis) اورعت ذاني تسم الدم (alimentary toxemia) كے تعلق ميں ان انضابات كوسبت اميت وى كئى ہے ليكن يہ تبلا وياكيا ہے كہ يہ سوائے نہاست نوعرا فراد كے و كيرا شخاص كى اکٹریت میں بائے ماتے ہیں اور قولون کے قریب الحقوص قولون صاعب اور بِیدی عوصہ کے قریب نہایت کثیرالوقوع ہن اور یہ کہ جنینی دندگی کہ میں ملمالی اوركبدي مومات مي ايك إنضائ على بيدا بنوما آب، اور بعض إصابتول مي يه لفائفی کوومنی حفرہ میں مُنت کرونیا ہے ۔ تا نت کے افیبا کے بیا وکورو کی کاان کا عمل بِنَمْتُه إِ بَرِيمُ كَي عَذَ الْجُهِ بِعِد لا شَعَاعُول كَ ذِرِيةٍ تَعْتَيْقِ كُما مَاسَكُمَّا بِ عَلاّ مَا تَتَ ۔ بب سال کم ہو آہے! بالک نہیں ہوتا تو آنتوں کے مجملا بن جائے کے مقام برشکم میں بے قاعدہ مزاحمت موجود موسکتی ہے۔ورنظا ات وہی ہوتے ہیں جراقہ کی مرض میں ہوتے ہیں۔ تضخيص بمحن مزمز التهاب إربطون كأشفيص كاني نبين بمكسا والمبب در ما فت کرنا عزوری بے اور اند ار اور علاج کا انحصار بی برسی (نم

ظ خطه مِواسّتها بمشكمي -

مرتفى النهاب باربطو^ن

(tuberculous peritonitis)

بحث اس بو آج الیکن التها با ربطون ہر عمر میں ہو آج الیکن بری الور نوعم با افغال میں نہایت عام طور پر ہو اگر آئے۔ وہ نہایت عام طور پر ہو اگر آئے۔ وہ نہایت عام طور پر ہو اگر آئے۔ اسی و اسطے وہ اکٹرسل یوی دور سے حصول کے تدرنی تقرع 'جُنبی اساریقی غدو' اور وضی اعضاء (مثلاً فلوتی آنبوات کے تدرنی تقرع 'جُنبی اساریقی غدو' اور وضی اعضاء (مثلاً فلوتی آنبوات کے تعمین اور منوی تو میطات) کے امراض کے بعد انوی طور پر ہو آج۔ مکن ہے وہ حا وعمو می تدرید ن سما ایک جز وہو۔ اس میں تک نہیں کہ بین کہ بین کو رسکتے ہیں جب کہ اس میں کوئی صرب فرو۔

ا مراضیات ـ تدرنی التهاب باربطون کے جاراتمام ہوتے ہیں :۔

(۱) استسفائی مشکمی قسم (ascitic type) - اس میں با بطون کی سلم چیو کے بین اسیدی مالی ذرات سے و هلی ہوئی ہوئی ہے ، جن کا قطع تا ه می میر ہوتا ہے ، اور جوسلم سے سی قدر اُ جر بے ہوئے اور باس باس جمتع ہوتے ہیں ۔ یدور نے والیا فرام کی تحتا فی سلم پر اور کو کمول میں نہا بت کہ تت کے ساتھ ہوتے ہیں میسلی میالی کاعبرارتشاح واقع ہو آ ہے ، جو مکن ہے کہ مقدارتیں کئی بائنٹ ہو اور کم کمی ساتھ ہوتے ہیں میسلی کا این اُتنی ہی زیاوہ ہو جتنی کہ وہ کہت (cirrhosis) کے یام خوالب کے استفاء سنگی میں ہوتی ہے ۔ زیادہ شاذ اصابتوں میں یہ ایع مصلی می یام می ہوتا ہے ۔ (۲) کا منطوب کے درمیان انتخامی (plastic) کی اُسی ہوتا ہے ۔ اور آ نت کے لیجوں کے درمیان انتخامی کی مواب کی ہوتا ہے ، اور آ نت کے لیجوں کے درمیان کا میراز سلم مقدار میں نبیت ہوتا ہے ۔ نبیت ہوتا ہے ورجوں ہیں سخت الیفی بافت فائبرین کی سیم حور برجی ہوتا ہے ۔ نبیت ہوتا ہے درجوں ہیں سخت الیفی بافت بین اور باربطونی کہف معلموں ہوجو آ ہے ۔ نبیتہ بعد کے ورجوں ہیں سخت الیفی بافت بین اور باربطونی کہف معلموں ہوجو آ ہے ۔ نبیتہ بعد کے ورجوں ہیں سخت الیفی بافت بین جاتی ہے ۔ مکن ہے کہ در سے بالکل ظاہر یا وہ خواہ خواہ درس کی اس محتنی قسم ہیں اور باربطونی کہف معلموں ہوجو آ ہے ۔ نبیتہ بعد کے ورجوں ہیں سخت الیفی بافت بن جاتی ہے ۔ مکن ہے کہ در سے بالکل ظاہر یا دراخ نہ خواہ کے درجوں ہیں سخت الیفی بافت بن جاتی ہے ۔ مکن ہے کہ در سے بالکل ظاہر یا دراخ نہ خواہ کے درجوں ہیں سخت کے درجوں ہیں سخت کہ در سے بالکل نظام ہر یا دراخ کی درجوں ہیں سخت کے درجوں ہیں سخت کی در سے بالکل نظام ہر یا در اور کا کہ بنی قسم ہیں ہوتا ہے ۔ مکن ہے کہ در سے بالکل نظام ہوتا ہے ۔ نبیتہ بیا کی مصلی ہی کہ در سے بالکل نظام ہوتا ہے ۔ نبیتہ بیا کو کی اور آ تا کہ بی کی در سے بالکل کا اس ہوتا ہے ۔ درجوں ہیں سخت کی در سے بالکل کا اس ہوتا ہے ۔ نبیتہ ہوتا ہے کہ در سے بالکل کا اس ہوتا ہے ۔ کا در سے بالکل کا اس ہوتا ہے کہ در سے بالکل کی در سے بالکل کا کو کر سے بالکل کا در سے بالکل کی ہوتا ہے کی در سے بالکل کی

ا علامات علامات بسل الت الماست من اور اصابت مر الماست من اور اصابت من الماست من الموسع و الماست من الموسع و الماست من الموسع و الماست و المراسطون و الماست و المراسطون و المراسطون و المراسطون و المراست و المراسطون و

مانب پیدیسطی برناممواریا گرکی ہوتے ہیں۔ معض اوقات تدتی در بزش کے تفکیب تورے بندوں کی طرح شرب ہو کے حرب بندوں کی طرح شرب ہو در بندوں ایک متعوض بند بنا و تناہے اور مطموس مربطا، (urachus) کے گرو کی بافت کا انتخابی بند بنا و بنی ہے۔ کہمی تمبی لیفی بافت کی زیا و تی اور اس سے بیدا ہو ما ہے و الیے انتخاب کے باعث شکم بافت کی دیا و تی اور اس سے بیدا ہو ما ہے و الیے انتخاب کے باعث شکم بافت موق کم نمائیہ کا تسد و مداکد و تناہے۔

معوريمي سے كسى ايك تب سے مث بر برسكتى ہيں -

بول مین مین ما تعین بین جن کے ممبر خصائص رکے ان پاول اور در سام است کا ہیں اور خوسل موی ("consumption of the bowels") اور خوسل موی ("consumption of the bowels") کے نام سے یاد کی جاسمتی ہیں۔ یہ تدر تی المتهاب بار بطون اور شکمی کمفائی فد دکا مرد ن شکمی مرض (cœliac disease) اور ساقہ وہ سو دسمند معہ اسہال ہیں۔ ان ہیں سے آخری مرض میں سے زیا وہ عام ہے مشتبہ اصابتوں میں لا شعاوں سے مرد ماصل موسکتی ہے۔ "، رنی النہاب بار بطون میں انضاات کی وجہ سے فیر شفاف مذا مجھوٹی آئے سے میں جو قاعدہ نقطوں بر جمجہ فے جمیعہ نے اختماعات بیدا کرسکتی ہے در است میں جو موسل موسکتی ہے۔ گذر مباتی ہے۔ گئر مباتی ہے کہ در رسیمی شرب ملطی سے بڑھے ہوئے مگر کا زیریں صت مرب ملطی سے بڑھے ہوئے مگر کا زیریں صت مرب ملطی سے بڑھے ہوئے مگر کا زیریں صت مرب ملطی سے بڑھے ہوئے مگر کا زیریں صت مرب ملطی سے بڑھے ہوئے مگر کا زیریں صت میں مبلانہ ہوئے مگر کیا جات میں مبلانہ ہوئے مگر کیا وہ سے میں مبلانہ ہوئے مگر کیا وہ سے میں مبلانہ ہوئے دیں۔ میں او قات جسم کے دو سرے معموں میں تدران کی موجود گی کے باعث

تشخیص کی تصدیق بوسکتی ہے کیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ بچوں یا نوعوں ایساوہ استہارت کی تصدیق بوسکتی ہے کہ استہارت کی ہوسکتا ہے کا کہ استہارت (hepatic cirrhosis) کے استہارتکی سے نمیز کر ااکثر مشکل موال کہ کہ بین کا ہوسکت دوجود ہوتی ہے۔ اوراکٹر وہ ملطی جو بعض و و برہ و تی ہے۔ اوراکٹر وہ ملطی سے بینی و و برہ (ovarian cyst) سمجہ لیا گہاہے کی بہال کہ بجراحی علمیہ سے ایکی فضل مونی۔ بزل کے ذریعہ نکالے ہوئے ایم کا امتحان ایک کی بجراحی علمیہ سے ایکی کے اندامیمی کے کہ اندامیمی کرکے کہا جا سکتا ہے کہ اندامیمی ہے در بار کا کہ نہو برکولین انتحال کی جامئتی ہے در طاحظ ہوتھی 170)۔ اندار کے نسبت سے تدرنی ضررات کے اندار کے نسبت نے دیا وہ اسیدافر ا ہوگیا ہے ایک کی نسبت میں میں کا علاج جلد شروع کیا گیا بہ بالکل شفایا ہوگئے ہیں۔ نصوف یہ کہ ما بیع حذب ہوگیا ہے ایک بعض اما تبول میں تصالب ور در بزش ایا انفای کم بھول کے نبرے نبرے تو وے باکل نام بالکل شفایا ہوگئے ہیں۔

نالی کئے جاسکتے ہیں۔ شم برازی کا علاج غذا کی چرب کم کرسے سے کرنا چاہئے۔ باربطوتی انصبا باشتاور مافیہا

(peritoneal effusions and contents)

كيف باربطوني كے الدر مائع الضيا بات حسب ذيل موتنے بيب : - (١) وه صلی ' مصلی فائبرین اور رمی المات موالتهاب یا بار بطونی التهاب سے بیدا ہوماتے میں خطبیت النهاب اغشبه مصليد (polyorrhomenitis) يا عمومي النهاب اغشبيه مصلید (polyserositis) یا کو نکا ٹو (Concato) کا مض کے نام اس حالت کو وكے كے بن جن مي جاربرى صلى اغتيد نيف تا رمور بليكورا أوربار بلطون يس دو با زائدا عن بيري بريك وقت التهابات يدا بوط نيس ـ ية لازم مدر في نبغي سبی اورنبغی ربوی سرایت ٔ اور حاور پیتیت (acute rheumatism) میں واقع ہوسکتا ہے۔ اس کو یک (Pick) کے مرض سے تمبر کرنا ضروری ہے (الم خطہ مو)۔ رم) وه ما بعان جن كا انصباب مخلف الاقسام كيدي قلبي إكلوي استنفامي ميوا ہے اور وہ کیلوسی ماکیلوسی الشکل میعات جوبعض او قات موجود موتے ہیں۔ (۳) وہ ما بعات جرعروق یا دوسری متصلد ساختوں کے انشقاق سے حاصل موماتے ہیں۔ اس طرح مکن ہے کہ () کیف اربطونی کے اندرخون یا ماجائے حرضہ سی انورسا کے انتقاق نزفی التهاب باربطون کا ساربقی غدو کی سِدا دیت یا علقیت سرطانی البدول سی عروق کے انتقاق طامج الرحم الرومل اور دو سری عالتوں بیں بیدا بوجا تا ہے۔ (ب) مکن ہے کہ طرکے کیستی دوہرے کے انشقاق کے دوران میں ورمیت کر مرارے کے انشقاق سے صفرا بار بطون کے اندر بہنج عائے۔ (ہے^تے) مکن ہے کہ کو ئی *سا دہ* یا متبقیم کیسیتی دُویرہ مثنّعوٰق موکرا پنے ما فیہباً كو مارمطون كے اندرخارج كروے - (3) مكن كرى كيوروں ي سے سب اور () کھو کھلے شکی اختار میں سے کسی کے مافیہ اضرب یا مرض کی وجسے کہفہ بارلطونی کے اندر چلے جائیں مثلاً معدے انتوں یا متا نہ وغیرہ کے افیہا۔

باربطون في البريس

اربین کے مون کے بعد تا تو کا لید ستہ طان ہے جواحثاء الخصوص تھ اور بین کے مون کے بعد تا تو کی طور پر بیدا ہو جا آپ ۔ بر بیشتر زیا دہ عربی ہوا آب مور بالب کے بیشتر زیا دہ عربی ہوا آب مور بالب کے بیشتر زیا دہ عربی اور کہا در کا کی ساتھ ہوا ہے۔ اسطیح در ندی طرح یہ بیجی والما فرام براور کو کول میں بہایت کرند کے ساتھ ہوا ہے۔ اسطیح شرب بھی و بیزاور در در نجمتہ ہوسکت ہے اور مکن ہے کہ بالا خرسطانی کر کمیں سارے شکی بر ہوجا کیں ۔ جیداصا بول میں کو لاکٹری سطان (colloid carcinoma) شکی بر ہوجا کیں ۔ جیداصا بول میں کو لاکٹری سطان (carcinoma بالبطون ہو آب اس کے ساتھ نون آمیز ہو آب ہو آب اس کے ساتھ نون آمیز ہو آب ہ

مُونِ خِيتُ كَى ايك دومري كل لحمى مسلعه ب ـ بينطف الب الطوني المنتول لحمى مسلعه ب ـ بينطف الب الطوني عناطبي افتول ترب الماريقا يارباط منتعوض بي بواجه فطف لبالطيوني محناطبي المحمى سلعه (retroperitoneal myxo-sarcoma) نبايت برى رسوليا بناسكا المحمى سلعه علامات مرسالتهاب باربطون كے علامات كے علامات

ان كا تحصارا قالى بالبدكيم على وقوع بربوقا ب-

اندار قطعاً غياميدا فزابوتائ اور علاج كانشارى مونا چائ كاعلات. تخفيف بؤاورجب سيال بهت زياده موتواسه عارضي طور بركال ديا جائدي تسدو معاميك جراحى عليه كياجاك مكن به كرعميت لاشعامى علاج كالحي ملعه برمفيد انتر مربت -

حوالهجات

REFERENCES

1	Λ . Rendle Short	1925 Brit. Med. Journ., 11.,
2	A. Bulleid	p 254. 1931 Guy's Hosp. Rep., 81,
3	C. B. Henry	p. 116 1930 Lancet, n., p. 35.
4	H Llovd Williams	1925 British Dental Journ, Dec. 9th, p. 60.
	R D. Paterson;	Journ, Laryng., pp. 285.
6	A. Brown Kelly P. P. Vinson	289. 1922 Minnesota Medicine, p.
7	W. W. Pavne and E P.	107. 1923 Quart. Journ. Med., 65,
	Poulton	p. 53.
8	G. W. Rake	1926 Guy's Hosp. Rep., 76, p. 145.
9	G. W. Rake	1927 Guy's Hosp. Rep 77, p. 141.
10	G. L. Scott	1922 Lancet in, p 988.
11	A. E. Barclay	1922 Lancet, ii., p 261
12		1924 Gny's Hosp. Rep., 74,
13	Bolton and Goodhart	р. 354
* * *		1922 Lancet, 1., p. 420.
14	Roard Compbell and	1924 Guy's Hosp. Rep., 74,
7.4	Hern	p. 23.
15	H. D. Rolleston	1896 Trans. Path. Soc. 47,
16	A. F. Hurst	p. 37 1914 Quart. Journ. Med., 8,
.	za z z z u i i	p. 300.
17	T. L. Hardy	1929 Lancet, i., p. 711.
18	H. Maclean and	1928 Journ Physiol., 65, p.
	W. Griffiths	63.
19	'Morell Roberts	1930-31 Quart Journ Med. 24, p. 133.
20	4 ,	1928 Guy's Hosp. Rep., 78,
21	Powell A. F. Hurst (Goulsto	p. 279. 1911 The Sensibility of the
1 لين	nian Lectures)	Alimentary Canal. Orf
	man rectities)	Med. Publications.
		men, i ubucutons.

	W. W. Payne & E. P.	1927	Journ. Physiol., 63, p.
2 2 ·	Poulton	1000	217.
	E. P. Poulton	1928	Lancet, 11., pp. 1223,1277.
23	W. W. Payne and E. P. Poulton	1928	Journ. Physiol. 65, p 157
24		1924	Masson et Cie., Paris.
	peptique)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
25	Sir B. Bruce-Porter	1924	Lancet, u., p. 495.
			Quart. Journ. Med., 15,
26	P. C. Couran		p. 144.
27	D. P. D. Wilkie	1928	Brit. Med. Journ., 1.,
			p. 481.
28	D. P. D. Wilkie	1922	Brit. Med. Journ., 11.,
			p. 1219.
29	D. P. D. Wilkie	1933	Brit. Med. Journ., i., p.
			771.
30	D. C. M. Ettles	1927	Guy's Hosp. Rep., 77,
			p. 216.
	K. Faber	1927	Lancet, 11., p. 901.
	J. Sherren	1924	Lancet, 1., p. 477.
	K. Faber	1922	Lancet, i., p. 65.
34	A. E. Barelay	1929	Lancet, ii., p. 1272.
	A. E. Barclay	1929	Lancet, 11., p. 1322.
36	A. Bruce Maclean	1932	Brit. Med. Journ., ii.,
			p. 1055.
37	M. J. Stewart	1923	Brit. Med Journ., Nov.
	T TT 3		24th and Dec. 1st.
38	J. W. McNee	1922	Quart. Journ. Med., 15,
90	m a n		p. 215.
	T. G. Bonar	1924	Lancet, ii., p. 261.
40	A. F. Hurst, R. P.	1926	Guy's Hosp. Rep., 76,
.11	Rowlands, etc.	1000	p. 156.
41	E. C. Rosenow	1923	Journ. Infect. Dis., 32,
40	A TO Theresal		p. 384.
14	A. F. Hurst	1923	Brit. Med. Journ., i., p.
49	T. T. Clanythaana	1000	1074.
3 ()	J. J. Conybeare	1922	Guy's Hosp. Rep., 72, p.
4.1	Sir B. Moynihan	1000	174.
45	E I Springs and A	1923	Lancet, i., p. 631.
10	E. I. Spriggs and O.A. Marxer	1922	Dancet, I., p. 725.
46		1092	Lamast ii m 900
		1040	Lancet, ii., p. 823. 421

4	i	r
•	7	,

ي	ما	11	•	
	•	, ,	,	

علطب مبدودم

		1923	Brit. Med. Journ., 1., p.
47	G. F. Still		579.
	F. N. Reynolds	1921	Lancet, 11., p. 891.
4 8	H. Tyrrell Gray and		
49	T. I. Bennett	1923	Lancet, it., p. 275.
	A. F. Hurst and		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	A. Newton	1913	Journ. Physiol., 47, p. 57
51		1932	Quart. Journ. Med., 1,
	ter & J. M Vaughan		υ. 603.
52	Discussion on Summer	1923	Brit. Med. Journ., 11.,
	Diarrhœa		p. 857.
5 3	G. Leighton (The Loch		•
	Maree Tragedy)	1923	W. Collins, Sons & Co.
54	W M. Scott		Brit Med. Journ., 11.,
			p. 56.
55	R. E. Smith	1931	Lancet, ii., p. 925.
56	T K. Monro and	1923	But. Med. Journ., i. p.
	W. W. N. Knox		279.
57	N. L. Lloyd	1925	Guy's Hosp. Rep., 75, p.
			410.
5 8		1924	Lancet, 1., p. 121.
59	E. I. Spriggs and		
	O. A. Marxer	1927	Lancet, 1., p. 1067.
	H. Hartmann	1922	Lancet, i., p. 307.
61		1923	Journ. Exp. Med., 37, p.
(10)	T. C. Orr		_365.
	B. W Williams	1927	Lancet, 1., p. 907.
	R St. L. Brockman	1927	Lancet, 1i., p. 317.
64	A. F. Hurst (Essays,	1004	TT .
05	etc.)	1924	Heinemann, p. 123, etc.
60	J W. McNee	1932	Brit. Med. Journ., i., pp.
0.0	D II W 4-1 m r	1000	1017, 1071.
00	r. H. Whitaker, T. B.	1933	Quart. Journ. Med., 2,
	Davie, and F. Mur-		p. 49.
67	gatroid.	1007	W-1 0 410
67	Mann	1927	Medicine, 6, p. 419.
68	A. R Rich	เษสป	Bull, Johns Hopkins
69	D. P. Drumy and	1000	Hosp., 47, p. 338.
Uð	D. R. Drury and P. D. McMaster	1329	Journ. Exp. Med., 50, p.
70	J. C. Spence and		569.
117	P. C. Brett	1001	Lamant ii m 1960
	i. C. Diett .	1341	Lancet, ii., p. 1362.

71	Y. Akerran	1934	Experimental Changes in Liver Function, Up-
			sala. Lancet, i., p. 380. Brit. Med. Journ., i., pp. 716, 783.
74	M. Brule (Recherches		,
75	sur les Icteres) W. Morrell Roberts		Masson et Cie., Paris. Brit. Med. Journ., 1., p. 734.
76	C. Newman (Goulsto- man Lectures)	1933	Lancet, 1., pp. 785, 842, 896.
77	G A. Collinson and F. S. Fowweather	1926	Brit. Med. Journ., 1., p. 108.
78	Sir H. Rolleston (Discussion on Degenerative Diseases of Liver)		Brit. Med. Journ., ii., p. 1055.
79	C. H. Best	1934	Lancet, 1., p. 1274.
	Review on Syphilis		Med. Sci., 8, p. 182.
	P. Rous, P. D. McMas		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	ter and G. O. Brown	1923	Lancet, i., p. 449.
82			Brit. Med. Journ., ii., p. 767.
83	T. C. Hunt	1933	Lancet, 11., p. 279.
	B. B V. Lyon		Amer. Journ. Med. Sci., 160, p. 515.
85	A. Leitch .	1924	Brit. Med. Journ., 11., p. 451.
86	J. Mellanby	1926	Lancet, ii., p. 215.
	R. Coope (Pancreatic		_
	Disease)	1927	London.
88	J. F. Brailsford	1926	Proc. Roy. Soc. Med. (Elect. Therp. Sect.) p. 41.
89	A. Rollier	1922	Brit. Med. Journ., ii., p. 741.
90	A. C Hampson	1919	Lancet, 1., p. 429.
91	H. L. Barnard		Contrib. to Abdominal Surgery, p. 335.
92	A. F. Sladden	1922	Lancet, ii., p. 68.
	H. C. Edwards		Lancet, ii., p. 1161.

422

خون طحال وركمفاني نظا كيامراض

امتحان خون

عصد ترویب النام ا

<u>.</u> دینه پر)	يىثيا س (سمولى عذا	سالم ثون (بحالت فاق رش)	
گرام براه گمندسی ۲۰۷	نی گرام نی ۱۰۰سی می ۲	لیگام نی ۱۰۰ سی سی ۱ میک	اليميزا يبثرنا شرومن
۱۰ کمک	4	1 14. 1 11.	کلورین کولسٹرال
		100 — A.	ڈکٹروکس غیرمپروٹمینی اکٹروجن
t	اعما	ا ہم تک	يوك اليذ

71	Y. Akerran	1934	Experimental Changes in Liver Function, Up-
73	D. T. Davies J. W. McNee M. Brule (Recherches	1922	sala. Lancet, 1., p 380 Brit Med Journ., 1., pp 716, 783
. ,	ri les leteres) V Pobert	1924	Masson et Cie , Paris Brit Med Journ , i , p 734
	ar coulsto Chars	1933	Lancet, 1, pp. 785, 842, 896.
		1926	But Med Journ, 1, p. 108
			Brit Med Journ., 11., p. 1055.
	H. Best Sciew on Syphilis P. Rous, P. D. McMas		Lancet, 1., p. 1274. Med. Sci., 8, p. 182
	ter and G. O. Broun D. P. McMas Ter and G. O. Broun D. P. B. Wilkie		Lancet, 1., p. 449. Brit. Med Journ., 11., p. 767.
٠,	r C Hunt	1933	Lancet, n., p 279
	B B V. Lyon		Amer. Journ. Med. Sci, 160, p. 515.
)	A. Leitch	1924	Brit. Med Journ, 11, p 451.
86	J. Mellanby	1926	Lancet, 11, p. 215.
~7	R. Coope (Pancreatic Disease)	1927	London.
88	J. F. Brailsford	1926	Proc. Roy. Soc. Med. (Elect. Therp. Sect.) p. 41.
89	A. Rollier .	1922	Brit. Med. Journ, i., p. 741.
90	A. C. Hampson	1919	Lancet, 1., p. 429.
91	H. L. Barnard	1910	Contrib. to Abdominal
			Surgery, p. 335.
92	A. F. Sladden	1922	Lancet, ii., p. 68.
93	H. C. Edwards .	1935	Lancet, ii., p. 1161.

422

خون طحال ورلمفافئ نظا كيامراض

المتحال خون

الفرون بيتياب (بحالت فاقد كتى) (سمولى غذا ويينه بر) (سمولى غذا ويينه بر) في داسى في د

على - جلدوم	ۇ <u>ن</u>	امتحالِن	414
•	بیشیا سب (سمولی غذاه	سالم خول (بمالت فاقدشی)	
گرام ہر17 مگھنٹامیں ۲۰ - ۳۰	لی کرام فی ۱۰۰سی ی ۲۰۰۰	تدگرام فی ۱۰۰سی سی ۱۹ – ۳۲	يو - يا
,		بلازا	
، کک	4	rar - rot	کلور <i>ین</i> البهومن
		1 <u>(</u>) 3 44	محلا بيولن اور فالبريومن البهومن محلا بولن نسبت
- 14	4 -	· > p > p	فائبرینوحن غیر امیاتی فاسفورس
		مصل	
-14	14-10	954	ليبشيم
-914	4	ין ניין	ميكنيشي
م کک	10 1	1910	يسيسيم پڙائشبم
م کے	۳	۳۳۵	موديم ا
*		CO ₂ (20-0-07	قلوی مخفوظ م <i>تناکسدگذدهک</i>
434	10.	13110	غیزامیاتی
· <i>y</i> Y	10	1 2 5	المنتحري
• 5 7	ها	730-11c	فيرمناكد كذمعك
			اكمشد

ما مشيد : -نون يامونيا إنكلنبي موتى يشاب مي المونيا كى ناكرومن الميها المينوليسد ناكرومن مع المعمم الكاموا عرصه (collecting time) - ايك يُجِن كاخون ايك ما وب

کاغذے بلاد بائے مبر باُو یا ایک منٹ بزشک کر لیاجا آہے۔ طبعی حالت میں اوا راک تا ہے ۲ منٹ میں موقوف ہو جا آہے ۔ لیکن مرض میں مکن ہے کہ وہ میں منٹ ملکہ کئی مگذش نہ کہ اطالت خسر ہو جائے۔

تنريح تتفلّ (sedimentation rate)- ايك شيشه كي على مين حركا قطرية

جييات ئي شكنائي (fragility of corpuscles) يبض امنين

سرخ جمیات کی مشکنائی معمول کے نعبت زیادہ پائی گئی ہے 'بالفاظود کمیر مُرَقَق الله اللہ سے دم پاشید کی ہوجائے ہیں جسیات یا کلو بجے نعبنہ کی مزاحمت ظاہر ارتے ہیں ہواں کی نتیبن کے بخہ خد کعب بنٹی میر خون کو آگر بلیٹ آف بوٹائیم کے ہم منٹی محلول رپوٹائیس آگر بلیٹ ۲۰۰ گرام اسوٹو میم کلورائڈ ۸ ر گرام اس کشیدہ . . اگرام) کے ساتھ ملاکر اس آمیزے کا امنی من کیا جا آئے موکر کشیدہ . . اگرام) کے ساتھ ملاکر اس آمیزے کا امنی من کیا جا آئے ہوا تا ہو کہ اور جبیات کو سوٹو کیم کلورائڈ میں محلول ہیں دھوکر بختیان کا امتحال سوٹ کی ما تھ کیا جا آئے ہوائی کی ما تھ کیا جا آئے ہوائی کی اور دس من مندی معلول میں کا مل دم پاشدگی طامر کر تھے ، میں ۔ اگر وم پاشدگی اور دس می محلولات کے ساتھ موال جو اس سے غیر سمولی طور پر پاشدگی نا مرکز تھے ، میں ۔ اگر وم پاشدگی نا مرکز تھے ، میں ۔ اگر وم پاشدگی نا مرکز تھے ، میں ۔ اگر وم پاشدگی نا مرکز تھے ، میں کو لات کے ساتھ واقع ہوتو اس سے غیر سمولی طور پر بازشک کی نا مر ہوتی ہوتو اس سے غیر سمولی طور پر بازشک کی نا مر ہوتی ہوتو اس سے غیر سمولی طور پر بازشک کی نا مربوتی ہوتی ہوتو اس سے غیر سمولی طور پر بازشک کی نا میں ہوتا ہے ۔ .


جيها ن شاري يا وموي شار - يرضو آزليس (Thoma-Zeiss) با

رکرز (بس (Burker-Zeiss) کے دموی طبیع (hæmocytometer) سے

على إلياط ما بعير

اول الذِّكراكِ شيشه كانشر بحد ہو تاہے ، جس س أيك " خانہ" بنا ہوا ہو اہد جس کی گہائی لے لمی میٹر ہونی ہے اور حرابی تہ میں لکیوں کے ایسے مربعات رکھتا ہم بن کے اضلاع کی اب بل میٹر ہوتی ہے۔ پھریہ مربعات کیروں کے ذر میعہ مگر کر ۱۷٬۷۱ جسو سے مربعات کے گرو بول سے گردہبند ہونتے ہیں۔ ایک مخصوص طرز کے ہے ہوئے نالجیم بنون کی ترفیق' ۱۰۰ حصہ میں ایک حصہ کی حدثک' ایک محلول دسود نیم فاسفیک یا کلور آند) سے کرلی جاتی ہے ' جوجب یات کو مفتر ت نہیں بنیانا ۔ اور بیراس کا ایک قطرو شریحہ پرکے سفانے " کے اندر کھ کراں پر ایک بہلا شیته محافظ رکھ رہا جا آئے۔ جب ات مربعول کے اندر تانشن موط تے ہیں، جن میں سے ہرمر بع بالہ کمعب لی میرکے برابر ہوتا ہے۔ سولسول مربعوں کے کئی گرو موں میں سرخ جسیہات شار کر لئے جاتے ہیں اور اُن کی مجموعی تعد ادکو ٠٠ اسے (جوتر قبق ہے) اور ٠٠٠ ہے (جومرجیو مے مربع برکے بسیال کا مجمہ ہے) سرب دیاجا تا ہے اور حال ضرب کو شار کر دہ جیو مقدم بغول کی مقداو ہے م كردياً ما تأب من سے ايك كمعب لى ميٹركے اندر كے جبيمات كى تعداد طال ے۔ نزگر (Bürker) کے آلدمی جوتھو آ زبیں کے آلدہے بہتر ہے' ننیشہ کی فط کوسب سے پہلے شکنی ل کے در بعہ سے جالیا جا ا ہے اور نیم **رق ف**ی فر ری شش کے ذریبہ اندر واخل کیا جاتا ہے۔ ہرکر کا طریقۂ ترقیق نمی نہیت بہنزہے' مگریہ ابھی اسس ملک (انگلسنا ن) میں زیا دہ متعل نہیں۔ ایپ معسل نانچه و في صدى أليسينك أييد كيسانه' . احصد مين احصد كي مدتك ترقيق كرفي كے لئے ہے جس سے سرخ جسيما ن غرمرنی ہوجاتے ہیں۔

رخ جب ات کی تعداد فی مقب علی میٹرو کورنے گئے واوراناف کے لئے میں میرو کی گئے۔ کے اسلام میں میں کے لئے اسلام میں میں کے لئے اوسلام موثی ہیں۔ پر اور جو لانی کے جس کے اندر تقریباً ، و فی صدی طبعی تدریس واقع موثی ہیں۔



بیماء زے نوا قد دارسر عملیات کا تحلف قسموں کی زئیس تصویر۔ نیچے کی قطار میں پلیج طبعی اجسات دکھائی دیتے ہی بہت سے حلیات میں متعدد الواں لیسندی اور فمر ۱۲ میں تعظمہ داراس سیسسدی طافظہ تو۔ (ڈاکٹر اے۔ باپنے فرار الوم) اسکے چھاپے کی اجارت عطار مائی ہے 'رسال امر اضیات وجر تومیات جلد ۲۰ میں جو لائی ۱۹۲۳)۔ (اتقال صمر 428)


(٥ : ٢ × معياري في في ون ٠٠٠ ١ ٢ م ٠٠٠ ١ ١ م ١٠٠ مي د انات كے لئے اوسط

اندن المرائد المرائد و المرائد المرائ

جب سیج کے وقت شار کیا طبائے تو سید خلیات کی تعداد ۰۰۰، م آ ۹۰۰، و فی کھب لمی میر بوتی ہے۔ اعظم تعداد ۱۲۰۰۰ دو پیر کے وقت ہوتی ہے (ملا ضلام

کو حید مشہ ماری ۔ سوڈ ئیم سائٹریٹ کے درم فی صدی محلول کا ایک فطرہ انگلی برر کھ کر کس قطرے ہیں سے انگلی کو چیو یا جا ہے ، جس سے خون اس قطرے میں بھیل جا تا ہے۔ مخلوط خون اور سائٹریٹ کا حا دہ حالت ہیں خرد بن سے معائنہ کیا جا تا ہے ' اور شیشہ' می فظ کے گرد ولیسیلین سے حلقہ بنادیا جا تا ہے کہ و خرشک مزدو ہے ہا ہے۔ اگر سرخ خلیوں کی فی کمیب نمی بیٹر تعداد معلوم مو تولوجی ا کی تعداد فیلم کے اندر اِن و و توں کی نبیت کی بنا پر متعین کی جاسکتی ہے طبی نقداد سے دمیان اختلاف پذیر ہوتی ہے۔

بہوگلو بین کی تخمیش - سریری اغراض کے لئے آلڈین کا بہوگلو بن پیا استعمال کرنا بہترین ہے - اس میں دوآ نبو بات موتے ہیں - ان ہیں سے
ایک بیں جرمیار ہے ملی تون کا ایک فی صدی محلول موجود ہوتا ہو توکار او نیاب
آگا مڈ (carbonic oxide) سے میرٹ دہ اور سیانی جرکے ذریعہ بند ہوتا ہوتا
دور آ افیور ۱۰۰ ورجوں میں تغییم کیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں خون کی ایک نابی ہو
مقداری ترقیق کی جاتی ہے بیال ماک کہ اگر ہیں کو کول کس سے سر شدہ میا جائے
(جن سے تمام بھو گلو بین کار باکسی ہموگلو مین CO-homoglobin میں بدل




المقال مع 421

۳ _{ځی و}موی مییات

غيرجهك

ME

٠,		and the state of t	
	ناع	2766	
,	لينابعنات	قدا تي	
	لتي المعنات	ايوسين لبند	
	لبئ اسمنات	اماس پیند	
جْيِنز كارنگ			
	نوريت	بو قلمول خل	
,	اتاری	خوىلا	
	دان <u>ن</u> رري	متعدال	
	نقلهادامای لیندی		
,	يغني	فالتوادا	



المقال مع 425

عِرِطْعی دموی خلیبات

428

ماتی ہے) تو وہ معیار کے ربگ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طالت میں بیانہ پرکا وہ عدہ کہ جہاں تک محلول ہنجا ہے، ہیر گلو بین کی فی صدی مقدار ظاہر کرتا ہے۔ قریر (Dare) کے ہیر گلو بن بیر اسے ہیا نہ کا معیار اس سے مخلف ہوتا ہے۔ آلا کا ہے۔ لیکن دوسرے آلان کے بیا نہ کا معیار اس سے مخلف ہوتا ہے۔ قوق کا کمانے کو بن کا معیار اس سے مخلف ہوتا ہے۔ قوق کا کمانے کو بن کا الاسکاز کمیقدرا خلاف ظاہر کرتا ہے۔ کیل جہا جمسیات کے اندر ہیر گلو بین کا الاسکاز کمیقدرا خلاف ظاہر کرتا ہے۔ کیل جہا جہا کہ بہر گلو بن کی فی صدی تعداد کے مقالم میں کہ بوتی ہے۔ کو ب قوت ہا کہ ہیر گلو بن کی فی صدی تعداد کے مقالم میں کہ بوتی ہے۔ بول قوبی قوت کا کہ جہا تھ ہیر گلو بن کی فی صدی تعداد کے مقالم میں کہ بوتی ہے۔ فوت ہا کہتے ہیں اور یہ س کا طاحت کہ ظیات ہمول کے نسبت او سطا چھو سے اللہ طرے ہیں کہ یا زیادہ ہو سکت ہو گاؤی ہو ت نما ہو گاؤی ہو ت نما ہو گاؤی ہو ت نما ہو گاؤی تو ت نما ہے یہ در ہو آ ہے۔ لندن میں مردول کے لئے اوسط میں راور جو لانی کہ مرد اور جو لانی کہ مرد اسے اور حور توں کے لئے اوسط میں راور جو لانی کہ مرد اور جو لانی کے مرد اور جو لانی کہ مرد کو اور جو لانی کے میں کو کھو کو کھوں کو کھوں

جمسیات کا فرو بینی امتحان - اگرچ ایک براگی بوئی فراسے سریک استخیص اکتر بوسکتی ہوئی فراسے سریک استخیص اکتر بوسکتی ہوئی فراسے سے سریک استخیص اکتر بوسکتی ہوئی استخیص اکتر بوسکتی ہوئی استخیص المتحان (Leishmann) کے استخیاب (Jenner) کے استخیاب اوٹر اکر نیا کی لمبئی (reticulocytes) کے استخوان محلول کو ایک کرم شریحہ بر بھا یہ اوٹر اکر خشک کر لینا جا ہے ۔ اِس صبغہ کے ساتھ خوان کو ایک قطوم لما لیا جا آج ۔ بھرا سے بھیلا کرخشک موسنے دیا جا آئی اور ایک سے موسنے دیا جا آئی اور ایک روخن عزی عدم استخاب کی جائے ہیں کو استحان کیا جا آئی۔ روخن عزی عدم میں استحان کیا جا آج ۔ بھرا ہے ایک جا کتے ہیں کو استحان کیا جا آج ۔ بھرا ہے ایک جا کتے ہیں کو استحان کیا جا آج ۔ بھرا ہے ایک جا کتے ہیں کو استحان کیا جا آج ۔ بھرا ہے کے دار بھرا سری کا استحان کیا جا کتے ہیں کو استحان کیا ہیں کہ جسیا ہے استحاب یا خلیا احمد استحان کیا گئے جا کتے ہیں کو استحان کیا گئے کے دار بھرا کیا کہ کو استحان کیا گئے کی کو استحان کیا کہ کو استحان کیا ہیں کو استحان کیا ہیں کو استحان کیا ہیں کیا گئے کہ کو استحان کیا ہیں کہ کا ایک کیا گئے کہ کو استحان کیا ہیں کا ایک کیا گئے کہ کو استحان کیا گئے کہ کو استحان کیا گئے کیا گئے کہ کو کیا گئے کہ کو استحان کی کو کر بھرا کیا گئے کہ کو کر کو کیا گئے کہ کو کر کو کر

طبی سُرخ جیمات جن کا قطره ۱ مدر ایم ایم ایم ایم محمود فحمیات یا خود خصلیند (microcytes) جن کا قطر م تا ۲ مار بر قائد - بڑے جیمات یا کبیر خطینے (megalocytes) بن کاقطر تراه ۱ المربو آب بسخ جسیدات کی عدم ملوا کو خلوی (megalocytes) کتی بس مربد برآ ل برسکل موت اکثر است کی عدم ملوا کارخلوی تساوی (anisocytosis) کتی بس مزید برآ ل برسکل موت اکثر است یا معنی نامین نامین تا تساوی (goikilocytes) کتی نامین ترات کار دل کو شقوقی خلید (schizocytes) کی تقبیم آن کی جامت کے لحاظ کو سرت ظیول (فاهضات احمی = erythroblasts) کی تقبیم آن کی جامت کے لحاظ کو ناهضات (microblasts) کی مناب کی اور بوقلموں ناهضات (microblasts) کی جامد ناهضات (poikiloblasts) میں واقع ہوتے ہیں۔

نوان دارسرخ طیتے طبی طور پرلت تعظام میں ہوتے ہیں۔ خون کے اندرائی موجودگی سے لبُعظام میں ان کی زیادہ بیدا کیش ظاہر ہوتی ہے۔ نا مبضات احمر کے انتقاق سے آزاد فوات دیکے باسکتے ہیں۔ مشبکی خطیتے

اورنوات تغیف طوربرانساس بیند موتا ہے۔ (۲) غیرفراتی یا ملعند آسست (lymphoid) رَضِيٌّ لِعِنْ مِعُولِ اور برت لمفي سَخِلْت (lymphocytes) جن كا زأت مجومًا ، كول ، توى طور برائاس بيد مونا سب اور ظنيه اي متورد أجوم خنیف سارنگ تبول کر آے اور بڑے یاف نواتی (large mononuclear) ! نرجاجی خلیت (hyaline cells) یا یک نواتی خلیت (monocytes) میاکاب عمرة أن كوكية من مجن كانوات اورخلية ما يخيف مارجك مبول كرماسيد يمغن افقات ان خلیوں میں آیک نعل کی شکل کا نوات ہو آ ہے اور چونکہ یہ کٹر الاشکال نواتی ظیوں اور لمف أما خليون كي ورمياني كراي سمجه جات مي لهذا إن كوبرزخي عليات (transitional cells) کیتے ہیں کیکن یہ مجمنا صحیح نہیں ہے لہذا اس اصطلاح سے احتراز لازم ہے۔ یک فواتی ظیوں کو کلاں آکلافت (macrophages) بمی كيت بي اوركثرا لاشكال فليول كوخوردا كلامن (microphages) بمي كيت ہیں۔ اِیسین لیسند خلیے بمی اکال خلیات موتھے ہیں۔ بہرب خلیتے اَ میبائی مرکت **خل**امر كرتے ميں يتفريقي شاركو في صدي كے طور بربر كُرْطاب نبي كرنا جا جيك مجربيشه يه تبلانا ما ہے کہ ایک مضوص قسم کے ظانیہ کی فی کمعب کمی میٹر کیا تعدا دہے اور اِسی واسطے سپید خلیوں کامجموی مضمار بمی خون کے اُسی منوز برسے کرنا ما ہے ' جو تفریقی شار کے گئے کامہیں لایا گیاہیے ۔ کشرالا شکال خلیوں اور کمفی خلیوں کمے اختلاف کی وج سے سپید خلیوں کے روزانہ دو تروجز ر ہوا کرتے ہیں۔ اُن کی اُفل معدادیں . ابج مبط ١٧ بے دن اور و بے شب سے ١١ بے رات مک بواکرتی ہیں - اور اعظم تعدا دیں ایک نے دن سے ۵ بح شام تک اور ۱۱ بے رات سے ۵ بے مبع تک بواکرتی ہیں۔ ا ن كاغذا سے كوئى تعلق نہيں ہو ا ۔ اسى واسطے اُن كا وقت ہمشے وْتُ كرلىپ ما جے-

تفريقی شار (إلغ مو ٔ ۲۰ آ مهرال)

تعتريب اب فىمدى

مت دادنی کمب لی میٹر ۱۰۲۹ بیکی سے دوہ پر ۱علم اثل اظم ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

كشِرُلانشكالُ مِن تَي ظِينَهِ ١٦ ١٦ علم هه-٠٠

بعض امراض بن فون که اندونی طبی سید خلیات پائے جاتے ہیں۔ اولاً انتخابہ

افتہ غلیے ہوتے ہیں جن کے خلیہ ایس خالیے ہوتے ہیں اور جن کے فواتوں کی لویٹ یکی طور نہیں ہوتی۔ دوء مختلف غیر بحتہ غلیے ہوتے ہیں جولب غطام سے انتو ہوتے ہیں اور جموا کہ ایم سے شہور ہیں۔ لَبّی ناهض اور جموا کہ بیت خلیقوں (myelocytes) کے نام سے شہور ہیں۔ لَبّی ناهض سے بدا ہوتا ہے۔ اور ایک برااقلی ظینہ (۱۰۔ ۲۰ ملا) ہے 'جولب غطام کے عفر تی ظیمے اور ایک کرار آگ قبول کرنے والا ہو آئے۔ اور ایک کرار آگ قبول کرنے والا ہو آئے۔ اور ایک کرار آگ قبول کرنے والے نامید ما یہ بیت رشہ سے دنگ قبول کرنے والے رتب فلی سے مثابہ ہو آئے 'کیون اس کے فلید یا یہ بیت رشہ سے دنگ قبول کرنے والے رتب فلی سے مثابہ ہو آئے 'کیون اس کے فلید یا یہ بیت رشہ سے دنگ قبول کرنے والے رتب فلی سے مثابہ ہو آئے 'کیون اس کے فلید یا یہ بیت رشہ سے دنگ قبول کرنے والے رتب کرا ہو آئے ہیں جس کے خلید ایم سے مثابہ ہو آئے 'اور دی ایک خلید کی خلید ایم سے مثابہ ہو آئے 'اور دی ایک خلید کی خلید کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام خلیے کفریا کی خلید کی جو تے ہیں۔ یہ تمام خلیے کفریا کی خلید کی خل


آساس بند لبن بخلیة (basophil myelocytes) موتے بین بن سیمتونی نظیات پدا بودا نے بیں ۔ اُن ایمن است است با ابودا نے بیں ۔ اُن ایمن است با ابودا نے بی بیدا کرد تیا ہے، اوداس بی برزخی در بے یہ بین : ملفی لبنی خلید (lymphomyelocyte) جرنست جیوا بوان نظی در تیا ہے میسا کہ ابنی استی بوا ہے اور بیش ملفی خلید (prolymphocyte) جس بی نوات کہ ااساس ب ندر نگاب قبول کرتا ہے ۔ به خلید منقسر بور کمفی غلیہ کو سدا کرد تیا ہے ۔

خون کے ذرائی نیلے ﴿ بینی کُٹِر الاشکال نواتی ایوسین ببندا ورمتولی فیلیم لینے پیشرووں کے ابار اصطلاح سفیل گول خلیات کے عتب جمع کئے گئے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں غیرود انی ظریات (بعنی لمفی طبد اور بڑا یک نواتی ظید) اورا ک سے پیشیں رو لمف آسا خلیات (lymphoid cells) کے نام سے یا دکئے باتے میں۔

مزمن تعینی میں بعض اوفات سیبی خلیول میں جربی موجو دہوتی ہے۔ اور مکن ہے کہ اس مالت میں ان است آیو ڈبنی تعاصل (iodine reaction) حال موجو کا کو مین مالت میں ان سے آیو ڈبنی تعاصل (glycogen) کی علامت ہے۔ اس کو تبلا نے کے لئے خون کی فلم پ کو بین مرتب کے لئے ایک شینتہ کی ڈاف ہو ال بیں رکھ دیا جا تا ہے جس میں آیوڈین کی قلمیں موجو دبوتی ہیں۔ بھران فلموں کا تراکب لیو سُولوس (lævulose) کے میشڈ مملول میں کردیا جا تا ہے۔ ایساکر سے برگلا تو جن ایک کہ اِ جمالی بھورا رنگ ظامرکرتی معلول میں کردیا جا تا ہے۔ ایساکر سے برگلا تو جن ایک کہ اِ جمالی بھورا رنگ ظامرکرتی

آس نتھ (Arneth) کا شہاد۔ یہ طریقہ کیس کوٹانگ (Schilling) کے سا و تر بنا ویا ہے۔ کثیرالاشکال نواتی سپید فلیوں کی مردیا فت کرتا ہے۔ ذراتی لبی خلت، یا نوع ظیدیں واحد کول نواق ہو گئے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے بعد التی خطبیا ہن ، تے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہ جن میں تعنیف کی تشمیل ہوتی ہے اور آخریں وہ کہ شنین ہوتی ہے اور آخریں وہ کہ من میں اس موتی ہے کہ ایک نعل ظہور میں آتی ہے [یہ بسن کا ایک فیل شہور میں آتی ہے [یہ بسن کا ایک نعل ظہور میں آتی ہے [یہ بسن کا اس موتی ہیں کہ ایک نعل ظہور میں آتی ہے [یہ بسن کا ایک نتی مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہی میں کی اور ایک کا ایک نا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا تھی مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہی میں کی الاشکال نواتی فلم کا تعقیم مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہی میں کی الاشکال نواتی فلم کا تعقیم مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہوگا کہ کی الاشکال نواتی فلم کا تعقیم مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہوگا کی الاشکال نواتی فلم کا تعقیم مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہوگا کہ کی الاشکال نواتی فلم کا تعقیم مول یو کہ کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہوگا کی سے کہ کی الاشکال نواتی فلم کا کی کھوں کی کوٹر کی کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہوئے کوٹر کا کوٹر کی کرشتگوں کے در میں مراے ہوئے ہوں ہوئی کی کوٹر کی کرشتگوں کے در میہ مراے ہوئے ہوں ہوئی کوٹر کی کوٹر کی کرشتگوں کے در میں مراے ہوئے ہوئی کوٹر کی کوٹر کی کرشتگوں کے در میں مراے ہوئی کی کرشتگوں کی کوٹر کی کرشتگوں کی کوٹر کی کرشتگوں کی کرشتگوں کی کرشتگوں کی کرشتگوں کی کرشتگوں کی کوٹر کی کرشتگوں کی کوٹر کی کرشتگوں کر کرشتگوں کر کرشتگوں کر کرشتگوں کی کرشتگوں کی کرشتگوں کی کرشتگوں کر کرشتگوں کر کرشتگوں کر کرشتگوں کی کرشتگوں کر کرشتگ

کہلاتے ہیں طبی حالات میں لتی خلیات بالکل بنیں ہوں گے، اور کٹیر الاشکال فراتی ظیا میں سے ۱۰ فی صدی تعدا د بعد کتی خلیات کی ہوگی ۔عفونتی حالنوں بی جب کراب الغطام پر بار بڑتا ہے، نوع مسمیں تعدا و میں بڑھ جاتی ہیں گوکہ سید خلیات کی مجموعی تعدا و زیادہ بڑھی ہوئی ہیں ہوتی مثلاً ایک عفونی حالت میں کہی خلیات آورنوع رقبیں ۲۵ فیصل کا



شکل ۱۵ - پراتش بونس کا دسمی نالید کی توزی کاشخی داس کے بال ن کے لئے تمن الماصل مول -

اور بند نانسیس ۲۵ فی صدی ک بر در مکتی دین اور کال کون یا فته خلیات ۵۰ فی صدی اکسی کماند است می کماند است کماند کماند است کماند کمان

طریق تشمید - بببوگلو بن کی قلت بس کے ماتھ مرخ طیول کی کی ہو

ا زہو عدم ومویت (anæmia) کہلاتی ہے ہواں وقت جب کہ خون کی گونی

نافص ہو غیر نکو دین الل موی (anæmopoietic) اوراس وقت جب کہ

خون کا الاف بہت زیا وہ ہوا قلا ف الل موی (hæmolytic) کہلاتی ہے ۔
عدم ومویتوں کو خود دخلوی (microcytic) اور کلان خلوی (macrocytic) کی مراف اللون (hyperchromic) کی اسلاما طاق و کی بہا جا ہے ۔ قبیل اللون (hypochromic) کی طرف اشارہ کرتی ہیں کی مختف کی اصطلاحات رکی ہوئی فلم میں فلہ ہے رنگ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کی مختف کی اصطلاحات کی جو در ہوئی فلم میں فلہ ہے رنگ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کی مختف معنوں میں استعمال کرتے ہیں (معنی بہت یا لمبندلون قوت کا وصف معنوں میں استعمال کرتے ہیں اوقات ایک ہی صف ف ان کو ایک سے زیا وہ معنوں میں استعمال کرتے ہیں طور پر بیان کیا جائے توخود فلوی عدم ومویت معنوں میں استعمال کرتا ہے ۔ مجمل طور پر بیان کیا جائے توخود فلوی عدم ومویت فلیل اللون اور کلال خلوی عدم ومویت کثیر اللون موزئی ہے ۔
قلیل اللون اور کلال خلوی عدم ومویت کثیر اللون موزئی ہے ۔

دىرىية حميات ميں واقع بوجاتى ہے۔ غيرى ذبل تى خلوب (agranulocytosia) ذراتى خليات كى قلت ہے۔

(polycythæmia بیموگلو بن اورمرخ جیبات کی زیا دتی کنزت ظیام (erythræmia) احمر ظویت (erythræmia) احمر ظویت کلاتی ہے۔


سپیجبیات کی زیادتی بیض و مویت (leukæmia) سفید نملید و مویت (leucocytoeia) کیلاتی ہے۔
(leucocythæmia) ابیض خلویت (lymphatic کی کمفی بین و مویت (lymphatic) ایوسین اسکال کی زیادتی کمفی بین و مویت (myelocytic leukæmia) ایوسین اوسین دمویت (myelocytic leukæmia) ایوسین بیندی (eosinophilia) کیلاتی ہے۔

غير كوين الدموي (فلتي)عدم وموبيت

(ANHÆMOPOIETIC (DEFICIENCY) ANÆMIA)

نابعن كيرسب سے دياده اولين سرخ ظليہ ہے۔ اس كے مزيدنشوه كما كے لئے ايك وقط طون ورت ہے ، جو كرمعده ميں اور غالبً اثنا عشري بي جي دوعا طون سے طبی طور پر بنیا ہے (۱) ايك انزيم جو كه كاش (Castle) كا دُرونی عال كہ كہ الله سے اور بوابی فد دميں اورشا، اثنا عشری میں بر ونر (Brunner) كے فدو میں سیار بواہ ہے اور در ۲) كائل كا "برونی عالی" شلاً وہ جو كه كائے كے گوشت وضعوماً لين ميں يا يا باتا ہے کہ سے كه اگر چه كوشت يرشتى عن ذا الله ين من يا يا باتا ہے کہ س كا ثوب يہ كه اگر چه كوشت يرشتى عن ذا الله ين

كوي الدموى عرق شعرته



شكل م ه و سنتيج المركى فاكه نمايريم

ومو بت بس بیاس کے نبیں بناکہ التهاب معدہ کی وجہ سے خرکی قلت ہوتی ہے۔ اس دموی جو ہرکے بغیر دموی سیموں کا نشوہ نما کبیز اہمنی درجہ بررک جاتا ہے لب عظام میں کبیر ناہمنی روعل ہوتا ہے اور اس میں طبیات بخس کر بوجہ ہوتے ہیں اور ایک کبیر ظوی عدم دمویت بیدا ہوجاتی ہے ۔ لول سانے کا ایک مش کہ جو ایمن جو اور مقا کراکس (thyroxin) کیا تمام طبعی کموین خون کے آخری درج کے لئے مزوری کے جوکہ شبکی طویت کے برزی درجہ کے بعد آتا ہے اور ان کے بغیر لب عظام میں جب

£80

ا مفی دبیل واقع موآ ہے اور ایک خرد خلوی عدم دمویت ببیلا ہوتی ہے۔ کبیرنامنی اور کمیں اسے کبیرنامنی اور کمیں کے اسے ایک خرد خلوی عدم دمویت ببیلا ہوتی ہے۔ کبیرنامنی اور کمیں کا میان میں ایک اسے ایک درجہ بہیاں کی عدم موجود کی کے باعث ان میں سے ایک درجہ برک گئی ہے ایک اس وقت جب کہ بررک گئی ہے ایک اس وقت جب کہ بروجا آہے ۔ اور کی میں نیم نیار الی اس وقت جب کہ کو کی میروجا آہے ۔

ای برے بزف کے فورا بعد طحال میں سے سرخ خدیات واخل موکر و موی شار برحد جا ہے۔ لیکن حبت ہی گفتہ کے اندرسیال دوران خون میں وائل موجا بھا را برحسیال دوران خون میں وائل موجا بھا اور کسس کے جم کی کمی پوری کر دنیا ہے المہذا اگر نزف سے پہلے کی سیموکلون معلوم ہوتواب اس کی آخری قدر سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی فدر نفصان نون موا ہے۔ جب عدم دمویت فائم ہوجائے تو تھوین خون ہیجائن ہے ۔ فیکن لوپ کے مقدان کی وج سے رک جاتی ہے دطیعی نا ہفتی روعل) ۔ بعض حالات میں مثلاً کی فقدان کی وج سے رک جاتی ہے دطیعی نا ہفتی روعل) ۔ بعض حالات میں مثلاً اس دخوی جم کی گئی پوری کرنے کی اس دفت جب کہ بہت سامیل ضائع موا ہوا جسم اس دموی جم کی کئی پوری کرنے کی قابلیت کھود تیا ہے 'اورمریعن بہت ہی بیار بوجا آہے ۔

(ecuryy)میں ہوتے ہیں۔ (۲) مرض برائٹ اسکروی اور ناتیں در قبیت ۔ (۳) مرخ جهبهات کی تقلیل مون آ مکِن میں اور بین دمویت کی مختلف موں میں واقع موماتی ے نا نوی عدم دمویت کا علاج وری ہے جوکدسا وہ بے ترشہ عدم دمویت کا موانی-عدم ومویت کے علا ات ۔ نمایاں عدم دمویت کی تمام اصا بتو ب میں بعض مخصوص خصابص مشترك موتے ہيں 'اگرج ببعض اتمام کی مدم وہو تیوں بیا نظے ممّز وتفصوص خصایص بھی ظاہر ہوتے ہیں، جو آ گے جل کر بیان کئے گئے ہیں۔ طبد شاحب اورموم نیا ہوتی ہے۔ مازہ نزف کی اصابوں میں رنگ بالکل سیبد ہو تاہے۔ "اہم یہ یا درکھنا چاہئے کہ مکن ہے حقیقی عدم دمویت بانکل موجود مذہواور وعا حرکی فعل کیے دموی نوز بع میں تغیروا تع ہوجائے سے شحوب بیدا ہوجائے ۔لب سکیے محلاتی نگ کے ہوجانے ہیں' اورمکن ہے کہ گالوں میں تم کی ایک خیف گلائی متماہٹ ُ ظاہر ہو۔ مَرِ بَی مَعاطَی اعتب عصیکے کِلا بی رَاک کی ہوجا نی ہیں' جسیاک ِ دہن' زبان ا در مورش کی اندرونی جانب میں و کمها جا آہے۔ نیون کا بدلا ہوارنگ ای تھ کی شبت یری وریدوں کی محبلک میں بھی طاہر ہوتا ہے، جوسیبید ممراے کے اندر سے کلانی نظر ہتی ہیں' نہ کو گلا بی مبلد کے اندر سے سیاہ ارغوا بی ۔ مریض نڈ صال اور کمزور صمانی یا دماغی محنت کے افابل مو آ ہے اسے در وسرا در حکرہ سے کا مکان موا ہے' آنکوں کے مانے دھیے نظر آتے ہیں' کا نوں میں آواز نیں گو تجتی ہیں' اور مختصیان کے دورے ہوئے میں محنت کرسے یا زور لگاسے برمانس مجول ما تی ہے اويعود قى كى تىك بىدا بوماتى بىد مكن ہے كە يا كول كا أ ذيما موعو د مو معبوك عمواً مر ہوجاتی ہے اورغذ الینے کے بدرسٹ البیف کے متعام برگرانی اینیق معلوم ہو آ ہے ا يا سنند مد سوزش سينه موتي سند -

آگرکوئی نمایاں درجہ کی عدم دمویت موتو ہیشہ قلب کو ہیجان میں لاکرخون کی فی منٹ درآ مدکوزیا دہ کردتی ہے ' اسیواسطے شرح نبض زیا دہ ہوجاتی ہے ۔ یہ ایک تعویفی میکا نیت ہے ' لیکن اس کے یہ معنی صرور میں کہ قلب زیا دہ کام کرا تو لین اسلام کا ادلین معا آرام ہے ۔ استماع کرمنے پر دموی خریرات ورحروفورونی لیندا ملاج کا ادلین معا آرام ہے ۔ استماع کرمنے پر دموی خریرات ورحروفورونی (bruit de diable)

222 ، 280) مكن بي كرقلب تمع مو جائ ـ

اخصريت

(chlorosis)

بحث اسمای ۔ انعفریت یا اس کے انگریزی مرادف کرینگینس (green sickness) کا ام اس سنری آل جملک بربنی ہے جوکہ کالوں کے سٹو کے ساتھ مخلوط ہوتی ہے۔ اس ام کا اطلاق عدم دمویت کی اس قسم برکیا جا اس ہو بالغو مقبی کی شرک بیت دی ہے ۔ اس ام کا اطلاق عدم دمویت کی اس قسم برکیا جا اس ہے جو الغو مقبی مقبی کی شکل بیت دی کھنے والی لڑکیوں اور نوعم عور تول میں چودہ اور چو بیس سال کے بین کے درمیان ہوتی ہے گومت نتی طور پر اس بی ایک حالت لڑکوں یہ بی دی کی اس خور کی اس کے درمیان ہوتی ہے گاز سے اخفر بیت کے حدوث میں بندری کمی یا گی گئی کی اور خاتی اس کے حدوث میں بندری کمی یا گی گئی کی تو کی اور خاتی اس کے حدوث اس مور اور کا کام نسبتہ بہتر طالات کے تحت استحام دیا جا آل کی دور کی اور ورزمشوں زیا دہ مقدار میں کیجا تی ہے (6) ۔ خاتی طائد کا حدوث کرتے تا تھا ۔ خاتی طائد کا حدوث کرتے تا تھا ۔ خاتی طائد کا حدوث کرتے تا تھا ۔

علامات - انصریت آیک خرد طوی عدم و مویت ہے۔ و موی شاریب مونی قوت تما طام رکر آہے کی فرد رخ طیات کی نسبت ہم وگلوبن ہیں زیا دو تخفیف یا تی جاتی ہم وگلوبن ہیں زیا دو تخفیف یا تی جاتی ہم وگلوبن ہیں نا ہضات سنبی ظیات شقوقی خلیات شدیداصا بوس ہے جاتے ہیں۔ سبید خلیات طبعی ہوتے ہیں۔ عدم الطرث موجو و ہو آہے ۔ معدی س ماری س ازاد الله موجو و ہو آہے ۔ کمی کمی صب بصری کا الہماب (optic neuritis) موجو و ہو آہے ۔ کمی کمی صب بصری کا الہماب (optic neuritis) اور مکن ہے بعد ذبول اور سنتنی اصا بتوں ہے نی شکل پیدا ہو جا آ ہے اور مکن ہے کہ اس کے بعد ذبول اور سنتنی اصا بتوں ہے نی شکل الہماب اور خلف البصله (retinal embolism) و اقع موجود کے ۔

ا نذار اور علاج - ملاخطه دساده مجترشه عدم دمويت -

ساده بے نزشهٔ عدم دمویت

(simple achlorhydric enæmia)

ید من دورنوں کو اس سے بہت زیادہ مام طور پر اوف کر آ ہے کہ مبننا مردول کو اور عور تون کو یہ نقر بیا کی برین جننے کی عربیں مائرف کرما ہے، اور سب سے زیادہ اصابتیں اور عدر تون کو یہ نقر بیا کی عربیں واقع ہوتی ہیں ۔ یہ بچرں میں اور معمر انتخاص میں (38) نمی واقع ہو آ ہے یہ ناہم یہ یا در کھنا ضوری ہے کہ صحت مندم دوں اور عور توں ہیں سے ۲۶ فی صدی ایسے ہوتے ہیں کہ بن کو ۹۰ سال سے او برسا دہ ہے ترشہ عدم دمویت ہوتی

علامات - ایک خرونلوی عدم دمویت بایی جاتی ہے اور نون ایک بیت

اونی قوت نما ظاہر کر اے متلف عدم دمویت کی طرح اس بی بھی لیے نرستگی ای باتی ہے البین خون بی بالمی دو بین کی زیا دنی نہیں ہوتی ، خیا کی و آن دن براب کا کا شفہ منفی ہو آئے ۔ اور صبل نخاعی بین کوئی تغیرات نہیں ہوتے ۔ طحال برحی ہوئی ہوتی ہے ۔ بسا او قات البتاب لاسان (glossitus) ہوتا ہے اور بالنتاب زبان پر حی تناف ہوتا ہے ۔ باخن مقر (جمید ننا) اور شیت برحل جاتی ہوتا ہے ۔ بعض او قات عراب لمع موتا ہے ۔ ناخن مقر (جمید ننا) اور شیت ہوتا ہے ۔ عدم و مو بیت نا کا نیا خذا کی خط بی سے لوہ کے ۔ عدم و مو بیت نا کی باغذا کی خط بی سے لوہ کے کے معدی س بی از مرکوں کے کے معدی س بی از مرکوں کے ایک معدی س بی از مرکوں کے ایک معدی س بی از مرکوں کے ایک عدم موتورگی اس کا جزوی سبب ہو۔

میں میں میں میں مربیخصر ہے کہ بے برسٹگی کے ساتھ پیت لونی قوت ماکی عدم دمویت مشارہ کی جائے ہوئے تو ت ماکی عدم دمویت مشارہ کی جائے جو بلاکسی وانتے سبب کے ہو مثلاً بغیر نزف کے ۔ اندار ۔موٹرعلاج کرنے کی مالت میں یہ اچھا ہو تا ہے۔

عسلاج . لوا بڑی مقادوں میں دینا جائے ۔ قشری تجمیز ایران نیڈ امیونیم سٹریٹ (iron and ammonium citrate) محوکہ فیرک سٹریٹ ایمونیم سٹریٹ (ferric citrate) میشنگ سیٹ مفبول عام ہے ۔لیکن روز انداس کا ایک و ام دینا چاہئے۔ لوا صف فرس (ferrous) حالت میں جذب ہو گا اور تا تیرکر آسپ (7) ، لہذا فیرس لو استمال کر تا بہترہے۔ بل فیری (pil. ferri.) (بلاڈ کی کو لی استمال کر تا بہترہے۔ بل فیری (pil. ferri.) (بلاڈ کی کو لی استمال میں دوست کا ایک آمیزوے کر ہے ۔ ہس کو سفوت کی شکل میں دے کا ایک آمیزوے دو آ ہ آگرین) بہت میمول نبویز کر ہے میں یہ دقت ہے کہ یہ متاک میں دوست ہے کہ یہ متاک ہو بہتر اس کا سراب اس کو را فی صدی کلوکوس محلول میں حل کر کے کیا جا تا کہ جا تا ہے۔ ایسٹر سلنیوٹ کو المیوٹ ہمنم کا گرین فیسس سلنیٹ کے لئے استمال کیا جا تا کہ ایسٹر سلنیوٹ کو المیوٹ ہمنم کا گرین فیسس سلنیٹ کے لئے استمال کیا جا تک ایسٹر سلنیورک ڈوالمیوٹ ہمنم کا گرین فیسس سلنیٹ کے لئے استمال کیا جا تک ایسٹر سلنیورک ڈوالمیوٹ ہمنم کا گرین فیسس

بهنت سى اصا تبول مي متى الامكان جلد از حلديه در إفن كرمن كى صرورت ہوگی کہ آیا علاج موثر است بیور ہے یا نہیں میس کے لئے جیا کہ متلف عدم دمویت كے عنوان كے تحت بيان كيا كيا ہے ايك شبكي ظوى حرج كي الأش كرني جائے - اكثر عدیدی تجیزات مین تا نباموج و ہو تاہے کیکن اگر مزورت ہو توال کو کا پرسلفیٹ کے ب فی صدی تعلول کے روزانہ ۳ - ۵ سی سی کی صورت میں بچو بز کبا جا سکتا ہے - ال مرکا نوال رکمنا جائے کہ اقص در قببت موجود نہ مؤ اور بہ کندامی میاتین ج کی کا فی مقدای_ہ موج دہے بوکہ نار نگی اور لیمیوں کے طور پر دینی بہترین ہے۔ اسکروی میں عدم وہم نز من ہو ہے سے پہلے وکھی گئی ہے۔ یہ امرشکیم شند و ہے کہ انتراب کے دریعہ دلی فو لوہے کی تمامی بن بنگار ہیں' اور سسنکمیا دینی غایر طروری ہے ۔ لیکن حکر یا خلاصہ سبکہ اوقا على مفيد بو أب وكراس الساوي وبراتسورنس كرام به - أكراك لتین کی صرورست ہوتو کی آ کیوزیل فیری (pil. aloes et ferri) رہما مرکرین) جس كرما تد فيرس لنيك نامل بي وينامنيد بع ـ قدر في طور يريائ جان والعامد بري سياه (chaly beate waters) مين فرسس كارونيك (carbonate موجود بوناسي مجي زائد كاربُن وائي آكساً لد (CO) محسلول صورت میں رکھتی ہے۔ اور بشر طبکہ ان کو سراہ و من حیث مدیر تا زہ پیا جائے یہ مغید ہوتے ہیں۔ تندید اِما بتول میں علاج کے دورا ن میں بستر بریارام کرنا منروری ہے اور مل الدم مفيد بوسكتے بيں۔

متلف عدم دموببت

(pernicions aucemia)

(ایل لیس کی عل مردموست = Addison's anæmia) (التهاب اللسانی على مردموست = glossitic anæmia)

ابنداء اسمض کی اصابتوں کو آیڈ تین (Addison) نے خود س و علم دمویت (idiopathic anæmia) کے ام سے بیان کیا کیونکہ ان میں مجرز خصا نفس نمایاں سے اوروہ اِن کا کوئی سبب نامطوم کرسکا۔ از ال معدا کرم مجرز خصا نفس نمایاں سے اوروہ اِن کا کوئی سبب نامطوم کرسکا۔ از ال معدا کرم فی بات (Biermer) اورووسرے صنفین براغطم اورپ سے مائل اصابی تنوقی بات مناف علم دمویت (progressive pernicious anæmia) کے ام سے مناف علی مدویت (progressive pernicious anæmia)

بیان بیں ۔ بحث اسساب ۔ یہ من دوسنول کوماو آیا اوف کرآہے اور ہو ہفیعہ اصابتیں جالیس سال سے اوپر کی عمر میں ہوتی ہیں ۔ اور معدی تغیرات کے لئے جوکہ اس من کا سب ہوتے ہیں آیک موروثی رجان کیا جاتا ہے ۔

مرضی تشریکی ۔ اعتفاء کے عام شحوب کے علاوہ بعدا کمات حالتی اسے ایک نیا بہت ستیر مالت قلب کاشمی انتخطاط ہے جونود کو عفالہ قلب کی تعباد سے ایک نیا بہت ستیر مالت قلب کاشمی انتخطاط ہے جونود کو عفالہ قلب کی تعباد سیاہ اور مید دھاریاں در واب سیاہ اور مید دھاریاں در واب قلبہ میں سے نظر آتی ہیں (دھاری دار فی جبی دھاریا = (tabby-cat striation) میں سے نظر آتی ہیں (دھاری دار فی جب کا سب بنون کے ہمدا یہ ناقص آگیجی رسد کے باعث ہونی ہی جب کا سب بنون کے ہمدا کی کمی ہے۔ بدیا ہی موجود ہونا ہے فالات میں واقع ہوتی ہیں ۔ مگر اور گردوں کا شمی استخطاط بھی موجود ہونا ہے 'اور شرائین کے اندر وئی طبقہ کا بی ۔ نزفات ندم من سامی دعے گئے ہیں ، بلکوہ ندم من سامی دعے گئے ہیں ، بلکوہ معملی اخت ہی دروں قلب معدے کی غشائے مناطی بی میدوروں سلح داغ اور دوسہ معملی اخت ہی معدہ میں اور دوسہ معملی اخت ہی معدہ میں اسیاح معمول ہی بھی معدہ میں اسیاح معمول ہی بھی معدہ میں اسیاح معمول ہی بھی معدہ میں اوقاست محال تغیرات باتے جرکہ التہا ب معدہ (طاحظہ یو) کے منظ کی معدہ میں اوقاست محال تغیرات باتے جرکہ التہا ب معدہ (طاحظہ یو) کے منظ کی معتبی اوقاست محال تغیرات باتے جرکہ التہا ب معدہ (طاحظہ یو) کے منظ کی معدہ میں اوقاست محال تغیرات باتے جرکہ التہا ب معدہ (طاحظہ یو) کے منظ کی معدم اور استحداد کی استحداد کی استحداد کی منظ کی میں اور استحداد کی استحداد کی استحداد کی استحداد کی منظ کی میں اور استحداد کی منظ کی میں اور استحداد کی منظ کی میں اور استحداد کی منظ کی منظ کی منظ کی میں اور استحداد کی منظ کی منظ کی میں اور استحداد کی منظ کی میں اور کی منظ کی منظ کی میں اور کی میں اور کی میں استحداد کی منظ کی میں استحداد کی منظ کی میں استحداد کی منظ کی میں استحداد کی میں استحداد کی منظ کی میں استحداد کی میں استحداد کی منظ کی میں استحداد کی میں کی

برمی ہوئی اورسیا اسخ یا ارخوانی رنگ کی ہوتی ہے۔ لت مظام مقداری صد تے زائد اور سرخی ال ارخوانی رنگ کی ہوتی ہے۔ لت مظام مقداری صد ت زائد اور سرخی ال ارخوانی رنگ کا یا گیاہے اور اس میں نوات دارسرخ جسیات کو بانسوس کبیر نام جات کری تعدا دیں ہوتے ہیں کر بدبرا س مگر کے فلیول ہیں طال میں اور گردوں میں لوہ کا وافر جا تو ہونا ہے کہ جو پولا اسٹیم فیروسا کنا کیڈا ورمزی الکارو فلی اینڈ سے عفنو کے نیلے ہو جائے ہے خلا ہر بوسکتنا ہے۔ نخاعی علامات والی اصاب والی استوانوں کا انحط اطرام موت کے بعد جانبی استوانوں اور بجھلے استوانوں کا انحط اطرام الکیا ہے۔

را صنبات أكس مرض كي امراصليات كي كسي بحث مين حدفه مل خصاص مرمن کا بیان کرنا صروری ہے : ۔۔ ۱۱) بول کے اندر بورو بالمین کی زیادتی مگرکے اندر کو ہے کے جاگو' اور نون کے اندرصبغہ صفراء کی موجو دگی تجس سے وا آن ڈن کڑ کا بالواسطه امتحان حال مواہد ما بوروں میں موم بشط مینون (saponin) بائری ڈین (pyridine) وغیرہ کے اِنتراب سے بھی ایسے ہی مظاہر حال ہو کے ہیں۔ (۲) سرخ لب غطام کی بیش پر ورکش اورسا تھ ہی دورا نی خون کے اندر بهرخ خلیول کی جبا مت اور سکل کی بنقائید کی اور کبیر خلیات کی اور معض او قات كبرن مفات كى موجودگى - يەمن الك كلان خلوى على د مومن ب سرخ خلبول كاحياتى كيميائى بنيه بهى متبدل بوماته المع جبيات مي المتدومين روال (H ion) كاار يجاز زياده مو اب جس كى دجه غالباً يه موتى ب كه فاسفورك ا بیڈا ببٹرس (phosphoric acid esters) میں زیاوتی ہو مانی ہے مینا تخییہ نعلیات اور بلاز ما کے درمیان قوم کا فرق (potential difference) بجائے آٹھ با نو ہونے کے مراطی و کلٹس (millevolts) ہوتاہے (12) ۔ (۳) معدی سسمی آزاد فأيشر وكلورك أبيد (free HCl) كى غيرموجود كى جوخاص كرالتها بمعده كى وجہ سے ہوتی ہے کیو نکہ معدنی کلوراً ٹڈاور پٹیسٹن بھی کم ہوئے ہیں مُ گو بالکل فیر موجود م*ر گز*نبنی بوتے (13) - غالباً مخوز اما" فأعلی" بالدر و کلورک الب (active" HCl) سميته بوآب (المنظم بوسكل اله عنود 331) - غذا ي ظم میں دوسری جگر النتیاب کی موجو دگی تمبی ممیز التیاب اللمان سے طاہر ہوتی ہے ۔

امد بعض اصابتوں میں اہمال معوی البتاب کے بعث ہوسکتا ہے۔ (مم) جب خلامہ گر راہ دہیں دراجائے تو اس کا شفائجش اثر۔


ز آن مال ک بیصور کیاجا آخا که بدمض ایک اولی خون ایشدگی کی وجت ہے لیکن یامرٹ کوک ہے کہ آیا خون اِ شید گی حقیقة منا یا ب ہوتی ہے ۔ اگرساری کی ساری باکلی رو بین ٹوٹے ہوئے جسیموں سے ماخو ذہبے تو اس کے بیمنی ہوں گئے کہ خون کے جسم وں کی از پیدائش ایک نامکن سے معت کے ساتھ واقع ہوتی ہے۔ ئیز اُلی رومین کا افراج نهایت ہی اختلاف پذیر ہوگا ہے طالا کم نعبو برخون ستم ر متی ہے۔ بہ نفیو برخون نے ترشہ عدم دمو میت سے جوکہ ایک اولی خون ایٹ بیدہ ر جي جه- به سو برور ب ره ده . ري-مرض هي بالكل مملف به . مرخ خليات ملف عدم دمو :ت مي اتني بي مدت زاه ر بنتے ہمیں کہ بتنے صحت کی حالت میں تقبیقت میں مرض اولی طور پر دموی مکیاست کی ا تفی کون کا نیتجہ سے جوکسنمہ 429 بر بیان کی گئی ہے۔ وموی جوہر کے بنیب لب عظام کا مل سرخ نلیات کورز تو مید اکر سکنت سیداور نه دوران خون میں ان کوخاج كرسكتا ہے ألهذا وولب فطام بن منس كر بھرے رہينے ہيں اور ہس كو سرخ ربک۔ 433 بخضية بين - أكر مكر و يا حائ أتو ناسخية خليات معنى مشيكي ظليات كا أي لتكروول خون مِن فَارج ، بوجاً إِبْ (لما خط يوضحفه ٤ م) مب) اوِر مرتاً . ا ون مي نقطه واتم کو ہنچیا کہے اور بہشنبکی خلوی استنجا بت عدم دمو بیت کے درجہ سے معکوس نہدنیا ر کھنی ہے ۔عدم دمو بہت بتدریج اچھی موجاتی کے دور تعمومر خون طبعی موجاتی ، مکن ہے لب عظام صدیے زیا وہ قعال ہوجا کے جیائج دموی شارتفتریہ ہوا گئ پرنیج ماآہ ۔ خلیات کی حیاتی کیمیائی نوعیت طبعی کے قربب موجاتی ہے۔ م ا پوسین کیسندی موجود ہو۔ سختیا بی ہیں جو تغیرات موتے ہیں ان کوشفل س^و و **کھایا گیاہے۔ مرض** کی انتہامیں صبغۂ صفراء اور مدیدی جماووں کی زیا دیتی کی تو ہے۔ واقعدے ہوتی ہے کدان کومیموگلوین کی تکوین میں کا میں نہیں لا ا جاسکتا ایک مجمع ہوجاتے ہیں لگاہے صریح برقان اور اس کے سابھۃ مثبت واتن ڈن بر^ی۔ موج وہوماہے۔

متلف عدم ومویت کے ماتھ صل النخاعی کے تحن الحا وممزوج انحطاط^ی










الد - اتمرد موید میر جبرد کی رس تصویر - بهایت نما بال اسا بول می زراق اور بهی زیاده بوتا ہے - ،

د ملف مدم دموت میر الک رگی مونی فلم کمبدی حاج کے ابتدائی مرحل میں جب بین بیکی فلوت و کھائی گئی ہے
ح ر ساحی سم می لفط دارا ساس لیندی - (تیجبیزات و اکٹر بیف الے ناٹ فی بنائی بیں)
(المدبل فرد 133)

ہم قریبی ملق رکھنے والے عوال کانتیجہ ہو آہے جو کہ حبل النظامی اورخون دو لؤں کو اوُف کرنے ہیں یکین الن میں سے ہر ایک تا نیر الگ بمی پیدا ہو کہتی ہے کیا ایک تا نیر دو کسری کے بعد بیدا ہو مکنی سبے (19) -علا مات ۔ متلف عدم ومو بت کا مریض بتدریج کمز ور ہوکر شاحب رنگ کا



شکل م ۵ منلف عدم ومویت کی ایک تنبی اما بت جربیلے خلامهٔ مگرکے پانچ درول منلی شرا بات اور بچرکس کوبرا و دامن دیے پراختم شبی خلویت اور خون کی باز بیدائش ظاہر کرتی ہے۔ لوئی قدت کامیں تغیر بینی مشیخ خلیات کی تعداد کی زیادتی کے مقابل میں جمیو گلوین کی زیادتی مخور کی مونا کو فرو من سے سے خوب وامنے ہے۔

ہو جاتا ہے۔ اس کی جلد کی رنگت زر دعبلک کی ہو جاتی ہے جمعمولی عدم دمویت کی

، سے مخلف ہوتی ہند ۔ بعض اوقات مجوری لونبٹ کی میوٹی یا ٹری مکتماً ہوتی ہیں۔ س کے ساتھ ہی یہ عمی ہے کہ انتہائی عدم ومویت کی حالت ہیں تعمی مریض ولا نېمىي بوتا اورنكن ہے كەس كى تحت الىلائر بى كىتىرالمنغدار بو - نەھال ين وماغى اوتيانى ت سے تنغر و دران سر کا نول می آ وال می وغیرہ اسی طرح ہوتی ہی مبلیک کہ دور ا قیام کی علیم دمویت کے بیان میں درج کی گئی ہیں اور علاوہ ازیں محنت کرنے ۔ مرکز ختلاج قلب اور در دولب ہو تاہے ۔ مریض زبان کے زخمی ہونے کی شکا بیت اُ آ اُ ہُڑ اودمكن سي كه ذبا ن من آسليم اورسرخ حكيت ب موس وكهندا صابتون ب مكن سيدك 434 زبان من مليما نت خيطبيه كا ذبول كلكه انشقا قات نعي بوب . مدم اشتبااه رسو الهللمي على مُنيه (جو الدخطه بو) كثير الوقوع ، من - معدى رس من آزاد بأ بذر و كلوركسد اليب بالكل غرموجود ہونا ہے۔ كا ہے كا ہے كا ہے وہ علاج كے بعد دوبارہ بيدا ہونا أست. پیشاب گارنگ پوروباللین کی زیادتی کی وج سے بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن آس سالٹون نہیں ہوتا ۔ کمال کی کلاتی ہوتی ہے ۔مکن ہے کہسٹ بکہ میں گیٹر انتعاا مرحمیو سے جمبو ہے ا نزفات نظر الممي جوقوس بصري ك كروب كتريت بوت مي - يد مخطط يا شعاد ماموند ہیں اور مکن ہے کہ ان کے ماتھ سب و عصیے بھی موجو و ہوں۔ دو سرا منہ خاصہ تب۔ جس سے ۱۰۱ ما ۱۰۱ درجہ کی میش مہل ہوسکتی ہے، لیکن عمواً یہ نب بے قاعدہ ہو آ ۔ مكن بي كة تب كئي د نواري كم موجر دري نبوا اور موت سه يبلي اكثر تيش تحت الط-مي ہوتی ہے۔ بعض اوقات مگر طرمها موا اور الیم ہوتا ہے۔ فون نہایت شامب مران ا اورمرخ جيبات كم وكرفي معب ملى ميثر ١٥ ملكه ٥ يا اس ترسيل بوجاتے ہیں۔لیکن ہلموگلو بن کی کمی نعبتہ کم موتی ہے۔ منائخ کوئی وت نام و . آ زا کہ جو آہیئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی جسیمات معمول کے نعبت بڑے ہو ، ہیں۔ تاہم اتنی کم قدریں کرمنس او قات ہر . تک بھی یا فی گئی ہیں۔ بوقلموں علیہ ووسرى مالت كالنبت اس مين زيا وه كثيرالتقداد موتي مين عمواً جنداوار ... خطيع بألخصوص كبيزا بمغابت موجود بوته بي كيكن كثيرالا شكال بواتي سبيده. عام طور يرممول كي تسبت كم تعدا ديس جو تي بي - يرا ش جرس كا وموى تودي میر او ای میکن ہے کہ قابلیت تر ویب میں تمی ہو کیکن جب اے محد میر اس

کوئی زیادتی نہیں ہوتی ایکم زیادتی ہوتی ہے۔

متلف عدم و مویت کے مرفیونی کیڑا گوں کا سن بن اور کمزوری مدم اتساق ا منفیر کی مسئلکے ، ورعا و ممزوج انحطا لم نخاع کے دوسرے علامات پیدا ہو مباتے ہیں لمکہ مکن ہے کہ عدم ومویت سے بہت پہلے نخاعی علامات ظامر بودائیں بعض اوقات ذرمنی انتقال لا میں دیکھر گئے۔

من است استا و کے ما تھ عمنوی مرض مثلاً مرطان معده کی جستو کی جائے ہو بعض او است ہیں یہ اہم ہے کہ است استا و کے ما تھ عمنوی مرض مثلاً مرطان معده کی جستو کی جائے ہو بعض او است کے مرکز ول کی جستو ہی کی جائے کو است کے مرکز ول کی جستو ہی کی جائے کا اور بعض ما لات میں براز کے معقول امتحان کے ذریعہ سانی کرمول (جو بی راسیہ اللہ عدم ومویت کو ممیز خصائص یہ ہیں است کے اندومبند مغراکی مروفکا مسلمہ مند کو میز خصائص یہ ہیں است مسل کے اندومبند مغراکی مروفکا جس کے مند کون قرت نما کے اور فلوی تو زیع کا تمثیلی مندی کو اور بیا کا تمثیلی مندی کو اور بیا کا تمثیلی مندی کو اور بیا کا میر بیا ہوجاتا ہے کو موسی مدر ہو ہیں ۔ کہ خطویت بلد کونی قرت نما کے اور فلوی تو زیع کا تمثیلی مندی کو اور بیا کی مور بیا کی جائے ہیں کی میر بیا کہ اور ایک میں مور بیا کی جائے ہیں کہ مور بیا کی جائے ہیں وموی فلم اس طرح بنائی جائی ہی وموی فلم اس طرح بنائی جائی ہے کہ جسیات باریم متراکب نہ جول ۔ اس کو روشنی کے سا مندر کھنے پراکی مستدیر کا لا کہ بی خلویت کی دلیل ہے ۔ اس کو روشنی کے سا مندر کھنے پراکی مستدیر کا لا کہ بی خلویت کی دلیل ہے ۔ اس کو روشنی کے سا مندر کھنے پراکی مستدیر کا لا کہ بی خلویت کی دلیل ہے ۔ اس کا میر کے ذریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب است کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب است کی دلیل ہے ۔ اس کا دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب است کی دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کو دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کا منا بیا کہ کو دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کو دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلافز انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلون انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلون انجمیب کے دریعہ علائے کرنے پرامیلون انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلون انجمیب کے دریعہ علاج کرنے پرامیلون انجمال کے دریعہ علاج کرنے پرامیلون انجمال کے دریعہ علاج کرنے پرامیلون انجمال کے دریعہ علی کے

انداد - به اصابتین دموی جو برکے در بعد علاج کرنے پرامیلافزاممیبیت نلابرکرتی بین اور تحت الیاد ممزوج الخطاط کی ابتدائی علامتیں غائب بوجاتی بین ا اگرجراس کے لئے مگر کی نسبتہ بڑی مقادیں مزوری موتی بین اور جب مصیئے حقیقہ تلف بوگئ بول تو یہ علاج کوئی فاکہ ہ زئیس کرتا۔ یہ علاج غیرمتین مت یک جاری رکھنا جاسے ۔

علاج _ اُناك (Minot) اورمَ فِي (Murphy) كَي طَرِّكُ علاج كَيْ كِالْح

مقابله أس انقلاب على كرائة كيا جاسكنا سه جوانسولين كم انكثاف في الله كے علاج میں پیداكرد یا لہے۔ إس علاج كا فعلياتی نقطه زيكا ہ بيلے بيان كيا جا جيكا ہج یا کہ بھر دیکا کیا یا ہوا گرروزا رز براہ وہن ریا جا تاہیے۔ ہس کا مزہ جیسیائے کے لئے منس كيدسا تحد أنكوى يبيدك (anchovy paste) يالحمي للاصدم است extracts) ، مثلاً باورل (Bovril) يا نار تكي كارسن ملاكرو يسكت بير - با اسكو کا ط کر لو تدے بنائے ما سکتے ہیں ، اور ان کو رائس بیبیر (rice-paper) بیں لیبٹ کر سالم نگلا ما مکناہے۔ کیے معدہ خزیر کے چیا وتنن ہی کے معاول ہیں۔ ُفلا سرُحِكُر سفوف یا ما نُع کی شکل میں بھی لیا جائے تا ہے کیکن تحت العا و ممزوج انحطام کوشفا دینے کے لئے یہ اتنا مفدنہیں ہے ۔خلاصۂ مگر ماہی نہا بت ہی توی ہے۔ مجقف معدهٔ خنه پرنجی ایا جاسکتا ہے ۔ تکین پیشجہبرات مبعض اوقات غیرفعهال شا بت ہو تی ہیں۔متلف عدم ومو بہت کی تبعض اصاً بتیں علاج سے اثر بذیر تنس مونس كيونكه معاريع ومواى حوبر حذب نبس موما - اتسى عالمت مي اشرابات كرف صرورتى رمين اور دروب عضلي (يا زيرطبدي) اور درون وربدى المرابات 485 کے لئے فلاصہ مانت مگر ال سکتے ہیں ۔ اگر بھیر بھی مجیبیت نہ ہو، تو تیجہ نز فالباغیر فعال ہے۔ یہ تجمیرات ایسی مقدار وں میں نجو یز کی جاتی میں کدوہ اس حکر کے اصلی وز^ن کے معادل ہوں کہ حس سے وہ لی گئی ہیں۔ اب ایسے خلاصہ مات مگریل سکتے ہیں کہ مریض کوصحت کی مالت میں رکھنے گئے لئے ہر جار یائا ٹھ مفتول کے بعد ایک مرتبهاً ن كا اشراب كريمة كي صرورت سب - انبدائي ورجون مي ايك يوند حبير كا خلاصه دینے کی مزورت بہشی ہ تی ہے، تا ہم ما بعد درجوں م*ن کسن مقدار کو* کمٹاکر کے پونڈیامس سے مبی کر کیا ما سکتاہے۔ وقتا فرقتاً وموی شار ا وان ان رنگ کا امتان کرنا سنا سب کہتے۔ اس علاج سے چندہی روز کے اند یعنوں کی حالت بہتر ہوماتی ہے اور مکن ہے کہ بالاِ خران کارنگ غیر ممولی کور برِکلفام ہوکراُ ن کے پہلے چھیکے زرورنگ سے بالکل عِلس ہوجائے۔عمونت کیے مريشه الكاتدارك بمي صروري سيئ خواه بيعنونت دانتول لوزتمن ياانفي مجأ کے باُفٹ ہو ۔مکن ہے نہا بین خطرناک مابتوں میں ابتداءِ علاج میں نقل الدم

عمل میں لانافردن مسلمت ہو خاص کراگر تیش لمبند ہو" بروی حال " گیہوں کے بیج اور لبن بوزہ گراں کے الکھلی خلاصہ اور مار ایٹ (marmite) (5) میں موجود ہوتا ہے اور اگر معدہ میں " دروی عالی" کی کافی مقد ارموجود ہو تو اُن استسبا کے دیسے سے بہت فائدہ ہوگا ' باحکن ہے کہ ابتد ائی علاج کے بعد" دروی عالی کی آئی مقد الر بہت فائدہ ہوگا کر ان کا ساکھ وابا ہے (6) اسکے (6) و

دوسری کبیرخلوی عدم و موینیں۔ یہ تنلف عدم و مویت سے مشابر موتی ہیں اور معبن کو بعینہ متلف عدم دمو بت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یا کلی روبین مویت اکثر آئی نمایاں نہیں ہوتی 'اور معض اوقات باللی روبین و مویت اور ایک خروظوی

باعدد مویت موجود ہوتی ہے۔ ان کے کہ اب یہ بین: ۔ قرصہ سرطان کی وجہ سے معدہ کا جزوی ہیمائی ناقص معوی انجذاب معدی قولونی نامور معاد صغیر کا جزوی ہتیمال معالی ضیق اور تدرنی تقرح 'شمی انہمال بشعول شکی من کے اسپرو (sprue) اور دو برگی جو بید عربی نیم یعند (diphyllobothrium latum) (18)۔ ان سے بہت سی اصابتول میں ہے ترمشکی موجود ہوتی ہے 'جواس وقت جب کہ مریض کی عالت میں اصالی ہوجاتی ہے 'رفع ہوجاتی ہے۔

غیر کو بنی عدم و مویت (aplastic anæmia)۔ یہ مرض سالورسان اور بنزال کے دورے مرکبات کے تشر (20) سے اور لا شعاعوں میں صد سے زائد مکشف سے پیدا ہو سکتا ہے۔ لیک عظام کی سرایت نا نوی ہو سکتی ہے (21)۔ سرخ جیمات اور ہیمو گلؤ بن میمول کے نقریباً ، م فی صدی ک گفٹ جانے ہیں اور کو نی قوت نما تقریباً ایکا ئی ہوتا ہے ۔ نوات وار سرخ جیمات اکٹر نہیں مونے ۔ کثیرا لا شکال نواتی خابول کی تقلیل کے باعث قلت جیمات سید ہوجاتی ہے۔ کثیر الا شکال نواتی خابول کی تقلیل کے باعث قلت جیمات سید ہوجاتی ہے۔ کثیر الا شکال نواتی خابول کی تقلیل کے باعث قلت جیمات سید ہوجاتی ہے۔ اور خوک کی بازید سی سرا کی جا میں کے تمام آمادات سے معرا اور جو کی ہوتا ہے۔ بین کی اور شرک کی بازید سی سرا کی جا میں کہ تمام آمادات سے معرا موتا ہے۔ بین کی جو مرض کا اولی سبب شار کی جا تی ہے۔ بین اصابوں (نو فی فی استقدیل کا حو دیت

= aleukia hæmorrhagica) میں دموی کو حیول کی بہت کمی پاکال غیروجو ملگی جی جو تی ہے اوراسی کے ساتھ ایک شدید نز فی رجمان ہو تاہے اور عرصہ اورا میں آخر ہوتی ہے نئر بیٹر نو تاہے اور عرصہ اورا میں آخر ہوتی ہے نئر کی بیٹوراسے مائل ہوتی ہے والت شدید قسم کے بربر پوراسے مائل ہوتی ہے واللہ مائل ہوتی ہوتی ہے کا سیابی بنیس ہوتی کیو کہ فارد کو دین الدم کے سب سے ابتدائی درجے میں واقع ہوتا ہے (شکل ماہ) کور رہے میں واقع ہوتا ہے (شکل ماہ) کور رہے میں واقع ہوتا ہے (شکل ماہ) کور رہے میں واقع ہوتا ہے (شکل ماہ) کی زندہ ہے (34)۔

غارد مل تى خلويت (قلت جيمات تعديل يسند) - ياك متمانسس مالت بن جس کی زبا وه نرخصوصیت سغید گول (ذرانی) نلیاست کی تقلیں ہے جس کے ساننہ علن کی مشدید سرایت زوگی ہوتی ہے [حِرَّکہ غلیر **ذ**رّا تی خلوی دید (agranulocytic angina) ہے مثلاً وانسنٹ (vincent) کا ذبحہ یا وگربرابیت ۔ بہ رائے دی گئی ہے کہ دموی طالت اولی ہے۔ سرایت زوگی اس لئے ہوتی ہے کہ فلت جسیات تعدیل بیند کا نیتئ توت مافت میں تنفیف ہونا ہے۔ اس کے سانھ عدم کو پنی عدم دمویت مکن ہے مویا نہو۔ لمفی خلیات مکن ہے ملبی رہیں یا مکن ہے کچھ شخصف ظاہر کرویں ۔ نیکن مکن ہے بهلے بیل کی نواتی خلویت موجود مو (10) · ممات کئی سال مک موتیے رہنے ہیں ' پیلے بیل کیک نواتی خلویت موجود مو اور بیا او فات ان کے سانخد سرایت زوگی می موتی ہے۔ یہ را کے ونگی ہے کہ مس مِنْ كَى زَيْادِ تَى ' ايميدُ وَيَا تُرِينًا (pyramidon) (amidopyrina) _______ باربٹ بوریٹ (barbiturate) کے ساتھ اس واکے امتراج (11) کے عام رواج کے سائتہ ہمزان یا ئی گئی ہے ۔ سب عظام میں ناقص تکون ظاہر ہوتا ہے تہ اسے ساتھ ذراتی خلوی خلیات کی عدم موجودگی یا ئی جاتی ہے۔ غیرفرراتی ظوی ذبحدیں رشرے اموات و ، فی صدی سے او بر ہوتی ہے، لیکن جب س کا علاج بہنیوسس نیو کلموالید (pentose nucleo-tide, K96) 47 کے ذریعہ کرکے کشرالا شکال تكوين كوبيجان مي لا يا جا آئے تو يہ شرح كھٹ كر ١٥ في صدى (8) ہوگئي ہے' اگر ج بعض اصابتی با نکل کوئی مجبیت ظاہر نہیں کریں (9)۔

بیجبن کی غیر آلوین الموی علم دموید -یه فی انجد الغ عدم دمویو کے سائندمث به بوتی بس -

كبيد خلوى على هرد موتيان سشاؤين الكن وه دو بركي جوبيع رمينه

کی را بیت میں اور مشکمی مرض میں برونی عال کی عدم وجودگی کے باعث یا نگ گئی میں جیا تھے۔ مارہ مُٹ دیشے سے شفایا بی موگئی ہے کیو کمہ مرونی عال ہی موجود ہے۔

خرد خلوی علی در مورت کی میں سے سبت پہلے ہی عدم در وقت کے بیدا کی طون توجہ مبذول کی جاتی ہے جوکہ اسکوی اور قائت (cretinism) سے بیدا ہوتی ہے اور درقیہ دینے سے تعالیب ہوجاتی ہے بیشکی مونی بالعمرہ اسی قتم کی عدم دموسین ہو اید درقیہ دینے سے تعالیب ہوجاتی ہے بیشکی حوکہ تعفل یہ تی ہیں اور اس میں ایک اہم طال یہ ہے کہ اگرچہ ولادت پرسبگراول ملیال میں کر ست سے لوا موجود ہوتا ہے کا ہم دضاعت کے دوران میں یہ فخیب وہ میں ہر ہر کی اس کے دوران میں یہ فخیب وہ میں ہر کے دورون میں یہ خوب کی اسکے کے دورون می بدنست یہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیانہ شیرخواری کی عدم دموست کی اسک کے دورود کی بدنست یہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیانہ شیرخواری کی عدم دموست کی وجوات مندرج ذیل ہم ہوتا ہو ہا ہو اس کی عدم دموست کی اس کے کہ وجوات مندرج ذیل ہم ہی ہوگئی ہو۔ یا لوے کی معدل اور کئی ہو۔ یا لوے کی معدل اور کئی ہو۔ یا لوے کی معدل لوگئی میں دورود ہیں لوے کی احتیاج تقریباً دوگئی ہو۔ یا لوے کی معدل لوگئی میں دورود ہیں لوے کی قلت ہو گیا طویل مدت تک دورود پلا ایجائے۔ مدر خواب کی موال ہو ہی ہے جو کہ ساوہ بھی ترشہ عدم دمو تیوں کے لئے ہوتا ہے مینی فری سلاج اس کا وہی ہے جو کہ ساوہ بھی ترشہ عدم دمو تیوں کے لئے ہوتا ہے مینی فری سلاج اس کا وہی ہے جو کہ ساوہ بھی ترشہ عدم دمو تیوں کے لئے ہوتا ہے مینی فری سلین مرتبہ دینا۔ تانے کا مول یہ ہے کہ یہ اس لو ہے سے جو کہ گیا میں ہوتا ہے کہ میراد بیائی میں گیولادئی میں مرتبہ دینا۔ تانے کا مول یہ ہے کہ یہ اس لو ہے سے جو کہ گیا ہیں نہ دینا۔ تانے کا مول یہ ہے کہ یہ اس لو ہے سے جو کہ گیا ہیں نہ دینا۔ تانے کا مول یہ ہے کہ یہ اس لو ہے سے جو کہ گیا ہیں نہ تور ہوتا سے تو کہ گیا ہیں نہ تور ہوتا سے تی نہ کہ گیا ہوتا ہے۔

ہموگلوبن تیارکرہے میں مرور تناہے (15)۔ اس کتاب کی سابعۃ البرلیشنوں میں واتن کیکس (Van Jakach) کی مصنیعی کا ذب بیض دموی عل مرد مو بیت (زانه شیرخواری کی محالی عبرم دمویت) ایک متقل مض کے طور پر بیان کی گئی ہے ۔خون میں سفید ملیاست کی زیادتی ، م یک یا ئی جاتی ہے 'جن میں جندانی ضلیات یا کے جاتے ہیں۔ مگراور لمال ٹرمے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مالت غالباً ٹیرخوار بچرکے لب عظام کی وہ مجیبیت ہی جو کہ وہ میں ہیں ہیں ہور پر کے دو مدم دس سے محد اور کے دو مدم دس سے معلوں پر مدار کے دو ایک مریض میں منتیلی ہے صفرا ہوئی برقان سد اربو گیا (16)۔ مرایت کی طرف اور ایک مریض میں منتیلی ہے صفرا ہوئی برقان سید اربو گیا (16)۔

أملاف الدموى عدم دموس

(HÆMOLYTIC ANÆMIAS)

ا کاف الدموی عدم دمو بیول کا ایک گروه خاندانی ہے اور اس ای بیصفرا بولی خاندانی برقان داسی طوی عدم دمویت جوکریوان غدی کا نیول اور بولی خاندانی برقان غدی کا نیول اور ان کول برقرمات کے ہمراہ حبیبی بی باتی ہے شیخوار بیول کی نیایت کی شافر احمد نیا هضی عدا مرح مویت اور دفوذا کبل ول کا خطم نا کھی تیان شافر احمد نیا هضی عدا مرد مویت شامل ہیں۔ بھر مختلف سرایتیں برسی گس گنگرین سب ہے خراب عدم دمویت بیداکرتی سب مزمن تغیر اطالت بدیر حمیات سبی بی مون بشمول نفاسی ب کے اور مورث شام ماری المتاب ورول قلد جو کدا ور طی با زروی کے دا فرمیس دور می اس مرد نقل الدم اور دس سے آخر میں اس مرائی الدم اور دس سے آخر میں اور مرد نقل الدم اور دس سے آخر میں اس سے آخر میں اس سے ۔

علامات ۔ اگر آلا منون سرعت سے موتوہیموگلوین ومویت اور فیلن پدا ہوجاتے ہیں۔ لونی قرت نما' لب عظام کی جمیبت کی نوعیت پر خصر ہوتا ہے' جبیا کہ پہلے بیان کیا جا چاہے' اور زور دار مجیبیت کی حالت میں شہلی خلوبیت اور نواۃ دار سرخ علیات دیکھے جائے ہیں۔ بیا اوقات حگر اور عمال کی اور کسمی مجلفی غدد کی کلانی ورقع ہوجاتی ہے۔

میصفرابولی برقان (acholuric jaundice)

مزمن کلان طالی اللاف الدموی می قان (chronic splenomegalic hæmolytic jaundice)

يرَفان كى س مقالمنة ئا ذشكل من تنا تون كا تبدد نبس بوتا كيونكه راز كا رنگ طبعی ریننا ہے اور قارور ہ ' قطع نظرت دیرحلوں کئے مسنز سفراسے معرا ہوتا ہے۔ لکین مشس میں بور و اکسن موجو د میوتی ہے۔ اس کے برطنس دموی مصل میں صبغهٔ مفراموح و بورًا ہے، گروہ بورو بالمن إيورو بالمبنوجن تسمعرا بيو است اً سے وا ک ڈین رگ کا الواسطہ امتحان حاصل ہوتا ہیں۔ اولی سیب تمرخ غلیوں کا اک نقص ہے ہو زیا وہ تخرمبراین طاہر کرتے ہیں (ملاحظ منوفی 428)-طحال ان خلیات کو تعدا د کتیرین لف کرتی ہے اور خون میں کا صبغہ صفرا ن خلیول كے جيولكو بن سے آتا ہے۔ اگر خون كي تعويفني باز بيدايش ناكافي بوتوم يف عديمالم ہومانا ہے نسیجیاتی تمانا سے لمالی کب میں کثیرا نشداد ملبی منظرر کھنے والے مراخ نطیفه موجود موتفی بین اور فاعلی دَم ایک ورجه بین از او صبغه ایمن موجود موتا ہے۔ اجواف است بند گالی جوتے ہیں ۔ یہ مرض پیدائشی اور اکتبا ہی و دشکلول میں موتا ہی۔ ميصغوا بولي خانل ني يرتا ت (acholurie familial jaundice)- يه یرقان جوناندان کے منعد دارکان میں ہوتا ہے اکثر پیدایش کے بعد فوراً دیجیا ما اسم یا بعدمی بندریج منواب بوما است مکن سے که برما بهاسال مک جاری رَبِ الله معاف بركرو قت فرفت بجر بوتار متاب مربين عديم الدم بوتابي سرخ خليه كلت كروس سالي هم بروما تهرس اور معتدل درحب كي لوقكمون خلويت مُلوي لاتماوي متعدد الوان لبندي اورنتطر داراس سيدي ظامر کرتے ہیں۔ اور نوات دار سرخ ظیے بھی موجود ہوئے ہیں بے شبکی خلویت د فی صدی سے زائد ہونا کی ممیز خاصہ ہے۔ سرخ خلیات جھوا قطرر کھتے ہیں لیکن طبی سے زیاوہ دبنر ہوتے ہیں ۔ ہیموگلو بن . ۵ یا ۵ ہم فی صدی یک گفٹ جاتی ہج

اورلوئی قت نما اکائی سے قدرے کم ہو آئے۔ سپید خلیے عمول کے تسبب کے نفداو میں ہوتے ہیں کیکن بعض او قات سپید خلیوں کی کڑت ہوتی ہے بعض او قات سپید خلیوں کی کڑت ہوتی ہے بعض او قات سپید خلیوں کی کڑت ہوتی ہے محمی موجود موں یہ طواں یہ طواں کی تعداد صدے زائد ہوتی ہے اور مکن ہے کہ مرضی حالت کی ترقی کے ساتھ اس کی سنتی بڑھتی جاتی ہے ۔ حکر محض خیف سا بڑھا ہوا ہوا ہے 'اور اسس کا اکر مبری کھی ہوتا ہے ۔ ووران میں بڑا ہو کر مبری چھی اس برونا نا معلوم ہے ۔ وہ اکث است کی مرفی اس طرح مشتمرے ہوئے ہیں موقع جی کہ کہاں کہ کال ال محالی کہبت میں موقع ہیں دیا خط ہو صغیر 397) اور ذائن کی انگلیاں کہ کال محالی کہبت میں ہوتے ہیں دیا خط ہو صغیر 397) اور ذائن کی انگلیاں مرفی اور وہ سالہا سال کے ذریعہ دیکھتے پر دروں مدری بندا ہو سکتے ہیں ہے کہ یہ عار مندان کے لئے چندات کلیف اس برا ہو کہ اور وں مدری بندا ہو سکتے ہیں ہے سنگہا کے صفران کا دجان مجی پایا جاتا ہے۔ بہدا ہو سکتے ہیں ہے سنگہا کے صفران کا دجان مجی پایا جاتا ہے۔

اکسابی بے صغرا بولی برقات (acquired acholuric jaundice)-

من کی سن کر نمایال بوتی ہے اور کمن ہے کہ سرخ جسیات کھٹ کر ا دمویت کر نمایال بوتی ہے اور کمن ہے کہ سرخ جسیات کھٹ کر ا ها یا کسس سے بھی کم بوجائیں۔ لوئی قوت نما بعض اوقات متلف عدمو ہو تا کی طرح اکا کی سے اوپر ہو تا ہے۔ برفان اکثر بہت خفیف اور طمال بڑھی ہوئی ہوتا ہے۔ سرخ جبیات کا بھر نمبر ابن جنداصا بنوں میں طبعی ہو تا ہے۔ مرض کی دونول شکلول میں کیکن الخصوص اکتبا بی شکل میں کو م باست یدگی کے است تدا وات واقع ہوتے ہیں کاور منظر نول متعلف عدم ومویت سے مشابہ ہمو کہ ہے۔ میں عرب لاج ۔ متنف عدم ومویت سے مشابہ ہمو کہ ہے۔ میں

مسلاع مسلاع میست عام و مویت می طرح طریسے علاج کرنا جا ہسے ہا تھے اُس وقت جب کدسُرخ خلیات و سے ہی ممیز تغیرات ظاہر کریں۔ اکتسا بی اور اگرف م دونوں اصابتوں میں طحال کا استعمال کر دینے سے شغا ہوگئی ہے 'اور اگرف م ومویت شدید موتو اسی کو انجام دینا جاہیئے۔ یہ امریا در کھنے کے قابل ہے کہ اگر تندرست جانور و ل میں طحال کا استعمال کر دیا جائے توجیبے اس کا طبی تعریجا پ کم ہوجا آہے۔لکن مصفوا بولی برقان میں یہ تجر مجرا بن علیہ کے بعد کم ہمیں ہوا۔
لیڈرد (Lederer) کی الاف الدموی علیم دمویت بیطرم دمویت کی ایک سٹاؤ فتم ہے ، جو کہ بچول ہی زیادہ عام ہے ، اور مس میں آ کا ف الدموی علیم دموی میں اور میں آ کا ف الدموی علیم دمویت بنایت لیکا یک ظاہر بوجاتی ہے۔ جگر اور طحال بڑے ہوجاتے ہیں ۔بالعموم بینی نیلو بہت موجود فی کمعب بی میٹر ، ، ، ، م کم بہنچ سکتی ہے بہااد قام معدی معانی علامات موجود موتے ہیں ۔ نقل الدم کے ذریعہ علاج کر دن برسرعت کے ساخت شفایا بی ہوجاتی ہے ۔

طحالى عدم ومويت

(splenic anæmia)

یہ نام اُن متعدد اصابتوں کو دیا گیا ہے جن میں لمحال کی بڑی کلانی کے ساتھ عدم دموبیت ہوتی ہے۔ان کی مختلف امراضیات کا بیان صفحہ طاقہ پر درج کیا کیا ہے ۔لیکن مبعن اصابتوں میں یہ مرض بلاسٹ برآتشکی ہوتا ہے۔اور بابی رقب میں لمبندفشارخون یا یا جانا ایک اہم امرہے۔

س بلندفت رخون بایا جانا ایک ایم امر ہے۔

علا است ۔ پہلا واقعہ یا تو ایک عمومی عدم دمویت کیا نفئے الدم کا ایک حمد ہے یا بائیں مائیں مائیں میں در دی کوئی شکایت ہوتی ہے 'جوغالبا گروطی لی النہا ب
کے عوں کے سب سے موتی ہے ۔ پہلے ہمل مشا کہ وکر بے رطحال اکثر طری جامت
کو بہنچ جکی جوتی ہے اور دوران مرمن میں وہ آئی کا فی بڑی جوسکتی ہے کہ سامنے
ناف تک اور نیچ حرقفی وفت کہ جسلی ہوئی ہے ۔ عدم دمویت بہت زیادہ' اور انظریت کے قسم کی ہوتی ہے 'سرخ جیات ، ۔ ۔ ۲ سے لیکن ۔ ۔ ۔ ہا کہ اضفریت کے قسم کی ہوتی ہے 'سرخ جیات ، ۔ ۔ ۲ سے لیکن ۔ ۔ ۔ ہا کہ جولانی لیکھتے ہمیں اور بیمو گلو بین وہ سے کہ بنیں ہوتا ۔ یعید جیات طبعی کے نبست اللہ علی میڈر کے کوئی ہے کہ بنیں ہوتا ۔ یعید جیات طبعی کے نبست اللہ علی میڈر کی تعدا و میں ہوتے ہیں رقاب جی اور اکثر صوف ، ۔ بہا ہوتی ہے کہ بنی نامیغات بیدید ہوئی ہے کہ بنی نامیغات اور جند کمیرنا ہونیا ت موجو دہول ۔ یہ مرس لیک طویل ممر کے کرتا ہے 'اور اکثر سمن یا جارسال تک اور بین

اوقات وس یا بارہ سال کک جاری رہتاہے' اور عدم ومویت آہت آہت آہت بڑھتی حاقی یا تھیں ہوتی ہے۔ مکن ہے کہ رعاف یا سطیکی حاق ہوت ہوں ہوں ۔ مگر بڑوا ہوا ہو اسٹا اور باصغہ کی کلیفیں ہوتی ہیں لیکن لمفائی ندد کی کانی ہیں ہوتی ہیں لیکن لمفائی ندد کی کانی ہیں ہوتی ، سبف اصابتوں ہے ہے کہ نمایاں لونیت بیا ہوجاتی ہے ۔ یہ مرض دو فول صنفول میں اور کیبن سے لے کر آخری او مطبر عمر کی ہوجاتی ہے۔ یہ مرض دو فول صنفول میں اور کیبن سے لے کر آخری او مطبر عمر کی ایک طویل عرصہ کے بعد حکر اور بھی آرا ہوجاتی ہے اور واضح طور پر اکرب موتا ہے۔ یعرا کے بعد استفارت کی ہوجاتی ہے۔ اگر جہ یہ مجن او قات کربت کے بغیر بھی ہوجاتی ہے۔ بعد استفارت کی ہوجاتی کی اگر جہ یہ مجن او قات کربت کے بغیر بھی ہوجاتی ہے۔ مگر کی واضح کہست اور استفائکی کا متزاد مونا عمول مرض جیتیں ہی ہوجاتی کی طرف کی ہوتا ہے۔ طرکی واضح کہست اور استفائکی کا متزاد مونا عمول مرض جیتیں ہی طرف کی ہوتا ہے۔

دوسری الما نتول می ظمالی عدم و مویت کے ساتھ طمالی وریدوں کل عبت پائی جاتی ہے۔ کہنہ اصل نتول میں مزمن گرد کبدی التھاب اور گروطها فی التھاب بستند میں میں مذہبیں

تشخیص - مکن ہے کہ بہ مرض غیر بیض دمویتی مبض دمویت متلف عدم دمویت النہاب دروں قلبہ کے ساتھ فاط طط ہوجا ہے ۔ بسس کے حمیر خصائف میں ہو ہوا ہے ۔ بسس کے حمیر خصائف بیر بیا ہے ۔ انحفریت کی قدم کی عدم دمویت سید جیات کی قلت کی طال کی بڑی جامت کم بیض دمویت کی عدم موجودگی اور لمفائی غدد کی کلانیوں کی شام موجودگی اور لمفائی غدد کی کلانیوں کی شام موجودگی مرض کی طول مدت اور زفات کا وقوع ۔ خبیث التهاب وروں قلبہ کے ساتھ خلط لمط ہوجا ما حکن ہے کہو گئے کہس آخری مرض میں طمال کہت بڑی اور عدم دمویت ہیں۔ در طمالی عدم دمویت ہیں دموی خربرات کا موجود موزا حکن ہے۔ ہیں۔ ادر طمالی عدم دمویت ہیں دموی خربرات کا موجود موزا حکن ہے۔

بی یا در عامی عدم دخویی بی دخوی طریزات کا خوجود خود مین ہے۔ کہست کی اس اسا بتوں میں جن میں عموماً طمال بڑی ہوتی ہے، من میں میں کی شخیص قائم کرنے کا احتال بہت زیادہ ہے۔مصری کلائی طمال Egyptian) چاہئے۔ جاہئے۔ عسلاج - لوا اورسنگھیا بے کارہیں - اولاً کی عصد مشاہ ہ کے مبتینی قایم ہو جائے توطمال کا استیصال کر دینا جائز ہے ۔ اگر جدید نہ نزف کھے خطرے سے خالی ہیں تاہم بعض ا معا تبول میں بوری کا میا ہی حاصل ہوئی ہے ، بین دمویت کی طرح اس مرض میں بھی ارانجنی شمامیں آزائی جاسکتی ہیں ۔ نقل الدم ایک مفید خفینی تد بیرزہے ۔

بيض ومويث

(LEUKÆMIA)

طال اور لمغانی ند و برسب بید خایول کوفاعی طور پر پراگر سے کافعل انتقیار کر ہیں۔

جب یفعل جاری رہتا ہے نوطبی ذخہ ول برا ور بھی ذیا دہ دبا ویر آ ہے اور پہلے

خون کے اندر اور بھی زیا وہ اولین شکل میں بینے و سے جاتے ہیں۔ نبض اصل بڑول

میں طبعی ذنیروں کی ہس بڑھی ہوئی فعالیت کے ساتھ غیر میمولی مقالات بر سبید

فلیول کو بدا کر سے والے از ہ رہے بن جاتے ہیں جو یا تو گتر آ سا (lymphoid)

فلیول کو بدا کر سے والے از ہ رہے بن جاتے ہیں جو یا تو گتر آ سا (lymphoid)

یا جم کے مختلف جھول ہی گر کمیں بیدا کر دیں (گر کمی بیجین) وہ مو سیاس نام سے

یا وکی جاتے ہے کہ ملاخلہ ہو)۔ مفی لمی سلعہ کے ساتھ قریم علق ہو آ ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اسے اس نام سے

یا وکی جاتے ہوئے کے ملاخلہ ہو)۔ مفی لمی سلعہ کے ساتھ قریم علق ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اے ساتھ قریم علق ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اے ساتھ قریم علق ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اے ساتھ قریم علق ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اے سے اس کا میں ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو ایک کا ساتھ قریم علی ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اے ساتھ قریم علی ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو ایک ہو ایک کا میں بیا کہ کا میں ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو اے ساتھ قریم علی ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو ایک کی سلمہ کا میں ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو ایک کی سلمہ کی سلمہ کی سلمہ کی میں ہو ا ہے (ملاحظہ یا وکی جاتے ہو ایک کا میں میں ہو ا ہے اس کی ہو ایک کی سلمہ کی سلمہ کی اس کا میں ہو ایک کی سلمہ کی ہو گوئی ہو گا ہو

بین در بیت میں اساسی تول زیادہ ہوجاتا ہے۔ کیمیائی امتحان خون میں پورک الیڈ کی نہایت زیادتی ظاہر کرتا ہے جس کے متعلق یہ باور کیا جاتا ہے کہ برسفد خلیات کے اٹلاف سے پیدا ہوتا ہے۔

لتي طامي سيض فعوري

(MYELOCYTIC LEURÆMIA) طالی لبی سفیل گوں لُب آسا 'یا ذیاتی بیض دمویت' لبی خلوی دمویت (spleno-medullary, leucoid myeloid, or granular)

العدد العد

جس میں *مدمع خلیے متلف عدم* ومو بیٹ کے ممیز خصا نُس ظامبرکرتے ہیں کیکن جمال کھ سپیرخلیوں کا تعلیٰ ہے منظر خوان مغیر گوں بیف دمویت کا ہوتاہے،جس میں س

من کے منبتہ ایرائی درجیں المضوص جب کہ مض مزمن ہو کنٹرالاش

نواقی خلیتے نہا میت کثیر اِنتدا د ہوتے ہیں۔ اُن میںسے بیشر سمول کے نبت بہت رسيخ اورمبض سريحاً انحطاط ما فية موتے ہيں ۔ ايسے بعدلتي نطبتے بمي موحود ہوتے ہیں جن کے نوات مغل نما ہوتے ہیں' اور جیند تمثیلی ذراتی اور ایوسین کیسند کئی خلیتے بھی۔ ایوسین بیندا ورنستولی خلیات ز یا دہ موجاتے ہیں' کبکن کمفی خلیے بہت

زماً دہ نہیں ہوتے نِسنتُہ معد کے درجے می چند ہی مبیعہ نیلے موجو و موتے ہن لیکن بیش سبید خلیے مبی نطیئے میش لتی خلیے اور متولی ملیات به کثرت موتے ہیں۔ال کے

اور مبدر من آبی اسطات کا علیہ ہو آ ہے۔ اگر مرمض سریع سے (لبی ما هضی ہیں

دموسي = myeloblastic leukemia) توننبته زيا وه اولين طليات سيعن لتِّي امِضات ابتدائي سے بري تعداوي ويکھے جاتے ہيں اور دوسرے انسام کے

سبید خلیے غیرموجود مو ننے ہیں' اور دَموی لوجیے مجی کم ہو جاتے ہیں۔

. رصنیاتی تشرینے _ طمال کاور ن اکثر هیا ۹ اُونڈ مرتا ہے، سکین ما اونڈ رکھتی ہے۔ ہمئس کی سطویراکٹر کیسہ کی و بازت کی مکیتیاں موجود موتی ہیں' اوروہ بوارِستکم ڈایا فرام یا متصلہ احراب سے کم و بیٹن جیسی موٹی موثی ہے ۔ تراتشے بہد المِسْ كارنگ مرج مولے كے بجائے كستفدر عُبور اسا بوتا ہے، جو كميال مو تاہي يا سہکوں کی دہازت کی وجہ سے لنعبتُہ بھیکے رنگ کے خطوط کے نشا ن موجرد ہونتے ہیں۔ وہ مکنی سخت اور خشک موتی ہے ۔ اکثر اوقات بڑے بڑے فانه تمامعمات بوت بي جويا توزر واور مبني ما رئرخ اور نزني بوست بي فود طحال مي وتغير بوتاب

وه برہے کہ طی لی کتب بہت بڑھ جاتا ہے ، جو امنیس خلیوں سے بڑ ہوتا ہے جو خون میں ای کُ

جاتے ہیں اور الفی_{جی} اجمام کے فاکے غیروامنع موتے دیں کہنداصا تول ہیں ہمکی زیادہ

ليفي اور مهمكيس زياده دبيز رموجاتي ميں۔

جگر بڑھا ہوا ہو آہے' اور مکن ہے کہ ^اس کی جمامت ممول کے نعب^ی و تکنی یا گئی ہوجائے ۔ وہ میں کے رہاک کا اور حکینا ہو آہے اور حکن ہے کہ خرد بین کے سینج سپیرنمارس کی اکسکنتیف در ریزسش (لبی تُحکوی در ریزش) ظا مرکزی جن کی مِثْنَهُ نعداد با بی عروق کی توزیع کے گردو اقع موتی ہے کیکن کی صدیک گر بکی تورول کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ عوق بمی سیب خلیوں سے زر ہوتے ہیں۔ گر د مے سیکے رنگے اور را وی ماکل سید مطروحات ظاہر کرتے ہیں جو قشری ایمبدیات کے ورمیات ومعاربوں كى طرح دوڑتے ہيں مكن ہے كه التباب الغم إ التباب بلموم لوزيين كاورم اورزبان كى جراب كے جوابات كاورم اورمعالك خرابات كاؤرم اور تقح بي بوليتموسى (thyroid) درقى (thyroid) اورفوق الكليدغل دبى مُرْمَنَی 'ہو سکتے ہیں' اور جار کی رسولیا ل بھی مندرج ،یں ۔ بعض او قات بھید پھڑ ہے نزفی مفیوات میش کرتے ، بیں۔ لت عظام زر د آور ریم نما' یا کلا بی اور شخت موتا اورائت کی حربی کے بجائے فاعلی کت جمیری ایک بافت ابیدا موجا تی ہے جس میں کئی خلیان اور لوات وار سرخ خلیے کمثرت موتے ہیں اوراکن کے ساتھ مبض **ا**قعات إيوسين بن خطيه موترين اوركتي المعنات إلى بدامني خليه موتري الكام گاہے دماغی نزف کے علاوہ' د ماغ اور بنناع میں منتشر تصلبی تغییرت اور حام التهاب كے منتشر تبے پائے گئے ہیں۔

علا ات - تحاد لتی ناهضی بین دمویت acute myeloblastic علا است - تحاد لتی ناهضی بین دمویت اورایک اورایک اورایک مین بین در این اورایک مین بین مرض کا سارا مُر ایک مِفته سے مجی ذرا ہی کم تعا (22) ۔ خون کے اندر کتی نامضا نے کی تعدا داور عدم دمو بیت دو توں بہ سرعت زیادہ ہوجاتے ہیں - مزن

لتى فلوى المكال كى طرح اس اي مجى كثير التعداد نرز فائت بوتني بي -

مزمن لبی خلوی بیض د مویت chronic myelocytic)
او leukæmia مربی و مویت که ابتدائی علامات می سے کثیر انتدا و اصابتول
می ورم می می جوکلانی طعال کے باعث بیدا بوجاتا ہے اور مکن ہے کمید
کلانی بلاکوئی امارت ظاہر کے کچھ عصد سے منویاب موتی رہی ہو۔ عیر مکن ہے کہ

یکی کی مادی ائیں جانب ہے جگن بائی جائے اور ایک جنبوط سخت ربولی نادے کو چیلے کے طوف پیلو کے اندر جیلئے ہے اور اس کا اکلا حاشیہ نویں نلعی کری کے ویب ہے جانب اور اکثر اوقات برس کے عرف ہوروان کے لیول برخط درمیا نی میں پہنچ جانا ہے ، اور اکثر اوقات برس کے عرف سے اس کی عرف سے اس کی جو تراب کی جبیدگی کی وجہ سے پیلا ہوجانا ہے ، جو آت ایک ایسے دائرے کے محیط کے برابر الب برخصنے پر مجبور کرتے ہیں جس کا مربر شکمی محدی شریان ہے ۔ اس کا اکلا کنا ۔ م کو بیش کرتا ہے ۔ اس کا اکلا کنا ۔ م کو بیش تیز ہوتا ہے اور ایک یا دو کمنا کو بیش کرتا ہے ۔ ابتدائی درجو برطال کا کہا کہ ایک محض با میں مراقی خطے میں واقع ہوتی ہے ۔ جنگر معتدل درجہ کس برھا موا ہو اپنی محفق با میں مراقی خطامر کی محض با میں منافی جائے ہے ۔ ابتدائی درجہ کس برھا موا ہو اپنی اور وائی منافی جائے ہے ۔ ابتدائی درجہ کس برھا موا ہو اپنی اور وائی منافی جائے ہے ۔ ابتدائی درجہ کس برھا موا ہو اپنی اور وائی منافی جائے ہے ۔ ابتدائی درجہ کس برھا موا ہو اپنی کا فریت میں اور ایک ہے ہم اور جائی اور میں کے ہمراہ جارا ور مناطی اعتب کا شخوب پایا جاتا ہے ۔ انہ کی میں وائی جائے ہے ۔ انہ کی مقتب کی شخوب پایا جاتا ہے ۔ انہ خورا کی خورا رہو ۔ انہ میں کہ ہمراہ جارا ور مناطی اعتب کی شخوب پایا جاتا ہے ۔ انہ خورا در مناطی اعتب کی شخوب پایا جاتا ہے ۔ انہ کی میں وائی جاتا ہے ۔ انہ کی میں وائی ہو کی دور میں کے ہمراہ جارا ور مناطی اعتب کی شخوب پایا جاتا ہے ۔ انہ کی میں وراد ہو ۔ انہ دور کی طور انہ کی دور انہ کی میں وروز کر کر دور کی میں کا میں کی ہمراہ جارا ور مناطی اعتب کا شخوب پایا جاتا ہے ۔ انہ کی میں وروز کر دور کی دور کی کر ہو کی کر دور کر دور کی کر دور کر دور کر دور کی کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کی کر دور کر دور کر دور کی کر دور کر کر دور کر دور

خون کی منیرجات کی و اور منوفات کے وقع سے المام ہوتی ہے اور استرالذ کر بالحضوص رُعاف مور سول اور منع سے او ما داور جلد کے بینی بر برائی برستوں کی سکل اخت بار کر لیتے ہیں کی کی کی جیسے مرول معدے اور آتوں کردول کی سکل اخت بار کر لیتے ہیں کی کی کی جیسے مرول کی معدے اور آتوں کردول کی اور ان کا و ماغ کے اندر نرف بھی ہوتا ہے کے شہری بی نرفا ہوتے ہیں جہاں وہ ایک چینم بین سے نظر آسکتے ہیں اور ان کے ساتھ سپید دماریاں اور وصفے بھی ہوتے ہیں کہ سپین طیول کے تودے ہوتے ہیں۔ دماریاں اور وسطے بھی ہوتے ہیں۔ دمویتی النہاب شنبکہ یہ وریدیں اکثر نمایاں طور بر پیچیدار ہوتی ہیں کہ بین طیف دمویتی النہاب شنبکہ یہ دمویتی النہاب (leukæmic retinitis)۔

من کام مرفی کام مرفواً مُر تی ہو آہے ' یہاں کک کرائس کا فائد الم کت کے ساتھ ہوجائے اوروہ چھا ہ سے اپنے سال تک جاری رہتاہے نظائد کے قریب شوب زیادہ ہوجا تاہد ' پاؤں اور بسم کے دوسرے جھے اُ ذیبائی ہوجاتے ہیں مکن سے کہ اِستا رہنا ہا در استعارالعدر متزاد ہوجائیں نبین تیز ہوجا تی ہے ' اور اختلاج

اکثر ہوآ ہے۔ کھی کیمی اسہال ایک نمایا ل علامت ہو آ ہے۔ اکثر اوقات کھے تب موج دہائی ہے۔ اِلاَّ فرنقصا ل فون ' نها کن اسہال فرات لیخب فرات الریئر شخبی المتهاب یا اتباع قلب سے ' اور کہمی کمی و ماغی نزف سے موت واقع ہوجا تی ہے۔

سرخ ہو پر مکن ہے کہ بیون ومو بیت نیایاں ہو۔

ا مذا رآ فراً تا دا نی دو آید کیکن موٹر علاج کرنے سے مکن ہے زندگی لا اللہ اللہ میں مبلک موجا تی ہے۔ پذیر ہوجائے ۔ لبی ما ہضی بیض ومویت ابتدا کی مطرمیں مبلک موجا تی ہے۔

می ل براری (splenectomy) بموط یا نزف کے بعث بمیشہ مہلک مولی

لمفي سجنر فسمويت

(lymphatic leukæmia)

لمفي لمف المالي غلي ذواتى بين دمويت لمفي خطيد دمويت

(lymphocytic lymphoid, or non-granular leukæmia;

lymphocythæmia)

بەلتى خلوي قسم كەنسىت زيا دە تئا ذوا تقع بوتى ہے ۔ نون کی حالت - مزمن کمنی طوی بیش دمویت میں کمنی نطیتے زیا وہ ہوا من کیکن کثرالاشکال اور دوسرے طیول کی تعداد تقریباً وسی ہی رستی ہے ۔ مِنَا سَخِهِ مُكُن ہِے كُهُ مِمِوعي سفيدخلوي شار ، ا ہوا اور ا ن ميں ہے 4 9 في معدى ياسب ل كر . . . ه و لمغي خليه مول اور إقى الده . . . ه كبرا لا شكال موت ين جن کے ماتھ جند (بوسان بسنل اور متولی فلیات، ہوتے رہیں ۔ ما د کمفی بفن مر*ب* ہیں جو ایک *سریع مُرد کمنی ہے نبیتاً* بڑے غیر بختہ متسم کے خطیے مُالب نعد اوہی *ہوتے* ہیں بھین ان کولیی امھنی میں وموست کے لی ما سطنات سے تمیز کرنا اگر نامگر نتیج تومشكل صردرب يهس كيرملات ككن ہے كرميد خليوں كى مجموعي تعدا دفي كمو لى مشرطبى تعداد كرسبت بهت زياده نه جويا بالكل زياده نه روليكن اگراس مي عمى كنفي خليول كامجموعي شار في كمعب ملى ميثر زياده موحا كئے اور كثير الاشكال خليخ غِرِ متغر يأكم بول تولمني بين ومويت كى مالت مشناخت بوما في ما بعث إسي اما بتون كواكة غير بيض ومويتي بيض مق (aleukæmia leukæmia) لہتے، بب۔ یہ لمنی لمی سلمے اقابل تمزے اور غالباً و بی ہے کیو کہ دونول میں لني غدداورخون كاتنيهماتي منظر إلكل ماخل موآبد يضيعت بديه كدوه امتآي ہو کمنی کمی سلعہ کے طور پرنشر وع موئی ہیں کمنی شیف دمویت کی حیثیت سے ختم ہوئی ہیں عموا ایک افزی عدم دمویت ہوتی ہے جس س بنا ہوات دارسنج فلیے بھی موتے میں۔ جیسا کہ لبی طوی بیض دمویت میں موتاہے مکن ہے کبیر نابهضى ردعل موحود مواورسرخ خليات كالمنظر متلف عدم دموست سينمشابه

ہوماً ہے۔

علاات - حاد لمفي خلوى بين دموية acute lymphocytic (leukæmia میدود نور صنغور مین اور مات اور اینا ون سال کے ورمیان ہر عمر میں واقع ہوتی ہے۔ یہ بعاری وو مفتوب سے لے کرتین ایارمبنوں کے درمیان مہلک ٹا بن ہوتی ہے۔ یہ عام کمز وری اور سلمندی یا در و ملجال یا در و مفاصل کے سائھ غیر تحرسس طور پرنٹر وع ہوتی ہے ۔ ہرونی فد د بڑے ہو تنگتے ہمن تکین ہمیٹ ت المجرب موئے بنیں بوتے بلمال اور حکر کی ضیف کلانی موجود موتی ہے ا ورمكن ہے كہ بڑا ں اليم ہوں - كتِ شروع مصلم في فليوں سے تعسام ہوا ہوتا ہے اور اس سے علدہی نمایا ال عدم دمو بت بیدا موماتی ہے۔ ہمسناس اما ننوں میں نند کہ التاب الغمایک مناما یں خاصہ مواسع جس کے سساتھ موطوعون كا إغثاث اور كنكريل بوتات الدس كيما عدي بي ب اور مسور مسوں اور ہنتوں ہے اور مبلد یکے نیجے نرزفات واقع بیوتے ہیں جیم کے بهبت سد عقوس عدد كم في خليول سي كنا ن طور يرمسي موسئ موت بيل اور اسپواسطے وہ بہت لرے ہوجاتے ہی مشلاً مگر طمال گردے سرگردے لبليهٔ رئتی غدو اور دسی غدد- اور غده تیموسب علی حاله موجود رشاه حاورمبت برا بوماتا ہے اورمکن ہے کہ عضلہ قلب بھی کمفی خلیوں سے درسینن ہو جمحری نم کی مین و موننی در رختگی کے باعث جموظ العین منی و مکھا گیاہے۔عموماً خامتُ ہے پہلے استفاہو جاتا ہے۔

سی ہوں۔ کی طوی ہفن د موست کے رمکس لمفی خلوی ہبین دموریت میں طحال ثاذی اتنی ٹری موتی ہے اورسیارے میم کے لمفائی غدو اوراعضا عنقر دی اور سبے تمناتی ووفوں اکثر وسیع طور پر ہا وُف موضے ہیں۔

مزمن کمنی خلوی بیض دمویت chronic lymphocytic)
الدومن جومکن ہے کہ تقریباً جے مہینوں یا ایک مال سے لے کر
بارہ بکدا تھا رہ مال یک جاری رہے کہ لفائی غددیں شروع موکراً ن کے
گرو ہوں کو یکے بعدد گرے اکوف کرنا جاتاہے کی بیاں تک کہ جم مریک تسام

المفائی غدوا و ف ہوجا تے ہیں اور وہ گرون بن ران یا بغل ہیں ہوت اور حاکمتے ہیں۔ وہ معتدل طور پر شرے ہوجاتے ہیں ازادہ سخت ہیں ہوتے اور ایک دور سے پرا زادا نہ طور پر حرکت کرتے ہیں۔ متذکرہ بالاغدو کے تبت ماری غددا ورجی زیادہ کر شرت سے بڑے ہوجاتے ہیں کین طف البار بطون صدری بابی اور حرقفی غدد نسبتہ کم کثر ت سے بڑے ہوتے ہیں۔ ترا سے تبدد نظر آتے ہیں۔ ازائل بابی ناگ کے اور خرو بین سے و کیسے پر لمغی خلیوں سے متد و نظر آتے ہیں۔ ازائل کی دار کے اور اس سے ازائل کی دار کے اور اس سے ازائل کی دار ہوتا اور لمفی خلیوں سے عشا ہوا ہونا ہے اور اس سے ایک غیر کو بنی عدم دمویت برا بوجاتی ہو۔ لئی طوی بیش دمویت کے نسبت اس میں نزون کا رجان کر ہوتا ہونا ہے اور اس سے ایک غیر کو بنی عدم دمویت اس کی در رئینگی ہوجا ہے اور کے وہا و کے اشرات سے یا لمدی خلیوں سے ان کی در رئینگی ہوجا ہے ہوں کی فادر یہی علقیت کرو جہ سے مریف بلاک ہوجا ہیں۔ اِن مزمن اصابتوں میں طحال اور حگر بہت کرو ہوجا تے ہیں۔

تشخیص کسی الیم بہاری میں میں میں اغدو کو زمین کا اختیاں کی خمین اختیا لاکے سامتھ کرنی جا ہے۔ اندا رہا واصابتو میں برا ہو آ ہے خان میں سکھیا ہے یا ممیتی لا شعاعوں کے ذریعہ علاج کے لئے وقت بہت کم ہوتا ہے۔ کم سریع اصابتوں میں ابن دواؤں کو از فاعا جائے۔

سلعی الحض (chloroma) کمنی بیض دمویت تحی استه قریبی تعلقا پیش کرف والی ایک حالت ہے جس کوسلعه اخضر کہتے ہیں کسس میں کثیر التعلاو رسولیاں یا لمف اسامطروحات بالمخصوص مجورت میں (مبس سے جو ظالعین کابیا بوجانا ممن ہے) صرفی حفرات میں اور کھویری کی ہڈیوں کے گر دعظمہ میں بیدا بوجاتے ہیں ۔ رسولیاں لمتی پر اور طبد کے نیج اور مختلف اعضا مثلاً گردہ میں میں بیدا بوجاتی ہیں اور مبض اوقات بدرسولیاں دورا ان زندگی میں مجی سزرتک کی موتی ای رسولان الاخصر = (green cancer) محد کے نیجے سے نظر آتا ہے۔ ووسری دسولیاں میدرنگ موتی ہیں ۔ لئت آساسلو اضر (myeloid chloroma) کی

اما ښير شا ذېر بوتي بي -

یں موت کے بعد یہ تعملف رسولیاں ہرے رنگ کی ہوتی ہیں' جو کمشف کرسٹ پر پیکا پڑ جاتا ہے۔ اور لمغی غدد' ملحال' کب عظام اور دو سرے اعملنا ویسی ہی حالت میں ہوتے ہیں جبہی کہ لمغی خلوی بیض دمو بت کے سائھ ہوتی ہے۔ ہرے زنگ کی حشبیقی ما ہمیت نا معلوم ہے۔ وہ صبغہ معفرا ہنیں ہے لیکن قباسس یہ ہے کہ وہ دمی سبز رنگ ہے جبکہ اکٹر بیب میں و کیماجا تاہے۔

كنرت خليات احمر

(POLYCYTHÆMIA RUBRA)

کنیز طری و موبیت (polyeythemia) ایکترت طیات احر میں میں خون کے کرخ طینے زیا وہ ہو مائے ہیں (۱) سرخ فلتے بنائے والے اعضا کے اولی مون کے طرز پر پیدا ہوجاتی ہے (1 مر و موبیت = erythremia) و (۲) اور وورانی یا تنفی نظامات کے کسی ایسے طل سے می بیدا ہوجاتی ہے جس سے آکیجن کی قلت واقع موجائے اور جس کی معرودی ہو موجائے اور جس کی معرودی ہو میں مروائے اور جس کی معرودی ہو میں موجائے اور جس کی معرودی ہو اس میں موجائے اور جس کی معرودی ہو اس میں موجائے اور جس کے مالمین و یا دہ تعداد میں منرودی ہو جسے کہ پیدا بیشی موض قلب میں ۔ اس نا فری کنزت فلیات احمرکو احمد جسلوبیت میں ۔

كمرت فليات احمري أصابتون بساس تول زباده بوما اب -

احمردمون

(erythræmia)

یہ زیا دہ ترمیں اور ساٹھ سال کے درمیان کی مرکے مربینوں میں واقع ہوتی ہے۔ اگر جیکمی کہی کی مربینوں میں واقع ہوتی ہے۔ اگر جیکمی کہی کی مربین میں ہوتے ہیں۔ اس وَ اُن مَایاں یا شدید کی کم سے مربین کے مسلم کے مربین کے مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کا میں کہ محتلف ہوتی ہے اور اگر فون کو مقیرار ہنے دیا جائے تو دیکھا جا آہر ا

جیان بیال کے ہم جم کے برابر جگہ کھیں تے ہیں۔ ہموگلو بن طبی سے ۱۹۰ ایا ۱۹۰ ایا ۱۹۰ فی صدی کا کہ زیادہ ہوجاتی ہے۔ لوئی قوت نما ادنی ہو ناہے میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سُرخ ظلے چھوٹے ہیں۔ سبید طبیوں کی تعدا دہیشہ ہی بڑھی ہوئی نہیں ہوتی گرمکن ہے کہ وہ فی معب بی میٹرز الا سکال طبیات میں ہوتی ہوجاتی کے خون کی لا وجت معمول کے نسبت بھی یا جوگئی ہوجاتی ہے۔ کثافت نومی اور عرضہ ترویب کا معمول کے نسبت سیلے یا زائد ہو نا ہمشہ نہیں یا یاجا نے ون کا دون اس با یاجا نے ون کا دون اس با یاجا نے دن کا دون کا دون کا دون کی ہوجاتی ہے۔ کا دون کی ہوجاتی ہوتا ہے کی ہوتا ہے۔ کی ہوتا ہے کہ دون کی ہوتا ہون کا دون کا دون کا دون کا دون کا دون کا دون کی ہوتا ہونا ہونا ہون کا دون کا دون کا دون کا دون کا دون کی دون کی ہوتا ہونا ہونا ہون کا دون کا دو

441

موب ہودیں ہوتی ۔ کمفی غدد العمرم غیر نمائز ہوتے ہیں ۔ نگر مکن ہے محتمق مو لہب ''ہادت نہیں ہوتی ۔ کمفی غدد العمرم غیر نمائز ہوتے ہیں ۔ نگر مکن ہے محتمقن مو لہب غطام عام طور پر کہرے مرخ رنگ کا مواہے' اور شعمی لب الکلِ دکھا کی نہیں ویتا ُ خیا نمیے

ک مهم موریبه بهرک می رابعت ما بروایت به روایتی سب به من رفتانی این روایت ایسامعلوم بروایت که سرخ خلیات می نحوین کا وظیفه بهت براه کیا ہے۔

امراضیات ۔ اس کے مطابق اس مالت کی افرانسیات کے معلق عام طور پرسلر نظریہ یہ ہے کہ کسی ذکسی سبب سے لب مظام میں ہیجان بدا ہوکرام نظریات کی افراط کموین ہوتی ہے، اور یہ کہ دیگر تغیرات افزی ہیں ۔ اس امرکی کوئی شہادت نہیں ہے کہ کھرت خلیات احم' افول ہی آئیوں کی احتیاج کا آفزی متیجہ ہے۔ وہ مغیل جراکسیمی کوشک میں رکھے جاتے ہیں اس مدت کے حتم پرخون میں کوئی تبدیلی طاہر نہیں کرتے ۔

علامات - الكثرت طیات احمر کے ساتھ جو مالیتن عموماً پائی جاتی ہیں اور میں ہوں ۔ ۔ ۔ ذراق اور طحال کی معتدل یا شری کلانی ۔ زراق بالخصوص چہرے اس کا نول اور خاطی اغضیہ بیز طاہر ہو المب را لا خطر ہو صحفہ ۲۱ الف صفحہ (483) ہو جہ و برایک مضوص و ممیز بیک یا سرخی نظر آتی ہے ۔ مکن ہے برقان ہوا ور گا ہے کہ بہت بھی جنا نجیمصل وال ون برگ کا بالواسطہ تعالی ویتا ہے (88) ۔ سنسکیہ کی ورید ہی تعتی اور نہا بیت سیاہ ہوتی ہیں ۔ مریض کو در دسریا سریں ایک برگا

اور مخلف اقدام کے نزفات ہو جاتے ہیں جن میں رُعاف مور صول سے خون آنا کہ ہے۔
طمث قیالدم اور داغی نزف شامل ہیں۔ شرائین کی صلابت ہوتی ہے جس سے
طلقی التباب لعسر ق انطاعی (thrombo-angiitis obliterans) معمتوقف
عرجان (intermittent claudication) اور حمرتی وجع البحوارح-melalgia) معرفیان (melalgia) وارائنس کے بیدا ہوجاتا ہے۔ گردے مکن ہے مماثر ہوجائیں کی نواز ہوا اسٹری کے بیدا ہوجاتا ہے۔ گردے مکن ہے مماثر ہوجائیں کی نواز ہوا تھے۔ گردے مکن ہے مماثر ہوجائیں کی نواز ہوا تھی وریدی علقیت واقع ہوا کہ ہوا۔

احرومویت کی اصابتوں کی رفتار مختلف موتی ہے ۔ فش فلب سے یا دافی عروتی بھی گیوں سے کا قدرن سے ہلاکت واقع ہوگئی ہے۔

تعلاج - اس من کے لئے وقتاً فرقتاً فعد کا کھول دینا ایک افجاعلاج کو۔
ایک چڑی کھو کھی سوئے کے فریعہ سے ہر چھٹے میسے لی ایک نٹ سے لے کرا ایک نٹ کک فون نکال دینا جا سے نے کرا ایک نٹ کک فون نکال دینا جا ہے ۔ فون نکا کے حوت کی جا ہے کہ اس کٹر بیٹ اسمال کرناجا ہے جیا کہ نقل الدم کے لئے خون نکا لئے وقت کیا جا ہے ۔ ہدیوں کے لاشاعی علاج سے بھی کا میابی حاصل ہوئی ہے ۔ حال بی فین لیا مدیدین (phenyl hydrazine) موزانہ او وہن استعمال کی گئی ہے۔

احمرخلوبيت

(erythrocytosis)

ب*اں اصطلاح کے تحب*ی اُن امیا نبو*ل کو شامل کر ن*امتعبود ہے کہ جن میں کثرتِ خلیات احرابً عظام کی طرحی ہوئی **فعالیت کے ب**اعث ہ**ی ہوتی ہے** (بارکس وسیب م - Perkes Weber) كين ال معاليت كي تبييج قا فرست انوت اسبق طالات كي وجسے ہوتی ہے دین نجد ایک گرو ه مزمن قلبی اور ربوی ضررات سے بنبائے جن میں سے فلب کا پیدائشی تینوه نایال ترین ضراح ۔ او ۔ دوسرے سررات اکت فی مطری مِنِ کی مختلف شکلین نقاخ (emphysema) اور مزمن ریوی امراض بین جن کے ساتھ زراق کا ہونا مگر ہے (مرض آ برز ا =Ayerza's discase)- ان من ون کا قليل المكدائب عظام كے لئے تہيج كاكام وتياہے أيمين زوہ" مريض ايك ووسسرا یں۔ گروہ میں۔ان میں احر ظویت آیک آسلیم ہی کو ٹنگ کے اندر رجس میں۔ ہم فیصدی آکسیمن موجود ہو) علاج کرانے سے کم موجاتی ہے (Hunt & Dufton) ۔ ایک اور گردہ اُن اشغاص کی کٹر ت خلیات احمرے بنتا ہے مجر البندار تفاعات کے رسم والدبوتے ہیں جباں خلیات احمری زیادتی اس الیل آکسیم بینش کی تلانی کردتی ہے جو کنفس کے لئے مال سوئے والی موامی یا ٹی جاتی ہے ۔ کثرت علیات احمر فاسفورس اور کاربن اناک کیا کیا کے مزمن تسمیم میں اور ایکر تمین (Addison) کے مولی ورو یا جسی قرای*ں می دا*قع ہوتی ہے۔ مبیاکہ الحرد مویت میں ہوتاہے' سرخ جیات ت^{اہم} اٹھ یا فو لمین (ایک لمین = ۱۰ لاکھ) میک بینج سکتے ہیں ۔ نون کی ہیموگلو بن اور لز وجت دو نوف مقدارس زياده بوجاتي بي-

مبم وكلوبن موتت

(HAMOGLOBINAMIA)

ميموكلوبن دمويت أسس دقت پيدا بوماتي بيد جب كدعوة ق وموير كاند

دموی جسیات کی ٹوٹ بچوٹ واقع موکر بلاز ماکے اندر میموگلو من خارج موتی اور ات کا بی جملک دے دیتی ہے۔ اور جب یات وموی بیٹ (rouleaux) بنامے کا رجمان إلكل نبير وكحضة عام طور برعدم وموسيت معدكسي قدر بوقلمو ل خلو بيست إور خلوی لاتیا وی کے موجود مونی ہے۔ نہا بیت ہی شاحب سیسے (معایلہ فاب مسممے) دیکھے جاتے ہیں۔ بھریہ ہیموگلوبن گردوں سے خاج ہو کر پٹیا ب کے رنگ کو گہرا سرخ نبارتی ے اور میناب اِلک صاف ہوتاہے۔ اِس مالت کو صبی وکلوبن د موریت کہتے من اور برد کر بولیت سے متفرق موتی ہے من بریاب کے ماتف خود وان اور اُس كے جيمات فيے ہوئے ہوتے ہي اور بيتاب د هوميس كے مرامك كا مواہد كيونكه روشنى رخ جبيات كى سطول سيمنعكس بوط تى ، عليف نماس امتعان كيا جائے توہیموگلو بن دہمو بیت میں بیٹیاب سنراور زر وحصہ میں و و وصار یا ل ظاہر کر آج جُوكة كسى ببيركلوبن كي ما تعمن عقل بين اوروه طيف كي سرخ بسرے كى طرف ايك اور دىھارى ويا ہے جو كەمىت تهيوكلوبن كانتجے ، آخرالذكراكسي بموكلوبن ير يثاب كي الثركانيتي هيئة بيثاب مي البيومن موقام يخفيف ترح لوام عالب الم جیات کی بہت تحوظی تعدا دمتک موتی ہے ، ہمین گریس مسکانے لگتی ہے اور کلابون پٹیاب میں خارج ہوجاتی ہے۔ الیم حالتوں میں بروٹمین جوکہ بیٹیاب میں یا کی صباتی ے کلا بیولن موتی ہے نہ کہ معملی البیوس (serum albumin) ۔

جیات کا برنی آلاف (۵ مریا شیل گی) متعدد حالات میں واقع جو ا ہے، ۔ (۱) بعض سموم کے فعل ہے، مثلاً کلوریٹ آف بڑا سیم کی بڑی مقدار ول پائر و گیا لک آیٹ (pyrogallic acid) 'آرمینی ورشد بائڈروبن (arseniuretted) ہے۔ (۲) ناموافق خون کے نقل ادم الموام اور نیفتخال (naphthol) ہے۔ (۲) ناموافق خون کے نقل ادم سے۔ (۳) بیش کی انتہائی صدو و میں محشف سے بصیبے کہ حرقہ (burn) یا بالا اور سے موقد سے معتدل درج کی ہموگلو بن ومو بہت بیدا بوسکتی ہے۔ (۵) میلر یا تب موقد سے معتدل درج کی ہموگلو بن ومو بہت بیدا بوسکتی ہے۔ (۵) میلر یا بولیت ۔ (۷) نہا بہت خفیف سی وَم باشد گی تندرست افراو کے خون میں ملکتی بولیت ۔ (۲) ووری ہموگلوب

دورى بموكلوبن بولتيت

(paroxysmal hæmoglobinuria)

اس مقا بلتهٔ شا ذشکایت میں ہیموگلوین بولیث ا نفرادی مملوں کی مورت میں واقع ہوتی ہے۔

بحثثِ اسباب ۔ یہ نوعمر الغوں اور پیچاس مال کی عمر کک کے او معیر ا

اشخانس میں دیکھی حاتی ہے' اور اناٹ کی سنبت ذکور میں نہبت زیا دہ عام ہے۔ جبت ہو اصابتو ل میں ملیریا ئی تستم کی سرگذشت' اور بہت سی اصابتوں میں آتھے۔ کی سرگذشت

موجود ہوتی ہے۔ حلک فوری اسب سردی کا تکشف ہو ا ہے۔

تیمش کا ابتداری مرتفع ہوما امکن ہے، گروہ طبد کم بوما تی ہے۔ اوران علامات کی مت مرف ۲ ہے۔ ۱۱ گھنے سک ہوتی ہے۔ مبعض او قات طراور طحال کھنیے کلانی مجی دیکھی جاتی ہے۔ یا تو ہلی ملامت کے معدفوراً ' یے مرف تمین یا جارگھنٹول کے بعد خون کی زنگت کا پتیاب ہوتا ہے کیکن یہ مالت بھی تموڑے ہی هرمہ کک دہتی ہے۔ چند ی کمنٹوں کے بعد مکن ہے کہ پتیاب بالکل صاف ہوجائے اور اس بی البئیوں اور بیر گلو بن : رہے ۔ اور کلول کے درمیانی و تغول میں پیتیا ب بھیشہ بالکا لمبی ہوتا ؟ یہ حملہ کے اختتام برطید کا رنگ پر قانی جعلک کا و کمھا گیاہتے اور بہت سے ملے یے بعد دگرے خار طرد موسے سے مریض بی خروملوی عدم دموست پیدا ہو جاتی ہے ۔ دودی ترد کل درارت ندارت خط ناک نہیں ۔

ہموگون برایت بدا تہ خطر ناک ہیں ۔ عملاج ۔ سروی میں کمشف سے بچنے کے لئے احتیاط اور ہا قاعد کی کے ساتھ گرم لباس استال کرنا جا ہے گرم کروں ہیں رکج ایش رکھنا چاہئے 'اور حتی الاس رات کی ہوا سے محفوظ رکھنا جا ہے ۔ ہم کے دوران میں مریمن کو بستریں رکھنا جا تھ بڑہ تھ اور پارہ کے ذریعہ کرنا جا ہے ۔ حملہ کے دوران میں مریمن کو بستریں رکھنا جا تھ

مبر منظم ولوبن ومرت وساحتي ولوبن وموب

(METHÆMOGLOBINÆMIA AND SULPHÆMOGLOBINÆMIA)

(معازا دنهاق =enterogenous cyanosis)

(نحر د عضو بتی نرس اق =microbic cyanosis)

نناذ اصا تبول می جیات کی کسی بیموگلو بن کے میں بیموگلوب اسلف بیموکلوب میں شغیر بوجائے ہے طبداور مخاطی اغت یہ کی عام کمبودی یا زراق ہیں۔ ا بوجا آھے۔

میسط میم کولومن دمویت (methemoglobinemia) بیمن ادویهٔ التحصوص اکسیا نیلائید (acetanilide) فیاسینین (phenocetin) اغینی پائرین (antipyrin) ویرونال (veronal) کے استعال سے بیدا موتی ہے اور کول تاری حاصلات (coal-tar products) کائی و بنزال وغیرو کا کام کرنے والوں میں زہر ملیے دخا ات کا استنشاق کرنے سے نیز بعض معوی خرات میں نا کیٹرائش (nitrites) سکے انجذ اب سے مب کہ انہمال ایک نمایاں ملامت موتی ہے اور

جب کہ نا مرامس کی پیدائی عفویوں مثلاً عصیہ قولونی کے سبب سے ہوسکتی ہے۔
بعض اصا تبوں میں کشر خلوی دمو بیت موجو درہی ہے اور بعض او قات محال کی کلائی
اور انتھ پاوس کی انگلیوں کی گرزشکلی مریفوں کا رنگ مہیب جا کولیٹ کی شب ہوجا کہ ہے۔ خون میں دکم پاشسید گی نہیں ظاہر ہوتی کی کرجب ات نہا بیت سیاہ موقے
ہیں۔ بالعموم نفسی تکلیف بالکل نہیں ہوتی کی گونکہ نسبتہ معوری می ہم کو گلوب کے
تغیر سے نمایاں رنگ پہلے ہوجا ہے۔ بیٹیاب موا طبی ہوتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ
سبب کو دور کیاجائے۔ اوریہ سے نسم ہوئے کی صورت میں مقنی اوریہ اور معدے
کی تغیل کی ضورت لاحق ہوجاتی ہے۔ کہ موت خرن کی آگیجن بردار توت کی
کی مورت بی مواتی ہوجاتی ہے۔ کو نکہ موت خرن کی آگیجن بردار توت کی
سبب کو دور کیاجائے۔ اوریہ سے نسم ہوئے کی صورت میں مقنی اوریہ اور معدے
کی تغیل کی ضرورت لاحق ہوجاتی ہے کہ لہذا آگیجن کا ملسل انتعمال ترجیجا ایک خیمہ کے ذراجہ
کی کا داجا سے نے خون جین کھنٹوں کے معد تو دبخود طبعی ہوجا آ ہے۔

میٹ ہیموگلوبن دمویت کی طرح کید مالت می اپنی لائن کے مشتقات میں ایشی لائٹ (phenacetine) کے تسم سے پیڈم تی مثلاً اسٹینی لائڈ (acetanilide) کے تسم سے پیڈم تی مثلاً اسٹینی لائڈ (phenacetine) کے تسم سے پیڈم تی کہ جس کے ساقت شایر قبض کی وجہ سے معادیں گندھک کے مرکبات کی کوین بائی جاتی ہے۔ لیکن مکن ہے وہ ایک معادق معاذ اوز راف ہو کو کھیت معادمی خود خود

تیادستده زهرون کانیتی دو اگری است انکارکیا گیائے۔ یہ مالت میسالیم کلوبن دمویت کی نسبت بببت زیا ده ویر سے زائل ہوتی ہے اور ہفتے اور سمینے لگ جاتے ہیں۔ لہندا اگر کول تاری ا دو یہ کی کمبی خوراکوں کے بعید زراق ہیدا موتو يديقيني امري كداس كاسبب سلف ميث أيموكلوس بوز كميث مي كلوب اكد مريش م سنف ميت ميركون مويت ورسيت ميوكلوري موست كي بهزال موجود كي ميان كي كمي 88)-

إندار - به مض مهلك نبيس بولا. سلاج ۔ قبض کے لئے مسہل دینے جا ہئیں۔ برسدہ وانتوں کونکا و بناجائے ۔ حملہ کے دوران میں آئے ہمن کا استعمال کرنا جا ہمنے، بالتحصو**س من ت**ت جب کے مریف ہے موش ہو۔

بربيورا

(نزفی مزاج) سلام کا اطلاق اس مرصی حالت پر کیاجا آہے جس میں جدیا مخاطی اغث یہ کے بنیجے متعد دِ نز فات ِ واقع ہو کر کم و بیش ارغوا بی رنگ تھے وَ دورہ بيدا بوجات زير يوسيلي و كي كياب كرايسي بي نزفات متعد وامراض مستلاً قرمزيه (scarlatina) نحسره بيجيك النفس وماغي شخاعي سب اورطاعون يب بواكرتنه بي - نيز كمبت طرك ما د اصفر ذ بول اور مين مويت (leukemia) غير كويني عدم دمويت (aplastic anæmia) اورخبيث لحمي سلمي باليدول مي ارت البتاب درون قلب اورقلب كے دوسرے امرامن ميں - آور معن صبى مراب مثلاً مبرال تفاع (tabes dorsalis) ميں - نيزنز فاست كا ذكر نر يغيب (hæmophilia) مرض فی جکن مرض برآ نث اور اسکروی (scurvy) کے تعلق میں کما جائے گا۔ اِ ہرسے تسم موسے کے داست نتیجے کے طور پر نزیفیت یواسم آیوڈائڈ کی بیش متاو دینے کسے یا بنیزال (benzol) یا بنس کے خاص مر بنیزین (benzene) کے تجارتی استمال (انته راکانے اور استفاق کرنے) - ،

امراصیات - برینورای شدیداصاتبون بی حموی زماند که دوران یک خون بی ساید و میان بی خون بی ساید و میان بنده سمید ملی و کیا جاسکتا به اور مهلک اسانتون بی خون بی ساید که خون سے اس کی کا سنت کی جاسکتی ہے ۔ اور طی کا در حله اکثر مسند بی کوئون سے دیگین بوتا ہے کہ بی عفویہ اس مرض کا سیب میں بوتا ہے کہ بی عفویہ بندی کی موز بندی کی کوئی سیب میکن ہے کہ اس کاسم اس طرح عل کرتا موکد عروق شعریه کی موز بندی کی کوئی راجت کا موجد اور سرخ جسیات کی پارجت کا موجد بہم مینجیا تا مود - بعض بر برکوراحسا سیتی صل میں (Ilergic shock) سے بیما بوجاتے میں ۔

به من بلک این شدید موتونون نانوی عدم دمو بیت کے خصا کص ظاہر کرتاہے۔
ایک جیمن سے لئے ہوئے نون کے پہلے قطرے کا عرصۂ ترویب طبی ہوتا ہے،
لیکن مبد کے قطروں کا عرصۂ ترویب ایک منٹ سے زائد ہوتا ہے (2)۔ ناید
یہی وجہ ہے کہ مع عرصہ اداء " (ملاحظہ ہوصفی 423) زیادہ ہوتا ہے مہم سے اِ مہزون جم میں اور رامصل کو اِ ہرریسنے دیتا ہے (26,29)۔
جم جائے کے بعد تعدکا سکر آ بنیں اور رامصل کو اِ ہرریسنے دیتا ہے (26,29)۔
لب عظام کوئی ممیز خصائص نہیں ظاہر کرتا۔ اگر اُس پر مطالبات کا زیادہ اربرا آ

غیر کمو بنی ہو جائے ۔

ام اتسام کے بریکو را کی اکثریت میں دموی لوجیے غیر**رج**ود **یا کم ہوجاتے** ہیں[مینے فی کمب کی مبلر ، (طبعی تعداد . . . ، ۲ سے ، هیک موتی تبعى] إس عالت كو قلت خليات علقى (thrombocytopenia) كيترين بادی انظریں کس کویریئورا کی توجیہ کرنے کے لئے کا فی مجھا حاسکتا ہے۔ کسیکٹن تلت خلیات علتی بدات خوداس کے لئے کافی نبیں ہے کیونکہ اسکروی میں حس س إدااً ت موتے من اور ہوناک کے بر بوامی لوجے اور عرصه جات اداروونول طبی ہوتے ہیں۔ آپس کی توجیہ غالباً یہ ہے کہ تمام پر پیوراؤں میں در ط**ری تغر**ر صروری عالم ہے' اور یہ لوحیو ل کی کمی کے بغیر بھی واقع بوسکتا ہے' لیکن جو کمہ لوجیے اور درطی خلیے وونوں لمحافاتو لمید کے اہم قربی تعلق رکھتے ہیں المدازمر (جرخواہ لوحيش مسل مويا بنيال دغير واطهه براهلي ورجوك سي يبلي عمواً لوحيول كو سلف کرد تناہے (22)- اگرمرف اسنے ہی لوحیکش مصل کا انتراب کیا جائے کم م سے لوجیے لف ہومائی تو پر برکورانہیں پیدا ہوتا میا کیے قلت طلیات علقی اس مون کی فروری مصوصیت نہیں موسکتی۔ دوسری رائے جومیش کی گئی ہے الیکن میں کی تربی سہادت سے تصدیق ہیں ہوتی ایم ہدکدار دے اس کے فایب موطق ہیں کہ وہ دامی عروق میں کے نعول کو التزاق کے فد می*یہ بُرِ کرتے ہیں۔ او جیے آ*ت سے يدا بوتے بي اورجب لئب غير كونني موائب تووه مي فيرموج و موتے بي - أعلي لمال لمف كرتى ہے اور محال كا استيصال كرنے سے اُن كى تعداد كر موصة كاس مراه جاتی ہے کیکن یوز إرتى محض كي عرصيد كے لئے ہى موتى ہے۔

علامات - بربگورائی خفیف ترین شکلول (ساد در بو بیکوسرا (P. simplex) میں آبی ہوتا ہے کو جم کے مختلف عصول میں چیکے سرم المہر۔ سرخ کا نیلکول ارخوانی رنگ کے وصعے بیدا ہوجاتے ہیں ۔ وہ گول ہوتے ہیں تفایل ایک کی میٹرسے کے کرلے اینج مک مختلف ہوتے ہیں واب سے غائب ہنیں ہو ۔ ا اور جب ایسی جھوٹی جا مت کے ہوتے ہیں تو عمواً سطح سے اوپر ایجرے ہوئے ہیں۔ موتے ۔ وہ جسم پر مبر مگر پیلیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہروصد کچھ عرضہ کے بعد بھولی یا زر د جملک کا ہو کر کمال جا آ ہے اور نسبتہ بڑی جکہتیاں بدیبی طور برتغبرات کے وہی مرارع ملے کرتی ہیں جو ایک کوفت کی کے لئے مفسوس وممتیز ہیں ۔ اس نوران کے ساتھ بنیکی اختلال نہایت کم ہوتا ہے ۔ ممن ہے کہ مریض کا رنگ سٹ حب ہوا وراس کی اسٹ تہا جاتی رہے ۔ شغا مو گا وس سے بیس ون تک میں ہوجاتی ہے۔

شدیداصا بتول مین زفات زیاده وسیع موننے میں اور عمن ہے کہ زیر طب

نون کے بڑے تو دے مِلِد کو اوپر اُ ٹھا دیں ' اور مُملّف مخاطی اَ مُضید سے جی
اوما ہوتا ہے (خزی پیر پئو وا = P. hæmorrhagica)۔ جنا نجہ اُک ' وہن
محے ' اور آ نول ' گرول ' سُوانی تناملی اعفا ' اور کھی بھی شی شائے نجاطی
محے ون آ کمی ہے۔ اِسکروی کی طرح مموڑھے کھی متورم نہیں ہوتے الیکن
بعض اوقات اُن کے جرم میں ایک نزفی واغ دکھلائی و تناہے۔ زیادہ سندیہ
اما نول میں گن ہے کہ میں است نرفی واغ دکھلائی و تناہے۔ زیادہ سندیہ
اما نول میں گن ہے کہ میں است نرفی واغ دکھلائی و تناہے۔ انبطاح طادی ہوجا آ
می طی اغرام میں موجا آ ہے میکن ہے کہ امتحان بعد الممات سے تفریعاً مت منافی اُنہ ہوجا اُنہ میں ' بلیکورائی ومور' با رمطون ' سحایا' بلکھیمیٹ ول اور
سب ہوجائے۔ ممائی میں ' بلیکورائی ومور' با رمطون ' سحایا' بلکھیمیٹ ول اور
سب ہوجائے۔ ممائی میں ایک مناطی کا اِمنا شد اور تفریح نبی اِلَیاہے' جس کے
انتھا باور التاب بار بطون بیدا ہوجائے ہیں۔ خاطف ہو سُوول اور الساسا میں اور تفری نہیں۔ خاطف ہو سُوول اور الساسا کا نام بعض الیہ اس سے بہت سی اصابیمی و مزید (scarlatina) کے معروطاتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی اصابیمی و مزید (scarlatina) کے معروف ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت سی اصابیمی و مزید (scarlatina) کو میں ہیں۔

می جد کے جربی اور (Henoch's purpura) میں جلد کے ضراحماری استی (erythematous) ورم ہوسکتے رہیں جو اکثر بڑے و سبع روتے ہیں اور جن میں نزف الکل نہیں ہوتا - ال کے ساتھ منعملی در دیا اورام در وَتَلَم کی صفحہ تنظے اور آنت سے نزف اور وم لوایت یائے جاتے ہیں - کھال قدر نے میں پدیر ہوتی ہے اور ہم نئول یا مہینول کے دوران یں جس پدیر ہوتی ہے اور ہم نئول یا مہینول کے دوران یں باربار کر رہوتی ہے ۔ ان اصابوں میں علامات کی ترتیب زمانی ہمت کے مختلف

مِوتی ہے 'اور یر بگورائی ٹورا*ن اکثر آخر کے ساتھ ظاہر ہو* آہے اور یہ جیشہ نہیں ہوآکہ یہ زیادہ وسیع ہو۔ اس سے اس امرکی توجیہ موتی ہے کہ اس میں معموموت اِ قلت طبات طعی کیوان مفغود رموتی ہے۔ اس کے برعکس ورومفاصل کے طبورات بمومانی سے صادر زیت کی تشخیص موجاسے کا امکان ہے، اور سبت سی مثالوں میں کم علامات نمایاں ترین ہوتے ہیں۔ بیناسمیر در دسٹکو سنے اور تمدّ معرى تسدو (intestinal obstruction) ما التهاب زائدة ووويد كاكمان موسكة ہے۔ یا یہی علایات اور اِن کے مائد ا نت سے نزف اور ایک میں یذیر دمولی اگر بجيرين مول تو انغما و الامعا ر (intussusception) كي شخيص موجا تي ره يبب ننكمي علامات بنهاموجود مول توشكم شكافي كاعليه كرو إكباب اورمغيروضد انغا وانت کا ایک ایباحصه ثابت مواہ جوانفعیا ہی خون سے در رئیختہ تھا۔ ممکن ہے کہ پشاب میں بہت البیّومن ہو اورخون یا سائک اخالص خون مکن ہے ہو انہو۔ ے ہوتی ہیں۔ دوسری اصابتیں شغایاب **ہوجاتی ہ**ر کیکن ان مي البيومن بوليت مهمينوب جارى رومكتي بعد سرندي موملوط (rheumatic) (purpura میں جو کہ عالیاً ہمنیاک کے بر پیوراکی ایک ضیف شکل ہے ماد منصلی التهاب نمایا ن بوآ ہے اور اس کے ساتھ ری بریکوری احمرارا ورسٹری ہوتے ہیں ب درول قليه اور البتهاب ترو قليه بول .

کے تمام کمن اسب بو خارج از بحث کو بناچاہے۔ اسکو وی کی شناخت موڑھوں کی اسمبی حالت کو حارج از بحث کو بناچاہیے۔ اسکو وی کی شناخت موڑھوں کی اسمبی حالت کو الجد اروائی تعلق (fascial indurations) سے ہوتی ہے۔ مکن ہے کہ خبیت کی سلعی سرسو لیاں (malignant سے میں قدر مشاہرت بیش کریں۔ یہ یا ورکھنا بھی اجماع کہ دوست میں اوقات غربیوں کے نیچ کیاں گور برا لیس کے مرے کے یا ورکھنا بھی اجماع العنب کرتے ہیں۔ یہ وصفے کیاں طور برا لیس کے مرے کے برار ہوتے ہیں۔ مند کا شفہ ہم ہنچا ہی۔ برابر ہوتے ہیں۔ صفط العنب بیانز فی مزاج کے لئے ایک مغید کا شفہ ہم ہنچا ہی۔ بازو برا سنا دیا و کہ جو بعن کو مطموس کو دیے لئے کا فی ہو دو منٹ یک مل میں اللہ بازو برا سنا دیا و کہ جو بعن کو مطموس کو دیے لئے کا فی ہو دو منٹ یک مل میں اللہ بآنے۔ اگر کا شغه مثبت موتومیش با زویر پر پنیورا نمودار ہوجا آہے ہو کہ بسا او قات رسع ہوتا ہے۔

شدیداصانبول بینقل الدم مغید موسکتاب اور س مفروضه کی بنا پرکه طال دموی لوحیول کو گلیا ہے اور س سے طال دموی لوحیول کو گلیا ہے اور س سے نفع بخش تبائج مامل بوئے ہیں (27) - حال بی میں یدادعاد کیا گیا ہے کہ المیکار بسالہ اسٹار (ascorbic acid) ر طاحظ ہوا سکروی کے اشرابات سے تمام اصانبول بی فائدہ بو تو ان نظر بات کی نظر شریخ بہ سے یہ میے نابت ہو تو ان نظر بات کی نظر شریخ کے متعلق مانے جاتے ہیں ۔

نزلفتيت

(HÆMOPHILIA)

نزینیت ایک مون ہے جو تغریباً تما منز مرود تک محدود ہے اورس کا ممیر خاصہ او اور سے کا رمجان ہے جوخود بخود ہو اِ صرب سے ہو۔ پرمن محدوثی مواکجہ

AAQ

اودعورت کے ذریعہ سے نتقل ہو آئے 'جوخود اس من سے باکل غیر متاثر ہوتی ہے' اوریہ مرف مروکو او ف کر اہے جو کہ ''روائی''('' bleeder '') کہلا آہے۔ ان امور میں یکاذب بیش برورشی عضلی شکل pseudo-hypertrophue muscular (pseudo-hypertrophue muscular سے مثابہ ہوتا ہے۔

امراضیات ۔ نون کامرمہ ترویب بہت اخرطام کراہے ، جومکن ہے كريره كرجاليس منت يازياده بمومائ لهذاكسي ميوث سے نزن كومبي حوا تفاق أ ہوجائے کوئی چنز نہیں روک سکتی۔ بروتھ امبین (pro-thrombin) کی کوئ خا انمركه سائمه بونى بيداكولوميه جوير وتعرامين بيداكرت بي طبي تعدادس موجود ہوتے ہیں اوران کا التز اق مجی لمبی ہوتا ہے۔ بتعرام بوکائنیں (thrombokinase) ليسن فاكبرين خميركا ووسراميش رومبى كافى مقدادي موجود بواب (8) كسيكن پروتمامین کا فائبرین نمیرنگ شغیر **و نامی نهایت تا** خیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگرایک استها أني مالت بيداكردي جائة توعرمئة ترويب بهت كم بوجاتا ها اورعلاج يا اسى عدفائده أيما يا ما ياس - قلب اورشرائين كاشمى انحطاط الجربيض اصابول ب یا با تا ہے افا الما الله علی عدم دمویت کا متیمہ جو تاہیے ۔ بعض دوسری حالتوں کونریز بن سے متفرق کرنا سروری ہے جنا کیے ایک اکتبالی قسم ہے جوکہ ا تشک فائسر ینومن کی ای یل الکلس نزیفیت میں نیت وموی کمیلیم مور اور ختیقی قلت خلیات علقی ہے تعلق ركمتي علايه) - يطالتين ان مونث داميات كي توجيه كرتي بين حوكه كالمحلني مب علامات۔ یمرا زندگی کے بیلےسال مین طاہر موجا تے ہیں اگر دیسوں ا وقات ان میں سات ای ٹوسال کات اخیر جوجاتی ہے۔ نہایت شدید درجہیں ا^ک مسور معول اور وان سيخ اور نسبة كم عام طور رمود سي ميسيد ول ما وعنائ ناس سيخور خود نرف واقع بوتيرس مغض اوقات ان سية بيلي ترى كا احاس وا الراج - نهايت خفيف س عَلَي مثلًا جِمَك كالكِدلكان وانع أكمار الدين میران اُنگی کے کٹ مانے کے بعد خطرناک بلد مبلک زفات واقع ہوئے۔ 'نقعانوں کے علاوہ خین سی جوٹوں سے طبہ کے نیچے آسانی نرٹ موکر ر^{مت ای} کاربولیاں بداہوماتی ہیں۔مفاصل کے زلا بی مبغوں اور انعموس کھنے کے جائیں

ہے۔ یہ نہایت عام طور پرسات اور حیوہ سال کی مروں کے درمیان موۃ ہی اور جوٹوں سے یاسدی ارطوبت میں مشف سے پیدا ہوما آ ہے۔ جوٹرول کی اِسس مالت كے ساتحہ تئے بھى موتى ہے۔ يہ حالت مكن ہے الحيى موجائے اليكن مير إرار عود کراتی ہے۔ یا لاخر مکن ہے کہ گردمفصلی انضا اس کی دنبہ سے مفصل جاسی انتخبیّت موما ك رعفالات كارتيتي عارضه اورتواني كلاتى عصيب كا ورو trigeminal)

(neuralgia نجی کمی نزیفیت کی بیب کیوں کے طور یر بیان کیا گیاہے -مکن ہے کہ اولا ت^ن کے ورمیا بی و تعفول میں نزیفینت کے مربیض بالکل میں

نظرة كمين كبكن نون ضايع ہوجانے سے مدم وموبیت پیدا ہوسكتی ہے۔مریض اكتشر المدرال كى ورك ببنيزے بيد نقصان ون سے بلاك بوجاتے ہيں لوداگر جوال ز ا ند کے بعد اُن کی بقائے حیات کے موقعے زیدہ بین اوسیرعریس بجی اسی طرح

. اس کا انحصاراس برہ کوخون کاعرصهٔ ترویب زیادہ یا باجا۔ ' کا جے ۔ سطمیٰ بزف کے نئے ہتہرین علاج بیہے کہ نقیطہ اومار پڑ بیکار تَفْكُولِ كُوبِهِ تَجْعِكُرُ نِكَالِ وَبِينَے كَهِ مِعِدُ قدرتِ ازه اسَا بِي خولز، مِن مِعْكُو بُي مو بُي سُرم رونی لگائی مائے۔ نیکن تا زوحیوانی افت بھی اشتال کی باسکتی ہے۔ سب سے زیادہ بقبی طریقه بیدے کرسانی کا قشب لگایا جائے۔ سائٹریٹ آ میز خون citrated بقینی طریقہ بید اور (blood کانقل ارم عرصة ترویب کو اینج سے سات دِن کے عرصہ کے لئے کم کردتیا ی فل مقيقت بها ن تك كما كيا ہے كه هرمنه وف كا يانج يا حد مكن المصول معليول معلي مقالمہ میں امتمان کرلینا چاہئے تاکہ ناگہانی ضرورت کے وقت اک میں سے کمراز کم ایک تورمیشه دستیاب بو سکے گا۔ زیادہ منفدار میں نون کے استعال کی صرورت نہلی۔ 449 اس كم تماول كم طور يرمر يك ميرانساني ولازا كانقِ الدم كرنا جاسي - ارحالت ایر خون کی گروه بندی کرنے کی صرورت نہیں۔ ب کبھی سی علایہ کی ضرورت لا حق ہوتو ايك ابتدائي نقل الدم على من لا اع بيئ - اوريد تياري حيو في سي حيوك عليه فيمل مجى كرنا مناسب ہے ۔ وس ون يہلے واس سى محمور اے كے عول كا تعن الجلداشاب كركم مريض مي أي فاطي استهداني مالت بيداكر انسبت المريقيني ب(41)-

عرصة ترويب مي كچه كمئ طركى غذا دے كر پهدا كى جاسكتى ہے ، جس طرح كه متلف عدم دمویت (42) ميں دى جاتى ہے ۔ جب لما از اكى انبيد من كلا بولن نسبت بست مو دمویت (42) ميں دى جاتى ہے ۔ جب لما از اكى انبيد من كلا بولن نسبت بواسكار كم الله كيا ہے اور در الى گرام بحر كے لئے كاميات است بواہ ہے (48) -

آگرمے بوئے جوڑ کے لئے گرم ہوائی خسل اور اللی الش کام میں لائی جا گئی ہے۔
کسی معدم س دو اکے زیراٹر انصابات کو توڑ نے ہے جمواً احتراز کیا جا جا اسے اکیونکہ
اس میں تارہ نزف کے مشروع کردینے کاخوف ہوتا ہے کیکن بیل بلا ایساحادثہ ہوئہ
انجام دیا گیاہے۔ اِس مرض کی خطر اک نوعیت پراور نسائی صنف کی وساطت سے
اس کے متقل ہوئے کے طریقہ پر نگاہ کی جائے تو یہ بریہی امرہے کہ وامی خانمانوں کی
عور توں کو سے اور نیمیں کرنی جا ہے 'گووہ خوونز یعنیت کی شکامیت زرکھتی ہوں۔

نقالتم

(BLOOD TRANSFUSION)

اس اصطلاع سے بید مراوی کہ ایک تندرست شخص رطی : " recipient")
کا نون کے کراس کا اِشراب علاج کی غرض سے ایک ربین آیا بندہ = " recipient")
کے دوران نون کے اندر کیاجائے۔ طبت میں اس علاج کے واعیا سے حب والی بیدہ (۱) سوہ نزون کے اندر کیاجائے۔ طبت میں اس علاج کے واعیا سے حب والی بیده (ectopic کی شاؤ معدی اور اثناعثہ ی قرم نویز تپ محرقہ بے محل کل (۱) سوہ نون شاؤ معدی اور اثناعثہ ی قرم نویز تپ محرقہ بے محل کی امران ورائندہ کا براز وم الا سود (melæna neonatorum) - (۱) امران مثلاً شدید بر بنورا نزیفیت ، عدم و مویت بین و مویت ۔ (۱۷) شدید سرایتیں مثلاً سادی التباب وروں قلب ۔ (۱۷) ثنایہ معنی سمات بجیسے کہ مخطور مویت ۔

وہ طریقے ذرا کا پسندیدہ ہیں جن میں معلی کی نشرطان یا ورید پرشگان وینے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے کیو کمر اُن ہیں معلی کے لئے عفونت کا خطرہ کو خفیف مگر صریح ہوتا ہے۔ اگر ایک چوڑی کھو کھلی سوئی کو مرا و راست وسطی باسلیق وریہ کے انعد داخل کر کے اُس کے ذریعہ سے خوان ماصل کیا جائے نومعطی کے لئے کو نی خطر، نہیں ہوا۔ **روئی کی نوک کو ایک ارکنساس تیمر پرنیز کرنا جایئے ا** در عدسہ باخر و بیس کی بیہ ہے۔ فاقت سے اس کا امتحال کرنا جائے۔ " سائٹریٹ طب بیت،" eitrate" (''method میں سوئی سے خوان ربر کی نلی کے ایک حمیو نئے کمڑے میں ہے. بیوکرایک المینے کے مقیم طرف کے اندر آھنے دیا جا تا ہے؛ حس میں زاز ہکٹ ید کئے ہوئے یانی ہے نائے موئے) موڈ یکم سائٹر یٹ کے موس فیصدی محلول کے . 19سی سی مون کے . . ، سی سی کے لیکے موجود ہوتے ہیں۔ بازوکے گروہ باؤ کے فریعہت۔ ہے اوکی شرح زبادہ کردی جاتی ہے۔ نون کو سارے وقت گرم رکھنا چا ہے۔ تعنین کے لیہ ا یک عقیم استوانی قیف استعال کی جاتی ہے جس میں کھتوڑا الح موجود ہو آ ہے اور ایک زبرگی المی اور میشکی اور سوئی لگی ہوئی ہوتی ہے ۔ سوئی کے قریب سیشہ کی بی كا يك مبيونا مكر اطائل كروما جا تاہے تاكہ وہ ايك دريجيہ كا كام دے اور اس كايتين رویے کے لیئے کرسو کی تھیک متعام برواخل ہوگئی ہے قیف کو ایک کھے کے لئے، نیچے تھیکا دیا جا آ ہے بیان کک کہ خون شیشہ کی نمی میں وافل ہوجائے ۔ بھراً ہے ا^ن بنیا اسٹھ کے سائٹر بٹیپڈنون سے تعبر دیا جا آپ ۔ آگ عقیمٹنیشی سی انتعال کی ماسکتی ہے آگر معطی سے خون مذربعہ امتصاص نکال کرخفیف وہا کا کے تحت مربین میں وانعل کیا جا تھے۔ اگرمعطی پرغشی طاری ہوجائے یا وہ شاحب بیرجائے یا اُسے پسینہ آنے لگے کی اگر ، کی نبض ۲۰ ہے کم ہوجائے توخون نکا کنا موتوف کر دینا طاہئے۔ فائبرین بود^ہ ا من المسلم المسام المرافز انت المج عال ہوئے ہیں النصوص را تیوں بیں ۔ فون کے اسمال سے امیدافز انت المج عال ہوئے ہیں النصوص را تیوں بیں ۔ لوم ہوتا ہے کہ *سائٹریٹیڈخون کے نسبت فائیرین ربودہ خون اپنے* انع سمّیت با ضدِّ حُراثنم خواص زماوہ حدِّثک قابم رکھتا ہے۔ سائٹریٹ بلانے کے بحا کے ج تون فیشی کے اندر برکرا آہے تو اس کو بلا یا عاتا ہے جس سے فائبرین اس خمیدہ نمی پرتۂ نشین ہوجا تی ہے' جوڈ اٹ سے **نیجے ٹیٹی کے بیندے میں جا کرمیے۔** راویر عِاتَى ہے۔ اِس فون کو اِثْراب کرنے سے پیلنے عقیمُ کا زیں سے چھان لینا جا ہے ' مُّاكِدُ فَا نُبِرِينَ كَيْ **جِيونَي حَيُونَي وَجِمِياً لِ فَارِجَ بِوَجَامِلِ** يَرُّ مَبِنَاعَتَي نَعَتَ إِلَى ("iminuno-transfusion") میں معلی کو پہلے سے شبع کر ایا ما آ ہیرکیا خوان کو

في الزجاح منيع كرلياجا تاب،

بعض احتیاطوں کوعل میں الناصروری ہے معطی کا تعالمی وازرمن دکمینا مائے اور معطی اور یا بندہ کے نو نول کی موا فقت کی تعیمین منروری ہے۔

موافقت (compatibility) الرمعلى كے فلئے ابندہ كے مصل سے ملتزق نہوں ہو اللہ كركے فليا تا ول الذكر كے مصل سے ملتزق نہوں ہو مقرق نہوں ہو مقرق نہوں ہو مقرق نہوں ہو مقرق ہوجا ہے ہوئیت فروری نہیں کیو کہ معلی کا مصل یا بندہ کے دوران خون میں کبار مرق ہوجا ہے ہوئیت کا امتحان کرنے کے لئے معلی کی انگلی سے نون کا ایک قطر ہو ہو یکی سائٹر بیٹ کے ہو، افی صدی محلول کی ایک سی سی کے اندر کرنے دیاجا تا ہے اور شاک سے مقلین کا ایک قطر سے میں ملا دیاجا ہے اور سی کا خرو بینی امتحان التراق کو دیکھنے کے لئے کیاجا اسے ۔ جند منظ کے بعد اِس شریعہ جارکروم کی مصر نے از اور کی ترتیب جارکروم کی میں حسب ذیل کی گئی ہے :۔

	ىل				
گرده ۲	گوه ۳	گروه ۲	گرده ۱		
+	+	+	-	گوه ا	
+	+	•	-	گروه ۲	ت ظ <i>ل</i> ات د
	-	+		گرده ۳	•
-	4	1	-	گوه سم	

چانچ د کمیاحائے گاک اگر گرده م اور م کے مصل نخور د کھے جائیں توکسی نے مورث خص کے خلیوں کا الزاق کسی موٹ خص کے خلیوں کا الزاق کسی

ایک سیمی واقع نیس بونا اوراسی واسط گروه به که ارکان بیش معطبول کے طویر کام دے سکتے ہیں کیکن عمواً زیا وہ بے خطرط یقہ ہی ہے کہ معلی اور یا بنده دونول ایک کام دے سکتے ہیں کی کہ معلی اور یا بنده دونول ایک کام دے سکتے ہیں گئی ہیں۔ یہ بتلا یا گیاہے کہ ایک مجا را لوقتی کا شغه (time-control test) قرین مصلحت ہے۔ یا بنده کے معل کو معود ف تاموا فلت کے خوان سے لیئے ہوئے ہیات کے ساتھ آمیز کیا جا ہے۔ کو ساتھ آمیز کیا جا ہے۔ اور الزات میں جو عرصہ لگتا ہے۔ س کو طاحظہ کیا جا تا ہے۔ یہ دومعلی کے طایات کو سمی اسی عرصہ تک و کیمتے رہنا ہیاہے۔ یہ اور این جو کہ بنظا ہر موافق خوتی ہے اس طریقہ سے کم ہوجاتی ہے۔ اور الزات جو کہ بنظا ہر موافق خوتی ہے اس طریقہ سے کم ہوجاتی ہے۔ اس

خون كانعام لورترسميت

(REACTION OF THE BLOOD AND ACIDOSIS)

اور الأراكس روانات (Com) كراركاز بربواجيد جب تعالى تند في بوتوائدروب الاراكس روانات (Com) كراركوان بربواجيد جب تعالى تند في بوتوائدروب الدراكس روانات كاارتكاز ساوي بوتاجيد جب وه ترشي بوتا جديد وانات كاارتكاز ساوي بوتاجيد جب وه ترشي بوتاجيد وانات كاارتكاز ساوي بوتاجيد جب وه ترشي بوتاجيد اورجاني بيت به الاركان ساح دونوں كا ماصل مزب بيشمتنل رہتا ہے۔ تعدیلی نظیر ادرجانی بیش برید ایس الا بركیا جا ایس الا بركیا جا ایس الا بركیا جا ایس الا بركیا جا ایس الا برکیا جا ایس الا برکیا جا ایس الا برکیا جا ایس الا برکیا جا ایس بربوتا ہے۔ ان امول کو طل بوت کی وجد سے تعدیلیت سے کسی قدر قلوی جا نب بربوتا ہے۔ ان امول کو طریقت عمرة اختیار کیا جا آجو کہ تعدیلی نقط برکیا جا ایس کر میں کو تعدیلی انتظار کیا جا آجو کہ تعدیلی نقط برکیا جا ایس کہ تعدیلی نقط برکیا جا ایس کہ تعدیلی کو تعدیلی کو تعدیل کو تو تعدیل کو تعدی

CO₃ متقل × بان كاربزيك كاانكاز

451

بب که ، CO کا دباؤخون میں طرمشدہ ، CO کے تناسب سے ہوتا ہے ملی کا کا میں سے موتا ہے ملی کا کا میں سے رائے ہوتا ہے میں کا دباؤ اس سے خدا کم ہوتا ہے کہ متنا ہیں پیروں کی مجافز و میں در دباؤ ہوتا ہے۔ اس ما وا میں انتقلافات بہتر کی طور پر مندر جو ذیل جدول میں دیکھے جا گئے ہیں :۔۔

مدول ١- ترشه ١ ساس توازن مختل هو ف كى شاليس

الم المحدة المائي الموادن المحادث الموادن المرافط المحادث المحدد المحادث المحدد المحدد

ا راس کا نقصان ۔ (حب) نم بادتی ۔ اسساسس (NaHCO) یا اسکانی اسال (شکلاً سوڈیم سٹریٹ) ؛ فراط نگلنا ۔ تریشہ کا نقصان شلاً معدی ولونی الو

جبیاک ۲ (و) میں تبایا گیا ہے ہی چیز اِئی کار بونیٹ کے الٹکازی کی سے جی پیدا موجاتی ہے - فلی دمو میت (alkalæmia) کی اصطلاح سس کی برعکس مالت کے لئے استعال کی جاتی ہے جس میں Ca غیر طبی لوریر کم موجاتا ہے ۔جیباکہ

ا۔ ، CO کوشائر کرنے والی۔ (ل) نم یا دنی ۔ زیادہ کویں ، ۔ تندور را ۔ کمی اخراج ۔ تنفنی مرکز کا مخدرات اینید کی وج سے بیت ہوجانا ۔ ننفس میں ماخلات ہونا (قلب یا بھیچٹروں کے مرض کی وقتے)۔ دوں ۔ میں سائش لینا۔

(ب) مکی ۔ زائر نفس ہے۔ اراوی ا برٹیر یا بیں جذباتی کرزمین محیطی بہیات کے نتیجہ کے طور پر حمیات میں کمبندار تفاق پُرخانفی قلبی بُہر میں ۔ ا (جب) میں بتا اگیا ہے یہ و CO کی کی سے بیدا ہوجاتی ہے یا جیا کہ (جب) ہیں بتا اگیا ہے یا ہوباتی ہے۔ یہ ایک خنیف بتا یا گیا ہے یا کی کار بونیٹ کی زیا وتی سے بیدا ہوجاتی ہے۔ یہ ایک خنیف طاک لمندار تفاعات بڑ اور زور دار تنفس تی وج سے جسم سے و CO وصل کر خارج ہوجائے کے بعد بید ا ہوتی ہے (بے دخانی) (ائب) اور بعض اوقات کرز (tetany) کی حالت میں تھی (طلاحظہ ہوصفیہ 488)۔ یقلی کی بڑی مقداری لیے نے بعد بھی واقع ہوجاتی ہے (۲ مب) میں سے مشکر کی برداشت کی کمی اور کیتونیت ہوجاتی ہے۔

تُر شد سمیت الم (acidosis) کی اصطلاح کو ابتدائم جسم کے اندلہ اکسیٹواکیسٹیک ایسٹر اور مثا آکسی ہوٹا کرک ایٹ کی بدائش اور مثا آکسی ہوٹا کرک ایٹ کی بدائش اور مثا آکسی ہوٹا کرک ایٹ کیا گیا تھا' جو ذیا بطیس میں ہواگرا ہے۔ اب اس حالت کو کمیتونیت (ketosis) کہتے ہیں۔ نسبتہ حال ہی میں تریشک سمیت کی اصطلاح کو قلوی محفوظ کی کمی کے متراوف کے طور پر انتخال کیا گیا ہے' خواہ یہ کی کسی می طریقہ سے بیدا ہوگئی ہو۔ لیکن وور سے صنفین سے اس المطلاح کو فلوی کو نا مرکر ہے کے لئے انتخال کیا ہے' جو ایک بالکل

مختلف جبیب زے۔ اسطلاحات کے اِس خلط لمط کے باحث بترین ہی ہے کہ تُرشہ می بیائش کے علی کو فل ہر کرنے تُرشہ می بیائش کے علی کو فل ہر کرنے کے لئے اور قلوی کشر دے (alkalosis) کی اصطلاح کو فلی کی بیدائش کے اُل کو فلا مرکز سنے کے لئے استعال کیاجائے۔

مندرج بالا تصریحات بهر کے مبض عام اقعام کے اسا ب بیرخورکرتے وقت
اہمیت رکھتی ہیں۔ نفاخ 'و مداور شعبی التہا ب میں اور دسولیوں کے باحث پیاا شدہ شبی نسدد میں جب کہ اِن حالتوں کے ساتھ بہر موجود ہوئون کے اندر وقل میں اور کے انجاع کے باعث نایاں ترشہ دمویت موجود ہوتی ہے (حبد ول میں الله) ایسی حالتوں میں جب کہ اِن آگ کہ اُن ایسی حالتوں میں جب کہ اِن آگ کہ اُن ایسی حالتوں میں جب کہ اِن میں ہوسکتی ۔ مکن ہے کہ اِن میں سے بعض حالتوں میں آگر جب کی قالت مجی ٹہر کی پیائش میں صدایتی ہو نون کا قلم کی معفی خارج ہوت رہا وہ ہوجا آ ہے کیونکہ اساس معفی خارج ہوت رہا وہ ہوجا آ ہے کیونکہ اساس بافتوں سے خون میں منتشر ہوجا تے ہیں۔

مطرانی مرض (mitral disease) کے بہر میں زیادتی تغنس کی وجہ سے
کاربن ڈائی آکسائڈ (CO₃) کر ہو جا آہے لہذا قلی وموبیت موج و ہوتی ہے (او ب) .
قلوی محفوظ طبی ہوتا ہے 'بشرط کی کوئی نہایت دسیع عام اُذبیا موج و نہو۔ آخرالذکر
کی موج دگی میں مکن ہے کہ قلوی محفوظ کم ہوجائے۔

ریریاتی ایمیت رکھنے والی ووری مالتوں میں ترشہ وموسی موجود ہوسکتی ہے ، یہ مالتیں کیتونیت مرجود ہوسکتی ہوریا وموست اور انشناج ایسکتی ہے ، یہ مالتیں کیتونیت مرحن با میں نہائتی یوریا وموست اور انشناج اکسی بیکٹا رکسا ایسڈ اور بیٹا آکسی بیکٹا رکسا ایسڈ کا اجتماع ترشہ وموست کا اولی سبب ہوتا ہے ۔ یہ مرکز نفس کو بہتے بین جس سے نفس زیاوہ ہو کر کا رہن ڈائی آک کا دوسا تھ ہی قلوی محفوظ ہی کی بوجاتا ہے ۔ لین کارب وائی آگا گئی مالیت کو ایک تا ایس کے ماحد نہیں ہوتی جانجہ بالک اکتابی درجوں میں ہوتی ہے ذیابی کی تا اس کے ماحد نہیں ہوتی جانجہ بالک اکتابی درجوں میں ہوتی میں کھے ذیابی نا پی جاسکتی ہے ۔ آخر درجوں میں تو ماکے آخاز کے زمانہ میں مکن ہے کہ نہا میت شدید

درجہ کی ترشد دمو بیت واقع ہوجائے (۷٬۴) فرابطیس کے بیان میں کیتو نبیت برمز بدخود کیاجائے گا۔ پوریا دمویت اُ اُذیا ئی التِهاب گردهٔ التِهاب گروه اور ا نشناج کی ترشہ دمو بیت بھی غالباً است نرشوں کے اجلاے کے إعث بیدا ہوجاتی ہے ' الخصوص فاسفیٹ اورسلغیٹ روا نوں کے اجست ماع سے۔ یوریا دموبیت سیکے تواکی ایک اصابت میں (۴) لی) مونت سے تھوڑے عرصه ببلے pu pu و عقا۔ نفاخ کی ایک اصابت می میں میں کارب والی آگات كا اختباس تما (ا و) موت سع جند بفتة يهين بب كدم يض كالل بوش مي جنا مید تا تھا مو ۲۲ و عقعا۔ بس یہ بہت مشکوک ہے کہ آیا ترشہ وموبیت مات يؤياً دُموتِي قوا كاسبب ہوتی ہے، كيونكه نفاخي مريض كاخون زيا وہ ترشيُ تمسا ۔ ز ما وه اغلب پیهه که قو ماخون می معبوس سننده ترشکی اشیاء کی ز مربلی نوعییت کے باعث ہوتا ہے۔ اِسی نظریه کا اِطلاق کمتیونیت پر ہوسکتا ہے، کیو ککہ اسس عالت میں ایٹوا کیٹک کے سالمہ کی ساخت سے اِس امر کی اچھی شہاوت کمتی ہے کہ یہ بدات ایک زمرے (Hurtley & Trevan)۔طبی علم می اور ڈا توی منقبض گروے (secondary contracted kidney) میں موریا دمویت طاری ہونے سے بہت پہلے قلوی محفوظ کی قابل پیایش کی داتے ہوجاتی ہے۔ کیٹر طوی ومویت میں اور گیس کُٹ گرین میں اور فا لبا مختلف حموی حالتوں میں مبی قسلوی محفوظ کم ہوجا آہے۔

رجب کے در بید معدی قولونی ناسور (۴ ب) کے در بید معدہ سے نرشر منائع بوجائے قامدی قولونی ناسور (۴ ب) کے در بید معدہ سے نرشر منائع بوجائے تو قلوی محفوظ برھ کر قلوی دمویت بیدا ہوجاتی ہے ۔ اسی طرح مس طرح کہ قلمیاں سکلنے کے جد ایک نانوی کمیتونیت بیدا ہوجاتی ہے ۔ اسی طرح مس طرح کہ قلمیاں سکلنے کے جد اور قلوی دمویت کے با وجود بیٹیا ب ترشکی رہتا ہے (87) کیونکہ کمے ضائع ہوجاتا

-(47) 4

فون کے درمیان رکھنے کے لئے منتف میکائے کا کے خات منتف میکائے کا کے خات میں۔ گردول کی راہ سے ترشہ دوطرح سے خارج ہوتا ہے:۔ (لو)۔ اس کے مقالمے میں ترشی فاسفیٹ کی زیادتی کی وجہ سے پیٹیا ب خون کی نمبت

زیا ده ترشکی د بتا ہے۔ رب) ایمونیا پیدا ہوتی ہے اور یہ ترشوں کے ساتھ مرفی ہو کر تعدیی ملی ت بنا وہی ہے 'جوکہ خارج ہوجاتے ہیں۔ جنا نج ببتیاب کی ایمونیا بھر کر تعدیی ملی ت بنا وہی ہے 'جوکہ خارج ہوجاتے ہیں۔ جنا نج ببتیاب کی ایمونیا بھریں اور کمبندار تفاعات بروافع ہوتا ہے جہاں ، CO کا دباؤ ببتی نفسی کی وہ سریں اور کمبندار تفاعات بروافع ہوتا ہے جہاں ، CO کا دباؤ ببتی نفسی کی وہ سے کھیلے جاتا ہے (۱' ب) ۔ بھرگروول کی را ہ سے قلی عنا ہے ہوتی ہے اور قلوی مختلط کا کہ ہو کر قلوی ومویت گھٹ جاتی ہے۔ (د) قلوی مختلط کا کے تغیرات روکئی کہ ہوگر قلوی اور اساسات لینے اور لینے کی طاقت بھی مثلاً قلی بھٹے کے مبد کو تا با با م

مانس كابچول جانا ترشه دمويت كى ايك فيتى د لالت ب ليكن يه امور ذيل كنه بام يت موسكتا ہے و الف) أسيحن كى احتياج (ب معکوس ننل کے طور پر حوکہ سنا بداولی مرض قلب کی حالت نبیں ہوتا ہے جس میں هنه ريب ووران خون كومه و وتاهيم- (جع) منفسي مركز كي مقابي زان (د) ترشه ونمو ببت وخون من كار مَن وا ويُ اكسارا ليا البستة ترشه كي زياد تي . (اللف) م بِينْ بِي غَالبًا كَبُودِي يَازِراقَ طَاهِر بِوكا۔ (هب) تنفس تيز بِيو اَهِي اور مرضِ فلب كے علامات موجود مول كے ۔ (1) درون تمجى مرض كے علامات موجود مول كے شلا و اغی نزف اورمریض غالباً ہے موشس موگا۔ (y) جہاں اولی ضریب شنم مفقوم ہو جو غالباً کاربن ڈائی آکا ٹری زیا دتی کے باعث کرشہ ومویت بیدا کروبیت ییر ولج تنفس کی زیا دتی غالباً خون کے اند ثنا بت ترشہ کی زیا وتی کے باعث ہوتی ہے ۔ تنفس اکی^ن آ مبتیہ اور گہرے ہوتے ہیں نیا بہت ترشہ کی مقدار کا**میج ترک** ا يتلوى محفوظ كى ائت تخين سيمعلوم موتاب كين بينكل ايك سريرى طریقہ ہے۔ تین دوسرے طریقے اِستوال کئے جاسکتے ہیں : _ (۱) بیٹیاب کے ا بک مرے میں ممری نا کٹر وخن کے مقالبہ میں ایمو نیا ناکٹروئن کی سنبے کی تتخبین کی دباتی ہے ۔طبعی طور پریہ سرتا ۵ فی صدی ہوتی ہے ۔ ترشہ وموہت کی شدید اصابتوں ہیں ۔ ۲ ، ہم فی صدی کی فدریں حاصل موسکتی ہیں۔ (۴) جوفنری

453

کاربن ڈائی آکسائڈی بیائش کی آلسے کی جاتی ہے شلا فرائی ڈیرلیٹیا کے کاربن ڈائی آکسائڈی بیا سے جس ایک اور ایس آکسائڈی نیدگی بیا (Fridericia's Contensimeter) سے جس ایک تخین تفریباً دس منطق لیتی ہے۔ (س) سوڈیئم بائی کاربونیٹ کی وہ مقدار معلوم کی دبائے 'جو بیٹیا ب کوئیمس کے لئے فلوی سنانے کے لئے ہمولی انتخاص میں بائے گرام کافی ہوتے ہیں۔ جب قلوی محفوظ براے و نبیتا دہ مقدار کی صرورت ہوگی 'اور اس کی سنناخت کے لئے بست در بیج برصتی ہوئی مقداری بین من یا جار جارگھنٹوں کے فاصلوں سے دی جائمیں (Sellards)۔

یہ نہا بہت صروری ہے کہ کینونیت کے رجس میں ٹا بنت ترشوں کی فوعیت :

معلوم ہوتی ہے ، اور دوسری حالتوں کے درمیان جن میں فلوی محفوظ کی کماور ترشہ دمو بہت ہوتی ہے ، واضح فرق کیا جائے۔ ببشاب میں فیرک کلوراً ٹر لائو سے مہاگئی جبیا بھو را رنگ 'اور را تغییرا (Rothera) یا لیکال (Legal) سے
کاشغوں سے ارغوانی رنگ ظاہر ہوئے ہے ' نیز سائن میں الیمٹیون کی توطئے سے کمیتونیت کی تشخیص برآسانی ہوسکتی ہے ۔ کنیونیت کی موجودگی ہمشہ جسم کے اندر قابل صول کا الوا انڈریٹ کی کی وجہ سے نہیں ہوتی ' کرجس سے ترمشہ سمیت کا رجمان ہوتا ہے ۔ وہ سوڈ بیم ای کار بونیٹ کی شری مقد اریں دسین سرید واجود واقع مراح واقع دموست مدال و میز کارجمان کھا ہے۔

دینے سے پیدا ہو جاتی ہے' جو قلی دمویت پیدا کردینے کارجمان رکھتا ہے۔ عسلاج ۔ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ پیمشکوک ہے کہ تُرشہ دمویت میں کہ میں میں میں میں ان کیا گیا ہے کہ بیمشکوک ہے کہ تُرشہ دمویت

بدا تہ کس مدیک موت کا سبب ہونی ہے۔ نیکن جب وہ قلوی محفوظ کی کمی کے ساتھ موجود ہوتو ہما رے علم کی موجودہ حالت میں اس کا ازالہ کرنا ہی تسدین عقل ہے۔ اِس مفصد کے لئے سوڈ یئم اِنی کاربونیٹ یاسوڈ یئم سائٹریٹ ایک وایک ڈرام کی مقتا دول میں ہر دوسرے کھنٹے سراہ و ترن دیا جاسکتا ہمت

جَبَال يسمِما مائے كەسرىرى مالت خون كے اندرسموم كى موجودگى

کی وجہ سے ہے' و ہل اِن سموم کی بیدایش کوروکن (طلاحلہ ہوکیتونیست کے تخت) اور اُن کے اِخراج میں آسانی پہداکرنا چاہئے (ملاحظہ ہو ذیا بیلیسی قوما کا علاج) ۔

امراص بطحال

طی است کم کے بالائی حصر میں بائیں جانب واقع ہے اور سیلیوں سے بالکل جمیبی مہوئی ہوتی کہے۔ تندرستی میں اس کے محلّ و قوع او صاً مت کی مین محض ندر معه فرع کی جاسکتی ہے۔ بائیس زیر بغلی خطے میں نوب اور كَبَارِهُوسِ لَيْلِيونَ اورمشموله فضا وُل مِن اصميت بإني جاتي ہے - ساختنے يہ بیت اُس خط سے محدود موتی ہے ، جو بائیں جمٹنی سے گیا رصوب ایس کی نوک تک کھینجا جا ہے' بیٹھیے وہ تقریباً اُس خط تک پہنچتی ہے' جوعضل عرب (ظربد کے اگلے قائضیے کے ساتھ مسلس ہے۔ جب مال بڑی ہوجاتی ہے تو وہ نیجے او سامنے کے طرف بھیل ماتی ہے اور اگر اس وقبت جب کہ مربض مہر کا سانس نے نویں اور دِمویں صلی کر بوں کے بیچے انگلباں رکھی جائیں **توطوال** کا عاست یا ن کے ساتھ کرائے گا۔ اگر کلانی اور زیادہ ہو توطحالی حاشیہ اِس تعام ہے واضح طور پر کیا ہوں کے نیچے آما آ ہے ' خیانچہ وہ بہ آسا نی محسوس کیا ماسکتا ہے' اور کم وہبیٹ شکر کے ائیں الائی رُبع میں واقع ہوتا ہے۔ انتہائی اصابہوں میں طلال نیجے رُباکل بِی اِرٹ تاب بہنچ ماتی ہے اورخط درمیا بی کونا ہن کے نیچ عبور کرتی ہے اگر جیمکن ہے کہ وہ بائیں جانب اور ہی رہے۔ اگلی داوار ت کمیں سے فرع کرنے پر ٹرمی ہوئی طحال بہشہ اسمیت ظاہر کرتی ہے۔وہ زیری بلیول کے عبن نیچے سے مکلتی ہے اور اگلی دیوارٹ کم کے تماس میں رمنتی ہے۔ بعض ا وقات اس کی کورسیلیوں کے نیجے سے بروز کرتی ابوئی بیجھے کو کھی میں موں موتی ہے۔ اس کے ایکے ماشیہ میں اکٹر ایب یا دور و اضح کٹا کو ملتے ہیں۔ اگر کلانی بہت زیادہ ہو تومکن ہے کہ بائمیں ما نب میں ایک کمنی وہویا وزن کا احماس مو

ممن ہے کدا نفعات کی تکوین' با اُس سے بیدا ہوجائے والے گرد کھا لی انتہاب اُ وجہ سے ورد موجود ہو' لیکن تمنیات کے ساتھ کی کلانیوں یں ورد کو ٹی نمایا زجمنوبر ہے۔ نہیں ہوتی ۔طمال کے لاشعاعی امتحال کے لئے ناخط ہوصفحہ 388۔

النجی بی نقله نظر سے لی ایک تنگی ترتیب رکمتی ہا اور اسکی تمرا فی رسدی تونول النجی بیات کو جا تی ہے ، جو محض محبوط لمفا کی غدو ہیں کا (۲) وریدی جونول کو اور علی خوالت کو اور بھر و لواروں کے ساات سے ہوکر براہ راست ورید ول کو وریدی جونول بیالت ہیں واحل ہوئ سے بہلے خون ہلکہ بیں واحل ہوئ سے بہلے خون ہلکہ بی واحل ہوئ واقع ہوتے ہیں اور جن کا فعل و و رید کا فعال کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مصراعول کے طور پڑل کرتے ہیں اور گت یا وریدی جونول سے خون کو بشریا فی نظام کے کے طور پڑل کرتے ہیں اور گت یا وریدی جونول سے خون کو بشریا فی نظام کے اندر و ایس بہیں جانے و ہے۔ لب آیک مشک حال سے بنتا ہے ، حس پر کتیر فیلی فیلی واقع ہوتے ہیں۔ یہ بین مسامر کرتیر کی فیلی فیلی فیلی واقع ہوتے ہیں۔ یہ بین مسامر کرتیر کی فیلی فیلی واقع ہوتے ہیں۔ یہ بین مسامر کرتیر کرتے کی مسامر کرتیر کی مصلی فیلی فیلی فیلی واقع ہوتے ہیں۔ یہ بین مسامر کرکتیر کو میں کرتے ہیں۔

طمال کے اہم افعال خون کے اندر کے اجمام غریبہ کی خلوی اکالیت اور ہے کار اور خستہ دموی جیمات کا آٹا ف ہیں۔ لیکن طمال دموی جم کو کو ہبیش کرنے کا کام بھی کرتی ہوں ہیں اور ایس کے نون کو طمالی ور یہ ول ہیں اور ایس طرح دوران خون میں موقعہ کے لی فاسے بھیجی رہتی ہے۔ جبانچ کمن ہے کہ دوران نزن میں کا ووران ورزمشس ہیں کا حرار ت میں کشف مولے ہر (جب کہ تہریدی اغراض کے لئے جلد میں فاضل خون کی مذورت موتی ہے) یا اختناق کے دوران میں طحال می کو کر اپنی طبعی جبامت کا بائویا ہوتی ہے جب کی وجہنا لبا بھی کم وہیش میں طحال کی جبامت اخیر نہ ہر ہوتی ہے جب کی وجہنا لبا بھی کم وہیش میں طحال کی جبامت اخیر نہ ہر ہوتی ہے۔ جب کی وجہنا لبا بھی کم وہیش میں طحال کی جبامت میں جبار ہوتی ہے۔ جب کی وجہنا لبا بھی کم وہیش میں طحال ہے۔

رف می می می است کا می می است کا خلاصه درج کیاجائے گا 'جوطال می کان توجا اب ان کے علامات اور طلاح کی بحث دوسری جگه درج ہے: ۔ بید ان کے علامات اور طلاح کی بحث دوسری جگه درج ہے: ۔ فعال امترا (active congestion)۔ طمال بہت سے ما دساری

اعال میں بڑی ہوجاتی ہے خصوصیت کے ساتھ تب معویہ می ناکٹایگیو (ague)
اور دورے لیریا ہی حمیّات میں ذات الریہ تضیح الدم خبیث التہاب مدوں قلہ
(malignant endocarditis) مرخ بارہ (malignant endocarditis) اور تشک میں میمانغا ہوتی ہوت کے بارہ (erysipelas) اور تشک میں میمانغا ہوتی ہوتی ہے عروق شعریہ اور وربدی خوال سے متددا ور تبریوتی میں محالی لب تو م اور کیا بالی استان میں محالی لب تو م اور کیا بالی کی روسے آسانی و معلق الریاں اور وربدی خوال ہے اور اسلامی کے خوال کے مطابق محال میں اور اسلامی کے خوال میں اور در حقی خلبوں کی شدید خلوی اکا فی خلبوں بالمحصوص غیر فررایی زجامی خلبوں اور در حقی خلبوں کی شدید خلوی اکا فی خلبوں بالمحصوص امال میں کئیرا درخ خلیے اور تعدیل بے شدید خلبوری کی خدبور ہو ہے ہیں۔ اس میں کئیرا درخ خلیے اور تعدیل بے مندیس میں کئیرا درخ خلیے اور تعدیل بے منابع بالی خلبوری کی موجود ہو ہو ہے ہیں۔ اس میں کئیرا درخ خلیے اور تعدیل بے منابع بالی خلبوری کی موجود ہو ہو ہے ہیں۔ اس میں کئیران کی موجود ہو ہو ہے ہیں۔ اس میں کئیران کی موجود گلے ۔ الفیری جسیات کی برظا مرکلانی ان کے گرو کے نام بیری سے میں اس کے میان کی موجود گلے۔ اور تعدیل بے میان کی برظا مرکلانی ان کے گرو کے نام بیریس کی میان کی موجود گلے۔ اور تعدیل بے میان کی برظا مرکلانی ان کے گرو کے نام بیریس کی میان کی موجود گلے۔ اور تعدیل بے میان کی برظا مرکلانی ان کے گرو کے نام بیریس کی میان کی موجود گلے۔ اور تعدیل بے میان کی برظا مرکلانی ان کے گرو کے نام بیریس کی میان کی موجود گلے۔ اور تعدیل ہوتھ کی برظا مرکلانی ان کی گرو کے نام بیریس کی میان کی کیون کی موجود گلے۔ اور تعدیل ہوتھ کی برخال میں کا کھور کی کی موجود گلے۔ اور تعدیل ہوتھ کی برخال ہوتھ کی کی موجود گلے کو موجود گلے۔ اور تعدیل کی موجود گلے۔ اور تعدیل ہوتھ کی برخال ہوتھ کی ہوت

التِهَا بِ فَيْ اللَّهِ (splenitis) اوركروطي الياليَّة الله (perisplenitis)

ان بی سے بعض ماری مالتوں بی مرضی کی بیش دمویت کے درجہ سے بڑھ کر مالا مادالتہا ہے کہ درجہ میں بہنچ جا آہے ہے میں کہ ذیگر (Ziegler) کی دائے کے مطاب عوق اور لت کے اندر سیب خلیوں کی مقدار کثیر کے لمنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ خراج عام التہاب طحال کا نہا بیت سٹ فیتیجہ ہوتا ہے۔ النہاب طحال کے ساتھ ما تحد مکن ہے کہ کید کا التہاب مینی التہا جا کہ دد میں ہے کہ کید کا التہاب مینی التہاب کی دور اس کے نتیج کے طور برمنصلہ اعتا میں التہاب کی دور اس کے نتیج کے طور برمنصلہ اعتا یا جدارت کے کے ساتھ انصاب اس بیا ہوجاتے ہیں۔ جا دیا مزمن التہا ہے کہ اور اس کا وقوع اکثر کا مخصوص حاد اللہ اللہ باری اعال کی طرف منوب کیا جاسکتا ہے۔

شکل میں ساری اعال کی طرف منوب کیا جاسکتا ہے۔

ایک بڑی جمامت عاصل کر کے طمال کا نصف یا دو تلت مصد کرکریں۔ بہی طمالی الانی کا سبب ہوتے ہیں۔ ان میں لونی تغیرات ظاہر ہوتے ہیں جو دو مری حکمہ (صفحہ 318) بیان کئے نگئے ہیں اور بہ عنونتی اصابتوں میں قیمی ہوجا سکتے ہیں۔ بین دموست اور طمالی عدم دمو بہت کی طمالوں میں بھی مفعات و اقع ہوسکتے ہیں ۔

ور نہ (tribercle)۔ پہلمال میں عام تد تن کے جزو کے طور بڑرا دی یا اکثر شوخ سرخ گر کموں کی شکل میں واقع ہو آہے، بومکن ہے کہ حیوئے مٹروں کی بہامست کک پہنچ جائیں' اور جو جرم کے طول وعرض میں اور اس کی سطح پر بنتھ ہوتی ہیں۔ بعض او قائت ایک اپنچ قطر یک کے ٹرے زر دمجنبی تو دے پائے مار تربو کا دیں جارک کا فن میں ایک سکتر ہیں۔

(۱) کلان طحالی معدگرد هلیاجی نما نزفا اورگرهکی بایت (splenomegally with peri-ellipsoidal hæmorrhages and

میده سطح پرمنند و سین فاعده شکل کی لو**دا ا**ور وز مشمول رکھنے والی زروی الل محبوری گرکمیں مونی بب جو قطریب ایک البین که میرے سے اے کر کئی کی میٹر کا۔ کی ہوتی ہیں ۔ نیز حیوفے گول یا بھنوی نزفا سننہ ہوتے ہیں ۔ گرمکیں اور نز فات دولوں بہیائی نما اجهام کے گرو واقع **ہوتے ہی**اور طحالی لت کے اندران منتشر ہے قاعدہ نز فائنہ سیے اُہ اُسا بی متفرق کئے دیا تگئے ہر ، حرکلا ل طحالی کی تمام اقعام میں عام ہوتے ہیں میکن ہے کہ یہ آر کمد محض ز ں کے بیرت را بہت (اليطربة ما الكب مي شعرية) كم باعث مول (31) . (٢) سب صفول بولى يقال (acholuric jaundice) برييل ايك حداكاند من كي حيثت سي بمان كياكما عد - (س) وه كلان طالى حركه في لي يا با في وريدول كي علقتيت كريم اه يا في مائ کلانی کا اولی سبب علفین معلوم ہو تا ہے ' جو حکس ہے کہ ورید کی دیوار کے انحطاط ا انتصرو ما کے ماعث مہو۔ لمحال کتب کی بڑی میش برورشس اور ساتھ ہی وسیع منتنز ليقيت ظامركرتي مه رام) خالص طفي الى بليش بيروراش (splenic) (hypertrophy حب کے ساتھ لیفیت مویا نہ ہو اور خبیں سے بوجہ زیادہ دو إِلاف كے عدم دمو بيت بيدا بوجاتي سبت۔ ﴿ هِ ﴾ ليفي عنس ل ي الحظاط ("fibro-adénie")، جبیاک بنیٹی (Banti) نے بیان کیاہے۔ یہ ایک نہا بت ننا ذحالت ہے مشرطیکہ یہ اس ملک میں ہوتی ہو۔ مرس بنیلی کی اسطان کا اِطلاقِ طیالی عدم ومویت کی اُن اِسابتوں برکیاجا **اُپ** جِن میں جگر مج*وع عص* ئے بعدا کہب ہو باتا ہے۔ (۲) طعال کی شبکی د رمحکئی بلیش میڈورش (reticulo-endothelial hypertrophy) وه حالت ميت سي الت طول وعرض میں اور در بدی جو فو ل میں بڑے بڑے در صنی خطبتے منتشر ہوتے ہیں۔ اِن اصانبوں کے کچھ نائب میں مزمن سرایت مشل فلب اور مزمن یا بی کہات مبب مرنس ہونے ہیں۔ ذیا بیطیس کی اصا نتوں میں مکن ہے کہ خلیا ہے ہیں لیا ً بلِا موجود مہوں۔ چب در علمی خلیے بہرت صریح موں تو اِس مرض کوجمواً مرض کوجمواً ئنتے ہیں' اور بعض امعا بتوں میں سنب کی درحلمی مکاٹر اس قدر اُفراط کے **ساند موّائے ک**

أس سے ختینی سلمی کوین کا گمان بیدا ہو ا ہے ۔

مندرج ولی نین ستا و آمراس کو شبکی در حلی نظام کے اموان

ك نام سير طاعت بندكيا جا آ سے ..

نآئی مین اور بک (Niemann-Pick) کامد ض ۔ شبکی درحلمی نظام کے بڑے خلیات لیا کٹر بڑشتمل ہوتے ہیں اور ' کف دار ' فطرآ تے ہیں ۔ یہ من تقریباً تمامتر نوعمر بہو دی بجوں میں ہوتا ہیں اور زیا دہ ترعورت بجوں میں اور وہ غذا دہی کے اختلالات سے شروع ہو کر طبہ ہی خوا اور بین روسات سے طبل کت واقع کر دنیا ہے۔ طمال حگرا ور لمفی گرہیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں بھوری ا

لونيت عدم دمو بيت اور منتدل البين فلوست موجود موتى به -

هدینل اورکوسیجن (Hand-Christian) کامرض به لیا ندخلوی احتماعات خاص طوربرچینی بدیوں میں واقع ہوتے ہیں ٔ اورجب جمجمہ میں موجود ہو توجموز العین ٔ جرکہ بہنا او قانت کی جانبی ہو آئے 'اور ذیا ببطیس پیدا کرنے ہیں ' جوکہ ایک ممیز علائمیہ ہے ۔ یہ اتبدائے طفولیٹ بیں واقع ہو آ ہے اور قریست '

458

نزفات ٔ اور کسورعام ہوتے ہیں۔

امراض ظام كمفائيه

نظام لمفائیہ منام اص سے متار تر ہوسکتا ہے ان کی اکثریت عوق المفائیہ کے اندر کوئی شئے عزیب مثلاً خرد عصنو ہے سلمی خلیات یا کوئی حب المفائیہ کے اندر کوئی شئے عزیب مثلاً خرد عمن ہے کہ با لاخر خرد عصنوی نوعیت کے شاہت موں) واخل ہو ہے کا نیچہ ہوتی ہے۔ اس سے یا توحاد التہاب پیدا ہوجا شئے عزیب کے شئے یا غذیب سے کم نامیس میں ہوتا ہے جو کہ شئے غزیب کے منبع میں ہوتا ہے۔ ان تغیر ات کی مثالیں اس کتاب میں شروع سے آخر کم منبع میں ہوئی میں۔ المتحاب لمفی عوق تی میں لمفی عوق نی زمروں کے میں ہوئی میں۔ المتحاب لموجا ہے جو تی میں لمفی عوق کا تعدد کا الیہ کا نیتی موقات یا حادیا مزمن النہاب کی وجہ سے انداب بوجا ہے کا ۔

مض إحكن

(Hodgkin's disease)

خبیت لمفی غلی سلعهٔ لمفی ذیراتی سلعیت کاذب بیض دمویت را LYMPHADENOMA MALIGNA, LYMPHOGRANDLOMATOSIS,

PSEUDO-LEUKÆMIA)

ولکش (Wilks) ہے اس مرض کو ایک نام سے موسوم کیا جسے موسوم کیا جسے موسوم کیا جسے موسوم کیا جسے موسوم کیا ہیں عدولمائی کی اصابتوں کا ایک سلسلدا نبدا ڈبیان کیا عصر سے طال کے اندر ایک مخصوص ضبح کا جا کو ہوجا گاہتے۔

میں سے طال کے اندر ایک مخصوص ضبح کا جا کو ہوجا گاہتے۔

میں طال کے در میان اور جا لیس سال کے در میان اور ایک بوری ہیں جو تو اللہ کے در میان اور ایک تنائی اصابتیں شیرخواری سے لے کر بمیں سال کی عمول کے میں جوتی ہیں ہیں جوتی ہی

نسبت مرد دو چند متبلا موتے ہیں۔ مرض آ حکن کے لمفی فدی ملعی غدو در نہ سے مارُف ہوجائے کا رجمان رکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں مالنیں زمانہ گذست نہیں اکثر خلط لمط کر دی گئی ہیں (82) ۔

مرضی تنترمیخ - ما و ف غدو لمفائیدترا سنت پر ملکے رمادی بارمادی فید بوتے ہیں۔ خرد بینی امتحان بران کے تمثیلی حصائف بدیں: ۔۔ جیمو سے حضرتی تعلیہ معدا یک دویا زیادہ نوا تول کے ایوسین بیندا بیض خلیے اورلیفیت .. طحال عموا معمول کی نبت بردہ جاتی ہے اور مکن ہے کہ اس کاوزت بالین

	ا د جوری	۴۶ وسمبر"ا	۲۲ حنوری	۹ مو ی "]	تا ه فروري	۳۱ حورق	ئا 4 ؛ فروري	۱ فروری
	سنرحواث عنه	انعاروان مت	مسوئمة	بيبوان فقته	- اکیبوارجمعته	باميسوان غبر	ميسوان مفنة	هج دير وان مبنا
1.0			++-			-}-}-		
7.	W.	+++		╟┼┼┼┤┥	- 			
5	7 1/1	\prod	MALAY.				1 1111	
المجار								The second second
46		VMV		MIL	I V	WWW	W	TWW .:

شك ٥٥ ـ مرضِ إلجن مي مزمن تب ناكسه

نیم تموه ما وه می شغیر جو جا آب یکی یازر در اوی یاسفیدگر کمین ظا مرکز آب امراه این استیم تموه ما وه می شغیر جو جا آب یا از در اوی یا بین والے غدو کی تعلیقات کا اثراب در وال در یو گوتوں یک کیا جائے تو ناہم آبائی اور اس کے ساتھ عضلی آبادی اور شبخی جال بیدا بوتی جی اور یہ ایک قمینی حیاتیا تی کا شفہ ہے گو کہ مزمن غدد اور ایسے غدد حن کا لاشفاعی علاج کیا گیا ہو منفی تنائج و نینے ہیں (46) - یدام زبات عمیب ہے کا بیا در مرکز کے حیاتیا تی خواص بھی بی مونے ہیں ۔ اجاب کے غدد کی تعلیقات کی ابتدائی اجمام مشلاکا و میج کے لیا ہی اجمام (Paschen bodies) و میج کے بین جمام جوایا کرتے ہی کہ یہ ایک قضبی مون ہے ۔

علا ما ت - مرض کے خاص سر ری خصابص لمغانی غدد کی کلانی اور عدم ذمو مِي عِمراً ملفائي كلاني بِهِلهِ واقع روني بِهِ إوريه تغير بيشتر إصابتو ل مي عمتي غاز کے اندر شروع ہوکرازاں بعد بنل اور مبلکا سے کے غدد کو او ف کرونیا ہے۔ یہ فار ہے قاعدہ اور مختلف البھامت گریکی تووے بنا دینے ہیں جو کبوٹر کے انڈے یا مرغی کے انڈے کے برابر ہوتے ہیں اور بالعموم سخنت عموماً غیر شکا کم ہوتے ہیں ؟ اور ا بتداءٌ طبد کے پنچے ایک دوسرے برآ زاو انہ تحرک ندیرر بنتے ہیں۔ با لا خرمکن' كه وه البر مُنضم بوطا كين كيكن أن ني نقيع شاؤه عد و اسطى عدو منا تربوط في ہیں جیسا کا لاشعاعوں کے ذریعہ بیٹر طیبتا ہے اور بعض اوقات واسطی سیا یہ کاجراً بوَمانا مرمن کی بہلی شہاوت ہوتی ہے (صحفہ ۱۵ بصفحہ 308)۔ ماسار بغی اور خلف الماريطون غدوتهي متاهر ہوجاتے ہيں۔ ان ميں سے ببت سيخطول ہي غدد کی بالب گی اسی بوسکتی ہے کہ میں سے متصلہ اعضا برخطر اک دا کو بڑسکتا بع. يداعضاً يداي المسركردن من حفره تعبنه الريه اور مرى اورصدرس برى وريدين اور با زگر داعصاب كيمبي مرياً ياك ما ون موجاتي مين كيكن أك يمركسر واتع بوي كاوه رجان نبيس موتا جيباكه سرطاني حله كي حالت مي موتا سے مكن بع كرنخاع بروا و يري كي وجرسي ما بغيركسي ظابرسبيك إفالي (paraplegia) واقع ہوجائے۔

۔ بالعمرم طحال کی کلانی مرف متدل درجہ کی ہوتی ہے ۔ وہ بائمیں ماشیتے

ت رہے نیچے بروزگرآتی ہے ' یا تھکم کے یا کمیں الائی رابع میں واقع ہوتی ہے ' اور شاذی اس جامت کو بہنجتی ہے جیسی کہلی ظوی بیض دمو بہت میں و بجمی جاتی ہے۔

'نا فری عدم دمویت' نسختہ عامل نما یا ل علامت ہے ۔ اور سے دید اصابتوں میں بوقکمول خلیات اور نوات وار سرخ خلیات دیکھے جانے ہیں ۔ ابیش نعلیا سے نعدا دمیں زیادہ بوجاتے ہیں ' اور جب خدو معمول سے زیا وہ نرم ہول نووہ کی سلمی میٹر د د دو ایا د دی ہو جاتے ہیں ۔ لیکن عام طور پر یہ زیا دتی تعنیف ہوتی ہے ۔

ملی میٹر د د دو سے اور پر ہوتے ہیں (ملاحظہ ہوسنمہ کوئی ہے ، جو کہ عام طور پر فی کمیں بوئی ہے ۔

ملی میٹر د د دو سے اور پر ہوتے ہیں (ملاحظہ ہوسنمہ کا) ۔ اور آیا کے قیمتی کمنہ رسنی میں ماخلت کی وجے ہیں نوبیت واقع ہوجاتی ہے ۔ لیکن بعض اوقات حلدی ہوسکتی ہے ۔ لیکن بعض اوقات جلدی ہوسکتی ہو تی ہے ۔ بعض اوقات جلدی کی وجے ہوسکتی ہو تی ہے ۔ کبھی کمبھی شد یہ خاس ش (pruritis) سے حکاک (prurigo) کے ہوجاتی ہو کہ تعنیف کا ایمار آ ہے ' اور نملہ اور جلد کی لمفی غل می سلعی در ریز سس واقع ہوجاتی ہے ۔ واقع ہوجاتی ہو اور اور جلد کی لمفی غل می سلعی در ریز سس واقع ہوجاتی ہے ۔ واقع ہوجاتی اور قال ہوجاتی ہوجاتی

تب ۔ جب عمیق غدو ما وُف ہوتے ہیں تو تب ناکس موجود ہوگئی ہے (ملاحظہ هوشکل ه ه) جوکد وگرناکس تبول سے اس امریں مختلف ہوتی ہے کہ اس مرض میں مدت علالت نسبتہ طویل ہوتی ہے، جو بچاسی فی صدی اصا تبول میں بندرہ اور جیس وان کے در میان اور ہرانفرادی اصابت کے لئے خاصی مقل مواکن ہے [(28) مرض بیل ایسٹین = Pel-Ebstein's disease)]۔ تب کاملس مونا

جي کمن ہئے۔

بی کی کی کی کی کا دری و کیفے میں آتی ہے 'اور جوں جوں مرمن ترقی کر ا جا اہے عدم دمویت کے افراز اوہ نمایا ن فق جاتے ہیں جمکن ہے 'ہر موجود ہونیز کچھ عرصہ میں جواج زیریں کا اذبیا واقع ہوجا اہے' اور سٹا بداس کے ساتھ ہی آتھا' سٹ کی کا دموری انصر با استعار الصدر ہو گاہے۔ اور جدیا کہ دو سرے سٹ دیا دموی امرامن میں ہو تا ہے' حکمن ہے کہ ناک یا مسوڑ صول سے یا طبد کے نیجے نزفات واقع ہوجا میں۔ مکن سے کہ جا و تقریح پیدا کرکے طبد میں سے بحل آئیں۔ بالآخر نگئ اختصاص نزف وما می اختلال قرما یا تشنیات سے یا ذات الریو واقعی

ن ہے کہ آجکن کے مرحن غدو کے انبدائی درجرکودنی کلانی غدو سے نز کر نامشکل ہوجائے ' مالحصوص کے موقت جب کہ بالبید گی ناد دیے ایک بی گردہ کا محدو و ہو۔لیکن در نی غدو ہاہم اُلحجے ہوئے ہو انے کا ریجان رکھتے ہیں۔اور مرنب لَمْ جَكُن مِن عَد دعمواً على وعلى والته بواته بي - درناعمواً عَد وك ايك بي كُروه كواوُف رُبَا ہے ۔ اور مرض باحکن میں تغیرات بالکا خروسیم ہونے ہیں ۔ نوایہ (neoplasm) ا ورغدی بخار (glandular fever) میں جوغدی کلانی واقع ہوتی ہے اس کو منفر رہے کی صرورت ہے ۔ آخرالذ کرمیں مک نو آتی خلو بیت ہو تی ہے' اور لم حکّن کھے مِنْ مِنْ صِمَالُه يَهِلِي بِيانَ كِياكِياتِ كُنْهُ الانسكال نواتي البين طويت وبوتي ہے۔ بيذكا لاشعاعي امتعان إوركار وأن كاحماتها في كاشفه عبى بيان كيه جا كي بيا -متذكرهٔ بالاقسم كي ميش ناكسه مرض فا حكِنْ في تا ئېدمس ايك قوي د ليل سينے -علالج يعض اصانتول مبل سلميا ببت مفيدتا بن موى به ع - أسع بر صنی مروی مقداره س می دینا جا سنے ایہات کک که لائکرا رسینی کیس (liquor) (arsonicalis کے 16 فطرے روزانتین بار لئے جائیں ۔ آرسٹینو بمنیزال (arsenobenzol) اورنو وارسينو بينزال (novarsenobenzol) تمبينغت بخش میں عمیق لاشفاعی علاج کے ذریعہ سے عدہ تما سُج حاصل ہوئے ہیں ۔ فوری سَائِجَ آجِيهِ بوتے ہیں' اورسب سے پہلے جاؤ فائب ہوجاتے ہیں۔ اگر مرض يهلي حيند مبيني ذنده رست نفي تواب وه جندسال تك زنده رستي بي ـ گارون كے قشب كے ذريبه جدر بني علاج المبي كك ستر إتى درجي ب -

عل بملدودم

458

حوالهات

REFE BENCES

3	O. S. Gibbs	1924	Quart. Journ. Med., 17, p. 312.
2	R. V. Christie, G Lovell Gulland and		p. 012.
	others	1927	Q. J. M., 20, pp. 471-510.
3	J. M. H. Campbell		Brit. Journ. Exp. Path.,
4	C. Price-Jones .	1922	3, p. 217. Journ. Path. and Bact.,
5	(1 (1 Haday and (1 V	1094	25, p. 487. Quart. Journ. Med., 3,
J	James		p. 523
6	A. Goodall	1932	Lancet, 11, p. 781.
7	E. Starkenstein .	1928	Klin. Woch., 7, pp. 217, 267.
8	E. Bulmer .	1022	Lancet, 1., p. 1119.
	N. H. Fairley and	11/01/	12ancce, 1., jr. 1110.
• • •	H. H. Scott	1000	Lancet, i., p. 75.
10	S. J. Hartfall		
	F. W. Madison and		Lancet, 1., p. 620.
11			Quoted Brit. Med.
4.0			rn., 11., p. 29.
12	A. C. Hampson	1929	Personal Communications.
13	K. Faber	1927	Lancet, n., p. 901.
		1932	Lancet, 1., p. 495, 549,
	nian Lectures)	11/02	653.
15	L. G. Parsons	1033	Brit. Med. Journ., ii., p.
10		1300	631.
16		1930	Arch. Dis. in Childhood,
177	E. C. Warner	1000	5, p. 299.
17	J. F. Wilkinson and W. Brockbank	1930-	31 Quart. Journ. Med., 24, p. 219.
18		1924	Guy's Hosp. Rep., 74,
10	A TO TE		p. 329.
19	A. F. Hurst		Brit. Med. Journ, i., p. 93.
20	Review on Diseases of		JU,
, ~ O			Med Ser 8 n ATE
91	S. C. Dyke		Med. Scr., 8, p. 476.
4 I	17. C. Dyke	1744	Lancet, i., p. 1048.

٠.	•	_
4	4	٨

22	S. P. Bedson		1929	Personal tion.	Communica	
23	R. L. Waterfield	• •	1928		sp. Rep., 78	ζ,
24	Mildred Warde	• •	1923	Brit. Med	. Journ., ii.	••
25	J. Barcroft		1925	p. 599. Lancel, 1.,	p. 319.	
	Review on Blood	Cir-			-	
27	culation, etc. G. A. Sutherland			Med. Sci.,	_	
28	B. Williamson A. J. Hall and J. S	4 C	1925	Lancet, i.,	p. 323.	:
	Douglas		1324	p. 22.	vin. Mea., 10	,
29	H. C. Gram (quot	ed				
	from)	•	1921	Med. Sci.,	3, p. 369.	
30	J. W. M. Mcnee		1929	<i>Glasgow</i> 1111, p. 65	Med. Journ.	٠,
31	J. Fawcett and Λ .	(ł.		, 4 .		
	Gibson		1928	Lancet, i.,	p. 1171.	
32	H. D. Rolleston			Lancet, 11.,		
33		•			sp. Rep., 80),
34	R. S. Harrison		1931	Guy's Ho	sp. Rep., 81	,
35	F. L. Knott and W	7 1.	1020	p. 215.	Lourn 11 n	
	Watt		1990	991.	<i>,,</i> 0 a, n., p	•
36	J. Bamforth and J					
	Edwards			<i>Lancet</i> , 1., 1		
37	M Marzels and C.	В.	1929-3	30 Quart	Journ. Med.,	
	Arthur			23, p. 171.		
38	F. Parkes Weber		1933 .	Lancet, i., p	o. 800.	
.39	H. L. Tidy		1930 -		Journ., ii., p.	
(i) T	W. Cramer	1			1220	
				ancet, ii., p		
. ,	V. W. Payne and R. E. Steen	1			ourn., ii., p.	
. . J	TV. D1.	1/		1150.	1000	
- ,, A	. W. Pickering	18	129 L	ancet, 11., p.	. 1239.	
1	Szent-Gyorgi	18		ersonal C ion.	ommunica-	
ſ	Venables	19	934 L	ancet, i., p.	108.	
I	R. Marrack			/ x		
		. 19	29 Le	ancet, ii., p.	512.	
VI	. H Gordon		P	roc. Roy.		
K	A. McCance	. 19		27, p. 1035. oulstonian I	Lectures.	

459

متخول وراندرًوبی افراز کے اماض

اساسى تحول

(THE BASAL METABOLISM)

(basal metabolic rate = راساسی تحولی شرح)

یه طریقه النصوص ختبه در فی مرس، ورفرجی بر بیش در قبیت او ناقص رقبت کی نشخیص کے لئے نیزاکی اصابت کی رفتا راورعلاج کا انز ظا ہر کرنے کیلئے اسلال کیاجا نا ہے۔ اساسی سخول سے وہ حرارت مراد ہے میں کو ایک فرد وقت کی ایک اکا فی بین معیاری حالات کے تحت خارج کر آئے بینے اس وقت جبکہ وہ آخری کھانے کے کم از کم بارہ گھفٹے بعد بیٹ کے بل جُپ چاپ لیٹا رہاور کو فی عفیل حرکت نہ کرے۔ زانہ حال ک یہ قدر اخذ کردہ آکسیجن اور حسائے کردہ کو فی عفیل حرکت نہ کرے۔ زانہ حال ک یہ قدر اخذ کردہ آکسیجن اور حسائے کردہ (CO₂) کی مفدار بیسے بالواسط متعین کی گئی ہے۔ زنیز (Zuntz) اور یہ فرص کیا گیا جا کہ خدا میں بروٹین ممولی مفدار میں موجود متی (10):-

مراسے فی لیٹر آکیجن (calories per 1 litri. of oxygen) (respiratory quotients)

> 7' 4 .3 LY 8' L1 .3 LB 8' L2 .5 A. 8' LA .5 A.B

۹۰، ۲۹۰ مر . التعلیم و الموت می موادد (۱:۱۱) کے مجم اور افدکردہ التعلیم ماصلِ تقسیم وہ نسبت ہے جو خارج کردہ دد (۱:۱۱) کے مجم اور افدکردہ

آگیجن کے حج کے درمیان ہوتی ہے۔ اِن اعداد برسے اُس فرد کی حرار سنے ، فی گھندیا فی جی بیس گفند برآ برکا حاب لگایا جا آہے اور اس کا اُسی جامت کے طبی اُشخاص کی اوسط پیدا بیش حرارت کے ما تحد مقابلہ کیا جا آہے 'یہ فرض کرنے ہوئے کہ اسی عرادت کی برآ مدحبان سطح سے ہوئے کہ اسی عرادت کی برآ مدحبان سطح سے متناسب ہوتی ہے۔ خانج قد کونعنی میٹرول بی اور وزن کو کلہ گراموں میں ناسپ کے بعد شکل اولا سے سطی قب مربع میٹرول میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدول علام میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مدول علام علی تول کے معیاد


جمانی سطح کے برم بن میر کے بیچے نی گھنٹا وسط حرارے (Du Bois) (4)

عودت حرارے	مرو حراب	عر مسال		
rms -	٠٤٤٠	17 tir		
p. 5.	rrs.	10014		
TA	811.	r- 6 12		
765.	T450	r r.		
7410	4950	N. ,, M.		
m41.	PASA	D- + N.		
ros.	T430	4. 40.		
mps.	7110	4. 11 4.		
TT1.	8010	No 9 40		

نیز جدول یا سے مختلف عروں کے طبعی مردوں اور عور توں کی مبمانی سطے کے مہری میں خرکے ہیجے فی گفتہ مرائی ہوتی ہے۔ اگر دریا فت سندہ قدر صاب مگائی ہوتی ہے۔ اگر دریا فت سندہ قدر صاب مگائی ہوتی قدر سے ، افی صدی سے زائد اختلاف نر رکھے تو سنول کوطبی سجمنا جائے۔

ہاہم آ دمی میں حرارت کی پیلایش کے طالبہ مطالعہ سے یہ پایا گیا ہے کہ زند اور شعبہ کے اعداد جس نظریہ بربنی ہیں (بینی بیا کہ نعنی عاصل تقسیم کار موج کی میں اس مقسیم کار موج کی دہ نسبت ظام ہر کر آ ہے جو کہ جسم میں جل دری ہے وہ

تو بی و اتعات کے ماتھ مطابقت ہیں کہ ۔ ملکہ یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ اماسی مالاً کے تحت کا ربولا کڈریٹ اور شم ہجینہ نقریعاً ، اور ہا ای مشتل سنبت میں ملتے ہیں ، وریہ کہ ملند حاصلات تقیم برکار کرائڈریٹ شم میں ہمزان طرر پرتبدل ہونا رہتا ہے ، اور میست حاصلات تقیم پر اس کے مخالف کتبدلی ہوتی رہتی ہے۔ اس سے



شکل و داس خاکه عصبم کی سطح کی تعبین مربع میرول این کی جاسکتی ہے اُس وقت جب کرددادروز ن معلوم موں (Du Bois)-

یہ نیچ نکانا ہے کہ کار بن ڈائی کا کیڈبدات خود اساسی کول کا ناہے کا اور آکسیجن جزوی طور پر تعدیلی سے کار بن اُنی آک کیڈ بیٹ کو ناہی کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ مریض ایک بڑے مقیاس کی وساطت سے رحس کا ایک جگر ہا لیتر نابتا ہو) ہیرونی ہوا میں سلس سانس لیے آگر دیوی تروی کی حاصل کی جائے۔ اور و قنول کے ساتھ محلوط زفیری ہوا کے نموے لئے جاتے ہیں اگر و دی کی مقدار فی صدی معلوم کی جائے میں سے کار بن ڈائی آگ کیڈی فی منا


برآ مرکامیاب لگایا جا آہے۔ اس کا مقابلہ اس ، CO سے کیا جا آہے جو کو منہ ہوئے فان کارش (nomogram) کو انتہال کرتے ہوئے وزن مواور صنف سے در افت کی جاتی ہے ایک سنتی کنارو دیئے ہوئے وزن سے لے کر دی ہوئی ویک وزان سے لے کر دی ہوئی ویک فاکھ کے داریا در کھ ویا جا آہے اور وہ او سط اساسی مرار سے بعلوم ہوجاتے ہیں ہے اور اور اس سے ہرجے ہیں کھنٹے کے لئے اساسی مرار سے بعوم ہوجاتے ہیں جب کہ غذا تج بڑ کرنی متعمود ہو ، وی کی طبعی صدود اس نقط سے اہمی طرف اور دائیں طرف اور دائیں طرف اور دائیں طرف اور میں طرف اور دائیں طرف اور دائی درد کی ہوجا ہے ہے دائیں درد کی ہوجا ہے ہے دائی درد کی ہوجا ہے ہے میں توزن ہیں ہے ہو کہ دور ان میں کی ہیں اور جو ای ہے ۔

ذيابط**يث** ري

(Diabetes Mellitus)

ذابطس شکری وه مون ہے جس کا حمیہ فاصہ یہ ہے کہ بیتابی شکر
(گلوکوزیاؤ کمیڈوز) مسل خارج جو تی رہنی ہے۔ اِس مون کا سب حب خابر
انگر اِس کا اقص فعل ہے جس کا مودوں ملاج یہ ہے کہ اِ نسولین کا با قامه
انتہال کیا جائے ۔ مشکر کے افراج یعنی شکر بولیت (علامت) کے ساتھ
اکٹر پشا ہ بھی ٹری مقداروں ہیں آ ، ہے (کماٹو مت بول) اور سی علامت کو افرای منایال علامت ہے ذیا بیطس کی وجہ سمیہ ہے (ذیا بیطس ایک وزائی افاط ہے جس کے معنی مربع ہیں ہے گذرجانا ہے) کٹر ت بول الماس کی وجہ سمیہ وزیا بیا مناکر بول با مشکر بولیات بھی بہت سی حالتوں ہیں بیدا ہو جاتی ہے ، جن ہیں سے ایک خاص ولیت بھی بہت سی حالتوں ہیں بیدا ہو جاتی ہے ، جن ہیں سے ایک خاص فرای جس کو لینے ہیں 'آئندہ بیان فرائے گی ۔ شکل جس کو لمیخ ذیا بیلیس (diabetes insipidus) کہتے ہیں 'آئندہ بیان کی جائے گی ۔

المن المحث المسباب - فرابطس الكرى كى بهت سى اصابتول الميكى تعليم المائي كى بهت سى اصابتول الميكى المين عاملات البيد المين جرمون كے المين عاملات البيد الله المين جرمون كے



461

<u>۸۰۲</u>

الدكه ليئه سازگار بوتے ہيں۔ ذيا بهلس بيود يول ميں به المن الم كدوه موروفي موايا أسى فاندان كر بعائيون اور بينون مي مومودتي س نها بيت خفيف بوسكيات مبين اكثر وه متوا اشروخ بوك كأرجان ركمتا فاص میں ہو تاہے' جو کھاتھ زیا وہ اور ورزش کہ کرتے ہ . ی واسطے بدمرن بالمخصوص متمول اشخاص کا ہے۔ ک کی ماسکتی ہے کہ لب یا رخوری تول کی زیا وتی بیدا کرتی ہے مجس سے لیڈ رورے افضا برزیادہ بار بڑما آہے۔ ذیا بیلس اور نقرس کے ایک یائے جاسے کی توجیہ عمی خالیاً اسی واقعہ سے ہوتی ہے کہ یہ ہردوا مراص بیارور انتفاص میں مواکرتے ہیں۔ بینا نیے و سط پوری کی سلطنتوں میں جنگی فذا سے من برگه ا ترکیا اور موسط عررسیده انشخاص کی شکر بولیت جاتی رئ-(Bouchardat) نے بھی اس تقیقت کا مشا نها بیت عام خیال بیرے که و ما بیلس موسے کا امکان آن لوگوں میں زیادہ ہو تاہے جرمشکرا ورمٹھا کیا ہے حد کھاتے ہیں' لیکن اعدا دوشکار اس کا تبوت مرنیس بہنجاتے ۔ مند وستان *من خیف شکل کے ذیا بیطیس کا بھیلا مو*ا مو^{نا} آ فرببی کے مناتھ وابستہ ہے ' میں کاجزوی مبب کاربو کا کڈر بیٹ پر مُنتَّى فَذَاكُی کُرْتُ اور ورزش کی قلت یاعدم موجودگی ہے۔ مکن ہے کہ دوڑ دھوپ کی زندگی اعصاب پر بار اور دند باتی صدمہ اِس مرض کے حکمہ م لیتے ہوں۔ بہ امرکیان (Cannon) کے شاہدات کے باعث س طور برومجسب ہے اور وہ یہ ہی کرحیوا نا ت میں حذبات نے سرگردول بیدا کرنے بیش مشکر دمویت بیدا کردی نیزید که ان طلب اکو جوامتیانات میں مثریک ہوئے یا جوکسی اہم جمانی آز آیش میں مثلاً اسپے اللہ کے طرف سے کمیل میں شریک ہوسے والے تھے اکر شکر بولیت کی شکایت ای - گرآ ام (Graham) می توواین حالت میں دیجھاکہ ۱۰ اگرام ڈیکسٹروز

لِینے کے تیس منٹ بعد دَموی شکرٹرہ کرہ ا ر . فیصدی ہوگئی' لیکن جب مجھ ت محنت کا کام کرا یا گیاجب که تعطیل کی صرورت تنجی اور اس کیے بعد میں ام عل مِي لا يا گيا تو دُموي سنتگر کي مقدار همه اء ٠٠ يا ني گئي اور نصف کھنٹر تنگ نند ہی رہی بخوطی کاکٹر (exophthalmic goitre) کے بعد بھی حقیقی و مابیط وسرائت بھی ایک سبب مُعِدّ ہے نواہ بیرسرا بیت عمومی رو به کے قرب وجوار میں محدو دالمقام رہ کرالتھا بالبلبہ بیب د ار دے۔ شکر کی کمر سرداشت اور شکر بولبیت اُن عَمَان حالیّتوں میں بھی یا بی مانی ے عن كوميض او قات كنا مال منحوني شكر بولىيت mpræmic (glycosuria کیتے ہی اور تذکرہ کے فائل ہے یخفن حالت و فع موجا نے پر پیٹ کر بولیت بھی جا تی رہتی ہے ۔ آ تشک بھی ایک مکن سبب ہے ۔ زند کی کے ہزی عاشور وں میں ایک ملکے قسم کی ذیا تبطیس کا ہوتا عام ہے ۔ سٹ ید أتصروما المضيخ خي شرياني تغيرات بإمنتشابيتين كمونني مملابت hyperplastic (sclerosis جزائرلنگر إنس مي كوني نقص بيد اكرديت مي اور بيخفيف ورم کے اس تقص سے مثابہ ہو آہے ہو کہ صلابت الشرانی گرف arterio-sclerotic (kidney کی طالت میں گردے کی اخراجی قوت میں واقع ہوجا تا ہے۔ فراہلیسی گنے گرین میں نمکن ہے کہ ذیا بیطیس اور گنگرین میرو**وکا ایک** او لی عروقی سبب لین اس مں کوئی شدنہیں کہ گئگہ بن شکر کولیٹ کو ٹرمعاً دبتی ہے' جرعلمیہ کے بید اکثر زائل ہوجاتی ہے ۔ نمکین اس کاعکس بھی درست ہے ، کیو کم مکن ہے ک ولبین سے گنگرین رفع ہوجائے ۔مِزب کے بعد بھی ذیا بطس ہوجا ا ہے 'ندھ^ن اس مزب سے جولبلبکے مقام بر او المکه اس سے بھی جودور در از مقال ت برام اللہ اس سے بھی جودور در از مقال ت برام م مثلاً ایک کمور جارحہ (fractured limb) سے بسرکے تضررات بھی شکر بولبت بداكر سكت بين - يه غالبًا كلافر برنارد كي وخسرى ويا بطيس "puncture") ("diabetes ہے متمائل ہوتے ہیں (آ مجے لما مظمرہ) ۔

ا کاربولائڈرسیٹ شے سخول کی فعلیات۔ جسم کے کاربولائڈیٹ محفوظات کلا ٹکوجن کی شکل میں مذخور ہوتے ہیں جو مگراور مصلات یں

462

، أوربيم كُرُده أسه في الغورخارج كرَّ كليو بيُّولُو" لے بعد فوراً زیارہ بانی جاتی۔ ا د . فیصدی کے قریر عا مُب ہوجائے کے باعث برابرقائم رسبی ہے۔ ساختوں میں ماتوڈ کیٹرو کراس سے کارئن ڈائی آکسائڈ (CO) اور پانی بن جا تاہے' یا اسسے

اورزیاوہ بیجیپیدہ مرکبات تیار ہوتے ہیں ٔ جن بیں سے ایک عضلات کی گانگومن ہے ۔ گلانگومن ہے ۔

اِ مُنسولین' جوجزا بُر*انگر بانس کا افراز کرده بارمون ہے ان عالیہ* حقیقی طور برحصدلیتی ہے اگر جیکہ اس کا فعل پیجیپیدہ ہوتاہے۔ اسس بر دونقطہ ہائے نظریے ہنترین طور برغور کیا جاسکتا ہے :۔ (۱) **مجیط**یں اینولین جوئے خون سے ڈ کیٹر وکسٹ کوغایب کردننی ہے کیونکداگر پیرفر یا بیطیس کے کسی ے دی جائے تو اُس کے بازو کے وریدی نون میں مشکر کی فی صر مقداراس سے کم ہوتی ہے کہ ختنی تنہ یا بی خون میں کد آل حالیکہ اِنسولین د بیٹ ہے پہلے دونوں فقرین تقریباً مساوی ہوتی ہیں (۵) · غائب ہوجائے والی تُنگر کا کچھ مصد تو کا لیدی اور قلبی عصّلات کے ذریعیہ متاکسد ہوجا تا ہے ' اور کیج حصب عمنلات کے اندرگلا کوئن بن داتا ہے (6) اورغالباً شمر میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ (۲) اس کی مرکز می یا حشا تی تاثیر گریردو طریقوں سے اللا ہر ہوتی ہے : ۔۔۔ (الف) حاد ذیا بیطس می شیخه الدم بوکر حکر میں میر بی بی زیا و تی بیوما تی ہے' غالبًا اس لئے کہ کار بولائڈریٹ بند ملنے کی وجہ سے چر بی گود اموں میں سے منتقل كرك ظريس جمع كرلى ماتى ہے اك وه كام بب لائى مائے (٧)- بهال وه فالما كاربوالأربيط من تبدل كربي عاتين سام سببت تنعنى عاصل معتبيم كي توجيد ہوتی ہے جوٹ بداصا تبوں میں یا یا جا تاہے، اور اس تبدی می آلیٹواکیٹاکہ (aceto-acetic) أور بنيا أكسى بكوهما مرك أيستر (B-oxybutyric acid) يم مِومِاتے من الكتو نبت (8)- أنولين اس عل كوروك ويتى مي كتيونية اور مشیم الدم نابود ہوجاتے ہیں اور حکرت جربی غائب ہوجاتی ہے اور منغ ما صالع کیم لمبند ہوما آ ہے۔ (ب) ویا بیطسی *جگریں ممول کے نسب*ت ملا کومن موجود ہو تی ہے ، کیو کر یہ جگرسے نارج ہو کرخون میں ملی جاتی اور بیٹ تكرومويت بيداكردتي بحركتوب متعارف ب مشديد ويابطس ون مے اندر م و ایا و قیمدی و کمیر روس کا ارتکاز طناست و نہیں ہے ۔ اوسول طَرِيكِ الدركل كومن كا امتباس بداكرويتي مي خِنائي كبدى تتحم كي كي كي الناسا

ويا بيلس شكري

کلائکومن زیاوہ ہوتی جاتی ہے ۔ یہ متبعہ مکن ہے کہ اس مُرك نشأ ياش خمير كے معل كور ولتى ہے 'جو أس كى عدم موج و گى ميں حديث زيادہ مرماً المهيئ حيات وموى مشكركا ليا يك كم موجانا حوالسولين كانبا بيت مسالال سریری اثرہے جزئز (فاللَّ مفن حنیف طور کیر) تکسید کے باعث موتاہے اور بسِزةً وستعاور اس وامورك الرسے مشکر کی وافر رسد موقوف ہوجاتی ہے۔ اِس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی ، غذ الحفر طور برليا ما آب تو وه كيم تو عكريس كلا كمومن كي عور مِي مُذَوْر مِوطا مَا اور غالباً كِهِ مِر في مِن سَدِيل مِوما مَا ہے ٠ ارتفاع احتراق کی کسی نمایا یہے کہ متعد دمثا بدین نے منفتی حاصل نقب یم کا ایک زیادتی کے بغیر یا یا ہے بچرکہ ننرورواتم ہوتی اگر لی ہوئی شکریں سے بٹیر ماجاتی۔ مندرج ذیل مت بده ظا مرکز اے که استولین کی وسالت سے مشکر کا فرتور موال مكن ب كرمض ايك عارضي ا مرجو - ايك مريض كو انسولين كه ١٠٠ اكإ نيول کی ایک منفر و بڑی معتا وغللی سے دے دی گئی' اور س کا اٹر زائل کرینے کیلئے ا سے فی الفور براہ وہن کا رہو إلى دربيث كے ١١٠ گرام وكيشروس اورروني كج شکل میں دیے گئے۔ یہ دوروز کا با فتول کے اندر محبوس رہے اور محیرانسولس کا اٹر وائن موما نے کے میدبڑی صدیک بیٹاب میں خارج ہو گئے (9)-

کبلنی فلت کا بندائی ورجہ (الماضلہ ہوسفیہ 400) ، جس میں و کیسٹرس اور نشا پاکسٹس نیم بر مگرے خون میں واخل ہوجاتے ہیں دو سری مگر مذکور ہے۔

مین دوسرے بنتنا تی فد و سینے سرگردے ورقبہ اور شخامیۂ جزائر لنگر انس سے مخالف سمت میں عمل کرتے ہیں کیو کد اُن کوسٹر کی ہنجا نے سے خون ہیں کی شکر زیا وہ ہوجاتی ہے۔ سرگردے دورانِ خون کے اندرایڈ ربنین (adrenin) وال کرتے ہیں اور یہ مگریس ہنجا کل کموش کو تو ٹرکراس سے و کمیشروس بنا دہی ہے۔
مرحے ہیں اور یہ مگریس ہنجا کل کموش کو تو ٹرکراس سے و کمیشروس بنا دہی ہے۔
معلوم ہو تا ہے کہ اِس علی کے وقوع کے لئے صفیرہ کبدی کا صبحے و سالم رہنا صرور ہے۔ در قبہ غالب مترکر دوں کوسٹر کی اس میں جہنجا کر ابنا ضل کرتا ہے۔ کا و بر ادر کا دائی اعصاب کے ور یعہ سرگردوں کوسٹر کیا۔ بہنجا کر ابنا فعل کرتا ہے۔ کا و بر ادر کو کو دائی اعصاب کے وزر یعہ سرگردوں کوسٹر کیوں بہنجا کر

\$68

ا بطش منت کری کی امراضیات . . . ۲ سال سے زائد عرصہ سے ذ بابطی*ں شکری لبلیہ کے مرف کے ساخھ و*ا آبت سمجھا جاتا ہے بھس کی وجریہ ہے کہ إس كى بعض اصابتوں بى لىلىر صربى مام ضى تھا يەمكىشىڭ بىر، قات مىر بگ (Von Mering) اورمنگوانکی (Minkowski) نے ایک ما نور کے لبلت کا انتہا ارکے اس من کو بخریتهٔ سداکر دیا ۔ طال ہی میں اُنگن (Allen) یے تبلاد یا ہے کہ اكراك كتے كے ليار كے تي حصے نكال و لئے جائيں نوخفيف ويا بطيس بيدا موجا آ ب، اوراگر في حصے نكال ديئے جائيں تو يه ذيا بيلس تنديد درجه كا بورتا ہے اور مزید برآ ں پہ بھی تبلاد باہے کہ وہ بافت حراہم ہے جُزیری ہوتی ہے نہ کہ عنیبی تچرتی مربن کے سریری خصوصیاتِ ا نسانی ذیابطین سے گری سے قریبی مشاہبہت ر كيت بن اور تنديد اصابتون بن كهيتون بوليت موجود بوتى بي اس وقت جب كه غذا يس حربي زياره مو - حال هي مي ايك حالت ويا بهلس كم برطس بيان كى كئى ہے اس من جُزيرى خليات كى ايك خودرُ وميش باليد كى بوكراس سيقليا شکرد موبت کے علاوت بار ہار بیدا ہوئے ۔ مُز ئی نسلیہ برآری کے بی*کرا* طالت کیا اصلاح ببوكني -

ويابطس مي اقى انده جزائر كداندك يحياتى تغيرات بالكل مفوس وممتز ہوتے ہیں خلبات میں اِتعتقا ہوجانا ہے (Weichselbaum) اورالبمنیں ات کے میز ذرات موجود نہیں ہوتے (Bensley)- وہ خترا ورور اندہ نظر آتے مین کیونکہ جزیری افت کی قلت کی وجہ سے اضیں کا مرحد سے زائد کرنا بڑا ہے۔ ا ننانی اصا نبول بن کسب لمیامتهان بعدالمهات بن اکتر طبعی نظر آنام اورکو فی مرتبح لیجهاتی تغیرات نہیں ہوتے۔ دِقت یہ ہے کہ لبلبہموت کے بعد بہ سرعت تخلیل موکر خراب ہوما تا ہے' مزید برآ ب یہ کہ اگر اصابت زیادہ مدست کی موتومزائر کے وونسیماتی تغیرات جو حاد اصانبول میں و کھے جانے ہیں غائب ہوجا سے کا رجمان رکھتے ہیں ' ليونكه طيات تدريج مروه موخه جاتے ہيں۔ تاہم ألمِّن بيان كرّا ہے كہ جب وہ كافى اختباط سے كام ليتا ہے تو خرد بني امتحان ليے ہميشہ ذيا بيلسي ورغيرفه إبيلسي

اننولین تیاد کرنے کا ایک طریغه عمل میں لا آگیا' اور بیچ طریقه مبض ترمیمات کرسائد تا چکا کامیں لا اطاقہ بر۔

تندرست فیمن نیم مولی استخانات سے بیشاب میں کوئی شکہیں اسکتی کیک محفوص طریقول سے استخان کرنے بر بیشاب میں ہمیشہ ، اور فیمندی کسٹنگریائی گئی ہے۔ جب دموی شکرزیادہ ہوکر تقریباً ہماد ۔ یا ، ۱۷ ، فی صدی کک پہنچ جاتی ہے توگردہ ڈیکیٹروس کو ایسی مقداروں میں خارج کرتا ہے جن کی مضافت باسانی کی جاسکتی ہے ۔ اِسکود ھلانو کلوی (threshold of کہتے ہیں ۔ فیمندی مریضوں کی دہلیز کلوی کم ہوگئی ہے یا زیا وہ ۔ اول الذکر طالت میں گوخون کے اندر کی فی صدی مقدار عسالم ج

سے تفت کرطبعی ورج پر بوگئی ہوتا ہم مشکر تھے ہمی خارج ہوتی رمنی ہے۔ آخرالذکر حالت میں جب کہ وموی سٹ کر کی فی صدی مقدار ہنوز زیا وہ (شلاً ۴ و ۔ فیصدی) ہو شکر کا اخراج موقوف ہوجا تا ہے ۔


خیکبن کے دموی تنگری برواشت کے منحنی Jacobsen's blood)

علی الصباح (پیمیت رکھتے ہیں علی الصباح (پیمیت رکھتے ہیں علی الصباح فالی معدے کی حالت میں وکی میٹروسس کی ایک خوراک دیجاتی ہے اور دموی شکر کی تخدین ہیں ہیں اور بعد میں مقررہ و تعول کے بعد کی جاتی ہے ۔ بیٹیاب جمع کر کیا جا تی ہے ۔ بیٹیاب جمع کر کیا جا تی ہے ۔ اور اگر اس میں کوئی مشکر ہوتو اس کی تخین کر لی جاتی ہے ۔ سیارہ

طبع طالب علموں کو . ه گرام د کمیٹروس وینے کے بعد ڈ اکسٹ رڈ بلبو۔ و بلبو مِنْ (Dr. W. W. Payne) کوجو نتا نج ماصل موے وٹسکل مھرمی تبلا کے سیمی بس - الف سارے گروه كا اوسط منعنى ہے، حب بسست ترين منحنى ہے اورج بلندترین منی ہے۔ آخرالذ کرمالت میں مبتاب کے اندرسٹ کر کا ایک شامعات المتمينون منعنيون مي وموى تشكر وُيرُيط مُحَقِينَا مِن فَصِيلُ كُرْمَعْرِيهاً نقطهُ آغا دِيرٍ ا ائتکی لیکن اوی ارتفاعات بھی نظر آرہے ہیں۔ بہ طریقہ کلوی ذیا بعلیں کی اصا نبوں کے گروہ کو حتیقی ذیا بھیس سنگری سے علی دہ کرنے کے لئے استعال كياجا آيد (ملاحظه هوصغه فه) (84) اس كروه بن تكرى برداشت كامنى طبى بوتاب، أگرچەرىفى ملىل شكرخارج كرنے دیتے ہیں۔ فرابطیس میں دموی شکر اکثر معمول کے نسبت زیادہ سرفت کے ساتھ مرتبغ ہوتی ہے اور أس كابدار تفاع منسَنَدُ زياده لولي عرصة يك جارى رسّا هي اور آبتدا في ليولي والبيي ميں بہت اخير ہوماتي ہے ۔ اِسے شکل مرح ميں مب ج ، اور دمنج بول سے طاہر کیاگیا ہے ، جو ذیا بیلس سٹکری کے مختلف شد توں والے مربعیوں عاصل کئے گئے ہیں۔ مقابلہ کی غرفن سے الف سمنی بھی ثنا مل کرلیا گیا ہے 'جو طبی طالب علم کامنی ہے جوشکل ، ۵ کے اوسط منی سے نہا بہت فستر یک منا بهت رکه این و کیاجائے کا که زیابلس کی مالت میں بی منعنیات زیادہ لمند ہونے کا رجمان رکھتے ہیں ایمکین اِس سے نبی زیا وہ ممیزامروہ طو بل عرصہ یه جوان کے گر کرنقط اُ غار میک پہنچنے میں صرف موتا ہے۔ یعومیہ جیشہ ڈیرمہ تخفظ سے زائد ہو تاہے ۔ گلوکوس کی صبح متا وجوبچوں میں استعال کرنی جاہئے ١١س كه المح لما خطه موصغي 6) -

ذیابطس کی ضبف اصابوں بن جنیس میں اوقات عندا کی شکر بولیت (alimentary glycosuria) کے نام سے یا دکرتے ہیں مر کا دی میں کا دیا ہوتی ہے۔ لیکن کا دیا گئردیٹ کی غذا کھانے کے بعد ہی بتیاب بی شکر خارج ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ شدیداصا بنوں میں غذا کوتمام کا دیو ہائڈ دمٹیں سے مبراکردیئے کے بعث میں شکر ملسل ناریج ہوتی دہتی ہے 'جس کی وج یہ ہے کہوہ پروٹمیز سے اور غالباً

چرنی سے میں بیدا ہوجاتی ہے۔ مشکر کے معربی کا شفات ہے۔ بنینیاں کٹ کے کیفی کا شفاہ (Benedict's qualitative test) میں ایک امتحانی کی کے اندوشتہ میتا کے تین باجار قطروں میں (حس کا استحصار قطرو کی سامت پر ہے ،محلول بنیڈ کی ط



شکل ده مدور شکری برانت کیلیمنی


كهمى سى شامل كرد في حات بين ، إلى أيرو كوكرم كرك خوب جوش ديام أب

ك الرامري ومتياط ركفني جاسيت كدوه ملول شديا جائ جر بينيد كمث كركمي استحال كيك مخفر بولها ورص در الله برايخ خيف المقدار سبيد سفوف عال بواب سشر كيك شرك كرموع ورود اور بیل ایک دومنٹ کک جاری رکھا جا تا ہے اور بھر آمیزہ کوخود ہو د معندا ہو ہے دیاجا تا ہے۔ اگر کلوکوزموجو دہے تو یہ آمیزہ ازسرتا یا ایک رسوب سے بھر جائے گاجومکن ہے کہ سرخ کی زردیا سبزی ماکل ہو۔ اگر سٹکر کی مقدارہ ، فی صدی سے کم ہے تو یہ رسوب صرف تعندا ہوئے بری بنیا ہے۔ اگر شکر موجو دہیں ہے تو یہ محلول بالکل صاف ر مبنا ہے۔

فینائل هائلہ بن کا کانشف (phenylhydrazine test) ۔

ایک امنی نی نقریباً اپنج ک فینائل ہائڈریزن صائیڈ روکلورائیڈ (phenylhydrazine hydrochloride) سے اور دوسرے لم اپنج ک فینائل ہائڈریزن صائی اور دوسرے لم اپنج ک سوڈیئر ایسٹیٹ (sodium acetate) سے بعرلی جاتی ہے۔ بھراس امتحانی نکی ویٹا ہے سے آومعا بھر لیا جاتا ہے 'اور پھرسب کو ایک بن کنتہ ہیں بندہ سے لے کرما شھرمنٹ کک (جس کا انتصار موجودہ سے کی مفدار بر برو تاہیہ) کرم کیا جاتا ہے۔ آسے ٹھنڈ ابولے دیاجاتا ہے۔ زر دفعل کا امتحان کیاجاتا کی جس سے خروبین کے نیچے باریک قلمی سوٹیوں کے کھے نما جمنڈ (فینائر کلوکومازو) طاہر بول گے جوہ ۲۰ درج سنٹی کر ڈیر بھیل جانے ہیں۔

تقطیب نما۔ ولی کیسٹروس تطیب کے متوی کو دائیں طرف بھیردتی ہے۔ اس میں بیٹیا آگسی بیو ماکڑک آیسٹر کی موجو دگی خلل انداز ہوتی ہے 'جوجپ گرداں جوتا ہے۔



شکل مره .. ذیا بیلس میں دموی مشکری برداشت کے مین منحسنی (بیان کم لحد من طاحظے مربو)

مغالطات ۔ نواہ مشکر موجود نہی ہوئم تکزیت بے اندرگلانگوائک ایسٹ پورک ایسٹر یئورک ایسٹر کرئے ٹینن اور موموجینٹ آبیٹر کی موجود گی تعوری ترجیع (reduction) وافع کرسکتی ہے۔ اسیو اسط خفیف ترجیع شکری موجود کی براس وفت زیادہ والالت کرسکتی ہے جب کہ بیٹیاب کی کٹا فستِ نومی پست ہو برنسبت اس حالت کے جب کہ یہ بلند ہو۔ کٹا فت نوعی کومحکوس طور پر بلند ہو۔ کٹا فت نوعی کومحکوس طور پر بلند کریے کے لئے بہت سی شکر ہوجو د ہونی جا ہئے۔

400

گلامُكيُودا بك اكيسلُ بميشه سي دورري شئے كے ما تھ جرما آئ جوکہ پیشا ہیں خارج ہوتی ہے۔ یہ مار فیا کلورہ فارم کے بخار کلورل ہوٹا کیل کلورل کا فور کو پیما کیاب مینی ئیلی میلک آیسٹ اور طینک آیسڈ کے استیمال کے بعد یا یا جا آہے۔ و کمیٹروس کے علاوہ دوسری ٹکریں تھی پیٹیا بیں السکتی ہیں۔ لیو بیُولو زخارج ہوسکتی ہے ' ڈیکیٹروس کے ساتھ اور تنہا بھی۔ اس کی موجود کی سے کردی قلت (hepatic deficiency) کا اختال پیدا ہوتا ۔ ہے اُس سے ترجیعی اور تخمیری کا شفات حاصل ہوجانے ہیں' لیکن اُس کی تفریق اِسْکُ خِبِ گُردا نی سے اور شیلی و ٹا وُ کے کا شفہ (Seliwanow's test) سے کی جاسکتی ہے ۔ ہم سی سی بیٹاب اور اسی سی کاشف بیلی واکو (Seliwanow reagent =ر بیارسِن ۵ گرام ایدروکلورک آبید مب کی کثافت نومی ۱۹۵ ہو' ، اسی سی 'آبِ کشیدہ ، اسی سی) کے آمیز بے کو ایک بین جنتر کے اندر چند منت كُ كُرم كياً ما آ ہے عمال تك كدوه أيلنے للكے و أكر ليو يُولوز موجود ہے توزس محلول کارنگ سرخ ارموانی موماتا ہے الیکن تنها ڈیکیٹروس رنگ کاکوئی اييا تغيرنيس بداكرتي أكاذب ليوبيولوز (pseudo-lævulose) (أيسو گلا کو بورا بی آبید = iso-glycuronic acid) بھی ہی رنگ بدا کردتی ہے۔ ليكشوز دوده بلانه والى عور تول بي لمتى ب اور التحرفوار بجول مي مجيب معدی معوی النتها ب (gastro-enteritis) کی شکا بیت ہو۔ اس سے ترجمع کا شغہ طامل بوجاً أب مر تخري كاشفه نبس عامل بوما اوروه راست گروال بوتى به-فینائل الدر بزین سے امتحان کرے براس سے علمی سوئیاں مامیل موتی ہیں جو کروی حبندٔ و س کی صورت میں ہوتی ہیں اور ۰۰۰ درجسنٹی گریڈ بیر بھیل ماتی ہیں۔ جِن مَصِلُول مِن ارا بِبُوز (arabinose) موجود بو (بینے چیریز:cherries کم میکینس

مريحة مرضى نظرية في سي - أكثر أس من ذبول بالتليف موما ما بيط إيه دونول بك قت موجو د ہوتے ہیں۔ اور اِن حاکات میں جو دو سرے تغیرات کیتے ہیں وہ حسب ویل ہو تے ہیں ویے غذے کے بڑے حصوں کامتغیر ہو کرشتمی بن جا ا ' تعییج' نزِف کا طال قنا تول میں سنگ اور دو ہرے رسیجیاتی تغیرات براس سے پہلے ور کیا کیا ہے۔ بهت سی اصا نبول مین با تنجه وس ای میں جو تفور تی مدت کی ہوں وہ سر-اعضاکے بعدا لممات مظاہرطبعی حالت سے بہت کم مختلف ہوتے ہیں۔ زیادہ یُرانی اصابتوں میں وہ امراضیاتی تغیرات بائے جا انتے ہیں جو بیجیب دگیوں کی وَمِ سے ہوتے ہیں۔ اکثر گرد وں کی کلانی یا بی جاتی ہے اور زیا وہ مُرین اِ صابْعول میں اُنبونی طلبات کلائکو مین کی در بیزنش اور ترویبی شخرطا ہر کرتے ہیں[۔] جو کینونیت کی وجہ سے ہونے ہیں ۔ خالی آنکھ کو جنگریں کوئی غیر ممولی ہاست نظر بنس آتی 'الآخون لونبت یا دَیا مطیس اسمر (diabéte bronzé) کی شافه اصابتون ي- (مِلاحظ بوصغم 394) - خون بعض اوقات ايك عجب كلاني یا اِسْرا بری جیارنگ ظام کرتا ہے اور ایک طرف رکھنے پراس کی سطّے برایک ملائی جیسی ته جمع بوجاتی ہے۔ اِس حالت کوتشخصوالدام (lipamia) کتے ہیں۔ ن اِس لما ئی جیسی تہ کو بنا سے والے ذرّات یقیناً اصلی ُجربی کے ذرات ۔۔ نگف اورلىسى تقين (lecithin) اور كلا بۇلىن (globulin) _ بىخ بوك ہوتے ہیں (نیز ملاخطہ ہوصنعہ 981)۔ خون کی حالت دورانِ زندگی بی مشکرتی عروق میں مشنّافت کرلی گئی ہے' جناسخیہ شرائین اور اور دو دو نول نعرمینا کے مرکز میں سامن محیلی کے رنگ کے اور محیط میں الائی کے رنگ کے ہوتے ہمر

(شبكينى تشخير الدود (lipæmia retinalis) - وه تمسع بوت بي اوداكي دوت المساحة وركب المستحد الدوية المساحة المستحد الدوية المستحد الدوية المستحد المستحد

ت (ketosis)- جبكاريو بالذريثيس كي قلت بوا ما انزالذا كامرمين الانتج ماسكين توغالبا غذائي شحرا ورصباني شحركاربو بالثرريث مي تبدل ہوم! تی ہے' اور اس کے ساتھ ہی اس شحر کسے ایسلٹو ایسیٹلے ایسل CH COOH= CH, COH (جس كوغلط طور برواني أيستنگ ايستركيت بي مناہد (8) - یہ ایک زہری شئے ہے' اورغالباً بڑی صدیک مگرکے اندر ترجیع کے در بعد بير بي . آكسى بنوا سُرك ايسل CH, CHOH CH, COOH میں مب میں ہوجاتی ہے اور گردے طبعی طور بران دو نوں بہ سیار کو تلف کردیتہ بين مراس على من متضرر مومات بين (41) تصور اليسموا بينك أيسه كارك وراني اكمالد (CO) كواكر مالم كو نفضان سيراً بسبتون (CO) كواكر مالم كو نفضان سيراً بسبتون CH3CO UH3 مِن تبديل بوجا آسهدرية مينول استنسيادخون اورمشاب مين ظاہر جوتے ميں' اور مزيد تر آل اليسٹون سائنس ميں ممي خارج ہوتا ہے۔ اس مالت كوكيتونيت كيته بي (لاحظه بوصفحه 451). به دوران فاقه مي ظامِر ہوتی ہے' نیز اُس دفت جب کہ غذا میں کا ربو ایڈرمٹیں کی قلت ہو' بالحضوص آگر جربی مدسے زائد ہو۔ اور شدید تفے 'جسے کہ دور تف (eyclical vomiting) ا وروورا نِ على كَيْ مُتلف قي كي حالت مي جموى اوضعفى حالتول cachectic) conditions) میں۔ اور ما بعد عدم حبیت (post-anæsthetic) یا م کلوروفاراً كَ آجِلَ تَسْمِيرٌ ("delayed chloroform poisoning") تَسْمِرُفَا سَعُورُسُ طاد اصفروبول (eclampsia) اورالنشناج (acute yellow atrophy) من جو ب طُرکا مرکزی تنخ شمی تغیرات کے ماتھ ظا ہر کرتے ہیں۔ تندرست وشخاص می سود یکم با فی کاربونیٹ کی بڑی مقداری لینے کے معد - اور ذیا سطیس شکری میں جب ایسٹوا بسٹیک ایسڈ خرن کے اندر ایک لمندار کازیر ہنے جاتا ہے تومكن ہے كہ وہ قوما بيدا كر كے بلاكت بيدا كردے۔ يبي شديد فريا بيطيس ميں اور عرصة كم قي بوسي كم بعدى واقع بوسكمات (المط خلد بوصفى 841) شديد

ذیا بیلس کی ایک اطالت نیزیر اصابت میں مربض کے نول کے سانقہ جہمانی شحم ٹری مہ تک غائب موجاتی ہے' اورمکن ہے کہ کیتو نیت بھی تقریباً غائب ہوجا ہے' لکر ہمریفن فافہ انوار سے ہلاک موجاتا ہے۔

ت سینے سر بری کا شفات - قارورے کے بٹا آگ ایسٹہ(B-oxybutyric acid)کے لئے کوئی لونی کا شفہ نہیں ہوتا ۔ گر آی کاشغه (Gerhardt's test) جوالیبیٹوا پیٹیک ایپڈکے کئے منتعل ہے' یہ ہے بشاب مِن فیرک کلورا' ٹہ (ferric chloride) شامل کردینے سے ایک پورٹ وائن (port-wine) جیارتگ حاصل ہوجا آ ہے۔ گرم کرنے سے بدغایہ یہ کوئی زیا دہ نا زک کا شغہ نہیں ہے۔ اِسے اِسُس مالیل تعامل بم سلی سیس (salicylates) لینے کے بعد سمبی حاصل ہموجا ماہے کیکن آخر الذکر ت میں گرم کرنے سے رنگ عابب بنیں ہونا سوط سیمنالط ونروسائلہ sodium) ما تخه أبيينُوا بيينك أيبنُه اوراُييينُون دويونnitroprusside) كاشفات حاصل ببونے من كيكن وه اول الذكر كے لئے إسس سے تقريباً بميں گنا زما وہ حیاس ہوتے ہیں کہ حتیج آخرالذکرکے لئے۔ لیکا ک کے کا شف (Legal's test) میں میشاب کے اندرسوڈیئم نائٹروٹروسائڈ کی ایک حمیوٹی قلم اُس کے تازہ تیار کئے ہوئے محلول کے چند قطرے ٹیکا ڈے جاتے ہیں' اور بھیم تدرے کا شک سوڈوا (caustic soda)- ایک شاہ وا زجیبا سرخ رنگ پیدامپوجاما ہے جوملد ہی ماندیٹر ما تا ہے۔ اب أیسٹنگ آیسٹر کی وافر مقدار مَلَا ویٹ ہے۔ ، قرمزی مرخ (carmine-red) یا نسبتهٔ گهرا ارغوانی رنگ بیدا بهوجانا -----وتحيرا كے كاشفه (Rothera's test) ميں ميشاب ميں جابدا يمونهم لفيد ط کے ساخة سوڈیم نائٹرویروسائٹری ایک قلم اور اُتیونیا کی وافر مقدار سطے الکردی جاتی ہے' جس کسے بتدریج ایک ارغوا نی انگ منو دار موجا ناہے۔ الیسیٹو الینٹک اُبٹے کے لئے سب سے زیادہ صاس کا شفیری ہے۔ یہ کا شفات کیتیونیت کی موجودگی ظا ہرکر نے کے لئے تونہا بت عدہ بی

لیکن اس کی مقدار ظا ہر کرنے کے لئے رحب سے یہ دریافت ہوسکے کہ آیا فرابطیر

مریض کو قوما ہوئے کوہے یا نہیں) جیندا ل کارآ مدنہیں۔ اس کا ایک جب تو ابد سے کے قریب بوناہے توفشار خون کے منفوط کے ساتھ گردوں کی فراق قوت زائل ہوتا نیروع ہونی ہے، جس سے بنیا ب کے اندران اسٹیا کی منعدا رہمی کم ہوجاتی ہے اور اِس کے العکس بہنون کے اندر ثمع ہلوجانے ہیں۔ ان کا یہی ا تباع ہے ص سے خطرے کی مفدارکا اندازہ ہوتا ہے۔ اِس کے بین طریقے ماصل ہیں بن ت فاكده أبنا يا جأسكتا ب (ملاخطه موصفحه 452) . مجموعي ناكثر وحَن سے أيمونيا ناكثرون كى نسبت كى دريا فن اور ۵ گرام سوۋىئىم با ئى كار بونبېڭ برا و دېن د بېغە كا كاشفاك سے بیلے کا فی طور پر بیان ہو جیاہے کہ جو فیزی کاربن ڈا فی آگیا کڈوالے طریقہ (alveolar CO2 method) کا استحصار ایس حقیقت پرہے کہ طبعی کارب ڈیا نی آ کرائڈ کی فدریں ہوم اور ۲ مر 4 فی صدی کے درمیان موتی ہیں' اور بیمردوں کے بت عور تول میں کیبقدر نسیت تر ہوتی ہیں۔ ذیا بطیس میں بِ فی صیدی قدر کے بہ معظ میں کدار اصلاح واقع نہ ہوئی نومکن ہے کہ جو بیس کھنٹے کے اندر قوا طاری ہوجائے۔مریض کی جوفیزی کارین ڈائی آگسائڈس اور سم فیصدی کے درمیان 'ونو ممکن ہے کہ وہ بہت و نوک بلکہ جیند مفتول تک زندہ رہے۔خراب سے نعراب تر عالت میں اسے نمین اچارون سے پہلے قوما نہیں طاری ہوگا۔ یہ پہلے ہی سیان ئىلگىلەپ كەكارىن ۋا ئى ئېتىمسانىڭ كى وەستىخىنى**ف جوز يادى تىنىنس** كى وجەسسے واقع موم ے ایک اسی میکانیت ہے جوخون میں کے نابت ترشے (fixed acid) کیزیا جا کی تبویق کرتی ہے' اور یہ خون کے ہائڈروجنی رواں کے ارکیکاز کا حدسے زیادہ ارتفاع ہومے کو روکتی ہیں ۔

علا ان ۔ فرا بطیس کے حکمہ کا آغاز اکثر غیر محسوس طور پر ہو آ ہے۔ مربیف محص بتدریج محسوس کے حکمہ کا آغاز اکثر غیر محسوس کو انہا ہے اور زیادہ محص بتیاب میں کوئی تبدیلی ہونے کے بجائے گرزوری اور لاغری کی شکا بیت ہو۔ بعض اصا تبول میں حکمہ کا آغاز جا و ہو تا ہے اور بوتا ہے ہے جب کہ اُسے پہلے بہل تشنگی محسوس مولی تنفی ۔

زیاده شدید می اصابت مین جس کا آغا زماد طوریه بویای نسته ضیف اسابت برهدکرزیاده شدید بوگئی بواجمیز عالمات علاج زبونے کی صورت بی جلدی اساب به مین المات علاج زبونے کی صورت بی جلدی اسی به مین از بوجائے بین کر ان کے معلق مغالط کا اختال نہیں رشاء وہ علامات یہ بهت زیاده گذائر جسانی کم وری اور فر بائی یہ بعض اوقات بموک بے انتہازیاده بوتی ہے کہ لیکن دورسری اصابتہ لیمی وہ بہت کم متا بر بوتی ہے اور اکسٹسر بوتی ہے کہ گوشت جسی ، بوجاتی ہے اور مند کا مزاعم والم بیشا بر باہم المری مقداروں کو بصنم کرنے بر کی والد بھی اوقات بولی کے گوشت جسی ، بوجاتی ہے اور مند کا مزاعم والم بیشا بر باہم کی والد بھی اوقات بولی کو بیشا بر باہم والی مقداروں کو بصنم کرنے بر کی والد بھی اوقات بولی کے اس کے مار تو اس کی کرم ایمی فرائی بر مقداروں کو بصنم کرنے بر کی والد بر بر بر بائی کی میا بوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ساتھ تند کیا برت شدت کے ساتھ متا در بوتا ہے ، اور مریض برسرعت لاغ بوکر ہے انتہا کم ور جوجاتا ہے ۔ وہ داغی محنت پر راغب نہیں بوتا اور مریض برسرعت لاغ بوکر ہے انتہا کم ور جوجاتا ہے ۔ وہ داغی محنت پر راغب نہیں بوتا اور مراج بر جرجاتا ہوجاتا ہے ۔ جوفیزی ربی سیدائی کی وجسے اس کی طبیعت بہت اور مزاج بر جرجاتا ہوجاتا ہے ۔ جوفیزی ربی سیدائی بوجاتی ہے اور مکن ہے کہ کوورتوں بی جیش کا آنا موقون بوجائے ۔

بیتاب کی مفدارزیاده مورد دانده با الید بوطاتی بواد خاج شده کرد ، مگرام اورادر کا ارتبحاز مرفی صدی تک موتا ہے ۔ اِس قدر شکر کی موجود گی کی وجہ سے بیشاب کی کشافت نوعی بره کر ، یم ، ایا ه یم ، ایک بینچ جاتی ہے ۔ پیٹیا ب عمو اً بیسیکے زر در نگ کایا ققریباً پانی جیسا موتا ہے ۔ اُس کی برسو کمی کھاس جیسی میٹی پیٹی اور مزہ بھی مٹھا ہوتا ہے ۔ تعال ترشی ہوتا ہے ۔ اُس بی ایسیون کا کیسٹو ایسٹی ایسٹر اور بیٹا مٹھا ہوتا ہے ۔ تعال ترشی ہوتا ہے ۔ اُس بی ایسٹیون کا کیسٹو ایسٹی ایسٹر اور بیٹا

آگسی بیوٹائرک آییلڈ موجر د موتے ہیں۔ ن کہ طرک ذخر نہ سراتی ریک

ویا بیطس کی نفیف اصا تبوّل کو بیف اوقات " غذائی شکر بولیت "کے ام سے یا دکرتے ہیں کی بردا شت کے منحبیّات سے ظاہر ہوا ا م سے یا دکرتے ہیں کیکن دموی سٹ کر کی بردا شت کے منحبیّات سے ظاہر ہوا ا سے کہ یہ ختیقی ذیا بیطیس کی ایک قسم ہے 'آگرچ مکن ہے کہ شکر بولیت مرف ایک ایسی کیر المقدار غذا کھائے کے بعد ہی پائی جائے جس میں نشاسنہ بہت موجود ہو۔

برگیاں۔ ذیا بہلیس کے دوران میں متعدد سحب کہاں واقع ہوئے کا امکان ہوتا ہے۔ مگن ہے کہ بول مشکری کی خرابش عورتوں میں ایک تخليف وه حكذ الفرج (pruritis vulvæ) أورمروون مي النهام حشيقه (balanitis) يداكروك عليدكي مام خارش عبي بوسكتي سب مكن ب كرصبي ع تختلف مصول برباتراج بيجه رفيد (carbuncles) اور كرمل (boils) بيسارا موجانين اوراول الذكرموت كالماعيث موجانين - فيابيطس مي نهن د سلحه (xanthoma) سمی بھی ایک نتیکل و تھی گئی ہے ۔ بعض اوقات یا وُل کی انگلیول کی یا ایک تورے جارحہ کی گھنگرین بھی ہوتی ہے ملکن یہ اتھیرویا ٹی شرائین کیسانھ والب ته بوتى ب يمكن ب كدا لبلومن بوليت موجود بؤجوسا تقدوا تع بونيواك کلوی تغیران کی لالت ہے۔ ذیا بطیس من اخیلی حصف اور کری حصنکے عمواً غیر موجو وہمنے من - بدا توالتهاب اعصاب معيط كي وم سے بوتے بي neuritis) یا اُم حنونہ اور رہا دی اور ہے کے درمیان کیچھلی عصبی جڑول كر رميتوں كے اسمطا وك إعث جس سے نتاع كے يحطے استوا ورس تغيرات واقع بوطائة بين (11)- وجع العصب (neuralgia) تنديد بوسكتاتية التفوص وَرِكُ فَذَا لَي اور توامي لا تي إينته عن عبي موسكتي ہے۔ نها بت لاغراشخاص مي ياُ وَلِ اور لمَا مَكُولِ كَا أَ ذِيمِا (صنعفي فقايج) وسي<u>كف بين آسكنا ہے ' اور وہ مو ڈ</u>يمُ با ئی کاربونیٹ کی مدسے زیا دہ متنا ویں ویسے سے بھی بہ اسانی پیدا ہوسکتا ہے سل مربوی نام السریه اور دو مرس ماری امراض فرابطیس محربیون مي اس سے زيادہ عام طور برنبيں ہونے كہ جننے عام آبادي ميں موتے ہيں۔ ليكن یں اندارسنبلہ خراب ہوتا ہے، گوزا نہ حاصرہ کے طُرقِ علاج سے اسے بہر بنا دیا ہے۔ ذ ابطیس میں مصارت کئی طریقوں سے متا *اشر ہوما*تی ہے۔ مکن ہے کہ

نظر كى قوت ما سكه مي سرويع تبديليا ب اوركليل لنظري (amblyopia) عضله كديبية کے منعف اور وسائط کے انعطاف نمامیں تغیرات کے باعث ہوجوغالیا شکر کی مرجوزگی کے باعث واقع ہوم نے ہیں۔ ذیا بطیسی نزول الماء (cataract) عمر بمشیخری قسم كا مواہد يكن نوعمر انتخاص من أباب مؤخر قطبى نزول المساء posterior) (polar cataract فربا بیطیس کی وجہ سے بل سکتا ہے اگر دیدیہ بہت مشافہے۔ مرم يضول مي النبّاب شبكيه (retimitis) عام بيئ جوصلا بن الشراني البّار شكيبهَ سے ماثل ہو آ ہے ۔ ا مكا ناية ذيا بهطيس اور يكينتي التهاب دو يو*ل ثمر يا ني مز*ل کے بعث انوی طور پر موتے میوں اور دو نوں بی کوئی راست تعلق نہیں ہوتا ۔ روسے تغيرات بدير ب النتاب فرحبه (iritis) . فلف المفلة صبى لتباً retrobulbar neuritis) جوعصب بصرى كا ذبول (optic atrophy) بيداكروتيا سب neuritis) شيداكروتيا سب شبكي تشحم السيداور زجا جيدمين نزفات ورشبكي تشحم السيداور زجا جيدمين نزفات ورشبكي تشحم السيداور زجا جيدمين نزفات والمورشبكي تشحم السيداد والمورش المورسة المو (retinulis من کا بیلے ندکرہ کیا گیا ہے شدیدعلاج اکردہ اصا بتول یں -و ما سطسی قولا (diahetic coma)- بدنام اس گروه علامات کو دیا کیا ہے حونون میکے اندرا کیٹٹوا یسٹنگ اُپٹر کے اختاع کے باعث پیدا ہوجاتے ہں' جو نظام دورا نِن خوت اور مرکزی عصبی نظام دو نوں ہر ایک زہرکے طور ہر ا ترکیکے ہلاکت خیز نتیجہ ببیدار و تناہے ۔ اس علالاً تی مخلوط کی سبیب می خوانگے اندر کار مِنَ وْ الْمَى آگسا ئبله (CO_a) کی قلت بعبی مکن ہے کہ حصہ کینی ہو۔ قوما کے ا راب مُورّه به ہن : _ (الف) ایسی غذاجس میں بروٹمین اور شحم بکثر سے ہو۔ (بَ) اشتعالِ بِآجِد ما تی صدمہ ۔ (ج ِ) عام عدم حبیت یفالیاً گیس اسکیجن کے ساتھ' سب سے گرمنٹرٹ رمال ہے' کسکن یا بہت اہم ہے کہ مریضِ نیلا نہونے یائے ۔ (۵) حاور انتیں ۔ (۷) گردوں کا ناقص فعل محب سے اسٹیوائینٹک المينة كانامكمل اخراج موتا ہے۔ (جِرَ) قبض۔ (سِ) آيك نوعمر مين مِن عِلَي بدن كى حربى النولين كى مدوست برمه كئى ہو النولين كا استعال حارى نەرتكىنا . تواكا أغاز أكر بندريج بواجئ ليكن علامات ذيل ال كي خبروية بن :-فقدان استنتِها' بِمثِیّاب آورسشکر کی روز انه خارج ہو سے والی مفدار میں آیک

ــريع شخنيف' بشاب مِن البيُومِن اورسسائك كيموجود گئ اور ٻيٽبلا قبين. بعض اوقات شدید در دشتکی بوتاہے۔ اس وقت مریفن کسیقدر خلد ہی حاکست لا بوحا تاليد ـ نبغي سريع وضعيف موتى سبع، درواحمشيني تناؤكم بوماتا ہے سطح جسم سرؤ جہرہ بچكا بوا اور حراج كبو د بوتے ہيں۔ مريض نيم، زيه الحكور، كيسائة برار ستأب أورايي گردوييش برانتفات بنيس كرّا. اور کوسوال کرنے براسے بندار کرکے اعظاما جاسکتا ہے گروہ آمیسی برمواسی سے، حواب و تناہے (بشر طبیکہ وہ حراب دے پائو یا وہ اُسے ا و معدرا ہی سمجما ہے نىغنى إن اصابتون مې مخصوص طرز كا جو تاب يەپىنى دە تامېتە تامېنة ، مېنه ، محجمرا ، اور آ ہ کی نوعیت کا ہوتا ہے ۔ سینہ کے حرکات نہا بیت وسیع ہوتے ہیں۔ تنف خانمه کے قریب کمبیقدر زیا وہ بار ہار ہونے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ سینہ کے ہ سے کوئی غیر مر لی جز نہیں تا ہر ہوتی ۔ اِس شکل کے تنفس کوجو ہے المواکث میں ۔ بہت سی اصلِ تقول میں مریفن کے مبتر کے قریب ایک میٹی سی خومشبودار ا یا آثیری کو محرس ہوسکتی ہے کہتے بعضوں نے سیب کی کوسے تنظیبہ وی ہے۔ یہ بوالسٹون سے منوب کی جاتی ہے مکن ہے کہ یہ مالت ایک ون سے من ون تک جاری رہے' اور بھر نبف زیا دہ زیا وہ صنعیف ہوتی جاتی ہے' گومکن ہے *کہ قلب قوت کے ماخد حرکت کرتا رہے ' مریفن زیا دہ بیے مت* اور بارلا خر ہا لکل **توہا زدہ ہوجا آ ہے' اور مو** نت اس منظر کوختم کر دیتی ہے ۔ کیم*ھی کیم موس کی*تھ ندیان کے ساتھ مرسرا ا رہا ہے۔ مبض اصابتول میں علامات سنبیّہ مبہت تریادہ سرديع بونے ہيں۔ مريض دفعنةً مهبوط بوجا ماسي اس كى نبض سريع و معيف اوراً طرا ف كبور بوجاتے بي - جوع البوا منو دار بوجاتی ہے اوروہ جو بیس یا جھتیس گھندں میں مرحا آہے۔

کلوی شنگر بولیت (renal glycosuria) عیر خبیت شکر بولیت (benign glycosuria) (سلیم فرابیلس:diabetes innocens) ان مطلاط کا اطلاق ایک الیمی مالت بر کیاجا تاہے ' من میں مربین سالها سال تک تنکر سلسل خارج کرتے رہتے ہیں کیکن وہ نہا بیت کا مل صحت کی حالت میں رہتے ہیں اور

کسی ایک سے کی جاتی ہے اور نسٹگی کی موجودی کی دریا بغت ترجی استانات میں سے
کسی ایک سے کی جاتی ہے اور نسٹگی کرت بول یا عضلی کر وری کی موجودہ یا آب
سرگذشت جی وجود موتی ہے کو ذیا بطیس شکری کی تعظیم کی موجودگی نظر
اگریشاب کا استحان نہیں کیا گیا ہے کو مکن ہے کہ اس مرمن کی موجودگی نظر
انداز کردی جائے اور مربض کا علاج ایک مبہر کردوری اور 'ناطاقتی'' کے لئے
کیا جائے کہ ایسے استحاص میں جن کا فراموش کردیا جائے کہ بیجید گیوں میں سے سی کہ
عاج کہ ایسے استحاص میں جن کا فریا بطیس بونا نامعلوم ہے 'قو اکا وقوع ذیا میں
عام کی وجہ سے ہوسکتا ہے ' اور یہ کہ ذیا بطیس کے مربینوں میں دوشکر ہی (جوافلہ
کی ہی وجہ سے ہوسکتا ہے ' اور یہ کہ ذیا بطیس کے مربینوں میں دوشکر ہی (جوافلہ
کی ہی عام مت ہوسکتا ہے کہ اس سے شکھ شکافی کی حود ت بیش آتی ہے جب کر کی پین
کی ہی عام مت ہوسکتا ہے ناص وقت اس وقت بیش آتی ہے جب کر کی پین
کی ہی عام مت ہوسکتی ہے ۔ خاص وقت اس وقت بیش آتی ہے جب کر کی پین
موجود کی اور فینائل ہا کڈریز بنی کاشفات سے در کیسٹروس کی موجود گی ٹا بت ہوجکی
ہوتے ۔ سریری کا شفات سے شکھ نا حاص میں خرابی گیا ہے ' لیکن اگر
ہوتے ۔ سریری کا شفات سے شکھ نا میں خرابی گیا ہے ' لیکن اگر
ہوتے ۔ سریری کا شفات سے در کی اور فینائل ہا کٹریز بنی کاشفات سے در کیسٹروس کی موجود گی ٹا بت ہوجکی
ہوتو بھی یہ معلوم کرنا صور می ہوتا ہے کہ آتا یا مربین حقیقی ذیا بطیس تعکری سے بالمائی سے بوتو بھی یہ معلوم کرنا صور دی ہوتا ہے کہ آتا یہ مربی خرابی کی تا بات ہو کی یہ بوتو بھی یہ معلوم کرنا صور دی ہوتا ہے کہ آتا یا مربین حقیقی ذیا بطیس تعکری سے بالمائی سے بھی کو تو بھی یہ معلوم کرنا صور دی ہوتا ہے کہ آتا یہ مربی حقیقی ذیا بطیس تعکری سے بالمائی سے بالمائی کی مقابلہ کے اور کی کی میں موجود گی تا بت ہو جب

اگردموی مشکر ۱۱ روسے اوپر ہے توتشخیص بنایت امید افزا ہوگی، گراگروہ اس کے کہائے وہ اس کے کہائے وہ است کی کہائے کہا

بیداد ہوسے پایس ۔ سخریز ۔ چول کے علاج کا جلد کیا جانا بنا بہت اہم ہے کہ اہدا وقتاً وقتاً استحان بول کی سفار مض کی گئی ہے۔ استعان بول سندر رکت اراکین خاندان کی حالت ہیں اس وقت بقیناً عمل میں لاناچا ہے جب کہ ذیا بطیس کسی خاندان میں موروثی طور برجلا آر ہا ہو ۔ ذیا بطیس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے لہ صحت مندانہ زند تی بسر کی جائے ماتھ ہی با قاعدہ ورزش جاری رکھی جائے اور فر بہی اور مرکزی عفونت سے بچنے کی کوشش کی جائے ۔

علاج ۔ ذیا بیلس کا پیلاعلاج جو عقلی اصول کے مطابق بیف ' رولو یے گیا ۔ اس سے حیوا نی غذ اکی خو راک تجویز کی حبس میں نشاہتہ اور شكرموجو وندتمقي يبطلهاء كك يهي طريقه نهايت عام طور براختيار كباحا التحيا وريرون ا در شعم کی بڑی بڑی مقداریں دیجاتی تھیں۔ایسی غذا کے ساتھ ذیا جیلس کے کشی ن کے پیٹاب کا شکرے خالی ہونا مقابلةً مشا ذامرتھا۔ اُن تجربات سے ج آتیف - ایم - آمکن (F.M. Allen) سے لبلیدر بورہ کتوں پر کئے اوران سرس شاِ بِدات کنے جو وات نور ڈین کو سکیا (Guelpa) اور گرا کا م نے مختلف افزمات مي كئے علاج ویا بطیس میں تقلیل تغذیه کی اہمیت کوواضح کردیا عمواً اختبارکژ طریقہ یہ ہوتا کہ پہلے فاقد کے ذریعہ سے بیٹیاب کوخالی از ٹنگر کر کیا جاتا' اور بھرغذا بندریج برمتی مونی مقدارون می دیجاتی، کاربواندریک کی در آید کو پیشدت محدود كرد ياجاً أ اورمريض كومتعلاً معمول سے كم غذ ادريجاتي اكه وه وُبلارے-رغذاما منے والے شخص میں اساسی شخول سین ہوتا ہے، جنا نخیر بری بافت بر رْ منبتَّه كم يْرِيّا ہے۔ يه امراًس وقت نها بيت نفع بخش ہو آہے جب كہ بر بِرَارُ قَلْت زوه ہُوتے ہیں رجیے کہ ذیابطیس میں 'کیونکہ اگران برکام کا بارصے زياده دُوالاحاتا ہے تو وہ تبدریج خراب وخستہ ہوجاتے ہیں۔ کنٹیر برونمین والی غذا اُ ماسی تول کو بلند کردیتی ہے۔ اِسی کو بروٹمین کا نوی حرکی فعل کہنتے ہیں اُبنون کے انگٹاف سے ذیابطیس کے علاج ہیں ایک انفلاب پیدا ہو گیا ہے۔لیکن اگرجہ اب فاقه کی ضرورت نہیں آہی تا ہم غذ اکی کسیقدر سحد پر اب بھی عمر ماً ضروری موتی **ک**ر النصوص زبا وه شدید اصا بتوں میں ۔


ملاج کے تشروع میں امکانی مرکزی سرایت کا جودندانی راسی سرایت ' مغونتی لوز مین مرارہ کیا زائدہ دودیہ کی وجسے ہو' استیصال کردینا چاہئے۔ علاج کا مقصدیہ ہے کہ النولین کا استعمال ایسی مقداروں میں اورایسے اوقات میں کیا جائے کہ دموی سٹ کر جو بیس مگفتوں کے دوران ہیں طبعی صدود کے

ہے۔ امول علاج ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر و بین کے ایک مریض کی دموی ٹنکر کی تخمینو ل بر متبط کیا باسکتا ہے ' جوشکل ۹۵ میں تبلائی گئی ہیں۔ منحنی ب اوسط منحنی ۱ الد
کے نسبت باند تربے کیو کدکین در روفین کے بجائے کار بولا کار بیٹ بیا ہوا ہا۔
الف اور مب میں غذا وہی تھی ۔ ناسٹنۃ اور رات کے کھالے سے پہلے ہا رہ گھنے کے وقفوں سے روزانہ و و ارانسولین دینے کا اثر بہتیب مجموعی ایک و وگونہ محنی پیدا کرنا تھا' اور ایک ارتفاع کھائے کے فوراً بعد ہوکر اُس کے بعد ایک سقو واہر انتفاع تمام کے بخوا۔ اس مرایس بیت زیادہ بمدن کی ایک کمیقدر کرتر مقدار سے مبریکا ارتفاع تمام کے اور تفاع کام کے بخوا۔ اس مرایس بیت زیادہ بمدن کی ایک کمیقدر کرتر مقدار سے مبریکا ارتفاع تمام کے بہد شروع ہوگیا' ادر اُس کی توجہ اُس بڑھی ہوئی تحولی فعالیت سے بوسکتی ارتفاع کے نبد بر بیدار ہو لئے برد فعنگ و افع ہوتی ہے۔ دو بری اصا بتواں میں اِنسولین کی مین مبتا دوں کے ساختہ مام کا ارتفاع بہند تر ہو اور جب اِنسولین کی مین متنا دوں کے ساختہ کو بقول کے نبد اور اُس کے وقت میں البا بایں وجہ کہ بروطین تحول کار ہو ہا کہ دیسے و ہوا ہے اور اِس وجہ سے وہ رات کے وقت میں میں بوجہ تو کہ ہو اور اِس وجہ سے وہ رات کے مقت میں میں بوجہ تو کہ ہوا ہو کہ اور اِس وجہ سے وہ رات تک ملتوی ہوجہ تا ہے ہوجہ تا ہے ہوجہ تا ہوجہ تا

جبعلاج ابتدارٌ شروع کیاجاً ہے توہ یا ۱ اکائیوں کے اشرابات ناشۃ اور رات کے کھانے سے نصف کھنڈ پہلے وئے جاتے ہیں۔ یہ متناوہ رووں ہا یہ نتیہ رے روز بقد رہ یا ہے اکائیوں کے بڑھاوی جانی ہے۔ اس سے بیٹاب بی شکر کی ہوکر الآخر غائب ہوجاتی ہے۔ اس ورجہ ہیں اگر مثنا نظالی کرنے کے مبدیوں شکر کی سخین کی جائے اور آئندہ ہا منٹ کے دوران یں ظارج ہونے والے مثنا کی سخین کی جائے اور آئندہ ہا منٹ کے دوران یں ظارج ہونے والے میٹاب کا امتحال کیا جائے تو و بلیز کلوی کی تعیین کی جائے۔ اگر و بلیز کلوی کی تعیین کی جائے ۔ اگر و بلیز کلوی کی تعیین کی جائے ۔ اگر و بلیز کلوی کی تعیین کی جائے کہ دموی شکر طبعی یا معمولی (۱۱۹ء۔ ۱۹۰۰) ہے توجو بیس گھنٹوں کے دوران میں متوا ترو تو ہو بیس گھنٹوں کے دوران میں متوا ترو تو تو بیس سے کردموی شکر کر بین خارج ہوئے والے بیٹاب میں شکر کی عدم موجود گی یہ ظاہر کرتی ہے کہ دموی شکر کر بین دیا جو نے تو الے بیٹاب میں موالی خالی از شکر امتحانات کی تو تع

ناکرنی چاہئے ۔ بھراگر د ہلنہ کلوی ملندہ تو قارورے کے امتحانات کی کچھ اہمیت ہیں ہے ۔ نیکن را قرالحروف کا تجربہ ہے کہ جب ایسولین کے ذیبے طلبے انتیار کیا مآ انہ تو آبند د ملیزات کلوی لبر مرفت طبعی موجاتے ہیں۔ یحیب یدہ اصابتوں میں شکررکے بالآخرٰغائب موجا ہے کے بعد انسولین کی زیا دتی کو مزید جاری رکھنا جا ہے' یہا تک مریض اس کی منتا د کے دوتا چھ کھنٹے بعد آیک نہا بیت ِ خلیف سا قلیل شکروموتی رمل (hypoglycæmia reaction) محموس كرين لك بعني حوارج كالرزم بموك خلوء يامنلي دوران سريا حكيرُ ذرمني اختلالات دردسرُ انتبلاجات ُ خسِتْلَيْ غشیٰ من بن مہری ! گرمی کے اخباسات اور تسمبی سہال۔ یہ علا**ات** ان کے وقوع كح توانرك لحاظ سے مرتب كئے كئے بس (12)- إس در بعدے مرفل كي ا بندا ئی درجہ میں اور طبی گرا نی میں ہو ہے کی مالت میں ہی عموس کرلتیا ہے کہ اِنسولین کی تقررہ مفدارہے زائد لمنے کمے اثرات کیا اور کیسے ہونے ہیں۔ اِل تحربه کی بنا براس کام کنده علاج سبتهٔ زیاده و تو ق و اعتباد کے ساتھ کہا جا لیکا-اعظم متا دحین کا مریض متی موسکے گا اُس مقدار سے ذرا ہی کم ہوگی جویہ علاات بدا کاویتی ہے اور یہی متبا دستجربز کرنی جاہئے ، کیونکہ یہ دموی کشکر کوطبعی درمبیر اُوَّ بیشاً آب کومشتقلاً فا کی از شکرر کھیے گی ۔ ایسے ذرا مع کی وساطت سے دموی شکر کے امتعانات کی صرورت بڑی حد تک لاحق نہ ہوگی ۔ آگرہ طبعی اشخاس من موی تَكُر تَعْرِيبًا ، . ، . كَاكْ كُلُتْ جائے سے عمواً علامات بیدا ہو قبائے ہیں آخرالذکر مِعضَ المَسے مربی نوب کوجوء صه دراز مک بیش شکرد موتی ره چکیون دموی ننگر کے منعبتاً لمندتر شالاً 9. ء . فی صدی ۱۲ ، فی معدی طبکه ۱۸ د . فی صدی سے بھی اوبرکے ایولوں برمحسومسس ہوسکتے ہیں' جسس کی دحہ غا لیا _کے کہ ان کا جم عرصهٔ درازسے مبیش مشکر دموبیت کے منوافق ہوجیا ہے (89)۔ سخت لاغر مرجیو کی مالت میں بہت اختیا طُ لازم ہے۔ اُن کوا تبدائے علاج ہی بی کاربوا کہ ریکے وینا جا ہے تاکہ فلیل تکومویت کے شدید علامات نہیدا ہون یا بین اور سل ر یوی می جالت میں اِسولین کی مقاد تبدریج برمعانی چاہئے تاکہ دموی تکرتبدیج كم ہو ورندمكن ہے كەمرابيت شديد طور پر بغز ك أسفے-

مکن ہے کہ ذیابطس کی شدیداصا توں میں اِنسولین کی ایک مقادوہ یا آن گفتر ہوں سے فلیل مشکر دمویت کے علاقات پیدا کر دے اور پیر قبل اس کے کہ دور ا مقاد ۱۲ گفتہ کے عرصہ میں دی عاب کے وموی مشکر برسرعت بلند ہو کرشکر بولمبت پیدا ہوجائے۔ یہ داعیہ براس امر کا کہ اِنسولین کا استعال روزا نہیں بار کرنا جاہیے بیدا ہوجائے۔ یہ داعیہ براس امر کا کہ اِنسولین کا استعال روزا نہیں بار کرنا جاہے۔ بیعنے یہ بجے میسے کا کہ بہے دو پہراور یہ بیتہ شام کو میسے تمین خاص کھانوں سے پیا۔



تنکل ۹۵ - دس تکرای بیالیس سال آومی کی شب کاوزن ۱۳۸ بی غذا دیجا منونی افض س وقت لیا گیجب که اس کونمین دن کک ایک اسی غذا دیجا رہی بس میں ۸ دگرام بروٹمین سبریال اوشتی بتیس سنحتی ب تین ول بالکل السبی بی غذا کے بعد الآید که ۳ گرام بروٹین کی بجائے آئی بی تقل بالکل السبی بی غذا کے بعد الآید که ۳ گرام بروٹین کی بجائے آئی بی تقل کاربوا کنڈر سٹ کی دی گئی موکد ناشته اور را ت کے کھامے پروٹوبل روٹی اور آلو کو کو کی کے گئی سن سام کا کھا اور آلو کی کھانے سام کا کھا اور النولین جودی گئی ۔ ن اشته در وو پرکا کھا اور السلی شام کا کھا اور السلی بیج جائے ۔ س رات کا کھا آ۔ وموئی تکر برکا کھا اور السلی کے طیفے سے ۔ بر رات کا کھا آ۔ وموئی تکر برگی ٹرازل (Hagedoru) اور بیس سام کا کھا ہے۔ بیس سام کھا ہے کھا ہے۔ بیس سام کھا ہے۔ بیس سام کھا ہے۔ بیس سام کھا ہے کھا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے۔ بیس سام کھا ہے کہا ہے کہا

بعض او فات ایسولین کے انٹراب کے بعد فوراً مریضوں کو ڈ کک لگنے کی ح

لیفہ ہے کی شکا بیت موجاتی ہے جوائنولین کے محلول میں ترشد موجو و ہونے آ د بہ سے پیلا ہوتی ہے ۔ اس کور فع کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ ماس کی تعدل <u>کیلئے</u> ریکاری نجے اندر انسولین کے نصف جم کے برا ہر نیے طبعی کا (100 N. caustic soda) للعنيو لياحائد الجس من ٢٥٠٠ في سدى طرا ني كربيال (tricresol) موجود ہو' اور ایسولین کے سابھ آمہ کر لیاجا نے بہس کی تھیک ﴿ طلويهِ متعدا رمختلف سمَّا رتى حيفا ب كي السولين كحد لما لا يسيمختلف بيو تي ____ یکن اتنی *کا فی استمال کر فی حاسبے کہ جس سے پیکاری میں مُرتسب* اِنسولین ک*ی وجہ* ت تغیف میا مکدر سدا ہوجائے۔ اسولین مجنورت قرص مجی دستیاب موسکتی ہۓ جسے انتراب سے فی الغور بیلے آب عقیم میں حل کر لیا جاتا ہے ۔ نیہ ی ددوڑ ہے جومقام الثراب يراره كحفير بعد بيدا بوكردوبالتن دن مي رفع بوجاب ني بين به المفعوص أن سخاستول كے إعث ہوجانے ہیں جرائس خاص حیایہ كی إنسولین مں موجود ہیں کہذااب دوسرے حیایہ کی امنولین آنا کا جائے۔ بیشتر انگریزی اسولین گائے سے بنائی جاتی ہے اور مکن ہے کہ اس کو بدل کر خنزیری اسلمن د نامناسب ہو۔ مکن ہے بینود اسولین کی صاس کری کانیتی ہول اور حیونی مچھوٹی اور مرمنی ہوئی خوراکیں دے کرماسیت ریائی کی آزا^{دش} کرنی جاہئے۔ النولين كے علاج ميں ايك متعقل غذاكا دينا عروري ہے۔

بعض معيارى غذا بي صابيط

	کار بولائڈریٹ اور شم کی نسبت											
	1:4		1: ٢		1:1		1:1			حوالیے		
براا	ش	لوس	پگرام	شر	四	براثا	شر	رھا	بكرآا	ش	√ ೨	
6	+	1 =	14	+	1	4	J	ı	14	1	+	۲
ar	rt	1	04	7 1	9	4	4+	4 +	50%	9	4	16
44	4	17-	1			44	7-	1	29	11	01	10
^1	o t	17:	77	4	10	1-1	11-	17+	1190	1.	۵	77
	متن س ع ٠ اگرامشح							بولأكث	رام کار	/r.=	لاس	

جدول مترجهانی وزن (یاوُنڈ)

	عورت			2/			
اقل	اوسط	اعظم	اقل	اوسط	اعظم	جم كاطول (أي)	
71	ro	71	71	10	71	۲.	
74	77	14	14	777	ا مم	rr	
74	هم	00	۳4	44	م ه	7 ~	
34	٥٤	44	44	24	40	74	
09	47	**	۵٤	4.	AY	44	
٧ ٢	4.	1-9	۷٠	^4	1.0	۳.	
1	4^	171	41	95	114	jm;	
9.	1-9	188	^۵	يم - و	170	44	
49	119	الرم	9 ~	المال	اسما	rr	
1.4	1 171	14.	1.7	150	70	ا بهر ا	

171	يا بيلس شكرى اس			,	غلطب عبلدووم	
	عورث			مرو		. كاطول (ايخ)
اقل	اوسط	إغطم	اقل	اومبط	المنظم	
110	۲۳۲	120	115	444	174	ro
179	100	19-	175	100	115	74
157	149	7.0	تهمسوا	141	۲.,	m2
100	۳ مرا	774	کم کم ا	14/4	112	۳۸
			<u> </u>			

(بوط) عظم اور اقل اوز ان طبی افراً دکی تقریباً ، به فی صدی تعدادی بولت اختلاف ظاہر ِ

رقیق - به و کمها جائے گا بڑی جمامت والے انتخاص بی یہ نہایت وسیع ہے (3)
مریض زبن بربیٹی کراپی گیشت کو مضبوطی کے ساتھ دیوار سے لگائے

رکھتاہے اور اس کے کھنے خمیدہ او نے بیں ۔ سبم کے طول کو زمین ہے سرکی چوٹی

مک و بخوں میں اپ کراس کا مقابلہ جسم کے وزن کے ساتھ کیا جا آ ہے ، جو بغیر کیڑوں

کے یا وُنڈوں میں لے لیا جا آ ہے ۔ اگر مریض کسی مرض کی وجہ سے صدسے زیادہ موٹا

ماصدے زیادہ و کم الما بہوتو اس کے طبعی تحول کے صول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ

المدہ میں المدہ کی میں المدین کی میں کے دریا کے معمول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ

تعفد الا میں اوسط وزن سے ہو اس کے جیم کے طول کے نتنا ظر ہو گام لیا جائے مذکہ اس کے صلی وزن سے ۔ جدول سلاعمومی استعال کیلئے ہے ' جس سے اسی وفت یہ ظاہر ہوسکتا ہے کہ آیا مریض میے حد موٹا یا ہے حد و کلا ہے ۔

ذیا بیطسی مریض کے علائے میں آج کل اس سے زیادہ کار بولائے رسٹ ویا جا آئے کہ بنیا رہ کار بولائے رسٹ ویا جا آئے کہ بنیا زیانہ ماضی میں 'اور بشیر طیکہ غذا کی کل حراری قدر وافر نہو انہوں کی احتیاج اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ حتی بست کار بولائڈ رہنی غذا وُل میں ۔ حقیقت میں بلند کار بولائڈ رہٹ اور بست شع والی غذا جس میں ہوجا تی ہو ہو 'ایک فر بدمریض میں دموی شکر کو گھٹا کہ طبعی کک لائے میں کا میاب ہوجا تی ہے بغیراس کے کہ انبولین کی حذورت بڑے ۔ لیکن اگراس قسم کی غذا کو طول مدت میں جنراس کے لئے استعال کرنا بڑے تو بھر حیا میں لواور کے مزید دینی جا ہمیں ۔ غذا میں تجویز کے لئے استعال کرنا بڑے تو بھر حیا میں لواور کے مزید دینی جا ہمیں ۔ غذا میں تجویز کے لئے استعال کرنا بڑے تو بھر حیا میں اور دے مزید دینی جا ہمیں ۔ غذا میں تجویز کی دینی جا ہمیں ۔ غذا میں اور کے میں ہمولت بیراکر ہے کے لئے استعال کرنا بڑے تو بھر حیا میں اور دے من بدو بنی جا ہمیں ۔ غذا میں اور کے میں ہمولت بیراکر ہے کہ لئے 'مصنف مے کئی ایک غذا کی ضا بھے تکا لے

میں ٔ جن میں ہے۔ بعض جدول میں دیئے گئے ہیں ۔ ہرضا بط می**ں ، ہر**گرا**م کے کاربوا**الاً اُ را تبول کی ۱۰ گرام کے سحبی را تبول کی اُور گرامول میں بروٹمین کی ایک مِقْررہ تعدا ہ ہے۔ اویر کی سطر کو حوکہ ۲۰۰۰ حراروں کے تمنا طرہے 'جمع اور تفریق کرکے مزی صالط نکا لے ماسکتے ہیں۔ ان سنبوں کے مکا لئے بیں اس امرکا بالکل لھا وائیں نیا گیا کہ پروٹمین کار بوبا 'نڈر بیٹ باشم کا افذ ہوسکتی ہے۔ ای<u>سے حبابات م</u>د زیا ده فرضی هوته بین اور لمند تر کاربولی ک^{ار} ریٹ و الی غذا ُو**ں م**س شخم کا کلسه ال كاربو الدريث كے افذكى يشيت سے كھداہميت نهيں ركھا يكاربولا للزريث ا تتح ين ١:١كى نبت بايت عام طور يرمنيد يا فى جائے كى ليكن كول كے كئے م المرج بي اوراك لبن تركار لولا تُذريك والى غذاصلابت شرانين وبي صدريه عَفونت اوس ريوي مي خاص طور يمنيد بوگي - قديم رواج كي غندا ا: ایک نمنا طریقی کاربوز کرریٹ اور شیم کے رائنب فہرست الف مب اور ج سے طاصل کئے ماتے ہیں جو ہرغذائی اسے کی وہ مقدار بتاتی ہیں جو کہ بورب أَمُّ وص كاربو لأندريثي ياستحى راتب كم تنا ظرب اورفهرست في تي اسي غداي درج بين جن مين كار بولا نظر سك شحم اور يرومين موجود هي اور كه ميم مسلمولي استعال کے لئے چند مرکب اغذیہ درج اہیں۔ زیا بیطسی مربیض ہروہ غذ ا کھاسکتا ہو جو کہ معمولی وصنوع عاد تا کھا تا ہے استرطیکہ اس کے اجز امعلوم موں اورغذاول س اللیم کے ذریعہ مریض خاندان کے معمولی کھانوں میں شرکی ہوسکتا ہے۔ ی سے کہیں ٔ زیا وہ تغصیلی فہرست حس میں ۲۰۰ مرکب اغذیہ درج ہیں ، کسی دوسری مبکہ تما رئع کی مار ہی ہے (64)- شکروا ایکھانے (dishes) عام طور پر انسولین کے ذراہی مبدلینا جا ہئیں مینی ناسشنۃ اور رات کے کھا نے پر ۔ کیکن ہرتِ سطیم اس کو با لکل منع کردیتے ہیں۔سبر یوں کے لئے رعا بیٹ وی جاتی ہے کیکن آلوگوں' میم کی چیلیول (butter beans) اورمٹروب کے سوا ان کو تولنے کی ضرورت ہیں۔ مان بخی از ادا نظر بر لے سکتے ہیں۔ انگل دینے میں وہ مقصد نہیں ہوسکتا جوكة زاندامني مي برتا تحااور برتريه ب كداس سي اختناب كياجائ - بكيرول (beers) میں ہم تا مر فی صدی کار بولائدرسٹ موجو د ہوتا ہے۔ معلما کرنے کے لئے

یکرین (eaccharine) استمال کرکتے ہیں۔ یہ غذائی جدولیں بیشتر کار ہا ہُڈریٹ اور شرح سے اختاکرتی ہیں۔ ہروٹین کو کر وہیش کرنا ریا وہ اہمیت نہیں دکھتا کیو کک سسی کی موادی قدر اس سے کر ہوتی ہے کہ متنی شم کی۔ یہ دیا وہ مہمولت وہ ہوگا کہ خذاکو گراموں ہیں قولا جائے اور ان کسروں (fractiona) کے جمارے ہیں نہ بڑا بائے جو کہ اونسیں استمال کرنے ہیں بیدا ہوتی ہیں۔ جدولوں ہیں دو نون ناپ بی بیدا ہوتی ہیں۔ جدولوں ہیں دو نون ناپ بی بیدا ہوتی ہیں۔ جدولوں ہیں ان کی کھی مقدا وہ ہرکے کھائے کے ساتھ وہ ہوگا کہ اور ہرکے کھائے کے ساتھ اور ہائے کے ساتھ مجمی دی استمال کی کھی مقدا وہ ہرکے کھائے کے کہ ساتھ مجمی دی استمال کی کھی مقدا وہ ہما ہو گراموں کے ساتھ اور ہیں کہ ایک گون ایسا انتخاب کہ دوران کی کھی اسی کھائے سے ایک ناوروس کی اسی کھائے سے ایک ناوروس کھا ہے کہ دروی تعلی ہو گائے ایک کا توروس کھا سے سیلے آگھائے کے دوران میں واقع ہوجائے گا۔

انسولین کے علاج کیلئے مریض کا انتخاب ۔ کوئ کرلیت اکر اوقات کے لئے انسولین بنی انتخاب کرنا جائے مریض کا انتخاب ۔ کوئ کرلیت اکر اوقات اسی نوعیت کی ہوتی ہے ۔ میں جاس کی کے ساتھ حیتی ذیا بطیس بطردا کی سیمیت کی ہوتی ہے ۔ میں جاس کی کے ساتھ حیتی ذیا بطیس بطردا کی سیمیت کی ہوجود ہو' اس مورت کو اس امر کے انتخاب کا اختیار دینا جا ہے کہ جا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کے موجود ہو' ایس کے دمویت کے تقریباً تمام مریضوں میں طلامات کو بات کے دمویت کے تقریباً تمام مریضوں میں طلامات کو رفع کو دیے میں جوکا میا بی اِنسولین سے مامل ہوتی ہے اُس سے ظاہر بوتا ہے کہ ایسی تمام اما بتوں میں اولی نقص لبلہ میں جوا ہے' لہذا ترین متل ہی ہے کہ ایس کا المارس دی کے اِنسولین استعال کی جائے' اور جب ہی ہے کیاں جسے کہ گنگرین' نزول المارس دیوی' ذیر صدریہ وغیرہ' موجود ہول تو میتینا ہے ہے۔ بنا بیت خفیف معتبر مریفوں کی مالت میں گئی اور ش میں اور ش میں اور ش میں اور ش میں اور کوئی مالت میں دورا ہوت کو کھمشاکر کے کھمشاکر کے کھمشاکر کے کھمشاکر کے کھمشاکر کے کھمشاکر کے کھمشاکر کوئی مال کوئی کوئی کھرارے ذرا ہیت ہوں وہوئی کے حوارے ذرا ہیت ہوں وہوئی کرکو کھمشاکر

اللب بطدورم	ذيا بيل <i>ين شكر</i> ي	APP

ہیں مند میذنی میں با گرام کا ربو ہائٹ ربیط موجود کرام یا انس موتيابكو (pearl barley) (butter beans) ميم كي والي كاراكتيم اسوقت جكهوه دسترنوان برمني حاك . 지- 기다 가다 가나 가나 المرا (H&P) (water bisruit) مراب (captain biscuit) عَلَيْ مِينَّ لِيَّالِي الْمُعَالِقِينَ الْمِينَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُ روفی محضر موے آئے کی خشك كرده مشمش سما 14 فرکس (force) 14 + گولڈن سرب لائل کا Lyte's) golden syrup) 76 + نشهد (Macaroni) كروني 130 76 + ارفید کویر (Cooper) کا م كسفوروك 20 (oat meal) tike مٹر کا زہ ایکے ہوئے آ لو سنے اُلے ہوئے 1 12/2 1 110 با ول تول موك (اوريع دصوك الله) 74

ATO	من شری	زابلٍ	فحاطب وجادووم
مقدا وس برش بجابود	יטי		
گرام	م <u>ی</u> ا اونس	ہیں دجود گراہ	مدرمة بل بي ، أكرام كارو إلى ريث
•	<u> </u>	ri	ب شکر
•	r <u>r</u>	rr	کساواکی سومی (tapioca)
لوس	ار در مان انت (ب	ف كاربولم	کاوا بی توخې (tapioca) قېرست ب ـ نصر معانه ته از ماه رسخينه بو ۱ داو
	دانکے خلاف بیان کیا جائے اورخور	دا محورت یک	ميل جوازه اور سنجنة بول ال
•	1	مو ا	
ا <i>و</i> س اوس	گوم	بموجود میں	مندرجه ذيل مي اگرام كار بويانترريش
۳	ar		سيب
ي د	تع بغير ١٦٢	ميت لين ممثليوآ	خوبانی (apricot) محصلا
۲	24		كمبيلا
47	144	(ليك بيري (blackberries)
r 1	48		رف (cherries)
1 4 A	144		لشمش مسياه
9	700		كشمش مرخ
۴.	110		آلوبخارا (damsons)
4. 14.	ir.		کوس بیری (gooseherries)
r i	44		انجمور پر سخ
۳ ۱	98		(greengages) گرین گیج
4 - 17	717	(yellow melon) يَلُومُكِن
r f	174		نارنگی سر
7/ ₄	111		آ ژو داره شاری
r <u>\$</u>	1-14		نامشیاتی انتائس' ٹین ہند
1	۳۱		
۴	199"		(Victoria) (plum) ملم

الم مب - جلاوا	تره بيس عري	474
لام الخس	ريث موجود بي	مندرمه وملي من الرام كاربوايش
	مثلیوں کے ومیمی آنج ہے	بُرُون (prunes) جومعگ
7 41		بكائم بوئ بول
14 194	(76	رمس بعري (apberries
14	(str	اکسٹابری (awberries
	ا ن مير پرولمين نا قابل التفات	1
	يون سنزال	
	100	
		مندرجه ذبل كي معمولي مقدا
Corrections of the bar	ی. پیدا:	بنان ون بران ون
مویڈی کم (swedes) نصف محولاً کریے فو	میں ارس ، (narania)	مچھندر محاج
معت جوناريت وو (grapacruit)	پارسنپ (parsnip)	7,•
	گروه ۲ ریت د سره	l mart (ti.
		مندر جد ذمل کی اتنی مقدار
مولی	روس (celery)	يور م الله وك Jerusalem
ر يوندهيني	كمبيل	artichokes)
(see kale) و كالوكان الم	زانسیسی تیلیال French	اسپرانس (asparogus)
اسفاناج (spinach)	beans)	برسلز مسيروٹرز (Brussel's)
شاط	(lettuce) 4.6	sprouts)
(watercress) سلاداً بي	گہماکدو (marrow)	(cubbage) كرم كله
	مرزوانید کریس mustard &	(cauliflower) مچول گویجی
- (ل ش س س)	(موقعه من منهمی رانسب په نصف شمی رانسب	
١٠ الله تقوارون بي پر دُين بي گ ^{وور} وس وس	· •	بيان الله
وس گرام ام	ب گرام ا ۲	مندرجر ذلی <i>یں هگراشهم وج</i> رورا ممون
• •	7	
F	10	(cheddar)

APZ		ذ إسلس تعكري	الرطب ملدودم
ان تعارون ل تن بروين مي	رنس اوس	.//	ما من الله الله الله الله الله الله الله الل
اردم ه	اد <i>ن</i> ا	کوم مها	مند <i>رج فیل می ه گزاشهم موجودیت</i> مینم ^و کا لندی (Dutch)
4	,	4	انداً ايك عدد
e		لي وعنيب و	علج
ماتاً الماتقارون بياتني پروين موجود	نىصدىكايا	יפננ	
ان کدرون کی کوری و برد گرام	ائرس اوس	گرام	مندر ہر ذیل ہیں داگراشتم موجود ہے۔ ملوٹرز (bloaters) کیا ب کی ہوئی
'4	1	19	
		Y A	لم بل (eal)، وهيمي آنج بريي بولي.
4	. 1	44	مِرْنگ (herring) مثلی بنوییُ مرنگ (herring) مثلی بنوییُ
)• 4	1+	44 44	کیرفه (kippers) "تنورمی تصنی بوئی . منیکرل (mackerel) "تلی بوری
7	1-1-1-1	,r.r **	مارهٔ بینز (sardines)
,,,,	•	=	سپرالز (sprats) و صور سی مکانی سو
8/6	**	rı	اور کیاب کی ہوئی ۔
	<i>(*</i>	4	سفیدمجلی (white fish) مجایات
10	rþ	4.	يكائى بوئى-
10	r /	4.	مرکز (crab) بلاسین کے
10	YT		جمینگاهمجمای [،] بلاسیبی کے*
10	中	4.	مصوقی جمبینکا مجھلیٰ بلاسپری کھے
	اوُ	ں ہوگرام کمعن کا رینہ	
		لوسنت	سور کا نمک گفا یا ہوا اور کھایا ہوا گوشت'
<i></i>	, i	à A	معور کا مماست لکا یا ہوا اور محایا موالوست گردن کا بیٹھ اور را ان کا ۔
f*	' P	10	رون و بعربی کاران نک لگائی مولی اور
ASB	1 =	٣٤	د مورس کیا کی بولی۔
	۳	•	- ·

Bade- 4- 1		ذيا بيلس شكري	AYA
نداره رايل في ده ميز موجرد گرام ا ا	ز ان ان اول ا ا	مگرام بر	مقدم وفیل می وگرام مم موجود ب محائے کی میلید کا گوشت کیے جربی کا گوشت کا مستلد دسیمی آننج پر نکیا موا کر کرا
10	r	a ^	يربي ني 4)
1710	1-	ا مِوا سهم	بچیرے کی پندلی کا گوشت بھے پر باکا لیٹا بریاں کمیا ہوا۔ چیری میں میں ہوا۔
^	,	r. اعضا	و گر توشت بدهر بی کا
A J &	. 1	ا محصما	قلب بريان كباجوا
ه دها	جم' ۲	00	کرده' تلا موا گرده' تلا موا
j.	1	٣٢	Į.
1750	۲	20	لبلبه المسيئ أنج بريكا يا بوا
٨	<u>m</u>	71	د بان وصيى آنى بريكان مونى
10	r' 0,	غيان غيان بلفخو وغ	اوجوه على وهيمي آينج پُرسِيَا بَي بُولِيَا
4.	r to	40	جوزه بريال كما بلوا
ð	p	71	بللي وسيمي آن پرياني مروني
4	r	rr	المِنْ اللهِ
14	1 1	dr	پارٹری (partridge)
14	۲	96	فيزنث (pheasant)
je.	r 	نهوا سوس	ارشه (rabbit) وتعيي آيخ بريكا يا
ه د ۱۹ ربر و من موجودیس	ئار نەرىب شىخراد	سه سري کار بولئ	بیرو (turkey) بران کیا ہوا فہرست د ۔ وہ عدا
شيء كرام موجوب	ا الاس ا	عموم الخس ۲۰۰ ع	مقدر میں۔ ذیل غفاؤں میں وہ ورو مکرب منیٹی میٹروں میں نابا ہوا

AP4			الميناكي	j	علىبددوم
گوامغون ب	شء	rs	اينس	گزم	مندم ذلي فذا دُل ي
15	1+	1	11	74.	
۲-	Y	i t	r•	104.	
			لمك	ب	
430	+	1 1	11	64 (ا تما ليود (buth oliver) (المراج
			·		ربكفاسط (breakfast) (4)
050	†	4	ť	44	-(H & P)
	-				(cream cracker)
حديم	j	r	Y	06	-(H & P) (2)
					(Petit Beurre)
450	+	1	卡	~~	P.F
	·	·	·		(shortbread) ئارىك بريد
730	į.	•	1:	٣٢	(P.F) 'r + (Grenock)
			•		+ حاكو نيث (chocolate) بورول
١.	1+	+	r	44	(Bournville)
		,			+ عاكوليث بركيفاست chocolate)
10	-	•	•	74	(cadbury) breakfast)
		(វារ	uts)	سياريا	
710	•	•	.	10	برازيل (brazil)
ery	+	ţ	14	48	(chestnut) is.
	,		,		نَفْرِرُ (filberta) ده اگرام دل
۴	•	1	4	la	رونی کملاؤ)
۳	1	, -	+	14	اخروط
			۔ 'منخ	مختلف	
•	1	•	11		(fruit cake) ا - فوٹ کیک
			•		-

٠٨٨٠	ذ يا بيلس شكري			مولي - جلدوه			
سدرجه ویل فند اول میں	گزم	ارس اوس	ك	شُ	ر گرام دیمد		
1- 1 - استنج کیک (cake)		1 1	1	1	r		
۳- بنیری فزل (strawa) منابع کی مولی منابع		·		·			
ايك جوشا ل عصد مه مينير كي ساند كي مو		1 द्व	1	i	. 3 B		
(macaroni cheese)	•						
*	***	4	中	1	410		
هـ آلونون کا مجمرا ـ ن		N 1	ŧ	F	150		
بد دو مجھینٹ کر بنائی م جعاہے یکائی موئی۔		<u>ا</u> م	.1	ı	IJ		
(ب) مينشاكر بالي مو	•	A	'ቸ	,	•,		
تنور مینی ہوئی ۔ ا بیدڈ بل روٹی اور کمن کی		14	1+	•	ij		
نسف پڑنگ	14.	4 ±	吐	1	.18		
٨ _ نبوش مزه پنه نگ ـ نصا	7).	4	r	14))		
4-(و) سوئٹ (suet) کی معاہیے پیمائی موئی ن	•	r	1	,	ل م		
(ب) برونط کی پڑنگ							
مجنئی چوئی'۔ نے مر دن	76 4	4	•	j	•		
ا ـ يارك ثائر (kshire) . ا	1						
بذبگ ۔	Nr	~	4	ł	#		
۱۱ ـ ڈبل دوئی کی بھرتی ۔ نو . وہ فذائیس من بریہ نشان مرف کمبیب ہی ان کی اجاز				4			

نشخ

را) فرومل کمیك مله وند آمام له پرندسم ناکشمش مله بوند فكر له بید کمن - ۱ اند به المنس دوره - اگرام رائل بیکنگ بودر (royal bakıng powder) بی بیون فل) - تنورس ایک گھند -

ر ۲) المتعلَّج كميلك و النوس أو في المشكر و الدنس كمين - اونس و ودعه والمرار المستج كميلك و النوس ودعه والمر

ه گرام مکینگ پوڈر (میموار ٹی سیون فل) ۔ منوریں ۵۹ منٹ ۔

(س) بنایر کی لوزیر (مادصه straws) در امر (لیا الاس) پنیر (س) بنیر (پرا (موس) بنیر (پرا (موس) کا) اونس کی ایک ایک ایک دروی لیا اونس پایی منیک سیام جهان از کمن الا کرام (ایک کی زروی لیا اونس پایی منیک سیام جهان بوئی اید کی زروی اور بانی کے ذرایی مجیلا جوا بنیراور مسالے الما و اور خفیف طور پر چھنٹی جوئی اید سے کی زروی اور بانی کے ذرایی جبیکا و کرمس سے ایک سخت بیرا بن جائے اس کو بھے سے گو ندھو بیرن کے ذرایی است دا منت۔

(۲) بندیکے ساتھ بکی هوئی مکوونی (macaroni cheese) ۔ م ه گرام (۱۲ول) کرونی [یا ه گرام یکی هوئی مکوونی (spaghetti) ۔ م ه گرام (۱۴ اول) سٹار نیز کرونی [یا ه گرام یک اول اول ایک سٹار نیز کرونی ایک گفت کی میکو کی اور نمک کے در میونوب سال دا سیار کر کے اس میں کرونی اور بشیر حصر بنیر کا طلور اور ایک کے او پر جھراک دو اور توری بناؤ ایم میکو بی بنیر کو پی بیگر کی کے او پر جھراک دو اور توری بیموراکر و ۔ مدت و مرمن م

(۵) آلو وُں کا بھی آل۔ ۲۰۰ (عگرام) مجیلے ہوئے پُرانے آلووُں کو بجش اللہ میں ہوئے کے بُرانے آلووُں کو بجش ا بہاں تک کدمہ نرم ہو جائیں ' پانی کو میمینک کر منیف سی مجاب دو تاکہ وہ پورے پک جائیں۔ اس طبع کیانے پروزن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک اونس دودھ ' ۱ اگرام (ہے اونس کمن کے ہمراہ منجر تا نا وُ اورسیاہ مرج کلاؤ۔

(ا) چیدنگ کو بنائی هوئی بل کے ۔ (ال) ، گرام (لم) اوس) آم ، ایک انڈا ا اونس دودہ ، اگرام (لی اونس) کمن تسلے کے گئے۔ آمیز کرو بھیٹو اورڈ معاکم کر رکھارہے دو گاہے گاہے مجنیزے بھیر بھاپ دینے والے ظرف کر کرم کرو ہے۔ (4) ذیل روٹی اور حکھن کی بٹل مگ ۔ ، ھرگرام (۲ انوس) مجھنے ہوئے آئے کی روٹی کاگرام (لے اوش) کھن ایک انڈا '۱۰ اوٹس دودھ کا گرام (ہے اوٹس ہمزا مرکث ہ

ره) خوش ذا نقد میل مگ - ، هگرام (۱ اوس) جیسے بوت آئے کی دونی کے مکرے ۱ اوس) جیسے بوت آئے کی دونی کے مکرے ۱ اوس دودھ معتدل جامت کا ایک بیاز مفلوط بوشیاں یا کئی موئی پارسلے (paraley) سیاه مرجی اور نمک ۔ بیاز کے مکرے کرکے ممکن پانی میں جوش دو بیا ل کے کو مرزم ہوجائے اندوں کو بینیٹو اجزا کو آمیز کرو الا ممکن پانی میں جوش دو بیال کہ کہ دو فریعہ خوب سالدوار بناؤ ، کورے میں ممن ملکا کو اور من سے ذریعہ خوب سالدوار بناؤ ، کورے میں ممن ملکا کو اور من سے دریعہ خوب سالدوار بناؤ ، کورے میں ممن ملکا کو اور من ہو مونویے

() سو بیت کی پل نگ - ۱ م گرام (اوس) آلی - ۲ م گرام (اوس) آلی - ۲ م گرام (اوس) آلی - ۲ م گرام (اوس) مرئے کی بور فرسو بیٹ (Atora) اوس دوده م گرام دائل بکینگ بو ڈر اور نمک کو مجھان لو یہ سو بیٹ الا کو ، بھردوده و ڈال کراس کو مجون کا نے کے فد بعد خوب آمیز کرد - آمیز ہ کو سلا بیس کی میرت میں لگائے کے فد بعد خوب آمیز کرد - آمیز ہ کو میل برایک در طور فرده کی میرت میں لگائے کے لئے جا تو استمال کرو - (ل) اس کو جربی بند کا غذ کے ذریعہ و معامک و ما جا اس کو جربی بند کا غذ کے ذریعہ و معامک و ما جا اس کی میرون میں در میں میں میرن اجا ایس کی مرورت (جے) اگر ایک سلورسائی سٹورس کی میرون (جا اوس) آلی آمیز و میں اور ۱ گرام (اور اس) آلی و میلنگر کو د کا کھی سے لئے اسمال کرو۔

(۱۰) یاس کے شاکر (Yorkshire) کی بین اگ ۔ وہی آمیز وجوکہ مطابق ہے کیکن وش (dish) کو بھوننے کے لئے کھن کی بجائے جربی (dripping) استعال کردینو میں ۲۵ منٹ ۔

(فبرمتج ووصع)

ب مجلدور	45			شكرى	م مهم نیابیطس
گرام پ	شر	لدر	رنس اوس	گام	
•	1	-	1	4	مگحن (فہرستے ہ احصہ)
					ٹماٹرا فرسٹ ب
					شام کا کھا آ
					(العيماً ٢ شيس) سوركي لأن مُك لكًا يُ مولًا
					اوردهويس سريان کې موي
•	j	-	٣	A •	(فهرست ج م حصے) میگرو دیں کی اور زیریت
		•		.4.5	اُ بِی ہوئے آکو رائے (فہرت ل کا حصد)
7	•		٣	110	ر ۱ طند) کمن (فیرست یج ۱ <u>ص</u> ے) -
•	,		7	''	سن باس د فرست 1). سبزیاں د فرست 1)
					بریک مربعر نفسف چیوا کربیپ فروٹ
					مائے سلاد (فیرست ب ₎
					(الله كا ما اش مر) و بل روش (فهرست و ا
130	•	÷	*	14	لم حصر)
					الدار) إساردين محيليا
N3.	P	•	7	77	(فهرستیج' احصہ)
**	<u> </u>	•	1	+	مكمن (فيرست ج) احصد)
4	1	**	1	1"•	رات كالمان شدر بنر رفرست واست واست
-	+	•	4	4	(الحراث المراث من الممن (فهرسته، احسه)
۵	-	中	ľ	06	(العلمية الشرام) كممن (فهرستج) احصه) دول دوقي ول دوقي
***	41	土			مچل د فېر <i>ات ب ک</i> احمد ₎
77 ,	4F	炉			۱،۱۸ مرارے سبت ف اورش کی عرازا
ا پرگاو ب	, ,4 L	۵۸گاوش	ر ال	ه ۱۵ گراه	(نام العن نام شن معرّام ب)
+10-			- (· · · · · ·	

MO			ړی	إبيلس	على خيدوم
ارم پ	ش س	ك	ارس اوس	مخرام	
4	<u> </u>	F	-	•	دن بھر دودہ کاونس (الم بانش)
		•			مبزيان فبرست و بانسف
-	•	ż	-	~	چھوٹے گریپ دوٹ سمیت
1-50	-	٣	ŗ	111	ناسشته ولبل رونی
					(العَمْ المَهُ الله المُورَا فِيكُ لِكَا إِبِوا الْوَلِوالْ
					كوشت كرون كايكيما وروا
^	ļ	~	,	۳.	كأملا بوا (فبرسيج نهض)
					مما طرد فبرست ب
4	+	-	-	-	انڈارا) دفہرستہ ج اجھے)
•	j	•	7	11	کمین (فہرست ج ' دعیے)
					ستًّا م كا كمعا أ بري بي كالُّوشَة (فهريت
14	i	-	77	7-	(الفيزوش) ج معد)
					الملي يوكي آلو كياني (فهرت
7	_	ı	•	110	(و ' احصہ)
•	1	•	7	17	مکمن
					سزیاں (فہرست فر)
					نصف عيوالكريك فروث
					مائے سلاد دفیرست کی
					(بالفيرة اش م) والم روش (فيرست و
150	-	ļ	¥	14	(1 حصر)
-	+	•	7	4	مکمن
	,		•		سارة ين محيليا (فېرست ج
917	Ť	-	¥	**	ا مصد)
130	1 	-	中央	40	رات کا کھانا شدر منے (فرستہ سے

•

بمبلدن	عخطي			اری	دياسيس على	
ورم -	-	中中	انس ج ا-	Ţ	کھن ڈبل دوٹی میمل (فہرت ب احد)	•
	^ 	·	د ا گرام	م لڪ ۽ ر	۲۲۰۰ حوارست منت لشاهدش کینادا (به واله مانه واش ماه گرام پ) ۲۱۰ گرا	
گرام پ	ئىش س	,	اد اوس	تگوم	•	
-	-	 	-	-	چمو ٹے گریپ فروٹ بمیت نامضہ ڈبل روٹی	
٨	1	espe.	•	۲۰.	(ہے الشین میں سور کا نمک لگایا ہوا اور کھایا بواگوشٹ گردن با پیمدا ور ران کا الا مواد فہرستے ماھے)	
-	i	-	-		ٹماٹر(فہرست ب) انڈے(۲) (فہرست ج' اسمعے)	
-	1		ř Ž	ır •	کمن (فہرستہ کا جھے) میل (فہرست با اصد) سشام کا کھانا ایر محمل وحیمی آنے برکی ہوفا	478
٩,	1 		٣	M	(لج الحثرَّاش») (فَرَسِنْتِج ٣ مِص) أَلِح بِوكَ لودفرِس و'	714
۲	-	j	•	110	ا مصر) -	

طبی درجه براام کے لئے اکثر خود ہی کا فی ہوں گی کیکن کیتونیت سے بینا بیا ہے ۔ بی مالی بیں کرمن میں بلند کار و انڈر میلے اور بہت شم والی فذا بھی کا میا بی کے ساتھ استعال کی جاسکتی ہے بغیراس کے کہ انسولین دیجائے۔ تاہم نوعی مربینوں بی خواہ انکی حالت کیسی ہی خفیف درجہ کی ہو انسولین کا علاج فی الفور تروع کرونیا جائے ہی آباکہ مرض خواب ترز ہونے بائے اور ساتھ ہی جزائر کو آرام کا موقع لمنے سے کسیفدر شفائل مرض خواب ترز ہوئے یا موسی معدم میں دوا کے انتھال سے نصف کھنڈ قبل ڈکیٹروس از میں بیدا ہو سے ایمونی میں دوا کے انتھال سے نصف کھنڈ قبل ڈکیٹروس (۲) اور ساکھ کی دوا کے انتہال سے نصف کھنڈ قبل انولین کی دوا کے انتہال سے نصف کھنڈ قبل انولین کی دوا کے انتہال ہے۔

ی ۱۹۳۰ میاں۔ علاج ما بعل (after-treatment)۔ مربیغوں کو یہ سکھلا و نیاجا، کہ وہ خود کو انسولین کی بچپکاری کس طرح لگائیں 'اور انتیں سٹ کے گئے امتحال ہو کا طریقہ مجمی جا نیاچا ہئے۔ معمر مربیفوں میں ایسولین کا استعال کسی وقت بجی موقوف کیاجا سکتا ہے' اور اِس سے کوئی نفضان نہ ہوگا۔ نیز مکن ہے کہ اُس کا استعال جی

ھنا غیر خروری ہو جائے۔ نوعموں میں اِنسولین کی مقنا و اعظم ہونی **جا ہے کہ مرکلہ رخ**م تمل بوسکے بغیراس کے کہ علا ات بیدا ہوں ملبی و لیز کلولی کے ساتھ میشا سب ہمیشہ فالی از شکرا ورکیتو نیت کے لیے را تغیرا کا امتحان ہمیشہ منفی ہونا جا ہے۔ اکٹر را تضراً كالمثبت امتمان أس وقت يا يا جا آہے جب كه اِسولین ہے حد كم استعال کی ماریم ہو جس سے دموی سنگر طبعی درجہ سے اور رہتی ہے (14) مکن وہ ائس وقنت مبی تثبت یا یا جا ناسیه جب که غذامین کار بولچ انشر بیث از صد کراه چربی از مدزیاده بوتی ہے اسداب ایسی حالت بوتو خذامیں کھے ترمیمرکر فیصا مرمينول كوخلاف عاوت عضلي ورزش كرنا هوتو أسنيس ايسولين كركتني أمليبني أ ورزش دموی شکرکو کی کر دینے کا رجان رکھتی ہے۔ مکن ہے کہ ایک مریغ میں علات امبی بیان کے اُہوئے اسول برکیا جار ا ہے کچھ عرصہ کے مجد مجمول کو که اِنسولین کی وه مغنا دخم کا وه عادی مهد صدیت زیا ده نما به ت**رینی میدی** لیو کله است قلیل سنگردمویتی روعل محسوس مورب میں ۔ اِس کے بیمعنی ہیں کہ اُس کی حالت میں اصلاح ہور ہی ہے اور اُس متاد کو کم کرنا جاسے ۔ اگرانسولین سے شغایا بی مکن ہے تو شفا اکا مل کے لئے بیتنا چندسال کی مزورت موگی۔ بنس ا يست - جب مريض كوكوئي ما در أيت مثلاً اكتِهاب لوزمن ا

ا نغلوُمنزا کھرا' ذات الریہ معدی معوی البّنابُ وغیرہ بوط آسے تومبم کو

انسولین کی زیارہ احتیاج ہوجاتی ہے۔ ل) اگر معمولی غذالی جارری ہے تو اسولین کی معمولی متاور کا تی

ے۔ میں اب کا امتحان ہردومرے یا تبیرے گھنٹے کرناما ہے، اور اُگر تکرظا ہر **وو** ووببرکے تعلیمے سے پہلے یا وسط مثب میں (ایک باراز اند کھانا اور و کر) اسولین کی ا کیٹ تا زومنتاد استعال کرنا جا ہے۔ حکن ہے کہ اِسولین کی مقاومی تدریجی زیادتی مجی صروری مولیکن جوری کرتمیش گرجائے اور پیٹیا ب خالی از شکر ہوا لازا انوان كوفئ لغور كمركر ويناجاب ييخ

(ب) فِن كُروك فذا بني لي جاري هه (شلاً اگر تف موجود مي)-(۱) اگر چیاب میں شکر موجود ہے تو اینولین کی پوری مقا دم مولی و تست پر بنی چاب اود بنیاب کا استان بردور به یا تمیر سه گفت کرکے میاکہ پہلے بیان کیا گیا ہے اِنسولین میں تازہ انعاف کئے جائیں۔ (۲) اگر بنیاب بی شکر موجود فرائی اِنسولین میں تازہ انعاف کئے جائیں۔ (۲) اگر بنیاب بی شکر موجود فرائی اِنسولین میں تازہ انعاف کی تازہ مقادیں دی جائیں۔ دونوں مالتول میں کرکے اگر مرورت بوتو اِنسولین کی تازہ مقادیں دی جائیں۔ دونوں مالتول میں یہ بہتر بوگا کہ اِنسولین سے آدمہ گھنٹہ بعد کلوکوس ۱۰ فی صدی محلول میں (اگرام فی اکا تی) و بناچا ہے۔

فِي البطسي قوم ا (diabotic coma) - ذيا بطسي قوا كم آفادي

النولین کی ایک بڑی مقا و (مثلاً ۱۰ اکائیاں) کی تو تحت الجاری راہ سے اور کی دروں وریدی راہ سے و نیاچا ہے ہے ہی جس کے ہمراہ ، اگرام شکرایک یا شنگ یا فی میں و نیاچا ہے ہے ہی جس کے ہمراہ ، اگرام شکرایک یا شنگ یا فی میں و نی چا ہے گئے گئے گئے گرونیا چا ہے ' بہاں تک کہ بیٹاب کیٹونی اجام ہے ہمرا ہوجائے ۔ اس کے مدائولین معد شکر کے نسبتہ قلیل ترخقداروں میں زیا وہ طویل وقفوں سے جاری رکھیں ۔ موسی کے نسبتہ قلیل ترخقداروں میں زیا وہ طویل وقفوں سے جاری رکھیں ۔ موسی کے نسبتہ قلیل ترخقداروں میں زیا وہ طویل وقفوں سے کا اور اگر تین یا جہاری مسلم میں اور اگر تین یا جہاری مسلم کرنے کے لئے میں ہوتا ہے کہ ایسے قوی علیے گئی طراستعال کرنا چا ہے ۔ اِن احتیا طوں سے کام لینے کی وجد یہے کہ ایسے قوی علیے جوزی بیلسی قوما کے لئے صور ری ہوتا ہے ' مریفن کو درمیان میں ہوش آ سے بخیر نبایی ہی تا بی کے ساتھ کھیل سے کہ وہ یہ کی حالت طاری ہوجاتی ہے۔ اگر چر بیان کر وہ طریقہ سے شکر دیے ہرا میں بونا خلاف تیاس ہے۔ اُگر چر بیان کر وہ طریقہ سے شکر دیے ہرا میں بونا خلاف تیاس ہے۔ اگر چر بیان کر وہ طریقہ سے شکر دیے ہرا میں بونا خلاف تیاس ہے۔

اس کے ملاوہ علاج کا ایک نما یہت اہم طریقہ یہ کہ ایسے سیال کی
بڑی مقداری دی مبائیں میں میں شکر اور شا پرسوڈ کیم بائی کار بونید موجود ہو۔
اس کے افر سے سیلانِ بول جاری رکم زہری اَسِیٹو اَلینیک ایسڈ کے خارج
ہونے میں دو ملے گی جو قالمباڈیا بیطسی قو اکاسب ہو آھے۔ بے ہوشس مرین میں اس سیال کو دینے کے لئے ایک معدی انبوبہ انبوبہ انبوبہ ان (Einhorn)
میں اس سیال کو دینے کے لئے ایک معدی انبوبہ انبوبہ انبوبہ و اور ایک قیف صروری ہیں۔ مریض کو دائیں کروٹ پر لئا ویا جا ایک لمیال جا ذیر کے افر سے فور آ اثنا عشری میں چلا جا ہے۔
پر لٹا ویا جا آ کہ سیال جا ذیر کے افر سے فور آ اثنا عشری میں چلا جائے۔ ایب پائٹ گرم مقیم جم نشی محلول ہر گھندہ دیاجا تا ہے یہاں تک کہ آزادا در میلان اول قائم ہوجائے۔ اگر مریض نئے کرے نواس علاج کوہر گرز موقوف ہیں کر اچاہے بلکہ اس کے استعمال کی اسلی مرت کوزیا وہ طویل کر دیتا جا جسے آکہ صدے کا فقد ما اور یہا نمویاب نہ ہونے یائے۔ ایسا علاج مہم تا مہم بھنے کرنے کی صرورت ہوگئیاں کے کہرے تو اکی حالت ہیں ہونے کے بعد مریض کا ال طور پر موش ہوئے۔ ہرستعدی کے ساتھ علاج کے یا وجود موت واقع ہوجائے۔ تو ممن ہے کہ اس کا سب یوریا ومویت ہو کیو نکہ ایسی متعدد اصابتوں میں وموی یوریا لمبند یا یا گیا سب یوریا ومویت ہو کیونکہ ایسی متعدد اصابتوں میں وموی یوریا لمبند یا یا گیا سب یوریا ومویت ہو کیونکہ ایسی متعدد اصابتوں میں وموی یوریا لمبند یا یا گیا سب یوریا ومویت ہو کیونکہ ایسی متعدد اصابتوں میں وموی یوریا لمبند یا یا گیا

معلی می این کا موسیت (hypoglycamia) تعلیل شکر دمویت کے علاقات اس سے بیلے درج ہو تھے ہیں ۔ علاج کے ابتدائی درجوں میں شدیستیا شکر دمویت کا خطرہ بنیں ہوتا ' بشر طبیکہ علاج سے طور پر کیا جار کا ہو۔ اس کے بعد مکن ہے کہ شدید معنی مخت سے قلیل شکر دمویت پیدا ہوجائے ' ابخصول است مکن ہے کہ شدید معنی مخت سے قلیل شکر دمویت پیدا ہوجائے ' ابخصول است محت کے لئے اسولین کی جب کہ لمبند کا رہو گا گئر ریٹ والی غذا کا سخول واقع کرنے کے لئے اسولین کی است مقار دیں کی مبادی ہوں۔ مریصن الحالی مقار دیں کی مبادی ہوں۔ مریصن الحالی مقار دیں کے مرتب الحالی مقار دیں کے مرتب الحالی مقار دیں کے مرتب کے مرتب الحالی دیا ہے کہ ایک ایک ما تعرب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب الحالی دیا ہے کہ ایک ایک ایک ما تعرب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے مرتب کے دیا ہوں۔

قلیل شکر کمونتی قوما (hypoglycamic coma) نظیل شکر کمونتی قوما (دیا بیلی قراک برکس بوت بین به بیند بکشرت آیا م

ورمشرف ہوتی ہے وریدی نمایاں طور پرا بھراتی ہیں کمن کو کھیدے کھوا ذیما اور اس کے سابقہ می زراق اور سیال نفٹ ہو۔ مریض مشنج اور بیٹیاب میں کیتون نہیں ہوتے۔ ایک مریض سے شکایت کی کہ وہ نہیں لے سکتا ۔ فالج نصفی (hemiplegia) بھی بیان کیا گیا ہے۔ قل شکر کے موقعی قوما کی طالت بن ایڈر نیالین (... امن ۱) ہے ہا قط وار کا بخت الحالی ماش کی طالت بن ایڈر نیالین (... امن ۱) ہے ہا

قطرول کا تخت الجلدی اشرا بکیا ماسکتائے کا اگر اس سے ناکامی رہ۔ پہنٹو ٹرین (pituitrin) کی ہی مشاوری جانگتی ہے۔ یہ طلاح مرف اسی ا

ف بخش مو گاجب کے طریب کا کوئن کا انبہا ذخیرہ موجود مورد دہن کی راہ سے یا مدی اور بی بی کا دیا ہے۔ نہوں کے در بعد کمٹر ت شکر (شکر میں یا در کی مرس کے موالی اور میں کے در بعد کو طریب ن آجائے تو د کی میروس کے دیا و فی صدی محلول کا در ول رد کی اثر اب کیا جا اسے ۔ رد کی اثر اب کیا جا اسے ۔

خور بخو د ببشل نسولنيت (spontaneous hyperinsulinism).

ابئی انسولین کے استعال سے متعلق قابل سے کو مو بیت کا ذکر کیا گیاہے نیو د فرد استولین کے استعال سے متعلق قابل سے کھ کھی یا بیش کو بن کے اعد بیدا اس کی ساتھ یا بیش کو بن کے اعد بیدا ہوتی ہو اس ہے۔ شالی قلیل سٹ کر موتی علامات کی اصابتیں بیان کی مئی ہیں بن بس اور بن اس بن مدت بار کو کا بی بین بس اور ان اصابتوں میں سٹ کر و بینے ہوا قاقہ ہوجا آ ہے۔ علمیہ کے ذریعہ بعض افقا نہیں مالت معلوم ہوگئی ہے اور ضرر کو کا میا بی کے ساتھ دور کر دیا گیا ہے۔ مین الشعاع کو ایک تنبا دل طریقہ علاج سمجھا جاسکتا ہے۔ دوسری اصابتوں میں ملمی سابتوں میں ملمی سابتوں میں ملمی سابتوں میں موجو ہے۔ اور طلامات کا سب بوائے یہ مملوص نہیں ہوا۔ گاہے حب کم بیت وہ بی بیت موجو ہے۔ کہ بیت وہ بیت وہ بیت ارتبار میں درج ہے۔ گوکہ اس کا شوت منوز منعقو د ہے۔ ایک بیت وہ بیت اور بیت موجو دے کہ یہ معنی ہیں کہ بہت وہ بیت اور نیا میں درج ہے۔ گوکہ اس کا شوت منوز منعقو د ہے۔

صفل مرنجاعی قلت نده نخاسید کے مقدم لغذ کے بہت سافعا رئی سے ایک یہ ہے کہ اینولین کا قضا والعل کیاجائے ۔ چنا نجو کسب والجواج (ریاحال کیاجائے ۔ چنا نجو کسب والجواج (acrome یعایا) کا قیاب طیس مشہور و معروف ہے یجب مربر یہ یا یا گیا ہے کہ از ایک الب ربووہ کتے میں سخامیہ کو بھی دور کر دیاجائے ، توحیوان کا فراجیس فار تی ہے اور موی شکر مکن ہے طبعی کے اوپر سے نیچ آجائے ۔ اگر نخامیہ کو نظار تی جا اور فاقت ہی اور فاقت کی اوپر سے نیچ آجائے ، اگر نخامیہ کے اوپر سے نیچ آجائے ۔ اگر نخامیہ کی نہا دور کیاجائے تو ابنولین کا طبعی تضا و العل مفقود ہوتا ہے کا اور فاقت کی اوپر سے کے بعد قلیل سٹکر و مو بیت آبانی و اتب ہوجاتی ہے جس کا علاج شکر و سالمتی ہی مقدم نخامیہ کی تجہیزات آ زائی جاسکتی ہی فیل مناز دیو بیت سا در کے مرض (Simmond's disease) (جو ملاحظہ مور) کے نام نماز دیو بیت سا در کے مرض (Simmond's disease)

شخامی ضعفه (pituitary cachexia) میں شاہدہ کی گئی ہے۔ قلیل سٹکر دمو بہت کی دگیراصل تبیں یہ ہیں : — وافر عضلی ورزش شلا لمبی دوڑ دوڑنے والول میں کی گلا کموجن کے ذخیرول کا حتم ہوجا ادر قبیہ کھلان سے۔ ملائط ہو ضمیم صفحہ 604۔

غدهٔ درقبیه

(THYBOID GLAND)

طبی غدهٔ در قبیمی ایسے طبیات موجو د ہوتے ہیں جو کو لائڈ کا فرازیدا کرتے ہیں اور اس کولا ٹرسے ایک آیو ڈین شائل رکھنے والی قلمی سٹنے علیورہ کیگی بے صب کو تھا مُواکسین (thyroxin) کہتے ہیں۔

ون کے اندرایڈرئین (edronin) کی ایک زیادتی پائی جاتی ہے جبیاکہ پہلے جمالی ایک ورقی فرق الکوی الدی جرکے کا بحون کے اندائی ورقی فرق الکوی الدی جرکے کا بحوال ہے اور جباتی میں جرکے کا بجال اندائی کی الدی خون کے اندائی کی الدی جرکے کا بجال الدی جب اور حرارت اس آلے کا الماع کرتی ہے اور اس آلہ برجرا شمی میں تا اور اس آلہ برجرا شمی میں تا اور اس آلہ برجرا شمی میں تا ہو جا ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ در آل مالیکہ فوق الکید کا فعل سروع اور خفصر ہوتا ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ در آل مالیکہ فوق الکلید کا فعل سروع اور خفصر ہوتا ہے ۔ یہ خیال نظام کیا گیا ہے کہ در آل میں برجوز العینی گائی کے عنوال کے حنوال کے حنوال کے حنوال کے حنوال کے حتوال کی گئی ہے۔

مندر جرفیل اصطلاح سے فدہ ورقبہ کی کلائی مراو ہے۔ یہ مندر جرفیل شکور میں واقع ہوتی ہے: ۔ (۱) بیش ہرو ہائی بی کے سا تد و بھلات اور افرازی صنیات فدہ میں منشر طور پر تھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بلوغ محل اور سن یاس کا گائٹر ہے اور مکن ہے کہ یہ بیش براری (oöphorectomy) اور ضی من (ovarian disease) من (ovarian disease) کے بعد مجی واقع ہوجائے۔ (۲) کو کا کا کا کٹر (encapsulated کے بعد مجی واقع ہوجائے کا کہ کا کٹر (encapsulated کے بعد مجی واقع ہوجائے کے اللہ علی کا کہ کو کا کٹر (primary) افرادی الحدوث یا افرادی الحدوث یا افرادی الحدوث یا افرادی الحدوث یا کہ واقع کی کہ مدین کر تیو و وقعی کا کٹر (secondary) (primary) کے مدین کر تیو (secondary) کو کا کٹر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

مرضِ جیٹ۔ مقامی مورث یا انفراد می محدوث گائٹر

(endemic or sporadic goitre)

بعث اساب ۔ گائٹر بعض مقاات یں کثیرالوقوع ہے۔ وہ انگلتان میں ڈرتی شائر (Derbyshire) میں اور انگلتان کے مغرب اور

جنوب مغرب اورو لمیز (Wales) میں ہوتا ہے (16)-اور شہروں مکے نعبت نہلا میں زیا وہ عام ہے۔ براغطم بروہ نتیوائ (Sayoy) سومزرلینڈ شِمالی الحب ایا عَ آمِرال (Tyrol) اور اسطائر یا (Styria) کے بہاڑی خطوں می کثیر الوقع ہے لین وہ صرف پہاڑیوں میں محدور نہیں بلکہ اُن کے بنیے کے میدا توں میں رہائی بسیلیا ہے۔ مقامیالحرث کا کٹر غالباً ہوڈین کی قلت یاغیرموجودگی کی وہ يدا بوجاتا ب اور اليسه انتفاس بي موية كارجان ركمتا سه حرسمندر سدا ر سنتے ہیں۔ نیزوہ آ میوٹرین کی ضرورت کی زیاوتی سے بیدا ہو**مآ ا**ہے جو بورلا نہ کی گئی ہو۔ اس صرورت کو زیا وہ کرنے میں بہت سے عاً لمات مں۔آب نوشدنی کا زمن کے اندر کے کسی نا میاتی اورے سے لموث موجا اور مكن ہے سرازی مو۔ سرا بیت كيو نكەمبىن اوقات جا دُگا ُسروبا ئيشكل مِي وانا ہوتا ہے (17)۔ شناخت نا شدہ ا دے [شایر سایا نینز (cyanins) بوگ اُنتی بڑ ا تمناع كرنى بس] كرم كله اوربعض د تكرسبز يول مي شيم كثرت سن كما أ- لموغ ارثر تجربي حيوانون بن حياتين لزاورج كا فقدان خواه كركوت سيمة يوثرين موجودا (47) - كائم عورتوں اور نوعمروں میں نہا یت عام ہے ۔ غیر کائم ری اضلاع بیرا وأقع ببوينه دألحا نفرادي الحدوث كائبرون كيا توجيه تمبي الميس إمول إلج ىكتى ہے۔ مقامیالحدوث كائىڑاكثر مخاطی اُخ چھا اور قمائت كے م

امراضیات عبیاکہ پہلے بیان کیاگیاہ آیودین کی قلت فدے کی فعالیت کو تحریک بہنچائی ہے جس کے ساتھ ہی افرازی فلیات کا تکاٹر موکر لیفی کی اور دموی رسد کی زیا دتی اور کو لاکٹر کی غیرموج دلیالا جاتی ہے ۔ اس کل کے کسی بھی درج میں غدے کی حالت میں حکش واقع موکٹ فال درج کے چندمال نبدو کا مل ہوسکتی ہے ۔ اس کے مرعکس مکن ہے کہ اس فعال درج کے چندمال نبدو اقیام کا انحطاط واقع جو جائے :۔ (الف) ظیات کا فربول ہو کران کے بجائے لیفی نا مضات بیدا موکر لیفیت اور دوری تکوین ہو کیا (مب) نائے کی بُری کا فی واقع موکر ائیس کے ساتھ اس کے کو لاکٹر میں زیادتی ہو جائے

(کو لا کلای گائل) پر سابقہ فعالیت کے زاد کے بعد جوکہ آپوڈین کی صرورت کے بعد ابدا ہوا تھا فدہ کا استراحتی درجہ ہے کہ جس میں کو لا کہ اور آپوڈین جمع ہوجاتے ہیں۔ درقبہ کے فدی سلمات فلوی اقیات (cell rests) سے بیسدا ہوجاتے ہیں اور یہ آسی بہیج کے تحت بڑھ جاتے ہیں کہ جس سے کو لا کم گائٹر پر جاتے ہیں اور یہ آسی بہیج کے تحت بڑھ جاتے ہیں کہ جس سے کو لا کم گائٹر بیدا ہوتا ہے کو لا کم گائٹر واضح بہی مکش و بول وری کو رہ واضح بہی مکش و بول وری کو رہ واضح بہی مکش و بول وری کو رہ واضح بہی اور درمیانی اشال عام ہیں۔ فدی سلمات بھی مکش و بول وری کو رہ کو لا کم کا کم رہ بالم مرم غدی سلمات متعد و جوتے ہیں اور سن بلوغ کے قریب قریب بر یہ بالم مرم غدی سلمات متعد و جوتے ہیں اور سن بلوغ کے قریب قریب ترب بہر یا بہر بالم بی جائے ہیں۔ بالم مرم غدی سلمات کے اور فاق ہوئی سلمی یا جندی سرکے برابر بو انتقالے کہ ایسے تو دہ کہ جو بندھی ہوئی مشمی یا جندی سرکے برابر بو انتقالے کہ اور انتقالے بالا کی صفح کے سامنے لٹکا ہوا ہوا تو انتقالے کا الا کی صفح کے سامنے لٹکا ہوا ہوا تو انتقالے کا الا کی صفح کے سامنے لٹکا ہوا ہوا تو انتقالے کا الا کی صفح کے سامنے لٹکا ہوا ہوا تو انتقالے کا اندر سرطی قرنیت اور لمنی خلیا ہے کہ اندر سرطی قرنیت اور لمنی خلیا ہے کا اندر سرطی کو نیت اور لمنی خلیا ہے کا اندر سرطی کی گائٹر کے گئی ہیں۔ اس کا ایک سبب ہے ۔

علا مات - اکثر گردن کی کلانی اور کری کا احمال ہی بنها علامات ہوتے ہیں۔
اگر گاکٹر بہت بڑا ہے تو مکن ہے کہ مری پر دبا کو بڑے سے مگر البلغ کی قصبته الربدیا

بازگرد خوبی اعصاب کے انضفاط کی وجہ سے بہر موجود ہو۔ اگر بڑھے ہوئے غذ سے
کے متعامی اثرات کے علاوہ کوئی دو سرے علامات ہوں تو وہ درقبہ کے فعل کی تحفیف
میعنی قلیل درقیت برد لالت کرتے ہیں (ملا خطہ ہونما لمی اُذیبا)۔ کولا کہ کی گاکٹریس

اساسي تول هنبي يا قدرے گھٹا موا ہو ہ ہے۔

مرطان عمواً اوطرع بحرك بعد ہوتا ہے اور ایک سخت سریع النموسلاء پیدا کردتیا ہے، جرگر دو بیش کے مصول میں درریز ہوکران پر دباؤڈ الما ہے ۔ جب گائٹر کا سب سرطان یا لمی سلو ہوتا ہے تو عمواً غدے کے افعال جاری ہے ہیں۔اوراگر اسی حالت میں و اخلی اعضا میں تا نوی یا لیدیں موجود ہول تو ورقعہ کے استیصال کلی سے می طی اُ ذمی ہنیں پیدا ہوتا۔

ر کسی کلانی کی در قدیتی نوعیت اسس سع^دا بهت او تی ہے کہ وہ الکے کے مل کے دوران میں سخرہ کے ساتھ ساتھ اویراور نیچے سرکت کرے۔ علاج ـ مقامی الحدوث كائر كے رقبوں میں حفظ انتقدم كا طربقہ یہ ہے كهموسم بهارا ورموسم خزال بي دى دن تك روزانه آء. گرام سوژيم يا بوطام ا بوڈ ارڈ انتمال کیا جائے۔ سوئزرلینڈ کی رہ سے ایمن زلی Canton of (Appensell من مُل مح بر كلوگرام كے ساتھ دم و. ما در روام يوالسيم آيورائد شامل ہوتا ہے اک تمام باشند وں کو اس کا کجھ حصد صرور پہنچ جائے ۔غذ اکی عملیہ طبعی عالتين جوكه بحث اسباب مي بيان كي مي درست كروني عاميس - ووران حمل میں ان کاعلاج کرنے سے بحیر میں بیدائشی گاکٹررد کاجا سکتاہے۔ گاکٹر کے اتبدائی ترمن ورجه کے علاج میں اس و ثنت جب کہ غدی سلحاًت موج وہیں ہوتے اور کورین کا دا هلی انتعال مبینیه کی صورت میں روزانه ۲ با ۳ قطروں کی متما دوں میں کسیا جاسکتا ہے۔ آبود بن کے اسمال سے فدی ملی گائر کے نعل کی کثرت ہو گئی ہے، اورمكن مديدكة بردين كامزيد التعال كئه بغير مش درقيت مالمامال تك ماري رہے۔ آپوڈین متیقی موظی گائٹر کی مبش در فیت کوزیا دہ نہیں کرتی ۔ بنویا فیت كولا أَنْهُ فَأَكُوا تَشْرِينَ ٱللَّهِ وَيَنْ كَاعِلَا جَ جِنِدا لِ كَا مِيابِ بَهِينِ ٱوْرَخُلُاصُهُ ورقبيه كو إزامًا ما ہے۔ نہایت سخت اور نہایت شبے گائٹروں میں اور خبیث مرض می بشر طبیکہ يكافى ابتدائي درول مي شناخت كرك كيفي مول جراى تدابيري عزودت بوسكتي هي ويا تدابيريه بي كدكيد بندرسولي كا انقاف كرديام أي اورفد مح بیتر مصیر کو نکال دیا دائے ۔ رانجنی شعاعیں مجی انتعال کی ماسکتی ہیں ۔

(exophthalmic goitre)

(مرض گریو =Graves' disease)

راسيل وكامرت =Basedow's disease)

اس مرض كؤ مومورة ل يسموه ل ك نسبت زياده كثير الوقوع بهدام الداكى

نبت سے) (18) ' ابتداؤ مصلہ من وَ لَمِن کے ایک طبیب گروز (Graved) کے اور سنت سے) (18) کے ان اور سنت سے) ان ا اور مشکشاؤ میں ایک جَرمن طبیب آسیداؤ (Basedow) سے بیان کیا ۔ اس کے نمایا علاقت یہ جیں ، ۔ گراتِ حیصہ کا با ہر کو بروز کرتا ' فلد و و قید کی کلانی ' قلب سکے ممل کی کھڑت وقوع ' اور کرزش ۔

کی کی گئیسٹے اساب مجل طور پر بیان کیا جائے تواس من کی اصابتیں دو گروہوں بی تعسیم کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان دونوں گروموں کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں ہے، اور ان کی تعریق کوکسیقد رمصنوی تصور کیا جا تاہے۔

(۱) اولی جوظی کا پشر (primary exophthalmic goitre)-

اس کا آفاز ناگهانی مو آب اور فترات اور استنادوات باراد بوتے بن آنسنی تباولہ یا اسی سول کی شرح میں موس موس کے دوران میں بلند ہوتی ہے اور خنیف مرض اسس سول کی شرح شدت مون سکے دوران میں بلند ہوتی ہے اور خنیف مرض کی حالت میں کہ ۔ یہ مرض عرفاً فوع اشخاص میں ہوتا ہے ۔ یبض اوقات مصسانی رحوان بیلے سے موج و تما کہ بیسا کہ بہٹر یا (hysteria) امرع (epilepsy) یا نادن دافی مرض سے ظاہر بو آ ہے ۔ چند اصا تول میں یہ مرض کسی بند باتی یا داخی اُستال کر دافی مرض کسی بند باتی یا داخی اُستال کر دافی مرض سے ظاہر بو آ ہے ۔ چند اصا تول میں یہ مرض کسی بند باتی یا داخی اُستال کر اوقات فوج کے میں ہمیں علیہ میں در کھا گیا ہے ۔ دوران جنگ میں اگر اوقات و جی گئی موشدید داخی اُستال کی صحیح بدا برگئی ۔ بعض اوقات اس مرض میں ایک موروثی تعلق می مثابہ ہے ہیں آ یا اور این اور بینوں برحمل آور ہوتا ہے ۔ یہوا تعدی کر اوران جنگ میں خوالی کا نیز کی صدید کر اوران جنگ میں خوالی کا نیز کی صدید کر مولی تھا اُس اور میں کہ بدا کر سے میں خوالی کی توزیع سے مثابہ ہے۔ افراط کسس کے پیدا کر سے میں مدبول کی تعدی کی کو زیم سے مثابہ ہے۔ افراط کسس کے پیدا کر سے مدبول میں مدبول کی جو کا کا نیز کی سے مثابہ ہے۔ افراط کسس کے پیدا کر سے دیمائی کی دوران کا کا مورون کا کستان اور و کی ایک مدبول میں کیا کہ کو کی کا نیز کی توزیع سے مثابہ ہے۔ بو مدوث گا کٹر کی توزیع سے مثابہ ہے۔ بو مدوث شہروں کے تعبیت و بہاتی اصلاع میں کیا دو ہوتا ہے مثابہ ہے۔ بو مدوث شہروں کے تعبیت و بہاتی اصلاع میں کیا دو ہوتا ہے مثابہ ہے۔ بو مدوث شہروں کے تعبیت و بہاتی اصلاع میں کیا دو ہوتا ہے مثابہ ہے۔

و م) ما نوی سومن کو یوز (secondary Graves' disease)- کر د م می مرکزشت لمتی سے جریہ تباتی ہے کہ برعد سعندہ میں ان تغیرات بورہے ہیں۔ افراط فعل کے علاات اکثر منیتیں یا جالیس سال کی تحریک قریب منودار ہوتے ہیں اور کن ہے کہ یہ ندی سلعہ کی مالت میں آپوڈین کے ہتا ہا سے بیدا بوجائیں۔ یہ مون ایسے علاات کے ساتھ جو بتدریج زیا وہ شدید بوجاتے ہی سالھا سال کا جاری روسکتا ہے ۔ فتر اس نہیں بور تے ۔ تنغنی ساول میں آستہ ہم ترابرزیا دی بوتی جاتی ہے ۔ محر ظالمین اکثر بہت نمایا ل نہیں ہوتا ۔ قلب کی بے موابرزیا دی بوتی جاتی انقباض کا خاص احمال موجود ہوتا ہے اور تمن نہ کہ رین مالی سالھ کی سلعہ کی شدہ کے غدی سلعہ کی شہادت موجود ہوتی ہے توان اصا تبول کو اکثر سمی غلی سلعہ کا فدی سلعہ کی شہادت موجود ہوتی ہے۔ کو اس اصا تبول کو اکثر سمی غلی سلعہ (toxic)

امراصلیات ۔ یہ من اس طرح پیدا ہوتاہے کہ در تعید کی بیش پروش کی وجہ سے تھا ٹراکسن کی زیا دتی ہوجاتی ہے۔ اس کا ثبوت میں کہ اس کے علا است انمي علاات سے مثاب موتے ہيں جو خلاصه در تمد كى بڑى متادوں كے بعد بيدا مواتے میں نیزید کروه مخاطی او یا کے علا ات سے متضاد ہوتے ہیں اور ید کرمیس بروروہ ورقبير كے حزئ التيصال محے بعد مريض كى مالت ميں اصلاح واقع موم تى ہے ليكن عرصهٔ در ازسے اس امریس بحث علی آتی ہے کہ آیا یہ مرض معن طبی متعا رُاکسین کی میتے زائد بدادش کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس تما اراکیون میں کوئی تبدیل موجاتی ہے شاأ اس كے سالمہ ميں ممول كے نبت كم آيو ڈين مونائسينے يہ بحث کی گئی ہے کر اس مالت میں ایک حقیقی بیش درقیت (true hyperthyroidism) موتی ہے یا در تی سمیت (thyrotoxicosis)- آخرالذكردائے كى ائيدس بيدلائل ہیں کہ جا نوروں کو ور تمیہ کی زیادتی وینے سے طلامات ہو نبونیں بیدا کئے جاسکتے ' مینی تو ظالعین نہیں پیدا ہوتا ۔ مزید برا ل بعض اصابیں ایسی میں جن می بیش ورقبیت اور نیاطی فریم از بمائے علامات ایک ساتھ موجو ومعلوم موتے ہیں۔ لیکن اس کے په مغی بونالازمی نبتی که په ، ونول مرض ای*ب سانند* موجو د می^{ا ،} کیونکه حکمن ہے کہ بیش ورقیت کے علامات سے بتہ بیش فعالیت کے باتیات بوں جواب مُردہ ہوئی ہے۔ مملاً دوسری رائے ، کی تاکید میں **کا فی ثبوت موجو دہیں ہے ۔ انطب ہے ک** نبعض

ا مها بتوں میں درقبیہ کی فعالیت اس کے اس بیجان سے پیلا ہو تی ہے جوکہ تقدی نخامیہ (الله ظاہر) کے جہیج درقبی لا یمون کی کثرت سے واقع ہوتا ہے۔

د فيتي تشميم شاري كارتهيئ طُرِيب كلانكو من كي زيا و ه نرسل أورمفي تباول كي ز یا دتی بیدا کر دیتا ہے ا مریض ایسولین کے نہایت متحل مو نے ہیں جو گلاکون کی ترمیل لومدود کرے تھا اُراکسین کی مصاوت کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں کب مگر براٹر کا تعلق ہے' ذیا بیطس اور حوظی کا مُٹر وہ نول ایپ دوسرے سے مثا بہ ہیں لیکن اُن کااٹر عضلات برنها بن مختلف بوزائه كيونكه وال مجوطي كالمرين شكرطلائي ماتي لیکن فرابطیس میں بیملنا بری صرتک رکا موا ہو تاہے (15) مشارکی کا یہ تہسیج جَوْظُ الْعِينُ الَّارِبُ وَإِن كَرِيغَى (von Graefe's sign) سِعِتِ نفر إن قِلبَ اوربیسینہ آنے کاسب ہوسکتا ہے۔ کیا من (Cannon) کے مشہور تجربہ میں بنی کا عصب عبایی اسی بانب محفنتی مشار کی سے انک و اگیا ۔ اس طرح میب اگردہ تهبيج مشاركي من أسي حانب يرجموظ العين بيدا كردياً - اس مجوظ العين تحمتعلق یہ مال کیا گیاہے کہ یہ عضائہ مگڑ کے ہمان کے باعث واقع ہوتا ہے' جو محرمیل ستر یے دوالی حملی میں وتدی فکی شقاق پر دا قعہدے ایکن انسان میں پیعضت لم نا قُص النَّهُ بُوّاتُ : اور جند منتشر رئيسُوں پرشتل بومات ۔ دومرا إمكان يہ کہ اُ ذیبا ٹی سیال کر اے میضعہ کو آگے کے طرف وصلیل و تیاہے ' (کیو کہ مضلاتِ ر میشد کا او مامکی یا یا گیاہے) اور پیراسس کے بعد وال جربی کا انوی جاوُ ہوجا آہے

تخول بلند نفسی تبادلہ کے باعث ہوتاہے اور ساتھ ہی غذائی اختلالات کے سبب سے جوانجذاب میں مزاحم ہوتے ہیں۔ جب جربی کے گودام حتم ہو جکتے ہیں تو پروٹمین کام میں لایا جاتا ہے اچنانچہ پروٹمین شکست ور بخت بھی غیر طبی طور پر بلند ورجہ کی ہوتی ہے لیکن زیادتی احتراق کے باوجود جسانی تبین بلند نہیں ہوتی احتراق کے باوجود کی جوارت کا نقطان زیادہ موجود کی کیو کمہ بسینہ کی افراط کے باعث جم سے حرارت کا نقطان زیادہ موجود ہے کہ کیا تا احراج ہوتا ہے نہ صرف بیٹاب میں ملکہ براز میں می صفیقت میں ایک تندرست موضوع میں کیا جم کا افراغ ورتی خلاصہ کے ذریعہ اسس سے میں ایک تندرست موضوع میں کیا ہے کیا افراغ ورتی خلاصہ کے ذریعہ اسس سے میں ایک تندرست موضوع میں کیا ہے کہ افراغ ورتی خلاصہ کے ذریعہ اسس سے

زاده آسانی کے ساتھ انجام پا آہے کہ حبنا پر اتھارمون یا ترشوں کے ذریعہ میش نزودر قبیت کے خلاف (جو کہ طاحظہ ہو) دموی کیلیے بالکل مرتفع بنیں ہوا کہ حیثت میں بہت ہوئے کا رجی ال رکھتا ہے (گو کہ نزوور قبیتی کی درمی خلاصت وموی کیلیے میں بہت ہوئے کا رجی ال رکھتا ہے (گو کہ نزوور قبیتی کی درمی کی قلت خلا ہر کرسکتی کملیے میں بلنل ہوجاتا ہے)۔ لا شعامی امتحان پر بٹایا کیلیے کی قلت خلا ہر کرسکتی میں (21)۔

مُرضی تشریح ۔ وبھلی اور سنجتی بافت کے خلیات میں تکاثر واقع ہوا ہے ۔ وبھلات کے افسہ ابنی کو لائڈی نومیت کھو کر مخاطی اور ذراتی ہوجاتے ہیں۔ نبتہ بعد کے درجول میں مکن ہے کہ غدہ لیفی یا دُویری ہوجائے۔ اولی بحوظی کائر میں یہ تغیرات سارے غدے کے اندر منتشر ہوتے ہیں ۔ ٹانوی گر توز کے مرض میں غدے کے بعض جھے فعالیت ظاہر کرتے ہیں ۔ دو مرے جھے کو لائڈی تنجی ا لیفیت اور دُویری کموین ظاہر کرتے ہیں ۔ حکن ہے کہ متین غدی سلمی تغیرات بوں یا نبول ۔

عَدَّهُ تَيْرِسِيدِ اكْرُ بِا فِي بِوْمَا بِهِ الْمِرْمِطَا مِوَا مِوْمَاتِ وَطُولِ الْمَدْسَتِ السَّابِ عَضَالُةُ قَلْبِ (thyro-toxic myocarditis) كح اسا تبول مِن در تن سمى التهاب عضالُة قلب (thyro-toxic myocarditis) كح ساته عضلي دريتول كاتِنخ أور زُجاجي تغيراتِ واقع بوجاتي بِسِ (20)-

علاات مکن می کرفلات یکایک طاری بوجاتین کین عموا وه کیستدد دری بی نوار بوت بیل طاری بوجاتین کین عموا وه کیستدد دری بی نووار بوت بیل اورالمرم فلی علا ات پیلے ظاہر بوت بیل اور کرات بیشه ما بروز اور درقیہ کا تورم جند بسیوں مبد ظاہر برتو اے مکن ہے کہ کمی کمبی ان کے فلود کی ترتیب مختلف ہو کا تین خاص علامتوں میں سے ایک یا دوسری غیرموجود ہو۔ لیکن دوران خون کے متعلق شکا یت متعل ترین ہوتی ہے۔ کال منویا فنہ مرض میں قلب تیزی اور قوت کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ صدم القلب غیرممر کی طور پر بڑے دقعہ برخموس بوتا ہے سباتی اور بڑی شدت کو محوس کرتا ہے۔ شبن کا اور مریض قلبی صرب اور شریا فی شدت کو محوس کرتا ہے۔ نبین میں آگار شن کا شدت کو محوس کرتا ہے۔ نبین میں آگار بینی ساتھ جو برق گلبی شدت کو محوس کرتا ہے۔ نبین میں آگار بینی ساتھ جو برق گلبی الیک نبینی ساتھ ہوتی ہے۔ نبین میں آگار شن کا نتیا من یا ایک

طویل ف ل فاصلیموجود بوئو اور ن اورف موجیس جمامت بی ایک و مرے کے
برابر بول (20) - گاہے گاہے قلبی مدووی دکھی جاتی ہے ' الخصوص اس وقت

جب کہ ذکیجیٹالس بڑی مقدارول بی ویا گیا بو ۔ قلبی اختلال کے لحاظ سے مریخ کو

مانس میجو لینے کی شکا بیت ہوتی ہے ۔ مکن ہے کہ رفتہ رفتہ قلب بیش بروردہ اور

ازال بعد تمسع بروجائے ۔ عمواً شرے نہن کے تغیرات کے بالکل ساتھ ساتھا ساک

موہ بوجائے کے بعد بھی نبطن قلب کے متضر ربوجائے کی وجہ سے بلند سہی ہے' نبیا نہا متوسط الا بعاد ہوتی ہے' انہا ہے اسموری ہی نما اللہ ہے متفار تبویل کے متابر تصویریش کرتا ہے۔

بناسی آسی تحول ہی غدہ کی کلانی مشاکل اور عمواً متوسط الا بعاد ہوتی ہے' انہ شاف ہی اس برائے تھر رکھا جائے تو ایک فی ایک متاب کا برابر ہوتی ہے' انہ شاف ہی اس برائے تھر رکھا جائے تو ایک فی آب برحوس ہوسکتا ہے (جواس کے متاب کا ایک ہوتی ہے ہوتا ہے) اور مساح العد متاب کی وجہ سے ہوتا ہے) اور مساح العد متاب ایک الماشی خر سرسے ناچا سکا ہے۔

سے ایک انگراشی خر سرسے ناچا سکتا ہے۔

(امارت گریفی =von Graefe's sign)- یدالات براسا بت بس موجودی برقی اگریفی به بیما موجودی اگریفی به بیما وقات آنکه کے بروزسے بہلے ہی دیجی کئی ہے بیکن س کے ساتھ ہی یہ بیت کہ جب بیما موجود ہوتو اہم ہے کیونکہ یہ دو سرے اقسام کے جو المان میں نہیں واقع ہوتی عضلات متقاربہ کی کم وری سبی موجود ہوسکتی ہے (المرت موبیس =Mobius' sign) اور معضا اسا تبول ہیں وو نظری کی بعض یا تسام عضلا تب بیشند کا واضح شلل بھی موجود ہوسکتا ہے ۔ صدقہ اور تو فیق فیرمت اور موبی ارسکتی اور وہ کے سو اسے اور کو فیق فیرمت اور میں کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی جدید کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور وہ کے سو اسے اور کوئی حدیثر اور بیجید از کبکیتی اور دو کمی کوئی حدیثر اور بیجید در کا مرتبس مونی ۔

ترویتی اور نہایت متعل علامت جواح کی بکد سارے ہم کی کم و بیش ملسل نا زکسی لرزش ہے یعضلی کمزوری اور در د بھی نہایت میں بروتی ہے ۔ مسلس کا زکسی لرزش ہے یعضلی کمزوری اور در د بھی نہایت میں بروتی ہے کہ لہنداز بینہ چڑسنے کاعمل صوب میں دقت ہوتی ہے کہ لہنداز بینہ چڑسنے کاعمل صوب میں کہ اور دور کے دائین مکن ہے کہ ایک شام کہ بازووں اور دور کے عضلات بھی اوف ہوگئے ہوں یمکن ہے کہ ایک شام و بیع بھیلا ہوا استرخا ہواور رات ہمر بستریس گذار سے کے بعد دور ہے دائی ج

کا ل شفا ہوجا ہے۔

بعن او قات اس کے بعد خنیقی و یا بیطس شکری موجاتی بندی اور گر آبوز کے من کے مه ایمن معبض اوتعات فریا بهطیسی قوماسته بلاک موٹے بنیں سما زم عالث فا قد کی دموق تئر عمواً لمبي ورج بربهوتي ہے ۔ گمر بروا شب مُنارك محمٰي مِن كسيقد أمانيہ إلى حاتى بى-وتتنا فو تتلُّ علامات مين استندا وكالمكان موناهها.

تخيص - ابتدائي ورجول من جهونا العين يا در قيه كاتورم ظ مربو منا

فيص من دقت ميش آتى - جه داس مرض كو ، دن سے تمزر لا ايا بيا . موانك سرعت صريات قلب سيه جب كه برقي قلبي نظ يش ليمي مواور التحديق جب کہ بسینہ بھی آگا بو اس مرس کا اشارہ موتا ہے۔ "ما جھاً ذینی ریشکی انتہاض ا نوی مرض گر توزیں عام ہو آ۔ نیفنی تیا دائی تغییل کی لیا نے (الم خطہ موصفحہ (45)- ومو کیلیے کا و لی گرام یا اس سے کم بونا او عصلی نشانس کے لیے ولئے بھرکے باری کا ۲۰ فی امپیر کسے کم بونا بھی اشار وکن ہے۔

ا ندار - طال ہی میں تمیل (Campbell) نے ۱۲۰ مرمینوں کی رو ندادو یرا زا بتدا تا انتها غورکر کے اٹکا تتبع کیا ہے' جن کالمبی علاج **کا پُرزمیتال م^{ن واع}** اور حلالا کے درمیان کیا گیا۔ اس کے نتائج نہا یت تریبی طور پر ایسی ہی ایک تحقیقات کے مطابق بائے گئے جو پہلے ہیں وائٹ (Hale White) نے انجام دى تتى ـ إس عرصه ك اخترام برم في صدى مريض الكل اليم تق . ٣٠ في صدى تعریباً اینے متے اور بورے دان کا کام کرنے کے قابی متے کیکن اُن میں ایک یادو ارتين خيف طورير مارى ربي - مهافي مدى بهت بهتروات ميس تفاور الكا کلم کرنے کے قابل نتے۔ ۱۳ فیصدی کی حالت میں اصلاح بنیں موئی یا آن کی مالت بدترتمی ۔ ہا فی صدی اس مرض سے ہلاک ہوگئے۔ اگر علیہ یا تمین لا شماع كحەذرىيەعلاج علىم لايامائے تواندارمى بېت اسلام واقع ہوتى ہے۔ ٩٠ في صدى اصا بتول مي مريض بغيرتكليف كے بوراكام كرنے كے قا الج مائيگا **-(50 '4**9)

علاج ۔ غذا امیی سا دہ کام میں لا ناچا ہے جس سے میری ماصل موجاً اور جس میں کا ربو ہا گڈر بیٹ بر افراط ہو۔الکھی اور تمبا کوم ضربوں سے کا امتعال کھنے

بیں۔ چند بفتوں کے ایک بستریں آرام کرنے سے مربینوں پر بینیا مفیدا تر بواہ۔
اکاون مربینوں کے ایک بسلم میں جن میں مرف بہی علاج کیا گیا تین جو تھائی کا
انسی تول جد مہینے کے اندر ۱۸ فی صدی سے نیمے بروگیا (۵)۔ جب مربین کشن کی اجازت و بنی چاہئے کیکن آرام مہست
گئیں تو انھیں نہا بہت خفیف ورزش کی اجازت و بنی چاہئے کیکن آرام مہست لینا چاہئے ۔ جموعی کا کھڑکے مربیض اِنسولین کے مقالی ہوتے ہیں اور مکن سے کہ مربین کومعمولی غذا پرر کھ کر اِنسولین کے 18 ایا ۲۰ فینس ون میں دوبار و رہن مربین کوم واصل ہوجائے میں کے ساتھ لیا گرمین ہیرا تھا کرائٹر برا و دہن ون میں جاملین حاصل و دہن میں بارو کے جاتے ہیں (88)۔ ورقیہ پر برف لگائے سے تسکین حاصل ہوتی ہیں۔

ورقمه کی فعالیت کم کرے کے وہ خاص طریقے ہیں ، ۔۔ یعین اوقات الک یا دونوں درتی شرائین کی کرہ بندی عمل میں لائی جاتی ہے۔ لاشماعیں عموا ایک یا دونوں درتی شرائین کی کرہ بندی عمل میں لائی جاتی ہے۔ لاشماعیں عموا ابتدار من میں استعال کی جاتی ہیں اور اگران سے کوئی اصلاح یا افاقہ نہوتو بدی عملیہ کے متعلق عزر کیا جاسکت ہے۔ لاشعاعی علاج زیادہ طویل عرصہ کا کر ہوئے کا بعد علاج ایا کہ میں مسلول لوگالی ما بعد علاج ایا اندہ عاصل کر ہوئے کی مسلول لوگالی معلول یوگائے ہیں مسلول لوگالی معلول ہیں کے دونوں کا کہ دونوں کی مسلول لوگالی معلول ہیں کہ دونوں کی مسلول ایک یا دو بیفتوں میں گر کر طبی درج پر بوجا آ ہے۔ یہی نیم آوٹوئین ہوگا ہے۔ اس کی متنادہ اقطرے دوزانہ کے وہ دوزانہ کے دونوں کی متنادہ اقطرے دوزانہ کے دونوں کی متنادہ اقطرے دوزانہ کے دورانہ کی متنادہ اقطرے دوزانہ کے دورانہ کی متنادہ اقطرے دوزانہ کی متنادہ کا تصابی کی متنادہ کا شعاعی معلوج عمل العملی عملول سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی متنادہ اور ایسے لا شعاعی معلوج کے سائنہ سائنہ عملی متنال کیا جاسکتا ہے۔

(myxædema)

ر مع درقلتي ضَعْف = cachexia strumipriva

مخاطی افر میااور قمامت (cretinism) غدهٔ در تمید کے اس مونی کے تمایج بیک بس سے اس کے اور قمامت (cretinism) غدهٔ در تمید کے اس مونی کے تمایج بیک بس سے اس کے افراز کی قلت بیدا ہوجاتی ہے (ناقص در قیت) ۔ قائت بیدا ہوجاتی ہے در طفولی مخاطی آئی کی بروتی ہو اگر ما بعد زندگی بیں ہو اگر ما موریوه ا بعد زندگی بیں ہو اگر ما

میحث اسباب - خالی اویما مردوں کے تنبت عورتون میں بہت زیادہ عام ہے، اور مریضوں کی اکثریت میں علامات میں اور بیاس سال کی عمرانے در میان شروع ہوتے ہیں، اگر جبوہ اس قدر حکد کہ ساڑھے آتھ سال کی عمرین اور میان شروع ہوتا یا گئے ہیں ۔ موروشیت کی بیف ولا لیس می دکھی گئی ہیں اور یہ زیادہ تراکش مفلس جاعتوں میں دکھیا گیا ہے ۔ اُن اضلاع میں جہاں گا تھرا کے مقامی الحدوث مرض ہے، قلیل درقیت کی شام قسم سام میں دائے ہوں کا تھرا کہ مقامی الحدوث مرض ہے، قلیل درقیت کی شام قسم سام میں دائے۔

مرضی تشریح - جلدی ید نفیرات موتے ہیں کہ بسینہ کے غدد وسی غدد کا اور شعری جرابات کے غدد کو سی غدد کا اور اتصالی بافت کا نمو ہوتا ہے۔ اور شعری جرابات کے توب وجوار میں نوانی تکا شراور اتصالی بافت کا نمو ہوتا ہے۔ اور آق (Ord) کے مخاطی اُ ذیکا کا نام دیا تھے اُ

مرف چند بار ہی مندرج ہے۔ تحت البلدی شم کی ظامی مقدار ہوتی ہے۔ ا

جنم ورقی اپنی قلبی جامت کے گھٹ کر نصف یا ایک تہائی ہوجا ہے۔ وہ پیکے 'زردی اکل یا زردرنگ کا' اور لوجدار یا متصلب لیفی یا ساخت ربود ہوجا تاہے۔ فدہ الحسوس لیفی بافت پر شمل ہوتا ہے ' مس س طبیات کے منشرگردہ ہوتے ہیں' جو حسیسلات کے باقیات ہیں۔ اور بالآخر کشیف لیفی بافت کے سوا اور کھی باتی نہیں رہتا ہے منمامی بڑا' یا بعض اصابتوں ہیں بڑا اور انحطاطیا فت

ہو آہے۔ راقم الحروف کے ایک مریض میں فوق الکیے ندبول تنے ،صلابت شم<u>ان</u> ا ورعضائه قلب كا انظاط عام بي كيليم كي برآ مد كم بوماتي هيه -علالات ياتدار غيرموس بوتي بأيناني بشراما تولي تا وقست که وه خوب نبویا فتهٔ نه بوجائے معلوم نبیں ہوتا۔ بھرمریض کی مکل تمیر ہوتی ہے۔ حیرہ بے انہاز شلل ایرزازی سے لِمّا ملتا ہوتا ہے۔ ناک بیوٹے اورک بیولے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہرہ کی طدمی نہا یت ممیزاو رمفعوص تحفریاں یا کی جات ہیں۔ رنگ نمایاں طور برزر [،] ہوتا ہے اور سائفہ ہی ہرگال برا کے کسی قدر تیز ^ہ حکیتی ہوتی ہے اور لب گہرے بنج اِتقریباً کبوہوتے ہیں ۔ حبیم کی طبد عام طور برموٹی ہو ے اور اُ نگوں اور یا وُں کی شکل قدرے اُ ذیما ہی ہوتی ہے ' اگر جی بہت سے اما پر مي (سب اصامتول مي نه مهيي) تنفير بالكانېب موتي - كې تو گيشكل من مح نيات واقع موجات میں : وہ بعدر سنی ہٹریوں کے سروں کے مقابل زیادہ جو را ہوجا آ ہے' اور اُنگلیاں موفی اور کمیا اٹ کل کی ہوجاتی ہیں ۔ال تغیر کو ممیعا وڑ ہے ہیے '' ("spade-like") كانام دياكيا بيء جرسبت زيا وهميزنبس - ياول بحى اسی طرح ما وُف ہوجا نے ہیں۔ تیبینہ کم آتا ہے یا بالکل نہیں آتا ' حلایفشک اور مصلك دار موجاتى بيئ بال معرط التي بين مس سه سر برمض ايك تيلي سي بوس ره طاتی ہے یا طبدالواس کا حقیقی علی (ببین صلعه " ="frontal alopecia" او سووری رونی تب ن cassowary neck") . اور مجمور ل کی برونی تب ن کا گنج ("ابارت ابرو" = "eyebrow sign") اور لملول كا تمنح بيدا بوجا ما ــ ناخن معنم کر تمبر تمرے ہوجاتے ہیں۔ مفاطی اغت میں منی مغیرات ظا ہرکرتے ہیں۔ بہرطال لہاتُ اور نرم تالومتورم ہوتے ہیں' اور زیان بڑی اور مُوثی ہوتی ہے۔ مزید بران دانت بوسیدہ یا د طبیلے ہو قاتے ہیں ۔ مریضہ کاعصبی نظام وہ دور کی چیز ہے جوباِ ذب توج ہوتی ہے۔ وہ سُست اور ہے پروا نظر آتی ہے مجول لغی^ل اور مجبول الحوكت اوراكر بهري بيونی ہے۔ وہ سنی كے ساتھ اور مونچ سونچ كرولتی ب الرياك أس كى مونى زاك تطق مي ميكا في طور بيمزاهم جوتى ب ميكن كلم بح سائحة الكول كركات اور الجارك عضلات كحركات كاستى سفطا بريقا

رم الدیم معنلی الدین مجی خرابی موگئی ہے۔ احبال کے متورم موجائے کی وجہ سے اوازیت درج الدیما تفاع رکھتی ہے اور معبرائی موئی ہے۔ جہال کک ذبهن کا تعلق ہے حافظ اتفی موثا ہے۔ مریعنداکٹر جیڑ ویڑئ یا شکی یا سست اور حواب آلودہ ہوتی ہے۔ اور مریعنوں کے کچھ تناسب میں تو جات افتا طاحت اور شخات و سکھے کئے ہیں مکن کو دروسراور اثمیتی دروس کی شکا میس می کیجائیں میعنی اوقات کرز اسی طرح موجانا ہے میں میس طرح کے وہ درقمیہ کے علیتی استیمال کے بعد موتا ہے۔ میش مبشر شخت الحاد موتا ہے میش مبشر شخت الحاد موتا ہے میں مبشر شخت الحاد میں مردا ور اس کے الحقہ باول

نبض كمزور ياست موتى ہے۔ ترقی يا فت اصابتوں مي تلى عرقی مرض ہو آ ہے اور منتقود یا مربکس ن موج اور نبیت و ولیٹیج کی برتی قلبی نگارش حاصل موتی ہے ، اور صلا ہتِ مثر لیا نی موجو د ہوتی ہے۔اور پشاب رقیق ہوتا ہے اور لبا اوقا اُس میں تمتور االبیومن موحو د ہوتا ہے۔ امتخاب حون سے خر دخلوی عدم دمویت ظاہر ہوتی ہے جس کے ساتھ سرخ خلنے گھٹ کر ... وس ما اس سے علی کر موماتے مِں اور ہیموگلو بین بھی تمنا ظر در *حربک ک*ر ہو جاتی ہے۔ [،] معاییں قبض ہو تا ہے ۔ تنگر کی مردانشن زیاوه عوجا تی ہے؛ خیاطمیراس کی ٹری مقدارین بلکہ بخراصا بنو میں ۱۰ اونس کک لیے لینے سے بھی میشا ب بیں کو ٹی شکرنہیں طاہر ہوتی عورتو^ں یں کنڑن طمث ہونا عام ہے۔ زیادہ ثنا ذ طور پرعدم طمنت ہوتا ہے۔ رُعا ن جیمو^را کا یا جا آہے' اور طلقی غضروف سے پنیچے اس جگہ جہا اب خاکنا کے مونی جاہئے' قعبتہ الرید کے طلعے جش کئے جاسکتے ہیں۔ رفتا ر مرض ست ہوتی ہے۔ ا۔ مریف بی معلوم موطیر ہیں من میں یہ مون وس سال یا زائد تک بلاکسی اہم تغیر کے موجردر بام الم اس بر سنت بنین که به زندگی کو گفتا و بتا ہے - مریض عنلی قلبی ا صلابت شریانی تغیرات سے باہم روامراض جیسے کدوات الریہ اور عبی التهاب سے لاک بروجائے ہیں کیا عموی یا عصبی تنگی انتیں تبدری نشانہ امل نباوتی ہے۔ نفيص - مخاطميُ اذبيا مِثِينزاه قات من براتيك بإعضلي ملبي التُحطُّ الْط

487

(myocardial degeneration) کے ساتھ خلط لمط ہوجا آ ہے۔ گرگو ہیں مرض میں قدرے البئومن بولیت موجود ہوتا ہم کلوی وظیفہ طبعی حالت میں ہوتا ہے۔ برقی قلبی نگارش میں کی غیرطبعی حالتیں علاج سے زائل ہوجاتی ہیں جس سے تشخیص میں مدو لمتی ہے۔ اساسی شخول کے متحال سے جو نہا بیت شد بد حالت میں ممول سے۔ ہم فی صدی نفیے ہوسکتا ہے، قطعی شبوت حاصل ہوسکتا ہے۔

علاج - تما زائد مُم (thyroideum) (B. P.) جنشك كرده ندم سے بنا ہوا ہوتا ہے اتا ہ کرین کی مقبا دوں ہی برشامہ کے اندر ر کھکر یا گولی کی مت میں روزانہ ایک دوبار براہ دہن دِ ماجاسکتا ہے۔ تالیفی تھا راکسین synthetic) (thyroxin مجى برا م دين وي جاسكتي ہے اور اس كى صغير ترين روزان معتاد ٢ د. ملى گرام ہے ۔ مفاطى أ زبيا كى نها يت شديد اصا بتو آ يس علاج براه دان ہمیشہ ہی کا میاب نہیں ہوتا ، جس کی وج شایدیہ ہوسکتی ہے کہ غذائی ضطے سسے انخذاب نیا بت مست ہوتا ہے۔ تعالر آئس کے ایک فاص طور پر تیار کئے ہوئے محلول كادرون وريدى إنتراب آزا يا جاسكتا بيئ يفيغ هلى گرام في معتاد كي مين معتا دیںایک ایک ہفتہ کے و تعذیبے لیکن محفوظ ترطریقہ یہ ہے کہ ایا ۲ می گرام کے ایک اشراب سے شروع کریں کیونکہ مکن ہے کہ اِس کے استعال کے جومیس كَفْيْرُ بعد شديدر دعل ظامر بوجا ئين جن كه علامات به بي : _ نبض تيز وردسر رُزشُ مُنتلی میمے یا اسہالُ اور نیشت اور الما مگوں میں در د ۔ س ، ۵ ڈائی آ پوڈو تحارُونین (8:5 di-iodothyronine) أیک ما دوجوکه تھا ٹراکسین کے سساتھ یمیا وی طور برمتبانس ہے اور اس سے زیا دوحل مذیر ہے کا میابی کے سیائے استعمال کی گئی ہے (51)· اَ ماسی تحول کے امتجان کے قدیعہ سے اِس علاج باتعتاد کمنا ماسئے۔جب اس ذر بعہ سے جسم کے اندر تھا سُراکسین کا ذخیرہ سجے مقدار تک بڑھ جائے تو بھراس کا انتہال براہ ومن جاری رکھا جاسکتا ہے۔ ورقبہ کوکسی طورت بھی دیا جائے مناسب یہ ہے کہ عمیوٹی خوراکوں سے ابتدا کی جائے ور نہ ذکمی علاما یکایک پیدا ہومائے کا اختال ہے۔

قمائت

(cretinism)

ا نفوادی الحل ویث قماکت دوسرے مقامت منلاً انگلتان یکم تی ہے۔ اِس کے متلاوں میں در قمیة ملت زوہ ہوتاہے۔ یہ

ا مراضیات ۔ فرد اور جاعت میں مقامی المحدوث قمائت کا گائٹر کے ساتھ

یکجایا یا مانا بعض اصابتوں میں درقبہ کی غیر موجو دگئ اور مخالمی ا ذیبات شابہت پیسب اموراس مرض اور غدہ ورقبہ کے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں جمبقا کی محدوث ترابیب سرار در کر میں نامیس کا میں ترین ایا این میں نامی کا میں میں

تمائت اورگائر ایک ہی فرومین ظاہر ہوتے ہیں تواول الذکر آخرالذکر سے پہلے ہوتی ہے لہذا وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ۔ تمات ایک یادونوں والدین کی گائری

مالت کی وجہ سے ہوتی ہے' اور ال کے در قبید کا ناقص فعل خنین میں خرابی پیدا کروتیا ہے۔ یہ ضرر نز دور تی اور در تی' دو نوں اجام کو اگوف کرتا ہے۔

ہے۔ یہ ضرر نز دور تی اور در تی دونوں اجام کو اُوف کرتا ہے۔
علامات ۔ قانت کے ممیز خصائص یہ ہیں : ۔ اِلید گی تُصفحری ہوئی'
سر بڑا اور چوڑا' چہرے کے خطو و خال موٹے' آنکھوں کا ایک دوسری سے بہت دور
ہونا' ناک چیٹی' منع مٹرا' انتدائی عربی میں ناہموار اور کھر دری طِدیں تحقریاں'
سینہ تنگ' تھی عبرا ہو ا' بالعموم سری فتق' مانگیں ٹیڑھی یا تمدیدہ' کم ذہنی اتنی
زیادہ کہ اہلمی کی حد تک۔

ر پروہ کہ بہای ملک میں و کھیے ہیں ۔ یمیزخصا یعی عمراً زندگی کے پہلے سال کے آخری نصف میں و کھیے میں اسے میں مامس ہوتی ہے اور بالیدگی کی رکاوط ا

مكن كراس قدر موكه اكب إلغ قمى إليخ إجدسال كمربي سے زاوہ او نیامو لموغ میں بہت اخیر ہوجاتی ہے' یا تناسلی وظائف اِلک غیرموجود ہوتے رہیں ۔ ر کی قوت نہایت آ بمت ابسته ماصل موتی ہے یا بالک بنیں ماصل ہوتی اور بعض قمی ہیرے گونگے اور ابلہ ہوتے ہیں ۔ بعض اصابتو*ں میں رقص ا*لمغلہ ' حُول اور المانكول كى شبني استوارى بيدا موماتى ہے ۔ اكثر اوقات ترفوك سے اور شمی تو دوں سے بینے ہوئے تحت الجلہ ی سلمات یائے جاتے ہیں یعظمی نظام ہر نهایا ب نقائص موحور موتے ہیں۔ اساس قدالی اور اساس و تدی بڑیا ل قبل زولت شغَلَم بوط تی ہیں۔ لمبی بٹیاں شعمول کے منبت متقلاً جیمہ ٹی ہوتی ہیں 'طائلین خمیدہ ہوجاتیٰ بین اور گرِوعظمہ سے لیغی با فت بحل کر ٹری کے بڑیا کہ اور پوری کے در میا^ن برصط تی ہے۔ یا وُل اور کلائی کی بدیوں کے تعظم کے مراکز بہت تا خر کے ساتھ مورا ہو تے ہیں ۔ اِن ساختول کے شعاع نگاری امت^ک ان مفید فرا یع شخیص ہیں ۔ عسلاج مناطياً ذيباكي طرح قمائت مي هي فلاصد درقيه بهت كامياني کے ساتھ استعال کیا گیاہے۔ اس کے زیراثر بھوں کی بالید گی مرعب کے ساتھ ہوکر اِ فنوٰل کی اُ زیما ئی *در دیزش جا*تی رہی 'اور بی<u>نے</u> زیادہ شمحصدار ہو گئے لیکین ٹیلیم کرنا بڑ ناہے کہ نیجے کی دینی اصلاح کے نسبت جنما نی اصلاح زبا وہ آسانی کے ساتھ ہوتا بے فاص طوریواس وقت جب که علاج دیرسے شروع کیا جائے۔

نزد در قی غدر

(PARATHYROID GLANDS)

نزودر تی غدورہ حجوتے اجمام ہیں جو تعدا دمیں موا چاراور درقبہ کے قریب
یاس کے برم کے اندر مواقع ہوتے ہیں۔ وہ ایک لیفی حال کے اندر سم حکمہ آب
خلیوں کے گرو ہوں میٹ مل ہوتے ہیں کیکن اُن میں در قبیج سی حولیسلی ترمیب اور
کولائڈی شمولات نہیں ہوتے ہیں ایک یا علی میٹر اور
وزن میں تقریباً ہے گربن ہوتا ہے۔ پیل تھا م جون (parathormone) ہجوا

ندولا فعال جوہرہ سے سیارتی طور برحاصل ہوسکتا ہے۔ اس کا اخراب کیا جائے تو بہتے ہیں۔ ہیں جاس کی فاسفورسس کے بیار ہیں فاسفورس کے اندرکیلید کی زیادتی پیدا ہوجاتی ہے (بیش کلسیت)۔ کھٹ جاسا ہے ' بھرخون کے اندرکیلید کی زیادتی پیدا ہوجاتی ہے (بیش کلسیت)۔ معلی لیسی کے ایک خاص بجرانی لیول بروموی فاسفورس فی الفور لمبند ہوجاتا ہے فالباً کھڑی و فلیف کے بدل جائے کے باعث کی بیوکہ ماتھ ہی حون کی فیر بروشین کا نہوجن بھی بند ہوجاتی ہے ۔ شدید میش کلس الدم کو س میں واضح علامات پیدا کو بیتا ہے ، بند ہوجاتی ہے ۔ شدید میش کلس الدم کو س میں واضح علامات پیدا کو بیتا ہے ، فیری میں استعال کیا گیا ہے ، جن میں صل کے اندر رکوال سندہ کیلئے کی مقدار بہت بائی گئی ہے (ملاحظ ہودا دالرقص) ۔ افسوس کہ پیرا تھا رمون کا فیرن کا فسل تھے نہیں ہے اور دواکی طرف سے افسیت بیا اوقات مویا ہوجاتی ہے جس سے اِسس کی موثر بہت باکل ذاکل ہوجاتی ہے (21) ۔

موٹریت بالکل زاکل موط تی ہے (21) ۔ نزوور قی تغیرات واقع ہو سکتے ہیں جیسے کہ میش کوین شمی انطاط لیا بیت دوبری اور کولائڈی کموین ۔

بیش نود دی قیت (hyperparathyroidism)- مکن ہے کوال غدہ کی بیش کو ہے۔ میں نور دی بیدا ہوجائے ، جو شکتے وقت جُن فیر میں ایک رسولی بیدا ہوجائے ، جو شکتے وقت جُن فیر میں ایک رسولی بیدا ہوجائے ، جو شکتے وقت جُن فیر میں ہو مصلی کیلیے میں اور بلازا کا فاسفیٹ مز و مولی المیں موز انزمنا مع ہو اہے۔ وموی فاسفیٹ ہمیتہ لیت ہوتا ہے کیلیے فرلول سے آتا ہے اور وہ مرض بیدا کر اہم جوکہ وان می بیکانگ ھانس کے عمومی المتھاب العظام لیفی (generalised) موش مردوں کی نسبت عور توں میں دوگنا زیا وہ عام ہے۔ بہ مرض مردوں کی نسبت عور توں میں دوگنا زیا وہ عام ہے۔

علامات بلرلول مروبونا بداور لاستهای امتحال مقط منظر کا برکروا مید دید برید می متر طور رکیلی به کی فضا کول (استخدان شکن حلوی سلعه = osteoclastoma) کی احت برتا ہے، جو فو د بخود کر واقع بوت کا رجمان بیدا کرتی ہیں یکن پائٹ گئ کترت بول کا کوئ حسوات معلق کی عضلا کی بش لمنا ہی متلی تے اور لاغری بوجرک شدیدا ما بتول میں بوتی ہے۔ رہولی کم ا ستیمال کے بعداملاح شروع ہوجاتی ہے لیکن دھوی کیسینم کے سریع سقوط کی وجہ سے کو انہات عام طور پر بداہوجا ہے۔ ہن سرانعادمون دینے سیخنیف ہوتکتی ہوجر تا مال کرنے کیلئے ہم شاہل کھا چاہیئے (21) - علمہ کا بَرَل مَیْن آل شعاعیں ہوسکتی ہیں۔ مرکزی التھا ب العظام لیفی (focal osteitis fibrosa) میں جوکہ عام ترہے کیلیے کے تحول میں کوئی فیہ طبی اِت نہیں یا تی جاتی۔

(tetany)

کززُنز وور تمیه کے مض سے خود بجنود فاقص بنود وی قبیت ایکن ووٹاد (مرقب کے مض سے خود بجنود فاقص بنود وی قبیت ایکن ووٹاد (spontaneous hypoparathyroidism) میں کرز ورقبات کے انتیصال کے بعد ہونا خوب معلوم ہے۔ لیکن مریری کرز کے بہت سے دوسرے اساب می ہیں۔

تسم سے بھی دیکھے گئے ہیں۔ بعض اوقات بعض عسبی امراض اِنصوص ع (epilepsy) میں کرزموجو دہوتا ہے۔ نیز کمزز وا کو ایس مز دوروں کے اندرسال کے بعض موسموں میں کورپ کے خاص خاص مشہروں (واکنا ' ہیڈ لئرگ) میں واقع ہوتا ہے مصنوع کو پ وہ ملسل جبری نفس سے پیدا کیا جاسکتا ہے 'جس سے جبر کے اندرسے کاربن ڈوائی آگا کڑ (CO) وصلک یا برکل جاتی ہے (بے دخانی = acapnia)۔

راحنیا منت به اس من کاملی ممنه نامه میلی سر کی عصبه کی بیش نخ یکه ئے ظاہر کی گئی ہے کہ آکسیمن کی احتیاج اس کا او لیسب برتا ہے اورمتدوعا لمات يه اختياج پيدا كرويتي بن (26) يشلاً مكن ب كه وه قلي دمويت وڈیم اِئی کاربونیٹ کے اِشرا اِ ت یا جبری منفس اِجس سے کارئن ڈ ائی آگیا کڈ رجمے سے اس برکل جاتی ہے) کے سبب سے ہوتی ہے اس طرح علی کرتی ہوکہ ی ہموگئر میں سے آگیجن کے افراق کوزیا وہ شکل بناویتی ہو (کہتے پرط لبی = pleonexy) مِس سے مافت کا ایک یعنی تنا و کم پوجا آہے ۔ آخرالذکر گوا نیڈین (guanidine) اورسطامین (histamine) کے تسلم مس مجی واقع ہوجا آہے اور یہ ب ہوتے ہیں - نزو ورقبہ رآری (parathyroidectomy) خور ن کچے تنا وُ کو کم بنیں کر تی اگر جیدیمکن ہے کہ بیت دُموی کیلیے کی وجہ یول کی آنسیبنی رسد میں مزاحمت تبوحاتی ہو۔ ابسی مزاحمت کا وقوع سانا کڈکے م (cyanide poisoning) میں مونامعلوم ہے ۔ تجربی مکزز بیدا کرنے کا ایک دورالطريقه يدے كدا يك البير كتے كے معدے كو اجس كا بواب مسدد ترو يا كيا مو الله وصود البس یمود بیم کلورا کشر کے دروں وریدی استعمال سے یہ تکز زموقوت کس ماسلتا ہے جنا سنچ خلسع معدے (dilated stomach) تسدر موی (intestinal) obstruction) اورموری قولونی ناسور (gastro-colic fistula) این سب كي تكز ز كے متعلق ية تصور كيا جاسكتا ہے كه اس كاسب جيم سے كلور ائبير كا نقصا ب بهداور ان اصاً بتول مي ملازمائي كلورائيد بيت اور بلاز ان بان كاربونيث لمنديا باكياب اورخون مي يورياكي زبادتي بحي موجره موتي ب - إن اصابتون الله نفزر تلی دمویت کی وجه سے بنیس بوتا (33) اور مکن ہے کہ بہاں بھی وہ پست سے ہو (24) جِبَائِي سِشريائي مِشْ نفس بِي و مُغَيْ نُخا**مي مِيال مِي**

لمندئ يا بازوُول كى اكر " يالميم غيم عموس مو - بعض اوقات دوره بلاكسى انتباه كية ناكمها في طور مربوحا أب - ايسى حالت مي إيخة كلا مُيول مرم حات بن ایمکیاں بعد رسنی ملائمی جوڑوِل برخمیده ملامی جوڑوں پر بیبلی ہونی کاور با به مضبوط د بی مونی موتی بی اور انگو تطے بتخصیلیوں کے اندر تمیدہ موتے ہیں ا ينا خيرانكليال ايك مخروط نبا ديتي بي (ميل قابله main") : ''d'accoucheur' - کینیال قدر نے حمیدہ' اور یاز و جانبوں سے مقرب ہوتے ہیں ۔ بعض اوقات جاروں *انگلیاں یا تھ*کے اندرخمیدہ کلا<mark>ئیان ممل</mark>ی ييده ہونی ہیں۔جواج اُسفل میں' یاوُل انگ یر موتي اوركبنيان كالل طوربرخم تيميلا مبوا 'حَاره خميدهُ اوريا وُل كُيُّ الْمُكليا لَ خميده اور بالجم كَي بيو في مبوتي مِن -بميزا تقباضات ميں اور بشيتر اصابتول مب صرف يہى واقع البوتے ہيں۔ نهايت شديدا صابتون من مشكر سبينه جبرے اور زبان كے عضلات كاشيخ بيلاموجا ما ليَّ عضلا كت مِن مُضَّنج مِو مع سيخ منيف سي ببس طنا بي اور الم كليول كي عضلات كر شنج سي تول بيداً موما ما سه مكن هدكه او ف حسول من يقدر انتيمن جبيا در و بوا ورا مخول كي ببتت متورم اوروريدي متمدومول٠ ن ہے کہ بیتینہ' تمتا ہٹ' اور میش کاخیفِ ساار تفاع ہو۔ پیشنج پانچ ایند' منٹ مں موقوف ہوجا آہے' یا ایک دویا زائد کھفٹول کک جاری رہتا ہے۔وہ

بتدریج رفع ہوکر جند گفنٹوں یا دنوں کے وقفے کے بعد بھر کرر ہونا ہے۔ اِن وقعول کے دوران یں اعصاب وعضلات میکا نی خراش -ز با وہ انٹریذ بیری ظا ہر کرتے ہیں (Chvostek) ۔ اعصاب کے قرع سے تمنا ظر عفنلات مي انقباطنات بيدا بوط تع بين اوريه امر حيره مي عظم الوجنه اورزاديه ومن کے بالکل بیجول بیج قرع کرنے سے خوب ظاہر ہوتا ہے ۔ جہراے کواور سے يج كے طرف سہلاً من سے يكم بعد دكمرے عضلات كا انتباض بيدا ہوجا كے -

المرائین کو دبائے ہے ان و تقول کے زمان میں از و دورے بیالے کے جا اعصاب و شرائین کو دبائے ہے ان و تقول کے زمان میں از و دورے بیالے کئے جا سکتے ہیں۔ نیز سرکی اعصاب فرا دیت سے فیر سمولی طور پر اثر نیز پر ہوتے ہیں 'اور کلوا نم بہت سے قوا ور بھی زیا وہ (Erb)۔ اگر ہم کمی اکیلیے سے نیجے کی گلوائی روئیں زیر برقیرہ کو کھو لنے پر القباض بیلا کر دیں تو اس سے زیر برقیرہ کو کھو لنے پر القباض بیلا کر دیں تو اس سے ظاہر ہوگا کہ بیش سے باب ندیری موجود ہے 'جر گزز کی موجود گی کی دلالت ہے (طاحلہ ہوصفیہ 628)۔ طبعی جرات ہ رہ اور م کی ایمیئر کے در میان ہے۔ ب

نیکن دُورول کے درمیان وقعہ ہمیشہ ہمیں ہوتا ۔ بچل میں مکسل شیخ زیادہ فام ہے اور النوں میں مکن ہے کہ صفیح کلی طور پر ڈسیلانہ ہو اسی واسط اس شکل کے ضبح کو مشفقہ واور اس شکل کوجس میں کائل سکون کے وقفے ہول مُنتَوَقَّف کہنے ہیں ۔ محفی مکزز (latent tetany) میں جو خاصہ عام ہے ، صفیح کے مطلے خودر وہیں ہونے ۔

می می نظام کی غیر معمولی تخریک بندیری نصوف مکوز کی میرسمولی تخریک بندیری نصوف مکوز کی معروت بین میکند میرسی معنی مخرو (laryngısmus stridulus) اورتشنجات سے می خلا مربوتی ہے ۔

نزد در قینی کرزیس عرسی عمات موکدا بتدائی درجوں میں ایک شکافی چزاغ (slit-lamp) کے زریعہ مٹ ہرہ کرائے جاسکتے ہیں 'ناخوں کا بھر بھران اور صدیت (ridging) 'ناقص مینا کی وجہ سے دانتوں کی متعرض حید سیت اور بالوں کا گرجانا واقع ہوسکتا ہے (21)۔

یہ مرض چند و نوں سے لے کر جند مفتوں تک جاری رہتا ہے اور قاعدہ ہم کشفایا بی جوجاتی ہے۔ کہی کہی صحتیا ہی کے بعد نفو اُ ے عرصہ تک اُ انگول کی کچھ کمزوری باقی رہ جاتی ہے' اور عضلی ذلول اور رکینے کی لرزش بھی دیمی گئی ہے۔ لیکن جب و دورے شدید جول تو موت خستگی ہے' یا ذات الجنب ہے (جو تنفسی مزاحمت کا نیتجہ ہو تا ہے)' یا بجول میں اسی اسہال کی وجہ سے واقع ہوجانی ہے جس نے گزز کو بیدا کر دیا نتھا۔

میں واقع ہونا' اِس مرض کو کن اِز (tetanus) سے ممیز کر آہے۔ هسٹایر یا بی میں واقع ہونا' اِس مرض کو کن اِز (tetanus) سے ممیز کر آہے۔ هسٹایر یا بی افتار اُسات مکز زکی شکل افتیار کرسکتے ہیں۔ وہ عمواً یک جانبی ہوتے ہیں اور دور آبا ہمٹیر یا بی حالتوں کے ہمراہ واقع ہوتے ہیں۔ مخفی کز ز(latent tetany) کی شخیر اُماراتِ واسٹیک و ٹراؤسوکی مددسے کی جاسکتی ہے اور بعض اُن علاما ست کی موجو دگی برسے جوعموماً اُس کے ساتھ والبنتہ ہوتے ہیں' بیسنے وانوں کے میناکے موجو دگی برسے جوعموماً اُس کے ساتھ والبنتہ ہوتے ہیں' بیسنے وانوں کے میناکے مقابق کی اور متوالی التہاب ملتحہ۔

عسلاج - بیراتهارمون (parathormone) تحت الجدی ورول عضلی یا ورول وریدی راه سے روزاند ۱۰ تا ۳۰ پونس ویا جائے ۔ بیش متاوی کی عضلی یا ورول وریدی راه سے روزاند ۱۰ تا ۳۰ پونس ویا جائے ۔ بیش متاوی کی حسب سے بہلی طامت قئے ہوتی ہے کیائی گورٹ پر رویتے گفتے ویا جا آسے (25) کرین شیخوار بول کی حالت میں) براہ دہن ہر حویتے گفتے ویا جا آسے (25) کلورین دوران خون کے اندر جاکر کلور انڈ کی کی کی الائی کردتی ہے اور کیائی میں اممادسے خارج ہوجا تاہے ۔ ایمونیم کلور انڈ کی کی کی الائی کردتی ہے اور کیائی میں میں اور میں آزا یا جائے ۔ اس کا ایمونیا یو ریا میں تعبل ہوجا آسے کی میڈ اس میں جنا کیا اس میں جائے ہیں دی جاشکتی ہیں ۔ مریض کی میڈہ حالت کوختی لائک بید دور کردینا چاہئے ۔ مثلاً معدی اتساع کا علاج جراحی علیہ (معدی صائمی تنجیر دور کردینا چاہئے ۔ مثلاً معدی اتساع کا علاج جراحی علیہ (معدی صائمی تنجیر علاج کرنا چاہئے ۔ بچوں ہی اسہمال کا حور کردینا چاہئے ۔ بچوں ہی اسہمال کا خدا کوغیرہ سے کرنا چاہئے ۔ بچوں ہی اسہمال کا خدا کوغیرہ سے کرنا چاہئے ۔ بچوں ہی اور کولائنا ہی خور دیں اور کولائنا کی خور میں اپنے بچوں کو دود مدیلانا مجمور دیں اور کولائنا کریں ۔ اور کوروں میں اس متعال کریں ۔ اور کوروں میں استمال کریں ۔ اور کوروں کی میں اس میں اس میں اور کولائنا کریں ۔ اور کولائنا کریں ۔ اس میں اس میں کی کا تعداد کردوں میں اس میں اس میں کا دور دور میں اس کا دور دور میں کا نواز کولاد میں اس میں کاری کردوں میں کول کوروں کی کور کوروں کی کورائی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کیا کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کیا کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں ک

غدة تموسيه

(THYMUS GLAND)

غدة تيموسيد کاوزن پيدائش سے لے کراک سال کا وزنجم کا تقرباً اور ۱۱ اور ۱۱ سال کے درميان آس وزن کا ۸۵۸ وفيد کا اور ۱۱ سال کے درميان آس وزن کا ۸۵۸ وفيد کا اور ۱۱ سال کے درميان آس وزن کا گفت حقد بل لکين اگرا حتيا بل کے ساتھ کا سنس کيا جائے ہيں ہي اس کا لم بھی حقد بل سکتا ہے 'جوليفی اور شخمی با فت' لمفی خليوں کے جزيرات 'اور حين جُرا عن آس کيا ہو گائے ہوں کے جزارہ (Hassall's corpuscles) مين منمور (Budgeon) با تدرني يا ووسرے مزس مزال آفرين امراض کے جمراه بيا جا آہے ' يہ غدہ جمامت ميں گھٹ جا آہے ۔ تيموسيد کی کلائی متعددامراک بيا جا آہے ' يہ غدہ جمامت ميں گھٹ جا آہے ۔ تيموسيد کی کلائی متعددامراک بيل بي جا تی جن من سے اربی ترین يہ ہیں ؛ سيمون موسيد (leukæmia) بالحقوص لمفائی قسم کی مون آجکن جو کھی گائٹر اور منزقی عضلی نماکت بالحقوص لمفائی قسم کی مون آجکن ' جو کھی گائٹر اور منزقی عضلی نماکت تورہ بن سکتا ہے ' اور من تدے میں نو بالسید بھی ہوسکتی تورہ بن سکتا ہے ' اور من تدے میں نو بالسید بھی ہوسکتی تورہ بن سکتا ہے ' اور من تدے میں نو بالسید بھی ہوسکتی

زانانی میں غدہ تی رسید کی انتہائی اہمیت یہ بتائی گئے ہے کہ یہ آس مالت ہیں جوکہ تیہ وسی کمفی حالت (status thymo-lymphaticus) کے مالت ہیں جوکہ تیموسی کمفی حالت (status thymo-lymphaticus) کے لئے گئی گئے ہے جو معدم مس کے تحت خاص طور پر بچوں میں واقع ہو' اور موت کا سبب واضح نہ ہو۔ اِن اصابتول میں بیا او قات تمام جیم کی کمفی اِفتوں کی عام آب سبب واضح نہ ہو۔ اِن اصابتول میں بیا او قات تمام جیم کی کمفی اِفتوں کی عام آب میں بیا ہو تا ہو ایم کے خلاف میں ہوتی کے ملاف اور تیموسی کے ملاف اس سے ہرگز زیا دہ نہیں ہوتی کر تبنی کی مقدار غالباً اُس سے ہرگز زیا دہ نہیں ہوتی کر تبنی کی مقدار غالباً اُس سے ہرگز زیا دہ نہیں ہوتی کر تبنی کی مقدار غالباً اُس سے ہرگز زیا دہ نہیں ہوتی کر تبنی کی مقدار غالباً اُس سے ہرگز تریا دہ نہیں ہوتی کر تبنی کی مقدار غالباً اُس سے ہرگز تریا دہ نہیں موجو دموتی ہے گو کہ ایک ایسے بچے میں جو ہزال آفر میں مرف سے مرا مرز کم فی یافت و بول خلا ہرکر تی ہے۔ تازہ شخیقات سے اب یہ بہنہ جلا ہے کہ مرا مرز کم فی یافت و بول خلا ہرکر تی ہے۔ تازہ شخیقات سے اب یہ بہنہ جلا ہے کہ مرا مرز کم فی یافت و بول خلا ہرکر تی ہے۔ تازہ شخیقات سے اب یہ بہنہ جلا ہے کہ مرا مرز کم فی یافت و بول خلا ہرکر تی ہے۔ تازہ شخیقات سے اب یہ بہنہ جلا ہے کہ مرا مرز کم فی یافت و بول خلا ہرکر تی ہے۔ تازہ شخیقات سے اب یہ بہنہ جلا ہے کہ بیا تھا ہو اس بیا ہو تا کہ دونوں کا بھور کا کا ہور تی ہو تا کو کا کہ ایک دونوں کا بھور کی کی دونوں کیا ہور تی ہور تی

تیموسی غده بمی طبعی حدود کے اندر ہو تا ہے کہذا تیموسی کمفی حالت کی تشخیص کسی حقیقت پر مبنی ہنیں اوژ متقبل میں ایسی اموات کومعدم م می طرف برا و راست منسوب کرنا چاہئہ' یا نا کہانی موت کی دو سری شالوں میں کسی امعلوم سبب کی طرف ۔

فوول ميسي

(SUPRARENAL CAPSULES)

فوق الكليد كيس دو معول برشنمل بي :-

ا۔ قشم (cortex) ربین طوی نظام = interrenal system

مباں اَ دی خلیوں سے ما خوذ ہو تا ہے جواعضائے نیامل سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ أس ب كاكسيترين البيشر (cholesterin esters) اورسيستعين (lecithin) بري مقدار میں موجو دیو نے ہمی اور اس کا زرور نگ ایمنیں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا وزن بورے غدے کا ، 4 فیصدی ہوتا ہے اوروہ دوران عل میں کسیقدرزیا دوٹرا ہوجاتا ہے۔ قشرہ کے لیمیا کڈ زساری نوعیت کے ایک حاد ممری مرمن کے اعمت جرکہ مہلک ہوتا ہیں جیند ہی روز میں غائب ہوجاتے ہیں' اس کے بھیس وہ خوام كى ما لتولَ مثلاً خبيث مرض ميئ خارج نبيں ہوتتے ۔ إس لحا ظرسے وہ معمولی جہانی تنجرکے واکل مِکس فاصہ ظاہر کرتے ہیں ۔ قشرہ صنف کے ساتھ تعلق رکھیا ہے۔ شا ذالصا تبول میں جہال قشرِ وبیش پر ور دوہ ہوتا ہے ' اعضا کے تنامل کا نمو تتبا در ہوتا ہے اور مروانہ خصایص کی تریا دنتی کی خباتی ہے۔ زیا وہ عام طوریریہ علاات قشرہ کے سرطان سے پیال ہوجاتے ہیں (جو لماخطہو) ۔ مس کمے رعس **فوق الکلیوں کی ناقص کوین معضِ ادفات ِ اعضائے تناسل سے بالوں کے غائر** موجا من يا أبداري سے إن بالوں كى غير موجود كى اور اعضائے تناسل كى اقص كون کی حالتوں میں وکمی گئی ہے۔ فشرہ میں ایک ترجیبی شنے میکسیورانک الیب ڈ اے سکار بک (hexuronic acid or ascorbic) حیا تین ج سے مائل (النظ ہو) موجو و ہوتی ہے 'جومبم کے آگسی ڈیسینز (oxidases) کا اتناع کرتی ہے۔

جب برترجیی شنے غیر موجود ہو جسے کہ مض ایڈ یئن میں تو یہ کسیدیسیز جسم کے ترکیبی سا لمات کے اکثر و کیو فون گرو ہوں (hydroquinone groupings) کو سیاہ رنگ رکھنے والے کیوفون گرو ہوں (quinone groupings) میں متغیر کرنے میں بورے طور پرکار فرا ہوتے ہیں اور اس طرح جسم کورنگ و ہے ہیں (27)- ہوا میں کھلے رہنے برایت تا زہ کئے ہوئے میں کا ساہ برجانا میں کسید کی وجہ سے ہی ہوتا ہو تا ہے جو کہ ایڈیس کے مون کو روکتا ہے اور فوق الکوی قشری میں ایک فوجی او موجود ہوتا ہے جو کہ ایڈیس کے مون کو روکتا ہے اور فوق الکوی قشری فراون (suprarenai cortical extract) ایسکا ٹین اور فوق الکوی قشری فراون (eucortone) کے نام سے مشہور (eschatin) کے نام سے مشہور

۷۔ کُت (medulla) اُنھیں خلیوں سے اخذ ہوتا ہے جن سے مشار کی عصبی نظام کے عقدی خلیے ماخو ذہوتے ہیں۔ اِنگرومیٹ (bichromate) سے وهميزومفسوص لموبني تعامل فالهركرتاب أوراسيوا سط أسسه ايك كروما فيني جسو (chromaffine body) کہتے ہیں۔ وہ آبٹری بیت این (adrenin) ا ایبی نیفرین (epinephrin) نام کی ایک قبے تیار کرتا ہے جوبدر مید الیف می نیار لرنی گئی ہے' اور کیمیا ٹی لھا طے اور منتوڈ اٹی آکسی فینائل ایتھا'ال میتھا کُل کیمین (ortho-dioxyphenyl-ethanol-methylamine) ہے۔ا مشائی اعصار کومتہیتے کرنے پریہ شئے خون کے اندرمنصب **ہوما تی ہے۔ ی**رنمام مثار کی عصبی منتہا و^ی پرایک قری ازر کھتی ہے۔ طبعی طالات کے تحت دوران نون کے اندریانصاب أس وقت وانع بوتا ہے جب کہ تھ کیے ورد خوف اور عصد کے توی جذبات بيدا بوتے ہيں۔ اِس حالت ميں بضم آور تجديد بيد ائش سے متعلق اعمال كا تمناع بوجا أب - جيوان جنگ كي كئ يا زار بوع كے كئ كئ منعد بوجا اب - اس كى **سلیاں سیل جانی ہیں ۔ جلد میسکے رنگ کی جوجاتی ہے ۔ بال کھڑے ہوجاتے ہیں -**مرکتِ قلب نیز ہوجا تی ہے۔ جگر برکس شئے کے معل سے نوکن میں شکرز اوہ ہوجاتی ہے۔ ڈھانچہ کے عضلات زیادہ قوت ظاہر کرتے ہیں اور جلد نہیں تھکتے ۔ وَنَ کَی ترویب بذیر نماده بوجاتی ہے؛ اور اگروه جیوان زخمی موجائے تو ترویب کی یہ زیادتی کار آمدمونی ہے۔ ان میں شک

مِنْ مِكَا كَدَا يُكِرُيوا خِتْحُوس كَى طاقت جُرِفرب الاشال بِي إِي جاتى ہے ايْدينين كوالف المعمَّا بوقى كا دائك مانظون في أمكى قوي موس كرته بي ماثل قوى عذبات كارفوانس بوقيه عماست تر (dementia præcox) من يه يا يا كيابوك كي المحارة الإراب على مغيرات ظاهر كراب (28) ینحیال ظا ہر کیا گیا ہے کہ بدن میں پیدا شدہ مرارت کی نظیم ٹری مدتکہ ا کڈرینین کی رسد کی وجہ سے ہوتی ہے' جومگر برعل کرتی اور گلائٹکو جن کو منقل کرتی ے اوریہ کرتک ایڈرینین کے سریع انصباب کا نیتی ہوتی ہے۔ اِس مغروضا کی بنايروه ناگِها في خديد تنب جراكت كه اندرنزف يا شديدا متلاكه ممراه يا يُ جاتي بے ماد بنیس ایک سالیت (hyper-adrenalism) کی علامت سے (15)- ایسے نزفات عموماً نوعی حمیات مشلاً ملیریا و ذات الرید سرخ اره پرموا وغیرہ کے باعث ہوتے ہیں' جن میں لُبّ کے اِمثلاً کی توقع ہوسکتی ہے ۔ نیکن پیر نزف فوق الکلوی وریدوں کی ملقیت کے باعث مبی واقع موسکتا ہے۔ اور اِسی واسط اس حالت میں تئے سرایت کی وج سے مرکز نہیں ہوتی ملکہ شار کی ہنیج کے اعث بوق ہے۔ یہ ایک معم شاء کرانت "("sympathetic fever") ہے۔ اِن میں سے بیفِس ا صابتوں میں مکن ہے کہ تب جاتی رہے اور اس کے بعد تحت الطبعي ميش نهاكت اور ببوطوا قع بوط ئے ۔ يه عاد قليل ايك بيناليت (hypo-adrenalism) كم علامات بن جولت كة لمف بوط ي كم ما عسف بدا ہوجاتے ہیں ۔ اِس تعلق میں یہ اور کھنے کے قابل ہے کہ عام ضیق کے ساتھ بتدريج الماكت كوينيني والماتنخاص مي كتب كا ايثرريناليني المليد ٢٠٠٠ مي گرام يه ہے کرم وم می گرام تک یا یا جا ہے گا' در آ ں حا لیکہ ناگیا بی موت کی مثالوں ہی آگی مقدارہ وہم کی گرام ہو ہی ہے ۔ ما وقلیل ایڈرینا کینیت کے دورے علا ات شرامینی دردکانا کہانی حلداوراً کیمیت این اور اس کے بعد شکم کا تمدد۔ اورتشخات قوما اور نريان⁶ يا ايك محرتي درج -

مرض ايذكست

(Addison's disease)

اس مض كوسب سے يہلنے و اكثر تعامس أيد بيئن نے مصاله ميں بيان كيا-بحث اساب - يدمض مرعم مين دوئاتا ب اور ذكوري نعبة زياده عام ہے ۔ مدرن ایک نہا بیت کثر الوقوع سبب ہے ۔ بعض اصابتوں یف فرانکلوکا كيي اسبق إربوي يا شوكي بوسيد كي (spinal caries) يا حصري خراج (abscess معمرائت زده بوجانے بین ایکن بہت سی اصابتوں ہی بران غدو کی ایک اولی وَرِ فی سرایت ہوتی ہے۔ تراشنے پریہ نیم شفاف رمادی یاسنری کل ر یا وی با فست ا ورغیر شفا ن ِ زرد ٔ جبنی جرم کا ایک مجموعهٔ طا مبلیر تنے دمیں بعض اوقات بیر منبی ما ده مزم موکرایک ریمی کهفدین جانا ہے۔ ۲۵ فی صدی اصابتول میں تغیر صرف يهي بوتا ہے كہ فتشره كا ذبول واقع بوجاتا ہے (29)- دوسري شالول بي ان غدّو يرسلُّعه كاحلُّه هو تابيء ياعروق كي علقيت وافع بهوكرزون كي وعاً بدري بوتي بيء ا مراضبات مض أيد ين فوق الكليد كاقشره كه اللا ف كم اعث ہونا ہے جس سے اے سکار بک ایسڈ (ascorbic acid) کا فغدان ہو جا آہے۔ ص کانیتج^و جنیبا کہ پہلے سممعا یا گیا ہے' لونبت ہوتی ہے۔ نیز نوعی قشری ا دہ کی عدم موجووگئ نلاز لا كيسودي كلورائيد كاسقوط يواكسيم كاار تفاع أورنا مثروَجيني اوولكا کلوی اختباس پیداکرتی کیدے اگردے اب یمنی بیت سے کلورائیڈ اور دافریانی کا ازاج کرنے ہیں ۔ بدمیاتی کیمیائی تغیرات خون کے ارتکاز کی وج سے کثیرظوی دمویت ُ دہاؤُ كى كمى ا دراس مرض كى عمومى نهاكت اورشا يدمعدى معوى انتقلالات ببداكردية أي-اُساسى تول طبعى درج سے نیچے یا یا گیا ہے (4) ۔ علا ات ۔ اہم علامات یہ ہوتے ہیں ؛ ۔ کمزوری خون کے دباوی کمی

علاً مات - اہم علاً مات بہ ہوتے ہیں : ۔ کمزوری خون کے دباؤی کمی قط اور لونیت ۔ آغاز من کو بائدی کی اور لونیت ۔ آغاز من عمراً غیر محسوس طور پر ہو اے اور مریض کو بت دریج کمزوری انتخاص کڑ صال بن اور محسنت کے لئے بے رضیتی کی شکا بت ہوتی ہے۔ مکن ہے کہ کو کموں مراق یا شراسیف میں درو ہو۔ قلب کافعل نہا بیت ضعیف

موتا اوربسته من المين يرشى إدوان سر إمحنت كرمن يرسانس كايمونا اختلاج ہو تاہے۔ نبض کے ضربات فی منٹ اٹنی سے بود یک ہوتے ہیں اود ا صغیروسنیف بوتی ہے ۔خون کا وا و بنا بہت کم بوتا ہے اور اتنا کرکہ یا رسے کا . مر ما . و عي مدر روا ب - استهامواً كم روتي بيا اورمتلي البائيان اور في مرا کے اہم مطابہ رمیں یجوں ہی کہ بحوان ہونا ہے اورا رالبول اوراس کے ساتھ خول کا ارتکازا ورکنیزخلوی دمویت پیداً ہو تی ہے۔ چرمپڑاین اور بے مپنی بعضافاتا نہایت نایں ہوتی ہے۔ جلا کی عمیب وغریب بلس نگی ایک اسٹالم بع جوسب سے زیا وہ ما زب توجد رہی ہے مکن ہے کہ بدعلامت متذکرہ الاعم علا ات کے ماتھ ما تحد و تھی جائے کا اُن سے پہلے نمویاب موجائے کا اُن کے نمایا ں ہویے کے کئی ماہ بعد واقع ہو۔اصابتوں کے اس آخری گروہ میں اگر عمومی علامات نہا بت شدید من تومکن ہے کہ وہ جلد کے ماؤف ہونے سے پیلے ہی مہلکہ الما بت بروبائيں مينا شخه بض اوقات مرض المدنئين ميں لونيت غيرموحود ہوتی ج اور مشس کی توجیہد اسی طرح کی جاتی ہے۔ پر کونیت یا سھومت اپنی بکی مجا نیوں مین قاتم یا زردی اگل مجوری ا وربیفن ا **وفات نِر نیونی یاسبزی اِنْل مجور**ی رنگ^ت ی ہوتی ہے۔ اس کی زیادہ نمایا ل شکل میں حار کار نگ گہرا مجورا ایک خلاسی کھے رنگ کی طرح ہوناہے۔ یہ لونیت عمواً او لاً جلد کے اُن حصوں کو متنار شرکرتی ہے جو قدر تی طور پر کھلے ہوئے ہوئے ہیں جسے کر حمرہ کرون کا تحقوں اور انگلو^ن ی کثیت کیل ملدا اراس ما مونمیوں کے نیجے آپ کی طبیعترمتنا تررہتی ہے۔ رویم یہ اُن مصوں کو متنا تُرکر تی ہے جو قدرتی طور پر دو سرے حصوں کے تنب ہا آنے بسویم' یہ دبا ُواورْضیف حوٹ کے مقامات کوم*تا ٹزکر*تی ہے ' جیسے ک مورتوں میں موازہ بندوں اور کمر بندوں کے نشانات اور وہ مقالات جہال ہ بلہ ور اور لمیتر نگا ئے گئے ہول بلیکن طبد کو گف کروسینے والے زخمول کے ند مات سیب ہی رئیسے ہن اور رنگ کی ایک گہری تدان کی سرحد نباتی ہے -بعض او قات ہتھیلیوں کی گہری لکیریں سیاہ موجا نی ہیں مکن ہے کہ حلا^ک

ان صول پرجساه ہوگئے ہیں عجوفے جیو فے ساہ و بھے البوں ایجائیوں کی طوع انظرہ ہیں۔ اوقی یا فقہ اصابتوں میں مکن ہے کہ سارے جیم پرلونیت جیابائے۔

ایکن اس درجائک بہنچنے سے پہلے ہی ہیں مرض کو عمواً بہان کینے کے لئے تسیار رہنا جا ہے اور فی الحقیقت بہت سے مریض ایسی عام لونیت کے وقوع ہے پہلے ہی بلاک ہوجاتے ہیں۔ یہ لونیت علیہ می مک محدود آہیں ہوتی۔ اکثر ہولب پہلے ہی بلاک ہوجاتے ہیں۔ یہ لونیت علیہ کا ایک محدود آہیں ہوتی۔ اکثر ہولب کی اندرو فی جانب برابراورائے کے اندرو فی جانب برابراورائے کی اندرو فی جانب برابراورائے کہ وہ میں ایک منا ملی خشا پراورز ان کی جانب برادور کی موجود گیاو داخی ہوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ میں سے مبعض ہوسیدہ وانتوں کی موجود گیاو داخی ہوتی ہوتا ہے۔ الکن میں سے مبعض ہوسیدہ وانتوں کی موجود گیاو داخی ہوتا ہوتی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا منحول یا عدیم الدم مونا لازی ہیں۔ بلکہ مکن ہے کہ اور ہوتا ہے۔ لیکن اس کا منحول یا عدیم الدم مونا لازی ہیں۔ بلکہ مکن ہے کہ تحت الجاشے کی خاصی موئی نتراس کے خاتمہ کی باتی رہے۔ بلکن اس کا منحول یا عدیم الدم مونا لازی ہیں۔ بلکہ مکن ہے کہ تحت الجاشے کی خاصی موئی نتراس کے خاتمہ کی باتی رہے۔ بلکوں اس کے خاتمہ کی باتی رہے۔ بلکوں اس کے خاتمہ کی باتی رہے۔ بلکوں کی میں کی خاتمہ کی باتی رہے۔ بلکوں کی باتی رہے۔ بلکوں کی خاتمہ کی باتی رہے۔

مندرجُهُ وَبِلْ عَلْطِياں ہُونے کا نہا بت امکان مؤلمے: -(۱) دو مری کسی بدرگی کو مرضِ اَیڈیسَن سجمہ لینا۔ (۲) جب لونیت صفیف یا غیر موجود ہو علاماتِ مرض کی سفناخت میں ناکام دہنا۔ وہ بدرنگیاں جو علمی سے

ین یکی ایکی میں بہایت بی جدید ترقبوں کاآئینہ دارہے۔ نمک علاج ۔ بیطب میں نہایت بی جدید ترقبوں کاآئینہ دارہے۔ نمک روزانہ ۱۰ ۔ ۱۵ گرین کی متا دول میں مرض میں تخفیف پیدا کرتا ہے۔ کاڈین اسی سی تک کا روزانہ زیر جلدی اشراب علا ات کو بالکل دور کرد تیا ہے اور لوئیت فائب ہوجاتی ہے۔ اس قبی دواکی بہت حد تک ضرورت نہیں بڑتی بشر لیسک نمک دیا جائے ۔ او نیت کے سکا ربک ایسٹر دینے سے خائب ہوجاتی ہے۔

(لملخطريو) -

فوق الكليبيول كي رئيوليا

ان فدد کو اوف کرنے والی رسولیا ل فدی سلعہ (adenoma) محی سلعہ (neuroblastoma) محی است (sarcoma) اور مصبی ناہفتی کی سلعہ نیا ہے ہے میں است میں اسلی بیا ہے ہے ہے اور مرف بالنول ہیں یا ہا تا ہے مصبی ناہفی سلعہ بجول میں ہوتا ہے اور فعدے کے کب سے بیدا ہوتا ہے ۔ وواکی تعبیث اللہ اللہ بیول میں ہوتا ہے اور فعدے کے کب سے بیدا ہوتا ہے ۔ وواکی تعبیث اللہ

بسغیر خلبہ لحی سلعہ سعے مثیا ہر ہوتی ہے 'لیکن اس سی تکلیے ہوستے ہی جرمرکزی کا تظام کے فوا بول کا محضوص وممنز فاصد ہیں۔ وہ بڑبوں میں ٹانوی جاؤ براسانی معداکرونتا ہے۔ مکن سے کہ وہ آیک بڑا تو دہ بنا وے جرفلطی سے کلوی رسولی سم ليا مائے أن وقتيك اس كا جلد استيصال ذكيا مائے إس كے مبلك ال ہوسے کا امکان ہو آ ہے ۔ سرطان شا ذہی اولی ہو تا ہے نیکن وہ عموماً وسیع ٹانوی ضررات کا جز ہوتا ہے۔ اولی بوسے کی حالت یں وہ ایک صغیرطبیہ مرطان ہوتا ہ_گ جس سے نزف اور تنخر لاِسا ٹی پیدا ہوجا آ ہے۔ اِن طلیوں کی ترکیب آنیبی <u>یا</u> جوفری ہوتی ہے یا یہ عروق دموید کے گرد نصف قطری صورت من جمع ہوئتے ہں۔ اور اِن میں فوق الکلوی تشریب سے ایک عام مثا بہت ہوتی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں سلعہ کا انتشار بدر بعدسروح واقع ہوسکتا ہے ۔جب یہ بالہا موجود بنوتی ہے تواس سے سلمی خلیات کی فالیت (بیش بین کلویت - hyper) = interrenopathy کے باعث مخصوص اور ممیز علامات پیدا ہوجاتے ہیں۔ یہی علامات قشرے کی میا وہ بیش برورش کی حالت میں نمبی و کیتھے جاتے ہیں۔ اگر فتور ورول رحمى صابت كے دوران ميں شروع براہے تو نسا في خنو ثبت كاذبه (female pseudo-hamaphroditism) ومكوم جاتى بين وه فرووسنيت مورت ہوتی ہے کیونکہ بیضین موجود ہوتے ہمی کیکن ببرونی خصابص مروانہ ہم ہیں ۔ یہ خالت بیدا میشی ہوتی ہے اور اس کا سبب عمر یا دوجا نبی فشری میش مکون^ی ہے۔جب یہ مرض پیدایش کے بعد جلا ہی شروع ہوجاتا ہے تو وہ حالت بیب كره نياب جيه بلوغ قبل ا زوفت كيته بي - يربح سيم بوقع بي الأ میں تمیا در اورمتیا وزالی تناسلی منوبیدا موجاتا ہے۔ بڑی عضلی الماقت منودار موکر وه مالت بيدا بوجاتى سى جسے صبيانى هر كيولى قسم (infantile) (Hercules type كنتے بي - جبرے ير بال مودار جو جاتے بي اور تناسلي و لما نف برجع بوتے ہیں برگا ہے "انیث (feminisation) یا ہم صنفی تباور بیا ہوجا آہے۔ ارکیکیوں میں المعموم تذکیر ہوتی ہے کیا وگرصنفی تبادر بظری میش فرزن ا الوں كى بالبدكى اور اواز كے كہرے بن كے سائقد واقع ہوتا ہے ليكن م صنفى

الله المراق بيان كيا كيابية اور حمل بيد كان من بين جلد شروع الما المساحة المسلمة الما المراق من بين بين بيان المراق من بين بين المراق بين بين المراق بين

فوق الكليدكيول كے مبعق دور من تغيرات كا الذكرومي مزود ي سب التهاب اور تيتى مركزول كے با حدیث التهاب اور تيتى مركزول كے قرب كى وج سے خواج أز ف تضرد كے با حدیث جربش تغير و كي اعضا وك تغير كے ساتھ ما واسى در نے عام تدرن من اور شافولور بر بر تشكى معند كي يرسب ان دو مرى ا مراضياتى مالتوں ميں سے بي جو ل ستى إلى -

غذة تخاميه

(PITUITABY GLAND)



ت واکروی ورلوکی مربیند و در کی عمر ۱۱ سال و وجا بی فوق انکوی رسولیان سخامی حفر طبعی به سنسه با نی دبازت ارتفاع الصنفط بلید دموی سکر است و اکروی و را که مان عربی عمر ۱۸ میل میران م

رمیان واقع ہوآ ہے۔جزومقدم (لخنهٔ مقدم) سے بحلنے والاکولا کد جزومقدم (لخنهٔ مقدم) سے بحلنے والاکولا کد جزومقدم (لخنهٔ معنومی میں سے ہوکر بطین سویم کے انہرا آ بے اور و ماغی نخاعی سال کے اندریا باط آ ہے ۔

إمراضيات يتربنة وبول مي إيكيا ب كالنة مقدم كانكال والنف سيمان في عام إليد في اورا مضار تناسل كانمودو بول رك ماته مي رقلیل نشامیت = hypopituitarism) - میمرس غدہ کے فعال خلاصول کے عفر میتیت (gigantiam) پیدا ہوجاتی ہے۔ انسان میں لخت مقدم کی میش فعالیت و بیش نخامیت =hyperpituitarism) سے اوالل زندگی میں کمیں بڈیوں کی سیص الیدگی کے باعث عفریتریت اور الغ زندگی ہے جب كدامبي بريول كربريا في بالأفرمت علم بومات، بي أسكب (acromegaly) يبدأ غوما تأسب - ان داونون مالتول من اس بيش بالسيد في كے ساتھ غدہ ورقبیہ اورغدہ نز د در قبیہ اور فوق الكلوى قشرے كی بیش كو بن موجود ہوتی ہے اور یہ بیش بالید گی نەصرف کچریوں تک محدود ہوتی ہے بلکہ جسم کی تمام ساختیں اس سے متاثر ہوتی ہیں جہائجہ اس حالت کیے گئے کلا (macrosomia) كى اصطلاح كا استعال ببتر بوكا سازه تحقيقات سے مقدم لخة کی اہمیت یدٹا بت ہوتی ہے کہ یہ تمام اقعام کی دروں افرازی فعالیت کونہ كاربو إلى دويث كر تول كو (الما خطه بوقليا له شكر دمويت) منظر ركف ب والريمية كامقدم لخدة بربا وكرديا جائ تو در قيه مينين خصيتين لبله وكوق الكلية تشرواو تايدنزودر قيات مي انحطامي مغيرات واقع مرته مي را كاسد باب مقدي تخامی خلاصه جاست کے اشراب سے کیا جاسکتا ہے جن ہے جمیع الدر قریم جمیع المولد (الما حظ بومولدات) اوربيج فرق الكليد إرمون تياركي كي بن نيزايك اليا إرمون مركيستان مي بيجان بيداكركه وووه كا افراز ببداكر اسهديه إرمون غدة منخامية سطبعي طور ترنا زاد بوكرجيم مي واخل بو تفريت مي الوردو مرح درول افرازي اعضا برافتدار ركھتے ہيں۔ مثال كے طور بر مہم الدرقيہ إرمون درقبيكو بهيجان مي لا كرفقا راكسين بيراكرا اورس طيح اسأستى تحول كوبنه كرائحة

لیکن یہ ابندی دیریا تا بت نہیں ہوتی کیونکہ غدہ کی فعالیت کے جاری دہنے گئے انہا جسم کے صدیعہیج الدرقیعا دہ پیدائر تا ہے(40)- چنا نجے غدہ نخام بدکے درویا آبار تعلقات بیمیہ ہے۔ ہیں اور اس کے ضررات مختلف کثر الغدی علائمیات بید کرتے ہیں جن کا انحصاراس امر پرسے کہ کونساخاص ارمون مغفود ہے۔ ایک آبی

مُفَدِّ عَلَيْ الْمُونُ مِنْ فَقَ الْكُلُّهُ فَقَ الْكُلِيهِ مِنْ الْمِدْلِمَاتُ مِنْ فَقَ الْكُلُّهُ فَقَ الْكُلِيهِ مِنْ اللَّهِ الْمُدِاللَّةِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهِ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُل

مسیح الدر قدینده ورقد کوقهیج کرتا اوراساسی تحل کولبندکرا سبعه -م بلبه کوجائے والا ع بہر جنرورزنی

جرومونر سے ایک خلاصہ (یکوٹرین = pituitrin) عالی ہوتا ہے ہیں۔

دو ہارمون ضاغط العروف (بٹر ساین = pitressin) اور مسرع الولاد ت

(بٹو ساین = pitocin) موجود ہوتے ہیں۔ یمکن ہے کہ بیطبعاً کولائڈ کے سی خارج ہوکر داغی شخاعی سیال میں آجاتے ہیں۔ مسرع الولادت رحم ہربراہ رہ اللہ علی کرتا ہے۔ نماغط العروق معوی عضلے کو متہیج کرتا ہے اور عدیم الحس ما فرت کے میال اور دور عدم کے میلان کو زیادہ کر دیتا ہے۔ الکین غیر عدیم انحس انسان میں آل سے بیشا ب کہ مقدار کم ہوجاتی ہے۔ جزومونواک اور مادہ جبی ہم بہنچا تہے جوکہ معرفہ کے مفرز ترشن ملیات ترشد نعلیات کی نیزلب غطام کی بالیدگی کے کئے ضرور می ہے۔ خرگوشوں میں اسکی بڑی معتادوں کا اشراب نزفی البّها ب معدہ بیدا کرتا ہے ، جوکہ مغرز ترشن ملیات بیں شروع ہوتا ہے۔

بیں شروع ہوتا ہے۔

بیں شروع ہوتا ہے۔

بین شروع ہوتا ہے۔

ا عن پيدا بوتي هه - ذيا بطس لمنغ پر مبديس غوركيا جائے گا -

مرضى تنشريح مفاؤنخا مبركه امراض مندرجه في الباب ك المشاوكة ان: - (۱) مرج ترکی کے اندر کے اخرار (دس وں سرجی) بوصب فیل ہوئے بن: رو) إيوسين لسنل عَلى سلحم (eosmophilic adenoma) بو لنة مقدم كے ختیقی افرازی خلیوں میشتل ہو ۔ یہ بیش نخامیت پیدا کردیا ہے۔ ر مب) فأعلانه المور سرطر عصف والالون توس غل ع سلعه (chromophobe) (adenoma حبس كے طبیات میں ایسے ذرات نہیں ہو نے جو ایوسین کارنگ قبول كرليس بالمعدلخلي متقدم كوللف كروسي كارتبان ركتساب اوراسي وجهت فليبل نخامیت یا اکرو تناب - (بح) مخلوط عنی سلحد، (mixed adenoma) ج**س میں ابوسین بیسنداور لون تَرسْ دونوں عنامہ موجود ہوتے ہیں ۔ یہ مخا**مست فانق (dyspituitarism) ببدأكروتيا ب جوايك البي مالت ب عس من قليل تحاميت اور ببیش نتجا میت دو نوآن کے اُمارات ایک ہی وقت موجو و ہوتے ہیں ۔ یہ غدی سلعات ، ۲ سال سے پنیے کے اُشخاص میں عمراً نہیں یا نے جاتے ۔ (۵) غِلای سرطان (adeno-carcinoma) جوشاؤ ہوتا ہے ۔ رس ، وقف الدی تخت جو انفغام کی وجه سے بیدا ہو۔ (س نازه دریا فت شده اساس بیدندغدی سلعہ (basophil adenoma) معدا بني مخصوص ومميز ملامات كے . يه امرتبب الكذب ك اگريد غدى سلعدا منحانات لاش بني ١٠ في صدى مي واقع بوتا ١٠٠٠ خصوصاً الخرِي ز ند کی میں بدان اصابتوں میں ، ۵ فی صدی میں واقع ہو گائے کرمن میں نوا بہسم کے دور ہے حصول میں واقع ہوتا ہے (37)-(1) فوق سرجی اضرار حرب متلف ہونے کی وجہ سے قلیل نخامیت بیدا کروینے ہیں۔ ان ہیں سے فوق سرجی وویرہ عام نزین ہے۔ یہ داغی سلعد کے عنوان کے سخت بیان کیا گیاہے۔ دور مری رسولیال سخانی ملعه (meningioma) شخمی و دیره (cholesteatoma) عصبی سرایشی سلعه (glioma) اورلحي سلعه (sarcoma) بن _ رس) درو ل جمجي ا ضرار حرفا صله بربول اور حزنا نوی طور پر استمنقا را له ماغ (hydrocephalus) بید اکر کے غداہ خامبہ براویج دباۇر التے ہیں۔

علامات ۔ ان کا انحصار فدے کی فعالیت ہے اختانا نہ ضرر کی وجہ سے بیدا جو ماتے ہیں (غلبی علامات) نزار ووٹیس:

یردباُویژن برمو آب اجواسی علامات ، آخرالذکرُ دَمَاغی بلعه کے 'ر

نخت سان ک*ُدگئے ہی*۔

قلیل شخامیت دوراً مماوه دماغی ضرر کے علامات کے ہمراه یا فی ماسکتی

مري علامات - كبرالجواس يه بيش خاميت كه إعث بواج. اس من كوست على من أرى (Marie) في بيان كيا- يدعمو أربعان مي التأذ سن لموغ میں ہواکرا ہے۔ جوارح (لا تھوں اور یا وُں) اور چیرے کی بڑیوں کی کا اُن موتى كيم المات موثى موجاتى مين اورنجات العظام بيدا موجات مي بجا بڑا ہو کر بنیج اور آ مگے کو لئک آ آ ہے (جانوی بروزالث تی " mandibular")

= prognathism دانت متفاصل موجات مي . نرم حص مي موقع بوجات بي-بلد كے طبیات مبین برور دو ہوتے میں ۔ ناخن جوڑ کے موسے اور مضلع ہو ماتتے

ہیں۔ بلدمونی اور شمی ہوجاتی ہے۔ لب کان انک اور زبان موٹے کور رہے اور بڑے ہوجاتے ہیں۔ اُنگبول کی دَاِزت سے إِ تھ کی شکل ایک فاص طرز کی

بوجاتی ہے جے آری سے طرز کبر (type en large) کے نام سے یا وکیا ہے۔

اختاء مع قلب کے بڑے ہوجائتے ہمیں مکن ہے کہ تستم بھی ہوجائے۔ کبرالجواح میں جو فعال بیش نخامیت کے سائند ہوا ساسی سخول کیا زیاد تی اور برداشت

شکر کی کمی موحو درمو تی ہے ' اِسی وا سطے اگر برداشتِ شکرکا امتحان کیا جائے تو میش سنگردمو بیت اورسنگر بولیت موجود ہوتی ہے۔ مکن ہے کہ فقیقی ذیا نبطیس

اوراس كيسائة كيتونيت وانع بوجائه الورانسي بي ايك اصابت مي رمولي

نكال دينے كے بعد ذيا بطس ميں بہت اسلاح بروكئي (31) - اگر نخاميت فاتر واقع ہوجائے تو سرد است مشکرنیا دہ موجاتی ہے۔ اکٹ عقلی منوا ونی ورجہ کا موا

الربیش نخایست دوران طفلی میں واقع ہوجائے تو ہڈیاں معمول کی نبت

ب نابوطاتی بین مفریتیت انگلیال می نمول کی نبویان شری بوطاتی ایراه را نه اس طرز کا بوجا آسته جسه آری به نابه الدین (vos er ong) کے

199 ,

منظ مبیت - این ک_{هٔ خالص شالین و و نشاد اصالیس من من *انگار*} لعبة ا فقعا ما من ہے تلف موجاً ؟ ہے ' جرکسی من علی کا میتی ہوتے ایسا - اگرایسا لمفلی کے زمانہ میں واقع ہونو قرمزت (dwarfism) پیدا ہودانی ہے (نخاصی ما تاصی Loran type of = الورنى طرزكي تصفي pituntary ateleiosis = infantilism) ساراجيم جيونا بوتا سي (فصرتيمي == microsomi يا زميا مي قصارقامتی = hypophyseal nanism) نبکن تمناسب مؤاسد اعضا بنال غه منو یا فته اور ثانوی تناملی معالص غیر موجود ہوننہ ہیں اُس تسم ہیں ہے۔ سمانل ن (Simmonds) كامن كنته بي عمر بيض بطام بورها نظرة أي اوراس كے ساتھ جلد يرتمبر إن بوتى مِنَ أورشخت الحلد بافتو كا زبول نباكت عا نوی سبنی اور تناسلی دول بے طمئیت عدم است ما اورایت حسانی و موی فیصار تواترنبض وموی شکراور ایالی تحل موند می مکان ہےوہ نماب آلوده حالت میں مرحائے۔ اگر الگھ لختہ کا آنا ف زمان کوغ میں مومائے نوقیل ازوقت مشیخوخت اسیوفت را قع بهوجاتی به بنخای ٔز^۲: ^{به آب}ل زقت ستخوخت کے ہمراہ واقع پومکنی ہے ۔ یہ ایک تسمیر کا تشدینے (progeria) ہے ۔ ، وروں افرازی غدوں بر سخامبہ کا جواقت ارتی اثریبلے بیان کیا حاکما کا اس سے یہ ہم میں آسکتا ہے کہ جب یہ غدے نہ لول یا کئے جاتے ہیں توعال ماست ا درونوں کی متعد و تعلیل سے بدا ہوتے ہیں (ایک قسم کا کتابوا لغدی علائمیہ)۔ لازهٔ ' ان اصابتول می جواری علا ات مفقو د ہوتے ہیں لیکن مکن ہے لول الم^ت اصا بتول مين شخامي حفره حجيونامو (طاحظيه بوضحفه ، ه م ب) .

فوق مه جي رسو کياں عموماً شخيميت اور تصبّی کامجموعه پيلا کرونتي نهيں' جو بجوں میں با یا جا تا ہے' اور جسے علا کلميائے فو بلاٹ (Frohlich's syndrome) یا ذیرا فتیجی تناسل سرّ تغذیک (hypophyscal dystrophia adiposo-genitalis) کہتے ہیں ' جولل سخا میت کے باعث ہواکرتا ہے۔ چربی زیادہ ترشکم' سُرینوں ' جواج کے قربی حسول ہیں نظر آتی ہے۔ حکن ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوکہ وزمیت یہ ' ہوجائے یاعضا کے تناسل صبیانی حالت میں رہ جانے ہیں اور جلد شاحب تیلی ' زہ ' اور چکنی ہوتی ہے۔ ناخن جھوٹے اور ہے بلال اور انگلیا سے گاؤوم ہوتی ہیں بڑی فیر معدودرہ جانے ہیں۔ فرہنی موجمواً طبعی ہوتا ہے۔ سریری تصویر جوان رسولہوں کے باعث پیلا ہوجاتی ہے' اکثر غیرواضح ہوتی ہے۔ حکن ہے کہ نحول 'کٹرت ہول اور قبل راز وقت سے خونت موجود ہو۔

مد ہی درجہ ہی میں اللہ استفاص کا لون ترس نقدی سلعدا تبدائی درجہ ہی میں تناملی وظائفہ کا استفاص کا لون ترس نقدی سلعدا تبدائی درجہ ہی میں تناملی وظائفہ کا استفاص پیدا کردیتا ہے جوانا شعبی ہو ابھی بیان کھئے گئے ہیں اور تھیمینت اور اللہ جھڑ نے اور لونمین کا رجان تھی ہوتا ہے ۔ نیز مکن ہے کہ نہا کت عنوہ کی ہردہ شکر کی زیا دی اور کھٹے ہوئے ستحول کے باعث ستحت الحادثیش اور معض اصا بنوٹ ا

كثرت بول تمجى موجور بيو ـ

بالغوں میں مکن سے کر انتہائی فربہی کی اصابتیں شخامی مرض کے باعث ہی (Dercum's مرض کے اعث ہی (adiposis dolorosa) میں مرض کے اعث ہوں۔ وجعی صحیحت کے باعث ہوسکتا ہے (الما خط ہو سے مالیاً شخامی مرض یا تایل در قیت کے باعث ہوسکتا ہے (الما خط ہو سے مالیاً): صرع بھی قلیل شخامیت سے وابستہ ہوتی ہے۔

تنتخبیس - اس کا انحصار جواری اور غدی علامات کی سفناخت پر اس اور یہ موروں سرجی اور فرق سرجی ضرات کو اور دور اس جی اور یہ موروں سرجی اور فرق سرجی ضرات کی اور دور افتاد ، دروں تجمی ضرات جو سنجامی علامات پیدا کرد ہتے ہیں اس کے دروں سرجی آدو برہ کاسن مدو شد در میان تمیز کرنا اہم امر ہے ۔ غدی سلعہ اور فوق سرجی آدو برہ کاسن مدو شد بہلے دو کو تمیز کرنے میں کارا کہ ہوگا اور اس کے علاوہ آن ایمینہ لا شعامی مناظراد منت علامات بین میں ۔ دورافتا دہ دروں جمی ضررات مثلاً ایک دمینی ملعہ بھی ممیز علامات میش کریں گئے۔

ا ندار - یه برا بوتا ہے کیونکہ رسولی عمراً ترقی کرتی جاتی ہے 'اگرجہ سرج ترکی پرسے از الدالضغط کی علیتی ہلاکت تقدیباً ، فیصدی بحد (Cushing) علاج - قلیل شخامیت کی اصابتوں میں اگلا گئة کرغدہ درقیائی خلو کی بھورت افراص براہ وہن استعمال کرنے سے فائدہ عاصل ہوا ہے ۔ بچوٹرئی کو تحت الحجاد دینا چاہئے 'کیونکہ غذائی تنال میں یہ تلف ہوجاتی ہے مسال جو کی ادازہ بر واست سے کر پرے کیا جا مکتا ہے ۔ عملیتی علاج پردماغی سامنہ کو فوائی کے شخت مؤرکیا گیا ہے ۔

ذ إبطس لمبغ

(diabetes insipidus)

کٹرت بول اسب ویل سے بعل ہوسکتی ہے:۔ فزرات گردہ فون کے دباؤ کی زیا وقی و بار اسب ویل سے بعل ہوسکتی ہے:۔ فزرات گردہ فون کے دباؤ کی زیا وقی و یا بیطس شکری میں بیتیاب کے اندر شکر کی موج دگی سے شدیدمرا الم الله میں اور عارمنی طور برلبض حوارض و ماغ ' النصوص سمسند یا اور شفیقت الم الله میں اور عام میں فوا بیطس کمینے ایک وائی کہ ت بول ہے جو متذکرہ الاحالتونیں میں فوا بیطس کمینے ایک وائی کہ ت بول ہے جو متذکرہ الاحالتونیں

كسى حالت سے نسوب نہيں كبا جاسكتا ۔

ا هراضیات و فرانیس کمینی غده نخامبه (غالباً اس کے تعلیا فرق ،

تضریا من کے باعث بوسکتا ہے ۔ بچولرین (نغا غطالعوق) کے تحت ابنی وروں وریدی اشرا اس مرش کا نوعی علاج ہیں اور ان سے بشاب الله مقدار فی الغور کھٹ کو طبی جم برا آجا تی ہے اور مریعنوں کو ان کے علالم ت سے مثاب الله مقدار فی الغور کھٹ کو طبی جم برا آجا تی ہے اور مریعنوں کو ان کے علالم ت سے موان میں پیشاب باجم کھٹ جا آہے اور بہتقایل جم اس وقت اور بھی زین میوان میں پیشاب باجم کھٹ جا آہے اور بہتقایل جم اس وقت اور بھی زین مالماں بوتی ہے جب کہ صد ہو گئی ہی اور بہتقایل جم اس وقت اور بھی زین مالماں بوتی ہو ۔ اگر مشوی یا کلوی اعداب کاٹ و کے جا اس تو اس تو ان ان فرانی ان موجود گئی ان بیاب کی موجود گئی انہیا ہا ہے۔ غالباً اس خلاصہ کا فول محض شوی عورتی نصری کی موجود گئی انہیا ہا ہے۔ کہ در سری بولیا نے کہ کر د اسخد اب کے لئے صوری بو (المنظم بوسفو 186) کی مرد سے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہے اور آن کی وجہ سے اور آن کی مرد سے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہے اور آن کی وجہ سے اور آن کی مرد سے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہے اور آن کی وجہ سے اور آن کی مرد سے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہے اور آن کی وجہ سے کا در آن کی وجہ کے تصر دیسے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہے اور آن کی وجہ کے تصر دیسے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہوں اور آن کی وجہ کے تو رہ سے کہ کی مرد سے بھی ملیخ ذیا بیطس ہوسکتا ہوں وہ کو کہ اور آن کی وجہ کی کو کہ کی کو کہ کو کر آن کی کا میابی سے کان مدور ہو گیا ہوں۔

مرضی آتش بینج ۔ ریج ترکی کی شعاع نگا رستوں ہے مو اگوئی کلانی نہیں ظامر ہوتی ۔ ندہ سنخا مید کے باس کے قرب وجوار کے منتلف صررات بیان کئے کئے ہیں ۔۔ کسور پری کے قاعدے کے کسور دماغی سلعنہ آتشکی باتہ دہ قاعدی النہا ب بیا یا گھیا ہوئی کے قاعدے کے کسور دماغی سلعنہ آتشکی باتہ دہ قاعدی النہا ب بیا یا گیا کہ ایک کولی (basal meningitis) معمل انتجاب میں یا یا گیا کہ ایک کولی (bullet) یحیلے گئے کود بار ہی تھی ۔ آرکش برا ما بت میں یا یا گیا کہ ایک کولی انتخابی کے تعلیم گئے گئے گئے گئی ایک کا تذکرہ کیا ہے جسے وہ غدے کے تعلیم گئے گئے گئی ا

ور نی در ریزش خیال کرة ہے۔"

مگن ہے کہ شانہ کا انساع اور بہیٹ پرورش ٔ حالبین کا انساع اور گردو کی کلانی و کھینے میں آئے اور یہ حالتیں بیٹیاب کی مقدار کثیر کے طویل المذت ، او سے منسوب کی جاسکتی ہیں ۔

علامات ما یا توغیر محموس طور پریا بکا یک شروع موجاتے ہیں - نا آ

الا بن یہ بین کہ میٹاب کی نہا بیت بڑی مقدارین فارج ہوتی ہیں اور باس بہت را دو لکنی ہے جس کی وج سے مریض فارج شدہ یا بی کے نقصان کی المانی کرلتیا ہوت میں ہون ہے کہ میٹیا بین کے مقداری بین کے مقداری بین کی طفیہ میں ہون ، ۲۰ بلکہ ، م یا سٹ یک بہنج ماے ۔ بیٹیا بین کی طرح ہوتا ہے اسکی ماے ۔ بیٹیا بین کی طرح ہوتا ہے اسکی ماے ۔ بیٹیا بین کی طرح ہوتا ہے اس بی الما فت نوعی میں اور ایک اور انجا مل خفیف سا بیش ہوتا ہے ۔ اس بی الما فت نوعی میں اور ایک اور انجا مل خفیف سا بیش ہوتا ہے ۔ اس بی المانی فی صدی مقدار تھوڑی ہوتی ہے ۔ کسمی کر بولیت ہوتی ہی اور امعا یا رہے فی فیر کی اور امعا یا رہے ۔ کسمی خور کی اور امعا ہو ایک اس بوتی ہیں اور امعا ہی فیر کی ہوتی ہیں اور امعا ہی فیر کی بیا بیت ابھی صحت رکھتا ہو اور وہ ذیا بیلس کو بجائے ایک مرض سی خفے کے ایک نہا بیت ابھی صحت رکھتا ہو اور وہ ذیا بیلس کو بجائے ایک مرض سی خفے کے ایک وجر پریشانی سیمتا ہو ۔ مکن ہے کہ منا می مرض کے طلانات بھی موجو و موں ۔

نود بخود پیدا ہونے والی یاخوورو اصابتیں علاج نہ کرنے کی صورت ہیں نکن ہے برسول جاری رہیں۔ اگر دوری بیاریاں مداخل ہو کر ہلاکت نہ پیدا کردیں تو یہ اصابتیں شاذہبی مہلک ہوتی میں۔ کبھی تہمی سٹ کیولیت طاری ہو کر ہر جالت کو ذ ابیلس سٹ کری نیادتی ہے۔

، من الماري المسلم الله الماريت كنّا فت نوعي والے بيشاب كى مقلار الشخيص - ليجيكے رنگ اور سبت كنّا فت نوعي والے بيشاب كى مقلار

لنیر جس میں غیرطبعی اجزا موجود نہ ہوں' اور ال کے ساتھ تشنگی کی موجود گئی تمیز علامات ہیں ۔لیکن کٹرت بول کے دگرا تمام' مثلاً وہ جو معرض بولائٹ ورھشار کا میں ہوتے ہیں' نیارج از سجت کروینے جانائیں ۔اول الذکریں عمواً کسی نکسی وقت البیومن کی خفیف مفدار ممیز طور پر موجود ہوتی ہے پشیاب کی مقدار حیندال

زیا دہ نہیں ہوتی' اور دوسری د لاکشیں موجود ہوتی ہیں' جیسے کہ لمبند شریا بی تناکُر اور قلبی بریشں پرورش ۔ ہسٹیریا میں کثرت **بول م**ھن عارضی ہوتی ہے ۔ اسکار میں ایک میں میں میں میں ایک میں ایک ہوتی ایک میں ایک ہوتی ہے ۔

علاج یہ ہے کہ خلاصہ نخامیہ کاسخت العباد استعال کیا جائے۔ ابتداؤ اُس کے ایک کمعب سیٹی میٹر (ہا قطروں) کا اشراب دن میں دوبار کیا جاؤے۔ بھراس امر کی سی کی جاتی ہے کہ حتی الا مکان کم اِشرابات سے پیشاب کے جم باقتلا ماصل کیا جائے۔ بوشمتی سے وہن کی را ہ سے علاج بے سود ہوتا ہے کیو کہ جوہر فغال (پیچرٹرین) قنال غذائی میں لف بیرجا آہے۔ لیکن یہ وہا، وروں انفی رکتار (jelly) ۔:

(intranasal spray) کے ذریعہ دی گئی ہے ، یا ایک انفی جیلی (jelly) ۔:

ذریعہ کوجس میں پیڑ سبس (pitressin) ہوئی سب سے بہتر خشک کروہ شخامیہ فریعہ میر اک میرا میں نامی اس "(pituitary snuff") کے طور پر نفوخ کی جائے۔ بیض اصابتیں نیرسین سے علاج پذیر نہیں ہوتمیں ۔

آ نشکی اصابتون میں دافع آ تشک علاج (جو ملاحظہ ہو) کی ضرورت ہے۔ حلی دماغی مضن (مثلاً رسولی وغیرہ) میں فدرتا علمیہ کاسوال پیدا ہوگا ہے، اصابتول میں قطنی کیو کے سے تعنیف ہوئی ہے ، جس سے بنہ طیبا ہے کہ قاسد، اصابتول میں قطنی کیو کے سے تعنیف ہوئی ہے ، جس سے بنہ طیبا ہے کہ قاسد، و ماغ برمصلی النہا بسیایا (serous meningitis) اس مرض کا اصلی مبسب تقا (32).

عدة صنوبريه

(PINEAL GLAND)

جسم صنوبری (برنا مید د اغی یا مخروطید مصم صنوبری (برنا مید د اغی یا مخروطید مصم صنوبری (برنا مید د اغی یا مخروطید و تقریباً لم سرای ایک می موقا ہے ۔ ایا ہے موقع میں برنا ہے جو طبیعی و صنع رکھنے والی مهمکوں میں ہوتے ہیں اور بن کے درمیان و موی جو ف موتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تیم کو سید کی طرح ال کی ک خاص منعنت ابتدا ئی زندگی ہیں ہے اور بعد میں آل میں کستقدر مکش واقع موجانا ہے ۔ وہ ضررات جن کا اندراج کیا گیا ہے یہ ہیں ، ۔ بیش پروش اور و الله کی سلمات کو سرے اور بھوڑے نزف اور ہوشک ۔

سلعہ کی اصابتوں میں جن میں تول کے ایسے تنیرات ظاہر ہو کیے تھے' جن سے باطنی افراز کا اختلال ظاہر ہوتا تھا موصنوع کیا رہ سال کک کی عمروالے شیجے تھے' اور تغیرات حسب ذیل تھے (اگر چیمختلف اصابتوں میں بیمختلف درجہ کی تھے) د۔ ذہنی تباور' جسم کی غیرمعمولی طور پر مربع بالیدگی' قضیب اورصیتین کی کلانی موئے زباری تمبا در بالبدگی اور بعض اوقات هیمیت ران کے مقامی بعض اوقات هیمیت ران کے مقامی بعض اوقات میمی موجود تقین اور مختلف اصابتول بی جوسلها موجود تقی وه ید مقر : مسلمه کی طلامتیں بھی موجود تقی وه ید مقر : مسلمه کویری رکلی لخی سسلمه (cystic psammo) بسریشی سلمه (glioma) یا سخطتی سلمه (teratoma) .

تناسلى غدد

(GONADS)

النا خصیداورمبیض کے امراضیاتی تغیرات کا منظم بیان جراحی اورعلم امراض کی نصابی کما بوں میں یا یا جائے گا۔ بہاں تناسلی غدو برِ معض اُن کے درول فرازی وظیفہ کے نقطۂ نظرسے غور کیا جائے گا۔

ر نا نصنفی اعضا فی دوری ابنداین نزف موتوف بوطانے کو بعد رح کی مضار مخاطی واحدته کی بنی بوتی ہے ، بینی قاعدی عضار مخاطی واحدته کی بنی بوتی ہے ، بینی قاعدی عضار مخاطی کی اس دور کے اول نصف یں یہ منکا نز بوتی ہے اور ایک ارمون کے اثر کے تحت دبیر بوطاتی ہے ، جو کہ ایسٹرن (cestrin) یا جرابی ایسلولین (folliculin) کہلا ہے۔ یہ زنا نصنفی ارمون بوکہ او نوی صنفی خصائص کا سبب ہے ، گرافیا ئی جراب میں بیدا ہو تا ہے ، جو کہ اسی عرصہ میں بالید کی صاصل کر کے بختہ ہو جاتی ہے جب گرافیا ئی جراب کے بیشنے سے بیضہ آزاد ہوجا تا ہے توجہ اسفر ظہوری آتا اور محتفی جو اور یہ ایک دور را جمیفی اور مول یا ہے توجہ اسفر ظہوری آتا کہ کہ دور را جمیفی طروق یا محت کو زیادہ کرتا اور غدد کو کم فغف بنا کہتے ہیں۔ پروجیٹین رحمی خاطبہ کی غدی فعالیت کو زیادہ کرتا اور غدد کو کم فغف بنا دیاری ہے۔ اگر استعرار عمل نہ ہو ، توغشار خاطبی ٹوٹ میصی دور کا خاتمہ بوجاتی ہے اور رحم ہو نے مارہ کی بیوٹ جاتی ہے اور رحم ہو تا ہے۔ اور اس طرح حیفی دور کا خاتمہ بوجاتی ہے اور رحم ہو تو نسل میں خوراکو ل میں اسلامی کہ ڈائی آگسی ایسٹرن ایک ہو تا تھی ایسٹرن کے ہواہ خارج میفی دور کا خاتمہ بوجاتی ہے اور اس طرح حیفی دور کا خاتمہ بوجاتی ہے اور اس طرح حیفی دور کا خاتمہ بوجاتی ہے اور کا کا تھے کہ دو آئی آگسی ایسٹرن کے تو اور کی میک کا موجو کے کا در اس طرح حیفی دور کا خاتمہ بوجاتی ہے۔ اور کا کہ کہ کو کو کھنوں کی ایسٹرن کی دور کا کو کہ کو کو کھنوں کی ایسٹرن کی کھنوں کو کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کے کھنوں کے کھنوں کو کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کے کھنوں کو کھنوں

گیا رصوبی اور جو دسویں دن دیا جائے' اور اس کے بعد بروٹین (**دخرکوشی ہ**ٹ ویاجائے، یعنی ہرروز آیک خرگوشی یونٹ ستر صوبی روزے سروع کرے (42) جِنَا شَجِيهِ إلى طريقة بيد اس بيطمثيت كاعلاج كباط سكتا بي جوكصنفي أعصناً كه أله . باعث ہو۔ اگرحد سے زیادہ ایٹرن جمیں یا یا جائے یا کھلا یاجائے توکرا ہولی جراب کی بالبید گی ماری رہنی ہےاوروہ م<u>لعثہ</u> نہیں باتی اورغشار مناطی کی ^{بالہ} کی ممی جاری رہتی ہے اور وہ دوبری ہوجاتی ہے اور آخر کا راثوٹ میموٹ کشن نزف بیداکرتی ہے۔ جو نکہ جم اصفر نہیں بننے یا نا اس کے افرازی دربہ یہ كرين كے لئے كوئى بروجنٹن موج وہنیں ہوتا البندا اس كونزف كے درجہ من بذرا اشراب ويناط بين بياروقات إلكل جيوتي ننوراكين و كاروق بيايين مند وس نحر گوشی بونٹ د و نول بر تمپیلی مونی اگر جید ، او ما ، دریونٹ کی مذہ ور بن بر سکتی ہے۔ ایش و و سرے صنفی اعضامیں می تغیرات بیدا کرتا ہے اسکا جفتی کوان بنا بن کے لئے مہل میں (جو ہے اور موش میں سہ طِلمہ کا تقرآن) یہ ہو امر با من حیر ا ہے كة قدرتى طورير ايك ماسف والحدابيان كاسب سے زيادہ كنيرا لمقدارسى سانڈ کا پیٹیاب ہے' اورسب سے زیاوہ فعال مرکب دولاً ٹڈروٹین جو ہروں ہ ا میٹرن سالمیں ملامے سے حاصل ہوتا ہے بوکدایک سرال (sterol) سے كيمياوي طورير كولسدال (cholestrol) موركيليد فيال (calciferol) (عيايب ۵ یکے ساتھ ملتا جاتا ہے منیز نہایت ہی فعال سرطان تو بیں ماوہ کے ساتھ جال اب تک تبار کیا گیاہے ۔ میزید برائل متعدوُ مختلف لِیکن قریبی طور برمتما تل ایج ا میسے ہیں جو کہ مختلف ورجہ کے شبتی ہ فریں خواص ر کھنے ہیں' اورا کِ اوہ ا کِہا مب كا انتراب *بريغ ييشبق اور حكى تصييعٌ جلد مير كريمن*ه برسمرطا ن بپيدا بوتا ي. ^{46.} مبیض کے نمویز اور اس سب کچھ برجوکہ اس سے بطور تیجہ کے طہور میں آ تا ہے۔ نخامیه کا مقدم لخته ابک إرمون کے ذریعہ اقتدار رکھتا ہے میں کا اسمی تک کو^نا نام نہیں رکھاگلی برکین جو تھوڑی مقداروں میں گرا فیائی جراب کا نبواور لیٹر كاافرا زواقع كريا ك اور برى مقدارون يرضب ماصفركا كالل منوواقع كراب جس سے پر وجٹین کا افراز ہوتا ہے۔ حمل کے دورا ن میں خون اور میٹاب ^ی

اک قریبی طور پر عالمی او و یا یا جاتا ہے ' جو کہ غالباً مشید سے بیدا ہو تا ہے اور پرولا (prolan) کہلا تا ہے۔ اس واقعہ کو یا جے بال آئشیم (Ascheim) اور آرا بگر (prolan) کہلا تا ہے۔ اس واقعہ کے طور پر استعمال کیا کیو کمہ پرولائ پڑتا میں میں است میں دیے سے مبین میں بیفس تغیرات پیدا ہوجاتے ہیں ہو است میں دیے سے مبین میں بیفس تغیرات پیدا ہوجاتے ہیں ہو کہا۔ ہو کہا ہے میں (44) و

مروانصنفی اعصا یعمیون استیمال میبن اعصا موجیلات منوی فرامید و انصنفی اعصا یعمیون استیمال میبن اعصا موجیلات منوی قدامیه کوبر (Cowper) کے فدد اور قضیب کاعدم بنو او و بول بیدا کر است خصیون کا به اثر مردانه صنفی فی رمون کی وجه سے ب و کو کہ تصب کے رحنگی ضلیات میں نیار ہوتا ہے میمیم مولد و مرجو کہ حل کے دوران میں میثیاب میں موجود ہوتا ہے کہ نیاز ن مصید کا علاج کر دند میں کا ۔ آ مدے کیا نیو اردیا جا آ ہے کا انتراب میں دوبار دیا جا آ ہے کہ انتراب میں دوبار دیا جا آ ہے کہ انتراب میں دوبار دیا جا آ ہے (45)۔

منظر پیدا ہوتا ہے'اور عمواً الوں کی بالیدگی کم ہوتی ہے۔ مورت میں دہ مان میض برآری سے قبل از وقت ایاس پیدا ہو کہ فربہی' سرخے عمقا ہٹ ہنفٹی ہیں اور جنمی اختلالات واقع ہوجاتے ہیں عصبی نہاکت اور نفسی نہاکتی یادا النفسی علا، ظاہر ہو سکتے ہیں۔

خصیهانی (eunuchoidism) . اس اصطلاح کا اطلاق اُن عالزار کی وجه سے تناسلی غدد کے ضایع ہوجائے ہے۔ پیدا ہوجاتی ہے۔

یہ غیرنا زلن صیتین اضفاء المخصیتان = (cryptorchidism) کی فیدو الے مربین اس غیرعام نہیں ۔ اضفاء المخصیتان = (early eunuchoidism) کی طبع غیری خات وقت و تھی جا دو الماج ہیں غیرعام نہیں ۔ اضفاء کی طبعی عرصہ کے دوران ہیں انہ جا خصیا تی است الماد و الماد و الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد و الماد الماد الماد الماد و الماد الماد الماد الماد و الماد ال

سی طرح آجل لموغ جودہ نو ل صنول میں اس قدر ماه طور بریا یا ما آ ہے ، مکن ہے اولی طور بریا یا ما آ ہے ، مکن ہے اولی طور بر تناسلی غدد بر اولی طور بر تناسلی غدد بر دوست بدا ہو جائے۔

مختلف علائمات

(VARIED SYNDROMES)

فربهي

(obesity)

امراضیات مطبی خصی می جس کے مہم کاوزن متعل رہا ہے صوری ہے کہ وہ توانائی کی تلائی کرے جو موری ہے کہ وہ توانائی کی تلائی کرے جو موارت اور بیرونی مضلی محنت کی تکلیس برآ مد ہوتی ہے ۔اگر وہ شخص و نعتہ اپنے عاوات بدل کر منبتہ زیا وہ تعووی زندگی اختیار کرلے تو توانائی کی برآ مہم ہو جائے گئی لہذا نعتبہ کم غذاکی کمید ہوگی اور زائد از ضرورت غذاکا جسم کے اندر چربی کے طور بر

جاوُ ہوجائے کا یشخوم اور کا ربو ایڈ رشیس دو نول اس طریقہ سے آبانی ندخور ہو باز ہیں لیکن بروئین کے ترکیبی اجزار کی کمید زیادہ آسانی کے ساتھ موکران سے حرارت کی برآ مدندیا دہ ہوجاتی ہے ۔ اِسی کومبض اوقات پروٹین کا نوعی حرکی فعل (specific dynamic action) کتے ہیں۔ اِسی واسطے فریبی کی مبت سی اصابتوں کے اہم عوال جیانی عدم فعالیت اور لیسیار خوری ہیں۔

لکین وافر فربی کی الیسی اُصابیس بمی ہیں جن کی توجید کیا حقہ اِس طریقہ سے نہیں کی جاسکتی۔ تندرست آ ومیول میں بہت سے نہا بیت فربراشخاص بی آ نعبتہ بہت کی کھاتے ہیں اور اسس کے برعکس بہت سے بسیار نوراشخاص بی متقلاً وُلمے کیسے ہوتے ہیں۔

معلا دہے ہوئے ہیں۔ ان حصائص ذاتی کی توجیہ انفرادی خسوسی شرح کسیرے کی جاسکتی، اوران کا مقابلہ آساسی محول (الم خطر ہوسفی طفی (459) کی تخین سے کیا جا مکتا ہی قلیل در قبیع یا مخاطی اُذیبا میں اساسی تحول کر ہوجا آ ہے اور یہ مریض فن۔ : موجائے کا رجمان رکھتے ہیں اگر جیمشالی مخاطی اذبیائی مریض فر بہنہیں ہوئے۔

غدہ نخامیہ کے مرض میں میں بین ملیل شخامیت کا ظہور میو اساس بیند غدی ملومی کا فرق الکلید کمیول کے بیش کاری سلعہ (hypernephroma) میں غدہ صینو بریکے

امراض میں اور وا فی سلمہ کی معنی اصابتوں میں اور آخة گری کے عقب میں تعمیت واقع ہوسکتی ہے۔ ان میں سے بہت اصابتوں ہیں بشر طیکہ حتیقی وزن جب مالحام

کیا جائے' اُماسی تحرل طبعی حدود کے اندبا پاگیا ہے۔ اس کے بیمعنی ہیں کہ اُل میں حرارت آفریں بافتیں (عضالات اور غدد) طبعی سے زیادہ ممنت اعمار ہی ہیں'

روکہ بیش در قبیت کی طرف اشارہ ہے) کیو کمشمی بافت جو کہ زائدوزن کامب ہے اس کا اساسی تول نہا یت ہی لیت ہے (46) - شائد کول کی وہ زیادتی ہوندا

کینے کے بعد پیدا ہوجا تی ہے طبعی درج سے کم ہے اور اسی سے فرببی کی توحیہ موجا کے گر (4):

اس امر کی الیدی کچه شهاوت موجود ہے کہ فریبی انسولین کی وافر بالی کے باعث جو تی ہے۔ بیت نید کے باعث جو تی ہے۔ بیت نید

لنیکہ انس کے جزیرے ٹرسے ہوئے یائے گئے ہیں سٹکری برداشت زیارہ ہوتی ہے جیا کہ شکردینے کے معدد موی سٹکر کے منحنی سے نظام ہوتا ہند ۔ فریابطس کے رجانا

شکل ۱۰ و داکٹر آے جی گلس کا مریض جس کو د بی تحمیت کی شکا بیندیتی۔

کی یہ نوج یہ ہوسکتی ہے کہ جزیروں کابیاں فعال وظیفه کئی سال نگ جاری رینے کے بعد تھکا وٹ ہے متاثر ہوجا آہے۔ وه حالتنن جو که فریهی کے بمراه یا بی جاتی میں ۔ نهایت فریہ آغال لُوكِئي فِي أَراميانَ يَا دَفْتِينَ بِيشِ بِهِ أَرَامِيانَ يَا وَفُتِينَ بِيشِ اتَّى مِنْ اگرچه اِن کی وسعت کا اعصار بثبیترزندگی کے اس زمانہ پر ہو تا ہے جس میں فرہیل فق ہوگئی ہو۔ اگر قریبی اوا ک*ل عمرین سبنے* نو مکن ہے کہ عضلی نظام نبی منو یا فتہ ہوجا تاکہ ٹرھے ہو ئے زائدوزن سے مناط موصائ رجناسني قديم زمان كحكرتي مل بهمى جارے اینے زا زعلمے اربیت بیلواتو كى طرح اكثر فريه موتے تھے ليكين بسااة فآ نها بت نو به اشخاص زیا ده محنت مارما کے ناقابل ہوتے ہیں' ان کی سانس میو جانی ہے اور ان میں اِخْلاج بیدا ہوجانے كالمكان موأبء كيوكمه اكتراقفات قلب بيستمي بيس بالبيد كي موحود بيوتي ے۔ زائد بیدائش حرارت کا لاز می تیجہ یہ ہے کہ خون کا بیلان بڑھ جانے کی وجہ سے قلب کا کام زائد ہوجائے اور اس

قلبى عدم كفايت كى ان علامات كى توجيه بوتى ب جوكه اس قدرعام بير - فربهي كميماره

یائی جانے والی حالتوں میں سے نقرس (gout) کا تذکرہ بالنصوص کرنا جائے گرائے غذا کی زیادتی ہے اس کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ فربھی ذیا بیطیس تنکری کی استعداد ہمی بیدا کردتی ہے۔

مترقی شخیی سُوءِ تغلیه (lipodystrophia progressiva) ...

غیمِ علوم بیب رکھنے والا آیک ثناؤ مرض ہے بھس میں زیرجلدی شمر کا مشاکل نعقیات ہو اسپے جو العموم جہرے میں شروع ہو کرنیچے کی طرب بھیلیا ہے ' لیکن کثر اوّ آ جمر کے بالا کی حصے تک محدود ہو ماہے۔ یہ مرض کئی سال تک جاری رستا ہے'

اور مکن ہے بچین میں شروع ہو (58) ج

علیج مریض کوشی یا آس پیشتل غذاؤں کو بہت کم کردینا جاہئے یا بالکل ان میں برہنے کرنا جاہئے یا بالکل ان ہر بہنے کرزا جاہئے۔ گرد بالکوشت میں علاز مرخی وغیرہ پالتو پرند کے مجھلی سنز ترکاریا میں اور تا زہ بھل کھائے با سکتے ہیں۔ اِسی نوعیت کی پروٹین غذا جس میں پت کا ربو باکٹر رہیٹ ہوا ورجو بلانسم کے ہوبینٹ کے علاج (Banting's treatment) یا سالب می علاج (Salisbury treatment) کا اصول ہے۔ نہا بیت فر بہ رہینوں کی سالب می علاج (جمایت فر بہ رہینوں کی

ز. ده خت ندا بر کی ضرورت مبرگی . وقفول کیسا نو نا تدکشی کیه دن تجونز کرد شه ما الكي اورم يعن صرف فهرست ب بين درج كي بوئي سريان الماخط موصني 474) ادیاً زوم**جل کھائے' اور اِس کے سائنونحض اتنی بیٹمبلی (۲ یا ۳ ار**نس) کے کتب^ت ر و ٹمین کے روز انہ نقصان کی تلا فی ہو جائے ۔اگار اکارے تبار کی ہولی صلیٰ جو غَنال غذا في من حذب نہيں ہوتی' مقيد بيے۔اليسي نمدا ميں يه فائمه و موتا ہے۔ کہ اُس کی حراری فیترت کیست موقی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ عدانا صد بچر کمتی ہے جس کی وجد سے خلوے معدہ کا احساس نہیں ہوتا۔ بار لیشکر (harley sugar) حبب یری جائے تو بھوک کے احساسات کوتسلین ویٹ کے نئے مفیدے ۔ ان سے کم شدید علاج مین و بل رونی یا توس (toast) نشاسته وا ربکت اور آلوا و رنبرجو وانی اترے ہوئے وور صاب بنایا ہو اہو' یا وہ (Dutch) یا کا ٹیم (cotrage) نِهِ كَي احازت ، ي جاسكتي ہے - اگر مريض كولايٹا رہنا بڑے مثلا التناب مفالل نِينَ توحرا روں کو کم کردینا عاہیے بینی . . مرروز انہ عفنلی قلبی مرض میں بہت حراری نذا دینی دیا ہے' کیکن گلو کوئل شجر نر کر دینا جا ہے' ایک اونس جا رہا رگھنٹا ہے۔ بست شحروالی غذا کے ہمراہ کا فی لا اور ی حیا تبنیں تجویز کرنی جا ہئیں ' مسشلا ، يا يوسلولكم (radiostoleum) أيك كيسدروزانه - الكيلي مشروبات سيم بربزي بہتر ہے ۔ تکیمن اگرم یض مللب کرے تو کوئی خشک ہلکی انگوری نٹراب' یا وصلّی ی ہموانی مقدار جس کی ترقیق خوب کرلی جائے، ہہتر بن ہے۔ بیر سیئے جس میں

زیاده مالنوس موجود بو احترازلازم ہے۔
جربی کی وجہ سے بڑھے ہوئے دزن کو گھٹانے کے لئے ورزش بہت مفید
بوتی ہے۔ یہ امرکہ کونسی ورزش کا انتخاب کیا جائے مریض کی جراد عفلی قوت یک منصر ہوتا ہے۔
منصر ہوتا ہے ۔ پیدل علیا اور منظم طور پر بہا طرح اصنا مفید ہیں کیو تکہ کام کی مقدار
کو دجہ وارکیا جاسکتا ہے ۔ نہا یت فر بدا شخاص کو ورزش پر راغب کرااکٹر دشوا۔
ہوتا ہے یا لحضوص جب کہ درد بھی موجود ہو جیسے کہ وجہی بیت میں ایسی سریت میں مرب برگوتی علاج (Bergonie treatment) مفید ہوسکتا ہے۔ اس یں بھواور جوار کے بہتے ہے بلا دروا نقباعات کے عضلات میں توازن کے ساتھ منقطع کردہ فرادی دو کے بہتے ہے بلا دروا نقباعات

پیدا کے جاتے ہیں۔ بہ اتنا کا رگر نہیں ہو آجتنا کہ اِرادی عنائی کام کیکن بھے بی ہ ز ہو منے سے تو بہی ہنز ہے ۔ تحت الحارضل مفید ہوتے ہی کیو نکہ ان سے تول ہے زیاد تی ہوتی ہے ۔ ایسے شل کی مرت ایک تھنٹے کے ہونگتی ہے' اور میش اتنی کہ ہو جتنی کہ مریض برداشت کر سکے دشاید ، مدورجہ فاران ہا سُٹ) ۔

رقیہ کو تمائر اُلڑیم (thyroideum) (گرین ا۔ ۵) کے طور پرصرف اُس وقت تجویز کرنا چاہئے جب کہ یہ با ور کرنے کی کافی وجہ ہو کہ قلیل درقیت موجود ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا جکا ہے' بہت سی اصابنوں میں تحول طبعی ت ریا وہ فعال ہوتا ہے یہ تاہم در قبہ اور ارالبول بیدا کرے بھی تا نیر کر تاہے' اور پہلم یا در کھنا چاہئے کہ میال کا احتماس زیادتی وزن کا آیک سبب ہے۔

تصتي

(infantilism) تصبی سے مراد طفلی یا بنجین کے خصا نص کا معمول کے نسبت زیادہ لوال عرصہ تک باقی رہنا' یا نمو کا غیر طبعی طور پرشت ہونا ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ تصبی کے

ا شاط میں حووروں افرازی اعضاء علامية فيرك (Frohlich's syndrome) نخساس المتامي (pituitary) (progeria) مشيخ (progeria) اور ذيابطس مليخ كصبب سے بيا موما تي بي-تَصْتِي كِي دوسري مثاليس وهٔ تا خيرات نمو بس جوعد مربي خور (achondroplasia) ' عضلي ذيولَ صلابت البيله (scleroderma)، تعلي اورعُرو قي ضريبات كومك مري (microcephaly) استستقاء الدلم غ (hydrocephalus) وأبلبي (amentia) مش برورشی کمبت جگر (hypertrophic cirrhosis of the liver) کلال محالی بت (splenomegalic cirrhosis)، اور معنس دور مرت فتورات کے سساتھ

والمات

RUFERENCES

1 T. W. Adams and E. P.

Poulton ... 1935 Guy's Hosp, Rep

2 E W. Amley Walker 1916 Proc. Roy. Soc., B. 89, p. 157.

3 L. P. Poulton . 1917 Guy's Hosp. Gaz, N. S. 31, p. 50.

ول ملب .م.	مجانت	lip .	9-,
+ E. Dubois (Basal Meta- bolism in Health and Disease)	1924	Lea & Febiger, N York,	ew
5 R. D. Lawrence	1924	Brit. Med Journ., p. 516.	1,
5 J. H. Burn and H. H. Dale	1924		þ
7 J. J. R. Macleod		Brd. Med Journ, p. 45.	١,
* E. P. Poulton (Gouls toman Lectures) ** Burgess, Campbell, Os	1918 -	Lancet, June 22.	
man, Paync and Poulton 19 C. von Noorden (Pa-	1923	Lancet, n , p. 777	
thologic d. Stoff- wechsels) H R T. Williamson (Di-	1906	Berlm, t., p 207.	
seases of the Spinal Cord)	1911	р 371.	
12 E. P Poulton		Brit. Med. Journ, p. 261.	1.,
13 W. W. Payne and E. P. Poulton	1925	Lancet, 11., p. 638.	
14 W. W Payne 15 W. Cramer (Fever, etc.)	,	Guy's Hosp. Rep., p. 3	08.
and the Thyroid- adrenal Apparatus) 16 J. M. H. Campbell	1928	London. Journ of Hygrene, p 1.	26,
17 Adams and Crossley 18 G. R. Murray		Lancet, 11., p. 501. Brit. Med Journ., p. 908.	11,
19 H. Curschmann	1922	Klin. Wochenschrift June 24, p. 1296.	,
00 7 44 CO 131 1 T		, T	

1927 Lancet, 1., p. 486.

p. 393.

p. 753.

1930-31 Quart, J. Med., 24,

р. 1. 1924 Brit. Med. Journ., и,

.. 1925 Brit. Med. Journ, 1,

20 J. S. Goodall and L.

Rogers

21 D. Hunter

22 F. R. Fraser

23 R. D. Lawrence

	E G B Calvert	1924	Brit. Med. Journ., 31, p. 834.
24	Review on Brochemis-	10.30	
25	try of Blood S Graham and G. H. Anderson	1924	Med. Set., 6, p. 474. Quart. Journ Med, 18,
2h	J. Argyli Campbell	1926	p. 62. Lancet, 1, p. 72
27	D. Gyorgi (Communication)	1929	Assocn. Physicians Cambridge.
28	F. W. Mott and I E. Hutton	1923	Brit. Med. Journ., 11 p. 95
29	P. M. Statistics, London Hospital		h 10
	A W. M Ellis	1091	Lancet, 1., p. 1200.
	Tucker	1922	But. Med Journ. 1. "Epitome," p. 25
33	I Greenwald	1922	J. Biol. Chem , 54, p. 285
34	G Graham		Quart. Journ Mcd., 10.
		1.711	р 245.
35	F Dickens, Dodds, and		·
	Wright	1925	Broch Journ , 19, p. 853
36		1020	Med. Res. Council, Re-
.,,,	D. Lawrence	1849	port on Carbohydrate Contents of Food.
	W.O. Atwater and A.	1906	Washington. The Che-
	P Bryant		mical Composition of American Food Materials.
37	H. G. Close	1934	Lancet, 1., p. 732.
38	A. Walton	1090	Eugenics Rev., 20, p. 253
39	W. W. Payne and E. P.	COMO	Dagenies nev., 20, p. 255
.,,,	Poulton	1000	<i>(1)) 11 -</i> D
40	E. M. Anderson and	1928	Guy's Hosp. Rep.
	J B. Collip		Lancet, 1., p. 784
41	I Snapper	1099	Prog Pou Son Mad 01
	• (1920	Proc Roy. Soc. Med., 21, p. 1771
	C. Kaufmann		Proc. Roc. Soc. Med , 27. p. 849
43	E C. Dodds (Goulstonian Lectures)	1934	Lancet, 1., pp. 931, 988, 1048.
44	P. M. F. Bishop	1933	Guy's Hosp Rep., 83, p.
	4 , 4211/11/1/	4 000	308.

	ence and E. F. en (Communi-				etion,	Roy.
	ilton and E.C.	1931		<i>Roy</i> 13, p.		Med.,
#7 R McCar		1933	Brit. p. 67	Med.		n., 11 .
№ C R. Hai	ington	1933	Proc		Soc.	Med.,
++ F R Fia	(861	1931	$\frac{2000}{Brd}$ p $\frac{73}{2}$	Med	Journ	9., 1.
50 E. P. Por	ilton and W.		P 10	·		
L Wa	att derson, C R	1934	Lance	<i>t,</i> n., p	535.	
	ngton & D. M					
Lyon	3100100 41, 111	1933	Lance	<i>t</i> . 11 r	. 1081	
	rubull and M			Path		
53 W Hats		1933	Lance		. 1416	
54 E. P. Por			Diet T and		and R reatme	ecipes ent of

مرض گلا کموجن (وان گرک : Von Gierke کا کلا کموجن آفری کراکب : برک که اس من برک کوجن آفری کراکب اس من برک که اس من برگ است که و من برک برگ اس برک که اس برک که اس من برگ که اس من برک که برگ که ب

R. W. B. Ellis & W. W. 1936 Quart. J. Med., N. S. 5. Payne p. 31

صح معاممة

فبجج	غلط	سطر	صفحه
fluid vein	inspiration	10	11
<i>ب</i> ر بر	شنفس	9	' سما
فون بردائث نته	خون زا د	7.	^٢
مسند	مسغا	11	۳ م
رييي	اسين	r	9.5
vie	him	^	1
(staphylococcus-	(streptococcus-	1	"
5	کہہ	10	110
(HYDROTHORAX)	(HYDSOTHORAX)	م	141
پولٹسول	يولسس	14	114
بلعوم	بكعوم	75	199
مور و تی	مورتی	^	774
توسيه	منجسرة	4	773
إستغدركم بوكا	إسقدر إوكا	11	142
دا يا ٺ	بایں	ام ا	1 ,44

عل لب - مبلد ورم	مبحت نامه	······································	r
صبح	غلظ	سطر	صفحه
ا دیر کے مرض کے ساتھ	بابر	9	F 4 7
کے مرض کے ساتھ	کے ساتھ	5	124
رقع ہوکہ	قائم ہوکر	1.	r = 9
(م-1)	۱م-ک)	شكافي سطري	rar
(م - 1) قلب بنگارش	فلب بنگار	4	2
(1-1-)	(م ک)	فبعل اسطرا	ram
(3-4)	(م ک	شكافي اسطرا	۳۹۳
'مرض	المرش	19	17° A
بأمين رشني نسض	دأم	15	767
رنتهمي منض	د با تی نیض	ra	T24
ہو اہے	بو آ	10	۳.۵
ابين	اپنے اپنے	٧.	ا اسم
١١٥١ -	١١١١	rr	۴٠.
پیری میں	پيري مي	1)	٢٣٢
اس وقت	اس قت	ہم	pr9
و كصلا في	کھلائی	10	اسم
بائين	دائي <u>ں</u>	11	440
ثرب	ثُمُرب	۲	746
متخى	سخي	11	MAL
ا نبوبہ کے اس	انبوبراس	14	١٩١
ی جگه	جَلِه	1	44
استخلی	ا شخانی	14	M92
عضوى ضرطت	عفوی ضرت	70	DIT
	J		

۳	صحت ام	ووم	. ب - جلد
صيح	bli	سلمر	منفحه
أثين	وأبي	1	011
(gastro-jejunal & jejunal)	(gastro-duodenal & duodenal)	سم ا	ه ۲۰ م
بيمار ہونے	تے کرنے	rr	444
غذا کی غیر معمولی	غذا غير معمولي	11	ויין די
روسيان	بروسيا ئى	F	4 64
دأنين	يائيس وليبي	11	727
دأيس	بالمين	1.	740
سبيونكه اتولي	حبيو كمه علميه يسسه اقرلي	1	4.7
بے صفرا بولی برقان	بے ترشہ عدم دمویت	^	644
تورا ن	نور ك	14	1 667
<i>راست</i>	است	۲۱	41
اغلب	اييدا ذوا	,	444
مفلام نخاهى قلت	مقارم غخاعى قلت	14	10:
الأدى لمحدر	ارا دی دور	19	, 4 1
r	r·	11	145
	·		

. Von Noorden's diet in diabetes وان تورؤين كي عدا أ ديابطس معن ، ه

مرض ، المرض كا الموض كا الموض كا مرض كا مرض

. Water h ish. حرقان القلب مهاه er ، سمال شتایی ۱۰ ۱۱ mier cough,

ا به الملت و الله کی پهائش محمیر کرده ورد کی پهائش محمیر کرده ورد کی پهائش محمیر کرده ورد کی ده ورد کی پهائش محمیر کرده ورد کی ده ورد کی در کی ده ورد کی ده ورد کی در کی ده ورد کی در کی دو درد کی در کی در کی ده ورد کی در کی در

ره مين ۱ مين ۱ X ray reminer in broachiectasis, الأشماعي أملحال ١ بدور لشماء مين

o andomen, شکم کا eque & same in of stomuch,

«Xanthoma in diabetes » ورد سلمه ؟ دیانسانی معن ؟ ىرقار، مى ۴ ∧۳۳

Anthela mi in innidice د اسلمه اصفر و يرقار مين ۲۰۰ ա լատժեջ, به من ۲۲ مسارت اصفر و با و با و من ۲۲ مسارت اصفر

. ريل بيلسس ٢ طريقه تلوس * ١٣٣٠ ريل بيلسس ٢ طريقه تلوس * ١٣٣٠

The standard face Uh 1. Atheromators. of stomach and du Jenury, ا معد، وراثا عشم ی ۴ ماته SPR ISPRE untation colitie أ تقرح الممات مولون عود rae د الهات د بن له ۲۹۰ -00 كست الما الما الله الما كست وه-. Tramic ustima أيوديا جوني دمه ع عد True, dristase in, الول من لا ليس اسمة norn al constituents of, کے صبحی اس نے برسمینی کا ہات اللہ کا اللہ اللہ کا ا

peptic,

. مصراعي مرض علم مرمي ١٠٥١ المرمي ١٠٥١ مصراعي مرض علم مرمي ١٩٥٩ مرمي ١٩٥٩ 5-0 · 02 - 12 5 الدر، ٢-٩ کا اصافی توانر ، ۲۵۹ م ج ۳ ۳ ا واران داک کا تا معه ۱ ۱ مار داک کا تا معه ۱ ۱۹۲۸ Vasopiessin أصاعط المروق ١٨١٨. Tenous pulse, نص وريدي ٢٠٦٠ أ الماس المالي كاريشكى الماس المالي كاريشكى الماس المالي المالي Viriliam. مسترحلیت ، ۲ . Visible periatalaia مئی حرکت دوسی ، ۱۵۸ موتى حيال تا شل ' ٢٢٩ مرمك ١٩٠ Voice sounds | بولسے کی آوادیں ۱۹ 117 ' سلیدئوی معه کمهمت ۱۱۳ میلیدئو کا امتجاں ' ۹۹۳ Vomiting, eyelical, واری ' ۲۰۰۰

هستمرياتي ٢٦٦

واں ممر رہی کی امارت ' حجوطی گا'ٹر میں '

hysterical,

cagae s of, prognosis of, ittitue frequency of, right sided, Terns, auscultation of, استماع شرائس تم Vincent's angina, دعه ولسنت ۲۱۱ Vocal cords, paralysis of, fremtus, tactile ACSORANCO, . Volvulus of mestine لل مماء أ Vomit, coffee ground, in earcinoma of stomach. evanunation of,

Von Graefe's sign in cooplithalmic goitie,

قبال عدائي تسمم الدم ، ١٩٥٠ سمر عدى سلمه ، درقيه كا ١٨٥٨ حودرو عارصات ، ۲۹ ا قصبه كا اصماط ، ٢٢ کا ڈفتھدیا ، ۲۲ مين احسام عريبه ، ٢٧٠ معى يوناليدين ٢٢٠٠ 87 6 3 Jun 5 کا تصبق ، ۲۳ کی آتشك ۲۲ ۲۲ تمرد ۲۲ قصی کشاکش ۲۰۳۰ التهاب قصبة الريه * ٢٦ بتل الدم ع ٦ ٤ لردش خو رح ، حجوظی گانائد میں ، ۸۳۴ مثلثی نسدد کے حریرات ۲۵۹۰ نا روی کے حریر ت ، ۲۵۹ ماہ صيق ٥ ٧٠٣ ٹر اسو کی امادت ^{، ہے} د میں ، ۸۵۵ تدرن کے عصیات کی تلویں ' ۱۳۲ فلب کا ، ۲۲۱ آنت کا ، ۲۰۶ قصه کا ، ۲۲ أيوار سمول ؟ تشعيص معن ، ١٣٣ کا علاح ' سل رئوی میں ، ۱۳۰۰ تدرن حنجره ۲۳۱ 707. 6 5 طحال کا ، ۹۸، د نوی ۱۱۳ م قصبی کشاکش ۲۹۳ سلمات ، تلب کے ' ۲۲۲ 440 6 £ 0,42 معدہ کے ، عدر حلیث ، ١٦٥ ٹرنی برهارٹ کی حاعث سدی ۽ سل راتوي مين،

تطلل معام

طیلی آوارین ، قرع صدر مین ۸ ۰

Toxamia, almentary, Toxic adenoma of thyroid, idiopathics, Trachea, compression of, diphtheria of. foreign bodies in, new growths in, obstruction of. stricture of, syphilis of, tubercle of. Tracheal tugging, Trachestis. Transfusion, blood, Tremois of limbs in exoplithalmic goitre. Tricuspid obstructive murnuis, regulgitant muchaus, stenosis, Trousscan's sign in tetany, Tubercle bacilli, staining of, of heart. of intestine of trachen, Tuberculin in diagnosis, treatment in phthisis, Tuberculosis, laryngeal, of liver, of apleen, pulmonary, Tugging, tracheal, Tumours, of heart, of larynx, of stomach, ben gn, Turban Berhardt classification in phthisis, Tympanites,

Tympanitic sounds in percussion of chest,

Test, phenythydrazine, for sugar in ut is كيلثير ١١٢ وارڈن ہے کا ۱۸۰۰ یرو حسٹیں ہے ۱۹۸۸ את יכל אף∧ Tetany, حجوظی ناتار میں ، ۳۰ 110 6 320 إ سيمه ييوندي ، سل داوي مين، ١١٢٣ تدري نصاد من ١٨٠٠ ا دھلد کلوی ، شکر کے نشیے ، ۸۰۹ حلق کی گاد گدی ۲۱۳ کے امراض ، ۲۰۵ عدى سرتى الطماس التهاك ، ٢٣٢ ا يرييةورا مين فلت حليات عليَّى ٢ هـ.، مهاجر علی و ردی النها^{ن ۲}۹۳ علقیت ۲۹۳۴ 176 · LL فحدى * ۲۱۹ وداحي ١٩٩٠ حادی حوال کی ۲۹۹ ريوى ١٥٠٠ 8K 9 3 AM ا تيموسي عده ٢ ١٨٤ کا باقی رهما اور کلایی ، ۸۹۰ درقیه کا سرطان ۲۵۴ درق عده ، ۸۹۲ درق سمى الباب عصلة قلب ، ١٦٠ عامیہ کے مہیج الدرقیه هارمونر ، ۸۸۷ تها أرا كسين ٢٥٢٠ حرري يا قبل المعربين موح ، ٢٧٨ تما کو کا دعه ، ۲۲۹ لوره برازی احاد روماً رم مین ۱۳۴۹ النهاب اللورة ، ٢٠٥ حرانی ۱۳۲۲ لورات السابي ۲۱۳ المومى ٢١٣٠ کی مرمن عمونت ۲۰۹،

van den Beigh's, AAA أ خصيه في تهييج ايسترن سے 'Aesticle, stimulated by ascin, stanulated by progestin and seended in exophthalmic goitre. Ditent. وروائي كا اورت المحدري اورطي كا اورت المحدري اورطي كا اورت المحدد المحد The reoplasty in phthisis, in tuberculous effusion. Inreshold or kidney for sugar, Throat cough, diseases of, Thrombo angute onliterans, Thrombocytopenia in purputa, Thrombophic bitis rugians. Thrombosis, coronary, femoral, jugulai, of lateral simis. pulmenary. Thrush, Thymus gland, persistent and enlinged, Teyroid, earcinoma of, gland, Thyro toxic myocarditis, Thyro tropt hormones, of pituitary, Thyroxin, Tidal or prediciotic wave, Tobacco angina, Tonsillectomy in acute rheumatism, Tonsilntis, follicular, Tonsils, lingual, · pharyngeal,

sepsis of, chronic,

سذمهم کا رفن ' ۲۰۲ علامات والاابورسا ' ۲۰۳ علائمیه ' کشک کا ' ۸۹۲ فریفک کا ' ۸۹۲ فریفک کا ' ۸۹۲ کایم المدی ' ۸۹۱ هم دات افریوی نقیح الصدر . . ۲۳ است کی ' ۲۳۲ حمحره کی ' ۲۳۲ شش کی ' ۲۰۲ شش کی ' ۲۰۲ مما نے مستقیم کی ' ۲۰۳ قصم کی ' ۲۰۲ قصم کی ' ۲۰۲

سرعب العلب ٢٩٥٠ ساده ، دوری ، ۲۹۶ حيمه ' آکسرجو ' نعاح شش معن ' ه. اد عائے شش میں ۲۰۰ استرواح الصدر مين ١٩٠٠ کا استمال ' دمه میں ' ۳۲ شمى دات الريه مين ۲۰۳۰ دات الربه مين ۲۵۴ کا شفہ ایدڈ کئ ہول میں شکر کے اثر ۱۱۲ حياتياتي مرض هاحكن مين ٩٠، عمدی ، ول میں شکر کے لئے ، ۱۲ صعه سفراو ۹ کے بشر ۱۲۸ - ۱۲۹ معدہ میں حوں کے لئے ' ۱۳ ہ یرواں کے لئے ' ۲۲۸ اول میں شکر کے لئے ' ۸۱۱ وطبيعي، حكركا ٦٠١ مريد سريو د ۱۳۰۰ میلی کا ' ۹۲۹ گوایا کم ع دریعه ، ۹۰۴

75.650

ليو څولور ، ٦٢٥

امتحابي عدا ، كسرى ، ٥٠٠

کا شعه بیتراس کا ، وطیع ، ۱۸۳

معدہ کے امتحار میں ' ۴۹۹

Sydenham's chorea,
Symptoms, aneurysm, of,
Syncope, local,
Syndrome, Cushing's,
Frehlich's,
pluriglandular,
Syn pneumonic empyema.
Syphilis of heart,
of intestine,
of larynx,
of liver,
of lung,
of rectum,
of trachea,

Tachycardia, paroxysmal, simple, Tent, oxygen, in emply ema of lungs. in odema of lungs in pre-mothorax. use of, in asthma. in broncho pneumonia, in pheumonia, Test, Benedict's, for sugar in urine, biological, in Hodgkin's disease, termentation, for sugar in utine, for bile pigment, for blood in stomach, for jaundice, for sugar in urine, functional, of liver, galactose, Gnielin s, guaiaeum, Hay's, levulose. meal, fractional, in examination of stomach,

of pancreatic function,

معده کا ،تساع احاد ۲۸۰ سحوا هوا ۲ موم کا استحال ، ۲۹۶ لاشعاءوں کے ۱۰ یعه ، وہ کے امل احتلالات ، وہ ہ كا بت سمه في الماص عود سش تشم ، ۲۹۸ رير للشي ۲۹۸ ۲ الیا ، ۲ ۱۰۰۰ كا محاوراليوال قرحه ، وم ه ماد ه اله کے سکویی دس کا اہتجاں ، ووم کے امر حلیث سلمات ، ۲۲ و ere . ang 5 التهاب المر ، ١٨٣ الراتي ، هرس محكرين والم 4VL . Pt استرا ابری مراده ، ۳۲۳ طحال مين سحي شعريه ، ٩٠ نصیق ، ندیی ، مری کا ، ۹۳، معاء کا ، ١٦٠ ممائے مستقیر کا التہاں ، وہ ہ قصمه کا ، ۲۲ مری کا شایحی ، ۹۳٪ صرصره ، ۱۶ بيدائش حمحري ، ۲۳۰ رير ڈائفرامي يهوچا۔ ٥٣٤ - ٥٠٢ استرواح الصدر ، ١٩٩ هره لآراط، استرواح الصدر مين ١٨١٠ نعد سمالي امتصاص ، ١٨ شکر کے سپر دری کاشفات ، اول میں ، ۱۹۱۸ کا محمل ، مآراس کے اندرویی افرار کی

> سلف هامو گلوان دمویت ۲۱، صيع استهال ، ۸۴ ه تتيحى الهاب للمده ، ٥٣١ فوق الكليه كيسے ، ١٠٨ کی رسولیاں ، ۸۸۳

قلت میں ، ۱۸۵

Stomach dilatation of, acute, dropped, examination of, by X rays. functional disorders of. hoe glass contraction of, hypertonic, hypotonic. inflummation of, juxta pylonic ulcer of, leather bottle, resting pure of, examination of, ti mours of, beingn, ulcer of, S'omatitis, catarrhal, gangrenovs, herpetic, Strawberry gall bladder, Streptothrix in spleen, Stricture, e-catricial, of asophagus, of intestine, of rectum, inflammatory, of trachea. spasmodic, of esophagus, Strider, laryngeal, congenital, Subphrenic abscess. pneumothorax, Succussion, Hippocratic, in pneumothorax, Suction, post tussive. Sugar in urine, clinical tests for. tolerance in deficiency of internal score tion of pancreus,

Sulphemoglobinuria, Summer diarrhea, Suppurative gastritis, Suprarenal capsules, tumours of. مم المراز ، محاميه ك ، Supi isellar lesions of pituitary, تشيج مرماد ، ۲۲۲ - ۲۳۲

سط سکاد ، ۲۷۱

جهلك ، ادساع المده مين ، ١٥٥ طحال کا فعال امتلا ، ۱۸۵ کے امراض ، ۸۲ ، کی مرس کلایی ' ۸۹، چرشی ' ۳۱۲ کی شکی در ملمی پش پرورش ۹۰ ساره ۱۲۲۴ 144 4 413 K ا طمال عدم دمونت ' ۴۹ س یے س کی ، ۲۰۰۵ ا تطحل المريه و شعق دات الريه مين ١٠٠٠ ا التهال طحال ، ۸۸ء اللاف الدموى يرقان ٢٠٢٤ كلان طحالي كه ت ١٥٥٠ سمالان طبحالي مع "له د هليلجي عا تر فا ت _ ' مع طحالی علقایت کے ' ۹۰ ا مدوط طحال ، ۲۲۵ ا سکه بما نساق ، سل رئوی میں ، ۱۲۳ Stasia, ileal, ركود ، لعائبي ، ساه معوی ' ٥٦٦ حالت ليي ، ٨٤٨ يموسى ابي ' ٢٠٨٠ - ٨٠٨ اسڈیل ویک کی امارت ' حموظیکا ٹر 🗚 ' ۱ سیق ، اور طی ۲۹۳۱ يدائشي باش پرورشي ، معده کي ، ١٥٠٠ مطراق ۲۲۲ مطر ريوي ، ۲۵۴ اواتی کے نعد کے اتساع کے طلیمی امار -مثدی ۲۲۴ ممدہ میں خوں کے کاشمات ' ۵۰۳ کے حسم کا قرحہ ، ۲۰۱ كا سرطار ، ٥٥٥ میں لامی پری ' ۹۱۰ کے مادیہ کا استحال ' ۹۹۳ كا اتساع ، ٥٠٠

Spasm of glottis, Sphygmograph. ا سعط السص بيسا ، ۲۲۲ Sphygmomanometer, Splashing in dilatation of stomach, Spleen, congestion of, active, discases of. enlargement of, chrona lardaccous eticulo endothelial hypertrophy of, sugo. tubercle of, Splenic ana mia, of infancy, Splenisation of lung in broncho pneumonia, Splenitis, hamolytic jaundice, Splenomegalic cirrhosis, Splenoeigaly with percellipsoid d limitori hages, with splenic thrombosis, Splenoptosis, Sputum, num milar, in phthisis, intestinal, Status lymphaticus, thymo lymph sticus, Stellwag's sign in exophthalmic coitic, Stenosis, aortic, hypertrophic, congenital, of stomach, mitral. pulmonary rylore, physical signs of dilatition follow tiicuspil, Stomach, blood in, tests for, body of, ulcer of, curcinoma of, filling defect in contents of, examination of,

dilatation of,

Rupture of heart, اشتاق قلب ' ۲۳۴

ا صادو طحال ، ۱۲۳

ا سالسدى علاج ، قرمى مين ١٠٠٠

أ اقراط ريق علم و

صحت ساهی علاج ۽ ريوي تدرن مين ' ١٣٨ ا معوی رکک ۲۰۹۰

سیو کو انسی ، و یوی تدری میں ، ۱۸۵

ا مرص شان لین ، وج،

کریا چی ، ۲۳۳

ر پهيدهڙو ۽ مين ٽانوي مطروحات ١٦٣٤

ا سقراس کے اندرون افرار کی قلت ، مم

َ خُوں کی ٹمر ح تشمل ، ۱۷۵ سيلادة كاكاشمه ، ١٥٥٠

Sepais of torsils, chronic, عقومت، او راتان کی ، مردی ، ۲۰۹

CATC ... 22 Septic endocarditis, همويي التهاب درون قلمه ، ۳۹۰

ر نوی میوانیت ، ۱۰۹ در نوی میوانیت ، ۱۰۹

iliver wire arteries in hyperpiesia, إ جابدي كرة رحيسي شرياءين ، ار نفاع الصمعا

مير ، ۲۲۲

ا ساندر کا مرص ، ۸۹۱

حوق ادیی مسدودی ، ۲۸۹

700 . 5

ا حوق بناعد کی ، ۲۸۳

التيات الاحواق ؟ ٢٠٣

ا طریقہ سیمی ، هصمی قرحه کے علاج میں ،

Skin reactions in allergic state, حادي تماملات ، حالت حساسيت مين ، اه

دات الحب من ١٤١٤

۳۹۸ سیامی کا قدے Soldier's heart,

تلب کی آوارین ، ۲۰۰۰ قلب کی آوارین ، ۲۰۰۰

ATT: پهاوژ يے حيسے ماتهه ، محاطی اديما ميں ، ATT

Sago spleen,

Sichabury treatment in obesity

Sali, a, er cess of,

Sanatorium treatment in phthisic,

Sand, intestinal

Sanocrysin in I hthisis,

Schoole n's discase,

Scierosia, hyperplastic, disffuse أحلابت كاليش "كويلي المتشر، و٣٠٠

nodular.

S ybala.

Sc ondary deposits in lungs,

Secretion, internal, of panciers, deficiency

Sedimentation rate of blood,

Sellard's lest,

o.al,

درو د کرد کی این Siderosis, nodular,

امارت مسيط ، عدم Signe de Musset,

Simmond's discuse,

Sin auricular block,

mode,

Sinus irregularity.

Sippy's method in treatment of peptic ulcer.

اک، ڈائی کک ، Skodiac resonance,

in pleurisy,

Snake venom in treatment of homophilia, سا یا کا قشت ، بر نمیت کے علاج میں ، ہا۔

A9", ' معامى باس ' Snuff, pituitary,

تبعس 4 دات الحيث مين ، ١٩٣ حاث الريه مين ۽ ٨٨ استرواح الصدر مين ١٨٨٠ د بوی تدرن میں ۱۹۳۰ میں دلری حسر کار ، ۱۸ میں شش کی طبعی سحنان ۸، کے اعصا کے امراض ، ۱ میں سیمہ کا جس ۲، میں سینه کا تر م ی ، مين لعطات ١٧٨ میں خرخوات ، ۱۲ اتھلا ، حَلَا مِين كس سے لسمم كے نعد ، مین صوصره ۱۹، امن صوتی حصف ، ، طیل،۸ ه یں حویصلی خریر ، ۱۲ شکی حلیبہ ، ۲۳ طحال کی شکی در حلمی باش پرورش ، ۹۰ طحال میں شکی درجانی نظام، ۸۲۷ التبات شكيه ٥ شهريان صلاتي، ٣٣٢ ليص دمويي) ۵۵۰ حلف الملموم خراج ، ٢١٥ دوما ترمی التهاب قلب ، ۱۳۲۴ 774 6 AT تحت الحلدي كرائب ، ٢٢٧ روماترم ، ماد ، ۲۲۰ تعت الحان ۲۲۷ التهاب الارف ، حاد ، ١٩٤ حساساتي ، ۲۰۲ مرمن ، ۲۰۱ عرق حرکی ، حالت حساسید میں ، ۲۹ دوري سيلان الانف ؛ حال حساسيت مين 4 17 : 17 -دولوكي غدا ديا بيطس مين ، ١٨٥٥ کھلایل کی ماسد یسلیاں، لیےشش میں، عرو روتھیراکا کا شمہ کیتوبیت کے لئے ' ۸۱۵ دسمر ، تاء مودی ، ۲۶۳ یلیئورائی ، ۱۹ پلیشورانی تاه موری ، ۱۹

Resputation in pleurisy. in pneumonia, in pneutuothorax, in pulmonary tuberculosis. metallic finkling innormal long assonance in, organs of, diseases of, pulpation of chest in. percussion of chest in, rales in, thought in. shallow, after gas poisoning in war, stridor in, tactile vocal fremitus. tympanitic, vesiculai murmur in. Reticulocytes, Reticulo endothelial hypertrophy of spleen, Reticule erdothelial system in sphen, Retir itis, ai terioscleroti leukæmic. Retropharyngeal abscess, Rheumatic carditis, fever, subcutaneous nodes, Rheumatism, acute, subacute, Rhinitis, acute, allergic, chronic, vasomotor, in allergic state, Chinorihea, paroxysmal, in allergic state, Rhonchi, Rollo's diet in diabetes, "Roof tiling" ribs in fibroid lung, Rothera's test for ketosis, Rub, pericardial,

pleuritic,

pleuro pericaidial,

نعامل ، خوں کا ، 9 ، پروشه ئی ادرق ، کمیت مگر میں ، عم حلدی تماملات حالب حساسیت معی ، ۹۹ مما مے مستقم کا المانی تصیق ، ۹۰۹ سر ح تسكند ، ش كا ، لحتى د ت الريه مين ، كمة واحمه ، لحتى دات الريه مين ، ٨٦ نا، روی ۱ نور طی ، ۱۳۲۸ مطرایی ، ۲۵۹ 200 1 4-4 کاوي دمد ، عو شكم يوليت ، ۸۲۲ محمك ، قدري ، ١٠ اسکودایی ۹ صوتی ، ۱۹ تمفس / علا معمولي أوارين ١٦٠ قدري ۱۱، ممن و قرع مدر مین ۲۰۴ رية كا ، ٦ شمی ، ۱۵ چاں اسٹو کس ، ۴ 1 1 / mma معی بےکته ۱۸، مین فری آوار ، ۱۹ م مى در من محمدك و و حراح شش میں ۱۰۴، M9 (MA 4A2 شعبي التراب مين ، ۳۰ شعبي دات الريه مين، ٩٩ کیلوس صدری میں ، ۱۸۳ ہموط شش میں ، ہ، تاييح صدر مين ٢ ١٩٣٠ ایبی شش مین ۱۰۹، شش کی سمکریں میں ، ۱۱۱ صدر دمویت مین ۱۸۲۴ حمة العشمين ، ۲۸ اساسقا ء الصدر معي ١٨١٤ لحتى دات ال يه معن ١٠٠٨ و مے شمات کے سد میں ، م ا- ما ئے شش میں ، 29

Reaction, of blood, prussian blue, in curliosis of liver, Reactions skin, in allergic state. Rectum, stricture of, inflammatory, Rea hepatisation of lung in lobal pneumoria Redux crepitation in tobar pneumonia, Regurgitation, acitie, mitral, oulmonary, Renal authma, glycosuria, besommee amphoric, skodia , ocal, R spin tion, adventitious sounds, amphoric, resenuece in recussion of chest, Biot's. bronchial Cleyne Stokes, cog wheel, crepitation in friction sound in. hyper resonance in, in abserse of lung, in asthna, on bronchitis, in bronche pneumenia, in chylothorax in collapse of lungs, in empyema, in fibroid lung, in gargrene of lung in hamothorax, in hay fever, in hydrothorax, in lobai pneumonia, in obstituteion of large bronchi,

m ædema of lungs,

کد نایش ، ۳۷۴ سضان ، شعری ، اور طی عدم کمایت میں ، 716 یا رق کی مقدار ، ۲۹۹ Pulse, Buncrotic, نصن ، شموق ، ۳۵۳ معراتبيي ، ۲۷۲ کی میچی ، ۲۲۰ كا سعط ، ٢٦٩ کعاری ، ۲۲۸ کی شوح اور توادن ، ۲۹۸ حرري يا قبل الضرئيس موح ، ٣٥٨ وریدی ، ۲۰۶ ابور سا میں کعیری سفوں کے عدم مساوات ' دمن متبادل ، ۲۱۳ دو صرفی ۲۲۴ متباقص ، ۲۷۰ نقطه دار احاس يسلي ٢٢٢ حدقات کی عدم مساوات ، ۱۹۶۸ يريبۇدا ، ۲۸۵ استداف على 19، خاطف ، ۲۰۱ رثيعي) 24-التمات وريد البات ، ١٦٨-الص) مي ، ١٦٨ دة يحي ، ١٣٩ - ١٦٨ او ابی صیق کے تعد کے الساع کے طبیعی

> دعى استرواح السدر ١٨٢٤ حوفیری ریمی سیلان ، ۲۸۳

> > حرقان القلب ، ١٥٥

دعة لوريه ٢٠٨٤ تنمسى حاصلات نقسم ، ٩٩٠

محماری ہشت ۲۲۸ ۲ المصول کی عدم مساوات ، الورسم میل ، لفطات ، تنفس مین ، ۱۷ رام سٹیٹ کا عملیہ ، ٥٥٥ اساسی تحولی شرح ، ۹۹،

Pulsating liver.

Pulsation, capillary, in aortic incompetence.

or thrust, amount of,

dicrotic.

hardness of,

pressure of.

radiat.

rate and rhythm of,

tidal or predictotic wave,

venous.

Pulses, rudial, inequality of, in ancurysm,

Pulsus alternans, bisferiens, paradovus,

Punctate basophiha,

Pupils inequality of,

Purpura.

anaphylactoid,

fulnamens

rheumatica,

Pylephlebitis,

adhesive,

suppurative,

Pyloric stenosis, physical signs of dilatation following,

Pyo pneumothorax,

Pyorthera alveolaris,

Pyrosis,

Quinay,

Quotients, respiratory,

Radial pulse, pulses, inequality of, in aneurysm,

Rales in respiration, Rammstedt's operation, Rate, basal metabolic, Raynaud's disease,

کٹیر حلوی دمو بت ، ایڈیس کے مرض میں ممرور تشوهات قلب معر، ۲۰۸ كُونَ حليات ١٠٠، ٢٠٥٠ م من شعبی المتهاب کے همراه ۲۹۴ کتر کرد کرد ۲،۷۶ خدث الباب اعشيه مصليه ، ٢٠٩ عدومي المال أعشية مصلية ، ٥٠١ ا باني کوست ، دم ٦ ا بعد سعاتي امتصاص ، ١٨ حل اور م ص قلب ، ۲۸۹ 99 1 Leg پر ائس حوس کا د ہوی خلیہ کی توریع کا م حين ١ ٨٧٧ شدِ ع ۱۳۸۸ - ۱۹۹۸ يروحاسك ، ۸۸۸ - ۱۹۸ ا دو ۱۰ شدق ، ۹۰۸ يرولاد ، ۱۹۹ يرولان عاماده ، ۸۸۸ يرو أيؤد ، حالت حساميت مين ، ١٥ حكاك ، حالت حساسيت مين . وم حارش ، مرص هاحکی میں ، ۹۵٪ یروسیائی ارد ق معامل ، کرست حکم میر ، د نون کادب ، ۲۵م كادب كيلوسي استسقاء شكم ، ٦٣٨ حدوثيت كادره ، نسائي ، ه٨٨ کادب لیو ئیو لور ، بول میں ، ۸۱۸ كأدب المص دموات ١ ٢٩٢

کادب لیو تیولور) نول میں) ۸۸۲ کادب اس دمونٹ) ۲۹۰ کادب عماطی سلمه بازیطویی) ۲۰۰ کادب یوزیا دمویت) ۳۳۹ نمسی اثرات) معده میں هائڈرو کلورك ایسڈ پر ، ان کی تماثیر) ۴۰۰ زبوی سدادیب و علتیت) ۴۰۰ نارزوی کے خریرات) ۲۰۹ نارزوی کے خریرات) ۲۰۹ بارزوی / ۴۰۴ سیق) ۲۰۲۲

تدرن ، ۱۱۳

Polycythemia in Addison's disease,
in malformations of heart,
rubia,
with chienic bronchitis,
Polygraph
Lolyor homenitis,
Polysciositis,
Portal ciribosis,
Post thisave suction,
Pregnancy, heart disease and,
Pregnyl

Price Jones blood cell distribution curve,

Progenia,

Psaudo angina.

Pseudo chylous ascites,

Pseudo herrosphroditism, female,

Progestin,
Prograthism,
Prolin,
Prolandike substance,
Proteose in allergic state,
Prunities in Hodgkin's disease,
Prunities in Bodgkin's disease,

Pseudo leukemia,
Pseudo leukemia,
Pseudo myxoma, peritoneal,
Pseudo mianna,
Psychical influences, effect on lydro chloric and in stomach,

Pulmonary embelism and thrombosis,
obstructive murmurs,
reguigitant murmurs,
reguigitation,

and deficiency of interventricular septum, tuberculosis,

See also Lungs.

et mosie,

لوحیه شادی ، ۱۹۰ دات الحب ، ١٦٣ ڈائمرامی ، ۱۷۳ سی دیوی میں ، ۱۱۹ ى لختى ، ١٧٢ واسطى ، ١٢٣ 1cT comb ا يا دو دائي دگڙ ۽ ١٩ ا پلیورائی تناه موری قرك ۱۹۴ دات الحب من ۱۲۳ دات الحملي دات الريه ، ٨١ علائميه يلومرونس ، ١٩٢ كالد العدى علائمية ١ ٨٩١ سنٹ راویہ ، شش کے کلی ہولہ میں ، ہے قسم اول ، كا تواتر ، ات الريه مين ، ١٠ قسم سوم ، دات الريه من الداد ، ٩٣ باء موری هوائی احتاع آب ، ۲۹۹ ترب المربه ، ١٠٦ دات الربه ، ١٨ حاد رحمه کی ، ۹۸ باراتی ، لختسکی با دخسکی ، ۹۸ مرمن ۲۰۵۰ سحرو یی ۲ ۳۸ وريد المشاركا ، ٩٨ د کو دی ، ۹۹ استشائی ، ۹۹ لحبر (رتبي ريوي) ، ۸۳ خدا ریری ، ۱۳۰ عموني 19 صوفي ١ ١٨٨ Pneumothority | استرواح الصدر ع الم مصبوعي ١٣١٤ ریز ڈائفرامی ، ۱۸۹ - ۱۹۹ بوقلمون باهصات ، ٢٣٠ نو قلموں خلیات ، ۲۳۷ ا تسم ، خراش آور کیسوں سے ۱۴۹ عدائی ، ۸٦٥ تقطیب عا ، نول میں شکر کے کاشفہ میں ' حاد کرهکی کثیر شریایی التهان ۲۲۹

Platelet counting, Pleurisy, diaphragmatic, in phthisis, interlobar piediastinal, pulsating, Pleuntie rub ' Pleuro perieardial friction, in pleurisy, Pleuro pneumonia, Plummer Vinson syndrome Pluriglandular syndromes, Pheumococcus in massive collapse of lungs, type 1, frequency of, in pheumonia. type 111, prognosis in pneumonic, Pneumo hydropericardium, Pneumokomosis. Pneumonia, acute interstitiol, catarchal, lobular or interstitual, chronic, стопроия, Friedlander, hypostatie, inhalation, lobar (pneumococcal), scrofulous, septic, traumatic, artificial, sub phienic, Parkiloblasts. Poikilocytes, Poisoning by miltant gases, Polariscope in test for sugar in urine, Polyarteritis acute nodosa,

```
التهاب ناد طوق عجاد ، هوج
                                           Lendonitis, acute,
                 حاد محدود القام بر عود
                                             acure encumseril ed,
                        الصامي ٥٠٠
                                             adhesive,
                          حاي ١٥٠ ــ
                                             cascous,
                          ور مود ع ام ا
                                             chron.
                       دائدیتی، ہو۔
                                             fibrinous,
                      سے کو دی ۽ ج ۲۰
                                            plastic,
                     تي نون ۲۹۹
                                            pneumococ al,
                         تد د د د د د د د د د د
                                            tuberculous,
                  کرد اوری در ح ۱۸ ۲
                                          Pentensillar abscess,
                  Peritensillitis, المرد لوري النهاب ، ۲۰۸
    يول ٥ كاشه ٠ كيبت حـ يكر مين ، ١٠٩-
                                          Pail's test in circhosis of liver,
                 متلف عدم دمویت ، ۲۹.
                                         1 егисто в яна път.
                مین اسحاقی عیدا ، ۵۰۵
                                           test meal in
                    المعومي أورات ، ٢١٣
                                          Pharm geal tonsils,
               م من النباد اللعوم ، ٢١٣
                                          Pharyn, itis, chronic,
فیمائن ہائٹا ریزیں کا کاشعہ ، بول میں شہر کے
                                          Phenythydrazine test for sugar in urine,
                   نسم ، ۱۱۲
                     التهاب الوريد ، ١٣٣
                                          Phlebitic,
               فلعموني التهاب المده ، ٢٩٥
                                          Phlegmonous gastritis,
  . Phrence evulsion in phthisis ، قلع عصب ڈایا فرامی ریوی تدرن میں ،
                        سل ديوي ، ۱۱۳
                                          Phthisis,
                           ، ليق ١٣١٠
                                            fibroid.
                        سرياح ، ١١٦
                                            florida
                   بادچه ، ۱۱۳ - ۱۳۱
                                            hilum,
                   دات الروى ، ۱۳۰
                                            pneamonic,
                       117:36
                                              acute,
                      یك کا مرص ، ۱۳۰
                                          Pick's disease,
                     Pineal gland, عده صبو تریه ، ۳۹۸
                          یٹوساں ، ۸۸۸
                                         Pitocin,
                          یترسی ۱ ۸۸۸
                                         Pitressin,
        بعامیه کے مقدم لحته کی قلت ، ۸۵۱
                                         Pituitary, auterior lebe, deficiency of,
        کا اساس بسند عدی سلعه ، ۸۹۳
                                            basophil adenoma of,
م حلامه كااستم له ، دبايطس مليح مين ·
                                            extract, administration of, in diabetes in
                                                 sipidus,
                       عده معامیه ۱۸۳۰
                                            gland,
        کے دروں افراری ملقات ، ۱۸۸
                                              endocure relationships of,
                    تعامی هادمون ، ۸۸۸
                                            hormones.
                          باس ، ۸۹۲
                                            snuff,
```

أ النباب ناراس ، تقيحي ١ ٨٨٨ - ٩٨٩

ساهه حليميه ، حجره کا ، ۹۲۹ ا تناموركا نزل ، ه ٢٩ Paralysis of abductors of larynx, شال عصوره کے عصلات منعدہ کا ' ۲۲۹ حجرہ کے عسلات مقرنه کا ، ۲۲۲ عصلات حجره کا ، ۲۲۸ صوتی احمال کا ، ۲۲۹ أ شنيل رفن ٢٥٥٠ يبراتهارمون عمير اً نرد درق عدد ۲۰۰۰ ساده دوري سرعب القلب ، ۲۹۳ حرومقدم يا جروعدي ، عده تعاميه كا ، ٨٨٦ موخر با جزوعصي اعده بعاميه كا، Pectorilogue, صدر کلامی ع مرص ييل اياستان ١٩٥٠ کلاحت د ثدتی ، ۲۹۵ ا پین ٹوس پیشاں میں، ۸۱۵ هصمي قرحه ٢ ١٩٠٥ استسقاء شكدي مبر ، ٢٣٣ سيمه مين صوت طرف شكسه ، ٩٠ کابیان ، ، قاب کا ، ۲۲۹ MINION النهاف تاء مور ، ١٠٠٠ مرس تصيقي ، ١٠٨ تاء مود مسمم رئيق مبداء كا ١ ٢٩٣. کے امراض ، ۹۱۹ محرد ممدی خوا م ۲۰۵۰ كردكدى التباب ، ١٦٤ محرد وريدي النهاب ، ٢٦٣م Perisplenitis, کرد طحالی الساب ، ۸۸ Peristalsis, visible, حرکت دودی ، مرقی ، ۱۹۹۹

نادیطوں کا سرطان ، ۱۰،

ن کے امراض ، 790 ف

new growths of,

🙀 من تو ناليدين ١٠٠٤

Pancieatitis, suppurative, Papilloma of larynx, Paracentesis of pericardium. of adductors of larynx, of laryngeal muscles. of vocal cords, Paralytic chores, Parathormone, Parathyroid glands, Paraoxysmal tachycardia, simple, Pars anterior or glandulosa of pituitary gland posterior or nervosa of pituitary glan :. Pel Ebstein's discuse, Peliosis Theumatica, Pectose in urine Peptic ulce, Percussion, and ultatory, قرع ، اسماعي ، ۴۰ in ascitos, of chest, racked pot sound in, description of, of heart, Pericardial resection in Pick's disease, تاء موري حروي استيصال ، يك كے مرص Pencarditis. constrictive, chronic, Pencardium, adherent, of theumatic origin, diseases of, Peri gastric abscess, Pershepatitis, Periphlebitis, الاربطوق الصبالات ، و٠٥ Peritoneal effusions, Petitoneum, carcinoma of, diseases of,

ادعائي التهاب حبيره ، ٢٩٨ تمدد مری ، ۱۹۳۳ مری کا سرطایی سلمه ، ۲،۱۹ كالدبي تصيق ، ٢٩٣ مع عطير ، ١٥٥ كاخودرو اتساع ، ١٩٣ کا تسدد ، ۲۸۹ کا شدور بصیق ، ۱۹۳ ایستر در ۱ ۸۸۸ ـ ۱۹۸ جشم التي مناطر ، ارتدا والمعطمعي ، ومه Oral sepsis, همونت دهي ۲۸۳۰ آسلر کے قاط ووح represented, thousa generalised, ۱ شر ردردقیت مین ، ۱ ۸ ۸ ملطف ، عموانت دهی میں یا ۱۸۸۳ ا استحوان شکن حلوی سلمه ، ۱۵۸ الهاب الأدن الوسطني ، عنت الحاد ، ٢٣٢ وعيى اد ، ۲۹۴ نسم مين ۽ ١٥٠ آ کسیجدی حیمه ۴ دمه معی ، ۳۳ شمنی دات از به معن ، ۹۰۴ ششوں کے عاجمعی ، ہے۔ ادعامے شش میں ۱۰۰ دات الربه مين ١ ١٥ استرواح الصدر مين ١٩٠٠ Oxytoein. • مسرع الولادت ، AAA TOT (LINE

Pain, cardiae, قلت کا درد ، ۲۲۱ قلب کا ، ۲۳۸ اقراس کے بدوروی افرار کی طت ، مم کے امواص 4 ۱۸۲ کا امتحار ، ۲/۲ کے وطیعی کاشمات ، ۱۸۳ کے اومانے اور ۱۰ اورے ۲۹۳ التهاف ستراس الحاد ع عمر مرحق ، ۲۹۰ ير في ، حاد ، ١٨٨

(Fdematous laryngitis, Esphagectasia. Eschlagus, carcinoma of, cleatificial stricture of, diverticula of idiogathic dilutation of, obstruction of. spasmodic stricture of Œstur, Oplith almoscopic appearances to hyperpiesia, Osla 's spots, ii hyperparathyroidism, raicfying, in oinl sepsis, Osteocliston a Otitis media, sub acute, suppurative, icute, Osygen chamber, in powoning by irritant ا كوشك آكسيس ، حراش آور گسون عد . Oxygen in chionic cardiac disease آکسیجن ۴ درمن قلی مرض مین ۴ هم۳ tent in asthma, in bioncho pi cumonia in emphysema of lungs, in a 'ema of lungs, in pheumonia, ir pneumothoras,

> Palpation of cliest, description of of heart, Pancieus, deficiency of internal secretion of, discases of, examination of. functional tests of, neoplasms and cysts of, Pancieatitis, acute, chionic. hemorihagic, acute,

Ozoena.

النبان عضلة قلب ٢٣، ٢٣ حاد ٢٠٠٠ - النسكى ٢٢١، ٢٢١ - درتى سبى ٢٠٠٠ عصلة قلب كر امراض ٢٣٠٠ عاملى اديما ٢٥٠٠

ریر بامی قصیر قامتی ۱۹۹۰ ابع فناطبر کا استمال دات الریه میں ۱۹۹۰ سوء همم میں متلی ۱۹۰۰ تمحر ترویدی ۱۹۳۰ وقف المدمی تقلب کا ۱۸۳۰ جگر کا ۱ حاد ۱۳۳۰ دروں سدری بومایه حاث ۱۹۳۱ سقوط کلیه ۱۳۳۰ قلت حسیات تعدیل پسد ۱۳۳۰ اور الیده کا خطر ناك حاددایی برقان ۱۳۳۰ انیمیں اور یك کا مرص ۱۹۶۰ طاقچه کا لاشماعی منظر معدی قرحه میں ۱۳۳۰

حوق ادینی ٔ ۲۴۵ کرائٹ ، تحت العلدی ، روما ترمی ، ۲۴۵ گرهکل بیش تسکوین ، حکر کی ، ۱۲۳ صلات ، ۲۳۳

حدیدیت ' ۲۸۹ دیابیطس شکری میں اساسی تحول کے لیے

قانوں نگارش ، ۸۰۲ ناهصات طبعی ، ۲۲۵ باك كے امراص [،] ۱۹۷

سکه ما نساق ، ریوی تدرن مین ، ۱۲۳

قربهی ^۱ ۹۰۱ تسدد ^۲ معوی ^۱ ۹۰۹

امارت عضلهٔ ساده ۱ القباب رائده مین ۱۹۸۰ تهیج ۱ و هائی عصابی ۲۵۱۰ صمبی ۱ دیاییطس مین ۱۳۰۰ مرص قلب مین ۱۳۳۰ شش کا ۲۰ Myocarditis,
acute,
syphilitic,
thyro-toxic,
Myocardium, diseases of,
Myxedema,

Nanism, hypophyseal,
ابع فناطعر کا استما
Nasal catheter, use of, in pneumonia,
Nausea in dyspepsia,
Necrosis, coagulative,
ischamic, of heart,
of liver, acute
Neoplasms, intra-thoracic,
Nephroptosis,

Neutropenia,

Newly born grave familial jaundics of,

Nicumann Puck's disease, Nitch, X my appearance of, in gastric ulcer,

Node, auriculo ventricular, sino auricular,

Nodes, subcutaneous, rheumatic,

Nodular hyperplasin of liver,

sclerosis,

Nomogram for basal metabolism in diabetes mellitus,

Normoblasts,

Nose, diseases of,

Nummular sputum in phthisis,

Obesity,

Obstruction, intestinal,
See also Stenosis
Obtuiator sign in appendicitis,
Œdema, angero neurotic,
cachetic, in diabetes,
in heart disease,
of lungs,
suffocative,

real July من هيمو کلو بن دمويت ۲۹۶، امالحلیه ' ۲۳ Metrocyte, ا خرد دا همیات ، ۲۲۰ خر:خلیے ، ۲۲۷ نرد ۲ کلات . ۲۰۰۰ فرد ۲ کلات . ۲۰۰۰ Microsomia أقصر حسمي 🕶 🐧 شعیقه ، حالت حساسیت میں ، وم النهاب تاء مور مين لنبي اقطير ، ١١٨٠ ماوام کا مرص ۲۷۳ مطرابي مرض ٢٦٨ مهى قيمه عا اوركام با دهير ١ ٩٠٩

تسدد کے خربات ، ۲۵۹ لار روی کے شر رات ، ۲۰۹

نارروی ، ۲۷۹

T 67 (= 0

حجوظی کا گُھر میں مودائس کی امارت ، ۸۹۴

يك نواتي حليير، ٢٠٠،

ا یك نواتی سیید حلیم ، ۲۴

کثر لعتکی کوت حکی ۱۸۲۸

حويصل څر ر ؟ سفس مين ۽ ١٣

ځريرات کې يوعبت ، ۲۶۰

قلب کے مصراعی دھیوں ہر مرص کے ناعث ١ ٢٥٣

نرون قلمی ، ۲۱۲

دموی ۲ ۲۱۹

حہ ممبرا عی د ہوں کے حقیق مرض پر منحصر بهای ، ۲۲۱

کی اهمیت ، ۲۶۰

مصلی تحویك بدیری حجوظی كا نثر مین ، ۸۹۳

رائی کی گیس سے تسمم ، ۱۲۹

فطريت طحال مين ٢٠٠٠

الى باهصات ، ٢٥،

لی خلیے ، ۲۰،

لمی خلوی دمویت ۲۵۲۰

لمی حلوی ایس حمویت ، ۴۵۲

عضلة قاب كا اعطاط ، ٣٢٨

عاطي ادعا من ٢ ٨٦٤ ے علامات ' ۲۲۲

Metcorism,

Methæmoglovinæmia,

Microblasts.

Microcytes,

Migraine in allerg c state,

Milk spots in pericurditis,

" Milory 's disease

M.trul disease.

funnel shape I and button bole orifices ın.

obstructive murmurs.

regurzitant murmurs.

regurgitation,

stenosis,

Mobius' sign in exophthalmie goitre.

Monocytes.

Mononuclear leucocytes.

Mucous colic, محاطئ قولمج ، ۹۹ه

Multilobar curhosis of liver,

Muimui, vesicular in respiration,

Murmurs, character of.

due to disease at valvular orifices of heart

exocardial,

hæmic

not dependent upon actual disease of val vular orthices,

significance of.

Muscular exertability in exophrhalmic goitre,

Mustard gas, poisoning by,

Mycosis in spleen,

Myeloblasts,

Myclocytes,

Myelocythamia,

Myelocytic leukæmia,

Myocardial degeneration,

in myyardema.

symptoms of,

ا شش ب بسلسلة سابق کا تطحل ، شعبی دات افریه میں ، ۱۹۰ کی آتشك ، ۱۳۸ ابي عده آسا گائلر ، ١٥٥٨ الم عدى سامه ، خليث ، ٩٣٠ اليم اليمن دمويت ١٥٤٤ نظام کے امراض کا ۹۲ لى خليے ، ۲۳ الى خليے ، ۲۳ الى لمه حليه دمويت ، ١٥٠ لم دراتي سلميت ۲۹۳، الم آسا سيد خليسي ٢٣٠ الم آسا سيد خليسي ٢٣٠ بيور لحمي سلمه ، آنت كا ، ٢٠٠٠

يقطة مكبري " ١٩٥ کلان حلوی عدم دمویت ۴ سه کلاں آکلات ، ۲۲۵ کلاں حسمی ، ۸۸۷ ىشوھات قلب ، يىدايشى ، ١٠٠٠ حديث بيش دشي ، اداماع الصمط مهر ، ١٩٨٨ سلمات حمحرہ کے ، ۲۲۵ ۱۳۳ ' ماشو کا کا شعه ' ۱۳۳ السال حلم 4 ٢٣٣٠ واسطى دات الحسب ، ١-٢ التمات واسط ، ١٩٢ ليع ، ٢١٦

کہ یو حلیے ۲۲ .Megalocytic amemias کسر خلوی هدم دمویتین ۳ ۳۰۰ رازدم الأسود، ٢٥٥ عشائي النياب حمحره ' ٢١٩ ما ساریتم سدادیت اور علقیت معوی تسدد کے مشابه ۱۹۳۴

اللاشي قولون ، ٦٢١

بحول ، اساسی ، ۹۹۰ کے امراض ، ۹۹۶ طمعی کے معیاد ، ۸۰۰ فلری جهنکار ، تنمس میں ۱۸ ، لعد لبي ځليه ، ۲۵۵ ما بعد دات الرئوي تقيح الصدر ؟ ١٦٤ سروحات پهنيهڙون مين ۱۹۲۰

Lung of Lungs (Cont.) splenisation of, in broncho-pneumonia, syphilis of, Lymphadenoid goitre, Lymphaderoma maligna, Lymphatic leukamin, system, d seases of, Lymphocytherma, Lymphogranulonatosis, Lymphosaicoma of intestine,

Macrocytic anamia, Macrophages, Macrosmia, Malformations of heart, congenital, Malignant hypercusion in hyperpiesia, tumours of laryns, Mastorditis, Mediastinal plenisy,

Mediastinitia, fibrosa, Megacolou, Megaloblasts, کریز ناهضات ، ۲۳۵ Megalocytes, Membianous laryngitis.

McBurney's point,

Mesenteric embolism and thrombosis simulating intestinal obstruction, Metabolism, basal,

discass of, normal, standards of, Metallic tinkling in respiration, Metamyelocyte, Meta pneumonic empyema, Metastases in lungs. See also Neoplasms,

شكيتي ، ٨٩٦ ليا للال . عددالشعب كي تشحيص مين ، ٣١ سرطان شش بی نشجیمی میں ۱۹۱ معرفی سجمی سوء تعدیه ، ۹۰۴ حمر کا حواج ۱۳۹ کا حد اسع دنول ، ۱۳۳ کا سرطان ، ۲۲۴ کی کیست ۲۲۲ طحاني عدم دمويت مين ، ٥٠. کا دو دری موض ، ٦٦٦ کی مصان رسدگی کے باعث پرقان، ٦٣١ كي قلت ، حالت حساسيت معن ، ٥٠ کے امواص ۱۳۹ کا امتحان ، ۹۳۲ شحیم ، 109 کے وطیعه کے کاشفات ، ۹۲۳ ، ۲۵۱ کل میسی ، ۸۸۲ میں چرنشی "مار) 771 کا حادثنج ، ۲۸۲ کی دو بالیدین ، ۲۰۸ الص ، ۲۰۲۲ یك کے مرس میں مصری کی ڈلی حاسا ، کی آتشك ، ۲۰۲ کا تدری ، ۲۰۱ لحق دات الربه (سق ديوي) ، ۸۱ 100 (-1, 5 کا سرطایی سلمه ، ۱۵۶ كا هموط، ٥٥ کای ، ۲، کا نماح ، ۱۸ 100 6 1 تددالشد کے ساتمہ ، ۲۳ کی محمرین ، ۱۱۰

شال عا ، ۱۳

29 (K 31 5

کی طبعی محمل ، قرع میں ، ۸

میں ثانوی مطروحات ، ۱۹۲

honey comb,

tesonance, normal, in percussion.

secondary deposits in, See also Metastases

ædema of.

Ale " تشجم الدم ، ديابيطس مين " Appennia in diabotes, retinalis, Laprodol in diagnosis of brouchiectasis. of carcinena of lung, Lipodystrophia progressiva Liver, absects of, acute yellow strophy of, cal momi of, era hosis of, m splenic anamia, eistic disease of. damage to, jaundace due to, deficiency in allergic state, diseases of examination of, fatty, function of, lests of, hobn : led, lardaceous change in, necrosis, acute, new growths of, pulsating, sugar loaf in Pick's disease, syphilis of, tuberculosis of, Lobar preumonia (preumococeal), Trung and Lungs, abacess of, caremoma of, collapse of, massive. emphysema of, fibroid, with b onchiectasis, gangiene of,

. Kronig's isthmus in phthisis خاکمائے کوانے کو رہوی بدری میں ، ہوہ ا

Kiysolgan See Gold

ر اشاہ زیر گلسوں سے نسمہ ، ۱۳۹ ا لیکٹور نول میں ، ۸۸۳

. La vulose in urine فيوولور يول معن ع AVC کے دریعہ کا شمہ ، ۱۲۵

ر توی سرن مین ۱۳۰

معرسره، پيدائشي ، ۲۴۷ تدرن ، ۲۲۱

ا صرصری اشتح حیجره ، ۲۲۲

Laryngitis. التهاف حنجره 1 14

ار ای ، داد ، ۲۱۹

مر من ۲۳۰

ا عسانی ، ۲۱۹

ادعائی ، ۲۱۸

TTA (حنجره كي عدم حسم ' Larynx, an eatheart of,

ع آنشك ' ۲۲۳

کے سلماب ، ۲۲۵

متاره عا معده ، ٥٥٥

اليدرركي اثلاف الدموى عدم دموات ، ٩٩

لیگال کا کا شعه ، کلتو بیت کے لیے ، ۱۱

سبید حلیات کی مداد ، خون میں ، ۱۹ ،

کے اقسام ، ۲۳ء

سفید حلیه دمویت ، ۵۱،

ایص دمویت ، ۵۱،

عيرايص دمويتي 201

اچي ، ۵۵ م

حاد اور مرمن ، ۱۹۸

لمع خلوی ، لف آسا یا عبر درایی ، ده۔

لني باهمي ۽ ٥٣٠

لمي حلوي ۽ ٥٣٪

مرمی ۽ ۲۵۴

مرمکی ، ۵۲،

اسایی لورات ، ۲۱۳

Lacrymatory gases, poisoning by,

Lictore in urinc.

test.

المراه المراه المراه المراهي مرض ع مرض ع مرض

in phthisis,

المتعرى عصلات كا شلل . ١٠٠٨ متحرى عصلات كا شلل . ٢٢٨

strilor, congenital,

tuberculosis,

Laryngismus stridulus,

catanghal, acute

chronic.

membranous,

a dematous,

toteren bodies in, میں احسام عربہ toteren

syphilis of

tumours of

Lateral sinus, the ombosis of,

Leather bottle stomach,

Lederer's hamolytic abamia,

Legal's test for ketosis,

Leucocytes in blood, number of,

veneties of,

Leucocythæmia,

Leucocytosis See Blood changes

Leukamia,

aleuka mic,

lymphatic,

acute and chornic,

lymphocytic lymphoid or nongranular,

myeloblastic,

mylocytic,

chronic,

nodular,

Lingual tonsile,

برقان ۲۲۱

ے مراولی کا ایک کاسای ، ۲۸۸ حايدان عجم 700 6 30% دهد ق ۲۲۴ اولی کدی مصال رسیدگی کے ناعث ۲۲۱ ونائی ، ۲۲۹ مورائده کا عامدانی ، ست دم یاشده ، ۱۲۲ کلاں طحالی ، ۲۰۰ سيدي ، سا ي ، معاولي ٠ ١٣٠٠ دسددی ، ۳۳۳ 7rm " ,45 کی مراسات ، ۹۳۰ آ ی اشر ۱ شمات ۱۳۸۰ ما ہی قروح ، ۲۹۹ وداحي علقت ، ٢٩٩ عاورالوال قرحه ٥٣١

قرابیت الموم ، ۲۰۷ کنٹونیٹ کے لئے سر بری کا شمات ، ۱۱۰ کئے تعریف ، ۸۱۱ دراریطس میں ۱۹۲۰ شردے کی کارتی ، دیاریطس ملنج میں ، ۸۹۲

> کیك همزنده ، ۱۹۱ کا چرنشی مرض ^{۲۹۰}

Intest no, syphilis of tubercie of, volvalus of,
Intentholia de neoplasms,
Latiman factor of Castle,
Licubation, duodenal,
Licitant gises, poisoning by,
Lichard gises, poisoning by,
Lichard gises or heart,
Lichard in prindice

taundace acholacie, acquired. fau dy. catarrh d. dissociated. due to primary liver damage, epidemic. familied newly born, himolytic, . splenomegahe. hepatic, infective, common, obstructave, Litent. pathology of. tests for Jennal al ara Jugular thrombours, luxta pylone i leer,

ketons clinical tests for,
definition of,
in diabetes,
kidnes enlargement of, in diabetes insipidus,
flea bitten,
hidacous disease of,

Keratosis phuyngis,

يرقان نوزائيده ٢ ٣٣٠ اً سبى خودرو عارصات ، ٥٠ المائين د کود ' ۳۲۰ الهائي اعوري المادالامماء عدا لمائي قولويي العاد الامعام ع ٦١٠ معدی اور اثبا عشری ایلاؤس ۲۸۴ ماعتي بقل الدم كالماء

شعر خواری کی طحالی عدم دمو سه ۱۳۵۰ ا صبياتي معوى الهاب ١ ٥٨٣ ه کیولی قسم ، ۸۸۵ کے اقسام ۱۹۰۹ سرح ۲۹۵۴ سييد ١ ٢٦٦م

سرایت دیانطس مین ۸۳۸ ساری التهاب درون قلمه ، ۲۹۰ ا درویرش ، شحمی ، حکر میں ، ۱۹۹ رعی ، لحق دات الریه میں ، ۸۵ استنشائي دات الريه ، ٩٩ مائيه قلب ، ۲۴۲ دیابیطس میں ، ۸۳۹

کے دریعہ دیابیطس کے علاج کے اپنے مريص كا التجاب ، ٨٣٣

اس کاوی نظام ، ۸۲۸

ا تسدد ۲۰۹۴ حاد کے علامات ، ٦١٢ مرمن کے علامات ۽ ٦١٣ ریک ، ۹۳ ه د کود ، ۱۲۹ آنت سے ہوں ' وہ ہ

کی ہو بالیدیں ، ۲۰۳ کا تصیق ، ٦١٠

Icterus neonatorum. Idiopathies toxic, Ileal stasis. Heo caral intussusception. Heo colic intussusception. Heus, gastric and duoderal, laumuno transfusion, Incompetence See Reguigitation Infancy, splenic anamia of, Infantile enterities. Hercules type, مره ا Intantilism, celiae, types of, Tufaret, of heart, of heart, reď. white. AA ' سدادی معمات ' طحال میں ' Infracts, embolic, in spleen, Infection in dishetes Infective endocerditis Infiltration, fatty, in liver. purulent, in lobar pneumonia Inhalation pheumonia, Inspection of heart, ۱ انسواس کا استعمال ، ۱۸۰۳ نسواس کا استعمال ، ۸۰۳ in dianetes, treatment of diubetes, choice of ease for

Intermittent clarification عرحان متوقف ، ۲۳۵ Internal secretion, diseases of, Interrenal system, معوى بارك ، مموى بارك ، مهوى بارك ، مهوى obstruction. acute, symptoms of chronic, symptoms of, รถาสั झाववांप, Intestine, hamorthage from, new growths of,

stricture of,

```
استرواح الصدر مين هره يتراط ٢٨٨٠
                                       Hippociatic succussion in pneumothorix,
           ا هرش سيدوسك كا مرض ، ٦٣١
                                       Hascraprung a disease,
                   الم شعرانيت ، Tirrsutism, adult,
                  کل میجی ځکر ۱ ۸۰٪
                                       Hobnailed liver,
                    ا المرضر ها حکل ۲۳ ا Ilodekin's disease
                      شان عاشد ، بربر
                                       Honey comb lung,
                                       Hormone, follienlin,
                   حرابي ۱۹۲۹مون ۲۸۹۸
                   انحام هاريون ١٨٨٠
                                       Hormones, pituitary,
                                       Hour class contraction of stomach,
         معدد کا ، یت کهدی انتماس ، عوه
                   رحامی حلیہے ۲۹۹
                                       Lystine cells,
                                       Hydatic exsts of heart,
          کیسدی دو رہے قلب کے ' ۲۳۰
                                       Hydrarthrosis acnoxysmal, in Alergic state,
مودى المأسل مع مفصل حالت حساسين مين،
                                        hydropercudian,
              آن مو ی احماع آب ۴ ۸۴۳
                آق اسمرواح الصدر ١٨٣٠
                                        Hydro pneumotherax,
                    اسسقاءالصدر ، ١٨١
                                        Hymothorax,
                   ملائي الله بعاليت ، ١٨٠
                                        Hyper adrenalism,
                      بيش كاست ١ ١٨٨
                                        Hyper calcamia,
                     هش تمامليت ٢٠٠٠
                                        Hypergenitalism,
          حود عود ناش السوايدي ٢٥١،
                                        Hyperinusanism, spontaneous,
                   ۵۰ رد دروت ۱۰ ۸-۱
                                         Hyperparatbyroidism,
                     ارتفاح السمط ، ٢٦٩
                                         Hyperpiesia,
                      لاش معامیت ۲ ۸۸۸
                                         Hyperpituitarism,
        ا کر همکی اللش تسکویں ، حکمر کی ، ۲۳۵
                                         Hyperplesia, nodular, of liver,
               قرع سيمه مين الش كمك ، و
                                         Hyper resonance in percussion of chest
    ارتماع الصمط مين خديث بيش تبشي ٢ ١٩٨٨
                                         Hypertersion, malignant, in hyperpiesin
         باش رورشی صفر وی کمیت ، a Ilypertrophic biliary curhosis,
                Thypertrophy of heart, قلب کی بیس پرودش
                      المايت ماسليت • ٩٠٠٠ قليل ساسليت • ٩٠٠٠
                  ۸۵۰ ، ظین شکر دمو بت ۱ مای Hy oglyemmia,
               Me ' أقليل شكر دمويتي توما ' • ١٨٠٠ أقليل شكر دمويتي توما
       ر در نامی شجمی تماسلی سوء تعدیه ۲۹۱
                                          Typophyseal cystrophia adiposo genitalis,
                       قصد داءي ١٩١٠
                                            nanism,
                  فليل تعاميت " ١٨٨ - ١٩٨١
                                         Hypopitaitarism,
                     ۱۹۹۰ د کودی دات الر به ۱۹۹۰ از کودی دات الر به
                      . Hysterical vomiting ا هستامر بانی دے ' ۲۹۰
                               Teterus, ارتان ۱۲۲
                            مهترق ' ۲۲٦
                                              dissociated.
                             777 ' e==
                                            latent,
```

قلب کا اعطاط لوق ، ۲۲۸ Heart, pigmentary degeneration of, کے بدش ار وقت میریات ، ۲۸۹ premature beats of. کی شعاعیاں تشریح ' ۲۱۲ radiological anatomy of, مین راست حاسی اور حب جا سی علمه ا right-sided and left sided preponderance of, TT1 - TT . کا علی مصراعی مرص ۲۲۴ right iided valvular disease of, کا اشقاق ' ۳۳۳ rul tule of. حوی ادیم مسدودی ۲۸۹ ۴ sino auticular block, کی سوی ہے وارد گی ، ۲۸۳ ands irregularity of, سياهي کا ، ۳۹۸ soldior 's آوارين ٢٥٠٠ sounds, rri edat 3 syphilis of, کا تدرن ۴۲۱۰ tubcicle of, کے سلمات ، ۲۲۲ tumours of کا مرمن مصراحی مرس ۴ ۳۵۹ vilvular disease of, chronic, کی تشجیس ' ۳ ۰ diagnosis of, کی بحریر ۴۸۰ ت prevention of 7:9 ' JILIE prognosis of ک اصلی آو اتر ۲۹۹ relative frequency of, کا بطیعی ریشکی اسماس ۲۱۹ ventucidar fibrillation of, کی دو عمری کی نے قاعد گی ، ۲۸۳ youthful irregularity of, Sec. ilso Cardiac رق نصبي ٢٥٥٠ Hemichorea, روي نصبي قالح ' ٢٥٥ Hemplegia, choreic, هساك كا يريبلودا ١٠٠٠ Henoch s purpura, معائی تسدد کے مقانه ' ۱۹۳ حدي وان و حالت حساسيت مين ووه

تسدری ۲۳۲۰ رمادی ک د ؟ شش کا ۱ لحق دات اتر به مین ۴

رقار ' معمولی ساری ' ۳۴۰

الهاب حکر ، حاد ، ۱۸۰۰ Hepatitis, acute,

وان گرك كا گرلائسكو حق آقرين كلا السكاند ا

Hepatoptesis, سته ط کند ، ۳۳ على التهاب العم " ٢٨٣ هیکسیورانك ایسد ، ۸۵۸ سل ماديم ، ١١٣ - ١٣١

simulating intestinal obstruction, Hepatic deficiency in allergic state jaundice, infective, common, obstructive, see also mider Liver Hepatisation, grey, of lung, in lobar pneumo

Hepeto megalia glycogenica of Von Gierke, "Tlerma, diaphragmatic أ دُانُهر امي فتق " ١٨٩ Herpetic stomatitis, Hexuronic acid, Hilum phthisis,

سة القشر ٢٨٠ ع کا کاشفه ۱ ۲۰۰ قاب الم المل كي على طامعي حالمين الم ١٩٠٩ معی دری داب د کاری ۴ ۲۸۰ الم المارك علاعد ١٨٦ ٢٨٢ rir. J Lib کا انورس ، ۳۳۵ الا و طی اس ۱۳۹۱ تے دیں کار شکی بناس ' م ۲ T. 1 4 4 K کی مید و دی ۲۸۱ مید کا ہور دنول ۲۲۸۴ 778 6 Nas & Jan - 1 8 8 ے میں مرص کا عا ← ۲۸۱ كو نعونس ۲۱۱، ا پیدا سی نشوهان ۲۰۲۰ TTZ 4 41 3615 كا اتساع ، ٢٩٠ کا مرص اور " ل ۴ ،۸۹۴ کے عصلہ کے امراض ۲۲۰ كأ عبر مسطم فعا ٢٩٨١ 711 ' - 4- 4- E XE کا امدحال ۲۴۲ الاشماعو ، كي مدد يم ١ و٢٦٥ کے مستورہ ال کماشات ، ۲۸۹ کی "مو س کا فشل ۴ ۳۲۳ کا شحبی احمااط ۲۲۸ كا ليهي اعطاط ، ٢٣٠ كا كنه الوقوع همل ' ٣٩٥ کی و الدگیان ۲۳۹ کے کیستی دور یے ' ۳۳۷ کی ایش پرودش ۱۳۱۷ مدحرف الركو ، ۲۱۸ كا وليارالو ووع فعل ٢١٥٠ كا وقصالدمي للجر ٢٦٠ غلب النهاب درون قله ۲۹۰۴ مطرابی مرض ۲۹۸۴ ناروری ، ۲۷۱ 747 4 min

کے طعیلیات ، ۲۳۶

parasites of.

Hay rever, Hay' test, Heart, abrormalities of action or. electro cardiography in Alies Stokes syndione, alternation of, aneuram of, and codisease of. a arcular abrillation of, dutter of. ldack, bown attophy cl capacts et, tor effort, estimation of, chronic disease of, treatment of, compensation of, congenied midformations of. explicators of, Matitum of, discuse and pregnancy, I seases of myocardium, assordered action of, effort syndrome, examination of. by Alays. extra 858 oles of. tailure of compensation of, tatty degeneration of, fibroid degeneration of frequent action of, growths of, hydatid cysts of, hypertrophy of, excentite, infrequent action of ischæmic necrosis of, malignant endocarditis, mittal disease, regurgitation. atonosis,

Goitre, colloid, کائٹر ، مولائلی، و of مقامي الحدوث يا العرادي المدوث ع مهم exophthalmic, ححوطی ۴ م الم عده آما ، مهر ر ریوی الدرو کے علاج میں سویا ، وم . Gonadotropic hormones مهيج المولدات هارمو ير ، ممدح ساسل عدد ، مهر کارڈز کا قشب ، مر س ھا حکی نے علاج میں ' ٦٦-سراهام کی عدا ، دیابیماس میں ، ۸۳۵ کا کاشفه مواره سے وطیعه نے متعلق ۲۵۱ س داسي اديكي، سلمه ، عمويت دهن مين ، ١٨٣ مرص محريو ، ٨٥٦ دات الحبب مع حرو كوكا برد فقرى سنلث ١٠١٠ محوایا کم کے دریمہ امتسار کم وہ من كو المياكي عدا من المعالي من كو المياكي عدا المام من كو المياكي عدا المام من من كو المياكي عدا المام من من كو المياكي عدا

دموی حوهر ۲۰۰۰، Liemocytometer, دموی حلیه سما ۴ م هیمو گلو ای کی تحمیں ۱۹۴ هیمو محاو ۱س او لیت ۲۹۴۰ دودی ، ۲۵۵ اللاف الدموي عدم دمولتين ١٩٠٠ برقان ۱۳۹۰ کلاں طحانی ، ۲۵۲ ليدرر کي ۲۹۰ تاء موری احتماع الدم ، ۲۲۰ نريميت * Hamophilia, دموی استرواح الصدر ۲۸۴۴ ا مثالدم ، دیوی تدری مین ، ۱۳۳ مثالدم ، دیوی تدری مین ، ۱۳۳ مثالدم ، یرف مموی ۲ هاه ریوی تدرن مین ۱۱۹

التمال سة اس 4 ١٨٥ ، Hæmothorax مدر دمویت ۴ ۱۸۲ ا ميد اور كرسييس كا مرس ؟ 11 Hand Christian's disease, " Hanot's cirrhosis, هينوکي کهنت ' Thanot's cirrhosis,

endemic or sporadic, lymphadenoid, Gold in freatment of phthisis. Gonads. Condon's virus in freatment of Holgkin's Graham's diet in diabetes, test of gall bladder function, Gi inuloma, apieal in oral sepsis, Chaves' disease, trey hepatisation of lung in lobar pneumo الحق دات الريه مين رمادي تسكيد ، هم Grocco's paravertebral triangle in pleurisy, Guaracum test,

> Hamatimic principle, ۱Immochromatosis. حون لوبيت ، ٦٣٨ Hamogloban, estimation of, Hamoglobinaria, parovysmal, Hamolytic anamias. jaundice splenomegalic, Lederer's, - Hæmoperica: dium, Hamo pneumothoras, Hamouhage from bowel, in phthisis, See also Hamoptysis "Hemorrhagic diathesis وف حراح " ۱۸ pancreatitis,

Frietion, pleuro-perical dial, in pleurisy فرك باليورائي تاء مورى داب الحب مع ، کی آواد ، ساس لماسر میں ۱۹، sound in breathing Friedlander pneumonia فريدٌ المدركا دات إيه ١٨٠ I roblich 's syndrome, حیکر نے وطبقہ کے کاشفات ، ۹۲۹ l'unction of liver, tests of. سم الأوراط كاشهه و و الم Galictose rest هران کی کالسائر پلید ، ۲۰۰ Gill brudder cholesterosis et, ان سي ۽ ١٢٢ strouterry. ... (tall st me dy spepsie) سیک صدر، کا سوء همیر ، وی 7-9 (1) - - - - - (1) stoney کسکرین دیاسطس میں ، ۸۳۰ Gangrene in disbates, شس کی ۱۹۰ of lan-متشاكل بر ٢٠٠٠ symmetrical, طائر آور صيسور سے اسم ، ١٠٠ Gases, cuitant, poisoning by, الهاب المده ، حاد ، ۲۰ ه Gistritis, wite. مرس ۵۳۲ dnone. نفيح با فلعموني ٢٠١٥ Suppur cave or phleymonous, معدى قولوقي باسور ، ده د Gastro colle fistula. معکو سه ، ۳۳۵ reflex معده زاد اسهال عده Gistiogenous denishes. ممدى لفائي ممكوسه ، ١٦٠ Gastrophal redex. معدی معائی حدلالات ، حال مسامی میں Gastro intestinal disturbin es un allergie state. معدی صائمی قرو سے ، ۹۷ ه Gastro jeja sal ulcers, معدی صائبی تعویه کے عواقت یہ س Gestro jejunostomy, sequelic of, Gistroptonis, معده اس ، حم لدلر ، ٥٠٥ Gastroscope flexible, كاؤحركا مرص ، ٩١٠ Gaucher + disease استویت کے لئے الکے اللہ کا کا شعه ، ۱۸۰ Gullardt s test for ketosis, عفريتك ، ١٩١ Gigantism. کا مکسجر ، ۲۰۱ Glegg's mixture, کلسارڈ کا مرض ، ٦٢٣ Glenard's disease, تشبح مرمار ، ۲۳۲ ۲۳۹ Glottis, spasm of, مرص محملائے کو حق ۹۱۰ Glycogen disease, شکر دو ایت ، عدائی ، ۸۱۹ Glycosuma, alimentary, کلوی ، ۸۲۲ renal. اللائكيورانك ايسد بول معن ١٨٥٠ Glycuronic acid in urine. رrnelin's test) ميلن کا کاشفه ، ٦٢٩

۸۹۹ د اختصا ، Eunuchism, حصيباني ، ۹۰۰ Eunuchoidism. Ewald's test breakfast, ايوالذكا امتحالي باشته ، ووه امتحان سده ؟ Examination of chest AOT (حصوطي گانگر) Exophthaline goitte, ATT د حجوظ المين "كالمر مين > Exophthalmos in goitie, المن معن المث ۱۳۲ Expectoration in phthia.s. الكارويي عامل ، ٢٠٠٠ الاراكا رويي عامل ، ٢٠٠٠ امارت ارو ، محاطی د نما میں ، ۸۹۸ Evebiow sign in myvordema,

شم سدادیت ۱۵۳ شجمي امحمااطات ، حـكم مين ، ١٥٦ ولمب الميد ، ۲۲۸ وجدى عليت ١٩٢٨ اول میں شہر کا تحمدی امتحال ۱۸۲۸ رشے کی انساس ، ادبی کا ، ۳۰۸

> نطس کا ۲۱۶۰ الله كا ايو عدى العطاط ، ٩٠٠ ايع اعطاط قلم كا ، ٣٣٠

شش ، ۱۰۵ لمن من أعدد الشعب كے همر ه ١٣٠٠ 171 6 100

> حد حره كا سلمه ليهيه ، ٢٣٥ اليفيت ، شر بايي شعري ، ٣٥٥ لیف شش ، ۱۰۵

میرطان مقده میں نقص پری ، ۱۹۰ ممدی قو او یی باسود ، ۵۵۷ سوء همي درخيت ؟ ٥١٥ سیاو سریده سر دیم ۱۹۳

استسقاء شبكى معن تموح ، ٢٠٩٠ ، ٦٣٦ ادین رووقه ۲۰۱

> حمای لے ' ۲۵۲ 1941 ul > 1941

عدائی تسمم ، ۸٦٠ سوراح بصوى ، معتوح ، ۲۰۴ احسام عرسه ، آنت من ، ۲۰۹

حبحره مين ٤ ٢٢٤

قصبة الريه معن ۲۴ د Fractional test meal, مصمري امتحالي عدا ، •• ه

Fit embolism. Fatty degenerations in liver.

of heart. Pemoral thrombosis,

Fermentation test for sugar in mine,

Fibrillation, auricular, ventricular. Fibro adenie, Banti 's.

Libroid degeneration of heart

Fibroid lang with bronchisctasis, phthisis, Fibroma of larynx,

Fibrosis, a telio capillary, of lung.

Filling diffect in carcinoma of stomach, Fistula, gastro cola, Flatulence in dyspensia,

Flea bitten kidneys Fluctuation in ascites, Flutter, auricular, Fatal thythm.

Foed poisoning, Foramm ovale, patent,

Tolliculin,

Foreign bodies in intestine. m layus, in trachea,

Frighty of corphicles, حسیات کی شکمائی ، داء

1

```
77 5 6 2 - 5 10
                                      Limplys ma of largs,
                    حود ششی ، ه ی
                                         small lunged,
           عددانشمت کے ہے ، ہے ہے
                                         with bionehicerasus,
                نة ل م در ۱۳ م ۱۳۰
                                       I apyeme,
                       1 7 1 2016
                                         pulsating.
                      classe 1 as was
                                       Line cphalopathe.
   درون ده ۲ لماد ، حاد ۲۲۰ ۲۰۹
                                       Lardoculditis, icute,
                     حرثومي ، ۹۰۰
                                       - กลศยาปี.
                       709 L ... A
                                         uronic
                                        infective,
                       سار، ۲۹۰
                        -47 , L
                                        Jerta,
                                        septic
                       عدو نو ۱۳۹۰
                                        alcera ive,
                      نەر جى . ٣٩٠
                                       andocine relationships at pituitaix
    حامیه یے روے افرا ی تعلقات ۱۸۸۸
                                       I adopte clutis
             درون ور دی الیاب ، ۱۲ م
                                      Unteritis
                    معول المهاب عجاه
                                        cata thel
                دار ای ۱۰۵ م م
                                         r fantile,
                      مايايي ۲۸۵
                                         phlegmonous,
                     طعمویی، ۹۰ د
                    شبح الامعاء ، ووه
                                      Enterospasm,
                    معوی ر کوت ، ۱۰۰۰
                                       Futuroscasis,
           ا وسی اسید سید حلیات ۲۴
                                       Fosmophil leucocytes
دمه میں ایوسٹ پسند علیات کی را دی ، ۹۹
                                       Losmophiba in asilma,
   نعامیه کا انوسین پسد عدی سلعه ، ۱۸۹
                                       Eosmophil c adenoma of pituitary.
                    و ائیں قاں ، ۲۳۱
                                     'Epidemo jaunduc,
         Ep lepsy, in allergic state, صرع ، حالت حساسيت معن ، ۲۹
                    ا الوسيفرين ، ١٠-٨
                                      &pinephim,
                         Finstaxis,
                       الدري على Tpitubercolosis,
       ارب کی علامت ، تے کر ر میں ' ۸۷۵
                                       Fab's sign in tetany
                   احر دمو ت ، ۲۹۰
                                       Laythræmia,
                     Divthioblasts, ناهصات احر ، ۲۳
                     . حلیات احمر ' ۲۲-
                                      Erythrocytes,
                    ۱-۶٫ حلویت ، ۹۲۰
                                      Erythrocytosis
               يمريي زجع الحوادح ، ۲۲۸
                                       Erythrom lalgra,
                      لسیح احمر ، ۲۹>
                                      Laythron,
                      A < 9 6 with Eschatin,
                       Eucostone, یوکاد تو د ، ۸۵۹
```

عطمات مری کے ، ووم المهاف عطفه ۲ ۲ عطمت ۲۰۳۰

معدى قرحه مين عطمه كا لاشماعي منظر المم

قسات شرياني ، معتو - ، ١٠٠٨ اثناعشري مين ادخال اليو و ١٤٣٠ اثمانشری کا ساع عاد ، ۸۲۸ کے عطمات ، جج کا قرحه ۴ ۳۳۰ قرمیت ۲۹۸ محامي ٤ ١٩٨ ا عسر داود ، ۱۲۰ - ۱۲۰

سۇھىم ، ، ، ، ، حاد ، ۲۰۰ رائدى ، ۲۰۰ مرمن ۴ ۸۰۸ سهر اکا ، ۲-۹ سل ديوي مين ۱۲۹ ا

به spitustarism و کا تعامیت فانو ، ۸۸۹ ا میرکی تعریف ۳۴ ر بوی بدری میں ' ۱۲۳ شحمي بماسلي سؤ بعديه ، ١٩١

كان ٢ امراس ٢٣٩_ کارگا درد ' ۱۳۱

ایکر عا ؛ حالت حساسیت معن ؛ ۹م علانميه حمد ٢٩٨٠

حلک میں گیس سے منصوم شدہ ہو ہے اے امد ؟ ۱۳۹

این هادن کا اثبا عشوی ادو به ۲۵۳ محاطی ادعا میں پست وولشح کی رق طی ر گارش ۲۹۷

> رق قلب سیکاری ۲۸۰۴ ا هليلجي عا اجسام ، طحال مين ، ١٨٥ سدادیت ۲۹۳۴

> > ريوی ۲۰۰۴ حىيىقلى ، ٢٥٣ نهاج ، تعویضی ، ب کلاں ششی ، ۱۵

Diverticula or æsophagus,

Diverticulities.

Diverticulosis

Diverticulum, X ray appearance of, in gas tric alcer.

Ductus interiosus, patent,

Duodenal intubation

Duodenum, dilatation of, acute

diverticula, ulcer of, Dwarnsm, pituitary,

Dyschezia,

Dyspepsia acute appendix, chronic, gill stone, in phthis

Dyspacea, definition of in phthisis,

Distrophyradiposo genifalis,

bar, diseases of, Larache, Eczemi in alleigic state, Effort syndrome,

after gas poisoning in war,

Emborn's duodenal tube

Electrocudiogram low voltage, in myade ma.

Electrocardiography,

Ellipsoids in spleen,

Embolism,

pulmonary,

Embryocardia,

Emphysema, compensatory,

large lunged,

```
دیابیشی کا علا م مابعد - ۸۴۵
                                                                                                 Dianeles, after treatment of,
                                            وين سرات ، ۱۸۰۸
                                                                                                       infection in,
                                                           سليم ، ۸۳۲
                                                                                                       maocens,
                                                            (f 4 z. 1
                                                                                                      an anidus.
                                                     سکری ۸۰۳
                                                                                                      melutus.
اسوای کے عاج نے اے بریس ا
                                                                                                            close or each insulin treatment of.
                                        التحاب ١ ٢٢٨
                                  ک اس سیات ۲۰۸۰
                                                                                                           pathology or,
                                           ATT + د دیستی قوما + ATT
                                         ک علاج ' ۲۹۹
                                                                                                            tic ment (1,
                                             ڈائمرامی فیٹ ۱۹۰۴
                                                                                                Diaphic anatic herm,
                                              دان، لحيب ١٤٢٠
                                                                                                      Picunsy,
                                                            our . Thanks
                                                   سمراوی ۵۰۰۰
                                                                                                    Lilious,
                                                   هیسوی ۲ م ۵
                                                                                                      helera e
                                                   دوایی ۱ ۵ ۵ ۵
                                                                                                    colliquacye,
                                                     حراق ا ٥٥٥
                                                                                                    cotteal.
                                                   ر حدري ' ۵۵۵
                                                                                                    dysenteric
                                                ممددر اد ۴ ۲۲۵
                                                                                                     gastrogenous
                                         سندایی و بائی ۴ ۱۸۳
                                                                                                   Parantile, epidemic,
                                                        ا حلم که ه
                                                                                                    henterie.
                                                   ممكوس ٢ ٣٥٥
                                                                                                   reflex.
                                                      ا کادب ، بر ہ
                                                                                                   spurious,
                                                        صوبي ۴ ۱۸۶
                                                                                                    summet,
                              الله استايس ، بول معن ١٩١٤
                                                                                          Diastase in joine,
                                              معرشيق المص ٢٤٣ أ
                                                                                              Diciotic pulse.
                 ب Diet in diabetes عدا * ديايطسمين * ۸۲۹ تا ۸۲۲
                                    سوء همم میں ۲۰۱۴
                                                                                                   in dispepsia
                                             ورمهی میں ۲۴ ۹۰۴
                                                                                                   in obesity,
                                         کے سیجے ' ۸۳۱ ک
                                                                                  i lecipes,
                            امراص اعتسائے عمم ' 7'4
                                                                                        Digestion, organs of, disenses of,
                         تساع مرىكا ، حودرو ، ٢٩٣
                                                                                             Dilatation, idiopathic, of esophagus
                                                  فل کا ۲۲۱
                                                                                               of heart.
                                                   معددکا ، ٥٥٠
                                                                                                   of stomach.
                                                  حاد ، ۲۸۰
                                                                                                        acule,
                                 داني آئسي ايسلان ١٩٤٠
                                                                                         Dioxy astrin,
                               ۳۳ الريه کا کښد ا کا ۲۳ کا کوټو کا ۲۳ کا کېږيه کا ۲۳ کا کېږي کا کا ۲۳ 
  استسما کے شکمی میں عبر وصعیت ' ۹ م
                                                                                             Displacement in ascites,
                        عطمات ' اثباعشری کے ' ۹۲۲
                                                                                         Diverticula of duodenum,
```

Cough in phthisis, کهانسی و سل دیوی مین ۱۳۳ حلق کی ۲۱۳ throat, ا شانی ۲۳ winter, کو پردور کی تھیلی ' ۲۰۴ Cowper Rose's bag, (racked put sound in percuesion of chest, صوت طرف شبکسته ، قرع صدر میں ۲۰۴ سل د يوى مىل ١٣٤ in phthisis, 'reatorrhom, کم ترادی ۲۸۳ و در مین " کته تیمی مین " Crepitation in breathing, راحمه ، لحتى داشالريه مان ٨٦٠ radux, in lobai pneumonia, ্রবর • কার্ট্ন (Tietinisni, ۲۳۴ شلحی کروپ ، ۲۳۴ شلحی کروپ ، ۲۳۴ رتفاع الصمط مين بردحساسيت ، Cryasthesia in hyperplesia, و خداد الحصيتين ، و دو الحصيتين ، و و دو الحصيتين ٔ دمه میں ساق میں ترشاں کے مرعولمہ حات ' Curschmarn's spirals in sputum in asthma, مرك كا علا عمد الله المرك المركب ('ushing 's syndrome, رراق کا سب ' مصرای درس مین ' ۴۵۰ Cyanosis, cause of, in mitral disease, معاداد ، ۲۳، enterogenous, ساريوي مين ۲۳۹ ا in phthisis, خرد عصویتی ' ۲۹۲ այտոնև, Cyclical vomiting دوری فیم ۲۵۰۰ ٔ حکرکا دویری مرض ' ٦٦٦ Cystic disease of liver, Craticorcus cellulosa of heart و طب کا اسان دید حلوی ؟ ۳۳۵ دویرے حسمرہ کے ، ۲۲۵ Cysts of laryns, سقراس کے ' ۹۹۳ of pancreas, 44. 6 man Deafness. neive. فلتي عدم دمواتين ۴ ۲۹٠ Deficiency anæmias, احطاط " شجمي " فلت كا ١ ٢٢٨ Degeneration, fatty, of heart, حکر میں ' ۹۹۳ m liver, ا بی ، مل کا ، ۳۳۰ hbroid, of heart, عصله قلب کا ۲۲۰ ۲۲۱ mvocardial, شرائس کا ' وسطی ' ۲۳۴ of arteries, medial. یدی ' ۳۳۲ semile, لوبي ، قلب كا ، ٣٣٨ pigmentary, of heart مرص ڈرکی ۸۹۳ م ۹۰۴ Dercum's disease,

Dextrose, "difference value" of, in deficien

cy of internal scretion of pancreas,

مقراس کے الدروی افراد کی قلت میں ڈ مسٹروس

کی ''قدر فرق'' ، ۱۹۳

رهم نيي ' هکم بيي ' ۲۹۰ درد وسوه حلسي قليے مرطان معده مين ٩٦٠ Coffee ground vomit in caremonia st mach. . Cog wheel breathing ا دور مسین بنفس ۱۳۰ کام ' ۱۹: Cold or the head, olie, دو لنج ' عده . Colitie ب تهات التو او د ۱۹۱۰ حطراك ، ٩٣٠ عاطمي عشائي ١ ٩٩٠ riuco membrancus. 10 v on 1 1/16 375 - 375 ulcustee. . د شدین کاهموط ، هد Noo ' L' Lo L' Collo 1 portre, ۱ ۱ Ilonic ا مو نوبی د کوم ۲ ۹۲۰ به otosia استوط دو و د ۱۳۳۰ متوط oll x wring in menivane, اورس معي آبار داخل كريم كا كولث كا طريقه ٢٥٦٠ ATI " ورا العاسو " Com, d abetic, کا علاج ۲ ۲۳۸ treatment of علیلشہ کر دمو تی ۲۵۰۰ hypoglycama, خور کی موافقت ؟ ۵۵۰ ۸۵۰ Compatibility of blood, بعواص قلب کی ' ۲۹۳ Comp usation of heart ۳۲۸ ، ۱۲۰ هر famure of. Tr blaze t and Compression of trucked, کو کا او کا مرض ۱۹۰ c'oncato a digease, Congenital hypertrophic stenosis of stomach ، معده کا پیدائشی بیش پروزشی صبق ۲۰۵۰ onstipation Consumption, سل بوی ۱۹۳ را کص ' ۱۱۳ gadoring. tro f المناصات و محرد کے رسمی قدمی المناصات و Tro f استامات و Tro Copper wire interies in hoperplesia, ارتفاع الصفط مين بالمبيع ك تاركي ط ح صدقل شده شرائين ٢٢٢ م Cor boymum. قلت الثور ، ۲۱۸ ا کایل علت ، در (oronory thrombosis. ک شکسانی ۲-۱، fragility of کا حردنای اصحال ۲۳۰ microscopic examination of, 169 ' wist Cortin, 196 6 COIVAL ongh, hrassy, in aneurysm, . کهاسی ، تابورسا مین ، ۱۵۰

من کیلسیم ، ماغی سیال میں کیلسیم ، محمد Cerebro fluid in tetany, calcium in. دمه میں ساق میں شار کو ایڈن کی قلمیں ، ٥٩

> چیں اسٹو کس تھیں ، ۴ ٰ بچه کی ہمیں عما آوار ، ۲۳۵ Chudhood, anemins of, بجس کی عدم دمویتس ، 840 سلمه الحصر، ٥٢ ـ

تقيحي التهاب فمأت هايج صفراء ٦٨١

النبات مراره ، ۱۲۳ 74. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2

اخمم ت ، ۲۲،

طعموني المات مراده ، ١٩٥٣ مراده در گاری ، ۱۵۱

حصاتت صفرا) ۲۵۳ مرارے کی کالساریدیت ، ۲۰۳

د ق ، ۲۵۲

mar , 707 دللي ، ٣٥٥

Choren hempligit, وفي صبي فالح ، وه

کرومادیبی حسم ، ۹ ۸

An عاميه كالون ترس عدى سلمه ، Chromophobe adenoma of pituitary,

یمووسٹك کی امارت تسکرر میں ، ۸۵۴ كيلوسي اور كيلوسي الشكر استسقاه شكمي ١٣٤٢

کیلوس مدری ، ۱۸۲

ام اص اعصا ہے دوران خون ، ۲۲۵ ساریوی میں نظام دوران خوں * ۱۲۷

کمیت داولی ' حکو کی ' ۱۳۹

صفر اوی ۲۵۵

سرطانی ' حکرکی ' ۲۰۱

بيش يرورشي ۲۴۹۴

طحالي عدم دمويت مين ، ٥٠٠

خگو کی ' ۱۳۵

باني ، ۲۳٪

ع حال متوقعه ، ۳۴٥

تهدیل آبوهوا ، حلدیوی کے علاج میں ۱۳۹، اب گلدوں کے حرر شکلی ، سل دیوی معن ، ۱۲۹

نه در کا عرصهٔ ترویب ، ۱۵

اورطی کا پیدائشی تصابق ، ۸۹۸

Caline disease, شکمی مرص ۸۹

Charcot Leyden crystals in sputum autuma

. Chest, examination of.

Cheyne Stokes respiration.

Child crowing,

Chloroma.

Chlorisis

Cholangitis, supputative,

Choleeystitis,

gangienous,

Cholecystitis phlegmonous,

Cholceystography,

Cholchthiasis.

Cholesterosis of gall bladder

Chorea

mmot.

paralytic,

: Chromaffine body.

Chrostek's sign in tetany,

Chylous and chaliform uscites,

Chylothorax,

Circulation, organs of, discuses of

Circulatory system in phthisis,

Ciribosis, atrophic, of liver,

bihaiv.

carcinomatosis of liver,

hypertrophic,

in splenie an emia,

of liver,

portal.

Claudication, intermittent.

Climete change of, in treatment of phthisis,

Clubbing of fingers in phthisis

Coagulation time of blood,

Coarctition of north, congenital,

```
اور الي عدم "اهايت مع، شعري سمان ، ٣٦٠
                                      Conting paleation in north menupotence.
                فوق الکیہ سے ۸۵۱
                                      Capsule suprarchal,
   کاربوها بارید کے حول کی فعایات ۸۰۲،
                                      Cubolish ite metabolism, physiology of
      سه طایی سدمه ، حدحر کا ، نرویی ، ۱۱۹
                                      Cuciroma excinity of luvins,
               حيير الدوق الالا
                                       and and, or highs.
                      7665001
                                       of intestina
                     777 6 5 2-
                                       of liver.
                      مش کا ۱۵۲ ده ۱
                                       of lun. .
                      ميري کا ، ۹ م
                                       of solden.
                   بادر کا ۱۰
                                        ைப் பாய்யுக்
                     ممدد ۷ ، ۵۵۵
                                       or steards
                  عدد درقمه کا ع درد
                                        or thy out
                                          Soc 'so or le Neepl sus and Tumours
               فواد کا عدم ارتعاء ، ۲۹۳
                                      Curba achdasacot,
   قلب کے وول کی عبر طبعی حالتیں ، ۲
                                      Cirdiac a tion, bhormabilities of
                 TTT - 06 , 40. 5
                                         a bint.
        کے مرمی مرس کا علاح ، ۲۸۱
                                       des is chronic treatment of,
                     کا درد ۲۲۱
                                       pein,
                                          See also under Heart
               Carto pulmor ny murnurs ملم د وي حريرات ، ٢٦٢
                     سمتح المعواد، ٣٩٣
                                     Ce die spasm,
            يه ما در من التهاب قلب ١ ٣٩٨
                                      Circlitis Theur die
کیروثبی سر ترکار یا را ده مقدار مین
                                     Cutotin due to ingestion of live amount
        77- 2 12- 2-125
                                        of green vegetables.
   دسعی قدمی اهدامات الدکرد کے ۲۳۰
                                     Carpoped decontractors of tetany
كيارين كالمسيليت كاطريته الدرو الصدب
                                     Carrel's method of die nage in Juberculeus
                                       effusion
                   میں ، ۹۔۱
  سمهووري الردن . ماطي ادما مين ١٦٦٠
                                     Cissowity neck in myxademi.
   کاس کے دروی اور رویی عاملی ، ۳۰۔
                                     Castle s intrinsic and extrinsic ractors
                     OF ( 445 " 1"
                                    "Cat asthma
           رول الماء ، دنا علسي ١٨١١
                                     Citirut, dellata
                   re مسم ('it uib div.
                       معوی ، ۸۰۰
                                       intestreal.
                      عام داد ، ۳۳
                                       pituitou-
        داراي معوى البياب ، ٩-٥ ٥٠
                                     Citarrhal enteritis,
                      يروان ، ۲۰
                                       jaundice,
                المهاب حجرء 11
                                       laryneitis
ابع قامطير كا استعال ، رات الرده مين ١٦٠
                                    Citheter wisal use of in pneumonia
```

et obril ittick, hypotensise شی حماعی حمله ، ۳۲۳

softening, chrome,

مرمن دماسي ليديث ، ۲۳۳

dis,

ڑے شعبات کا تسدد ، مو شعوی تنفس ، ۱۵ هرد الشعب ، ۳۳ Bronchiectusis, حشك ٢٥٠ بؤیے شمات رہ سدد میں طرأسي شماساتي الهراب راز و شمق الثاب ، ٢٠ حاد کے علامات ، ۲: اور دمه ، ۱ ه مرمین کے علاء ت ، ۲۲ خشك ١٥٢ سكويي ، فائس سي اكروني ، ه٣ كندنده بالميتن ١٠٥٠ Dionchophony بشمنه صوتی ، ۲۰ Biencho pneumoni e شعبی دات الریه ، ۹۸ المالية ١٠٠٠ اولي ، ۱۸ بادوي ، ۹۹ ىدرى ، ۱۱۳ الم شمالة ١٠٠٠ شعبه اینی ۱۰۳، حراح شش ۲۰۰، ۱۰۳، Bronchoscopy in abserse of lung. شمنی بشدد برس ۱۸۵ تهدد الشعب مين ، ٢٥ الاهمة کی تشجیعی همان ، ۳۰ That d'aran, حرونعا سي ، ١٠٠٠ أَدَا عرامي فيق مين ٢٩٩٠ حروحدروق ، عدم دمویت میں ، ۳۹ ه و ت طروف شسکسته . سل معن ، ۱۲۰ حون میں قلوی محموطه کا فعل''ما ئله''، ۱۸۳ Buffer action of alkali reserve in blood.

د باییطس مین سمو مدیج ۸۳۰ یے درقیتی صعفه ، ۸۹۵ خوں کے اندر کیلسائم ، ۸د۱ د ما عی مما عی سیا ل کے اندر کیلسیئم کارد

حصوات اور حصاة ، عفراوی ، ٦٤٦ سةراسي ، ۱۹۲

Bronchi, large, obstruction of, Bronchial breathing, dry, in obstruction of large brouchi

Browniohitis, obliter itrie. Bronchitis, o we symptoms of, asthma and, chronic, symptoms of

plastic, librations or croupous. putrid or total.

confluent. primary, seconda 1. tuber alous Broschorthea

in bronched obstruction, in branchectuses. in diagnosis of asthma. in displicamatic hernia, Bruit de diable in anemia, Bruit de pot fele in phthisis Bruit of heart See Marmurs

Cachetic ademi in diabetes, Cachexia stramipriva, معن ، معن المعالم الم m blood, in cerebic spin d fluid in tetany,

Calcun and Calculus, biling, panereatic, Cinter ilişthin, حرورا کمی ۲۵۲

-44 - 113 Blordors, عرصة ادما ١٠. Bleching time, يرييلورامين ، م in our para, حہ کے برسہ سال ہواری کے جہ ہوتے کے Blood, and have belance of types or distri مالین ۲۰۰۰ کے داون حدہ طہ کی تھے سے کا کا ہ dkali reserve of definition of يا ناد کاريو يٿ ۽ مر ف ١ ٨٩ occidentate des it mot مان کیلسایم ۱۰۰۱ cucit man, ح وطے انہر میں ۱۹۳۰ or copulation are guita پرا س حو س کا دموی حلیه کی تو ریسع کا oll dis am one curve, Price 'ones' مسیحتی ۲۸س حول کے بعد ات رمه میں ، وہ changes or esthma م من شعى النهاف مين ١٩٦٠ it choose broadutes. فلب نے مشو ہات میں ' ۲۰۸ ne malicementer of heart, کی برویب ۲۵۰ agula on of, کی موافقت کید ۸ مد corportibuty t. کاشیر ۱۸۴۰ 14174. 400 norm d كا استجار ، ١٥٠ examinat in of ک^سلروه ، ۱۰-۰ 210 Hrs کی معدہ میں موحود کی کے لیسے کا شعات in stomach tests for, میں ساید حلیات کے امداد ' ۱۹ leacocytes in, number of کے طبعے حرامے ہر کیای ، ١٥٠ normal constituents of, platelet counting کی لوحته شریعا ۱۹ کا تعامل ، وے reation of. sugar tolerance in drubet's mellities ديا بيطس شكرى مين دموى شكرن ارداشت ، ۸۰۹ بهل الدم ، ٢٥٠ viansfesion عروق حوں کا امتحاں ، ۲۱۸ vessels, cremination of نرف مموي ، ٥٥٥ Bowel, hamor hage from قاروره مين بيناآ كسي بيو أا ترك ايسد ، ١٦٨ Boxybuty is acid in mind, بط القلب ، ١١٥ Bridycardia, یرقار میں ، ۱۲۸ in jaundice, باش تدشی دماعی حمله ، ۱۳۳۳ Brain, hypertensive, cerebral attack,

ترشہ دمویت میں سانساہ پھو لحادا ، ۸۳٪ بدری ا نصبا ب کے علاج میں برسکوکی پیٹی ، ۱۷۷

مرمن دماعي ليليت ' ٣٣٣

نعاسی کهانسی الورسیا میں ، ۲۵۳

Breathlessness in acidemia

softening of, chronic,

Brassy cough in ancurysm.

Buscoe's belt in treatment of tuberculous effusion,

```
ادين ريشكي القماص ١ ٢٠٨
                                         Auriculai fibrillat on,
                         رو له ۳۰۹۰
                                            flutter.
                     ادىي بطنى كوه ، ۲۳۵
                                         Ala culo ventricular node,
                      اسهاع شرائه ۲۶
                                         Au cult stion of arterns.
                           1 . . and
                                            of chest.
                          واب ۱ ۲۵۰۰
                                          of heart,
                         اورده ۲۵۹
                                            of vems.
                       مستماعی قرع ۲۰۴ Lusci Itatory percuession,
                         هر می این ا ۲۳
                                         Averza's disease.
              ىدرىعصات كى تاويى ، ١٣٢
                                          Builly, tuberely staining of,
             حرثومي التهاب دروي فليه ٢٩٠٠
                                          Bacterial endocarditis.
           التهاب حدمه ، ديابيل معي ١٢٠٠
                                         Bilanitis in Jiabet 9.
                                          Baldnes See Moperin
مصنوعی استرواح الصدر میں ہایأوراکی عار ج
نافتہگی ' ۱۴۳
                                          B discount of pleura in attacted pacuriothe
                       ىيىشىكامرص ، ٠٠_
                                        Banti s disease,
               كاليق عدى الحطاط ، ٩٠
                                           ab a dence.
  بيظميك اور نست كا اله كشاب السواس ، ٩٠
                                          Lenting and Best's discovery of insulin-
           میلات ک کا علاح درمهی میں اس ، ب
                                          Bunting's freatment in obesity,
                       اساسي خو ل ، ٩٩ ،
                                          Basal metabolism
                                         Base low's disease,
                     السيداؤ كاموص ، ٦٠
                                          Bisophil adenoma of piturary,
          عاميه كااساس يسند عدى سلعه ، ١٨٩٠
                يقطه دار اساس يسيدي ٢٣٠٠
                                         Basophilia, punctate,
                                          Bastedo's sign in appendicitis,
        التهادر أتدهمس امارت باسطارو المرات
                                          Bell sound in auscultatory percussion
            اسماعيرة عمين حرسي آو ار ٢٠٠٢
                                          Benedict's qualitative test for sugar in
بول میں شکرے لئے یہ ایکٹا کٹ کا کمبی ناسفه ،
                                                 urme,
                    مسلے کے درات ، ۸۰۸
                                          Bensley's granules,
              ورمهرمين راكو يى علا - ٩٠٥
                                          Bersenic treatment in obesity
بیست اور پیشبکا اسکشاق اسوای ۲۰۹
                                          Best and Banting's discovery of insulin,
                                          Bicarbonate, blood, definition of,
         دموی الیکار او سٹ کی تعریف ۱۸۱۰
     منعة صفر او يه كے اسے كاشفه ، ١٣٨ - ١٣٩
                                          Bile pisment test for,
                                          Piliary apparatus, diseases of,
               صفراوی آله کے امراض ۹۷۳
                                            examination of,
                   کا امتحان ، ۹۷۰
                                        Bahary calculi,
                   سيكها يے صورا ، ٦٥٦
                                            carrhogra,
                     صفر اوی کنینت ، ۹۵۵
                            Biot's respiration, تنفس بنو ؟ ٦
                                          Bladder, dilatation and hypertrophy of, in
دیابیطس ملیے میں مثابہ کا انساع اور بیش ،
                                                 di ibetes insipidus,
                   يرودش ۴ ۸۹۸
```

۱۳۹۲ ماه ماه ۱۰ مرطی صیتی ۲ ۳۹۲ -Apri al grai Homa in oral sipsi سن داخی از کلی غلمه ۲ سفورت دهی و س ۴ ۱۹۸۳ Apinson and mua, عم سکو ی عدم د و ری ۴ سمی مرا دهم الماس مع معمد الماسرة معمد معمد الماسكة الماس من من سؤهم من Appendix dispensia, مرياني دار Arterial pressure, الميد ٢٩٠ high, د دو اړ کې و عيت ۲۵۰ we!, nature of. Artems, rescultation of 4 1 ° , but 1 7 reo المرياني شعري ليفيت ١٠ الدرياني شعري ليفيت ١٠ مرياني شعري ليفيت ١٠ م ۱۴۲ امر بای صلات ۱ ۱۲۲ شر بای صلات ۱ ۲۳۸ The iosileratic retinities, Vit the acure أم اللي المهاب عداد ، ٢٩٨ ساري ۱ ۴۹۳ ant cure, آشه کی ۲۰۰۰ -yphilitic, تدری ۲۰۴۰ tu' en ulous المهاب مفاصل حماروما درمي ماس ٣٨١ Arthuitis in theamatic fever, Ashe tosis, ١١١٤٩٠ استسداء شركمي ١٩٠١٠ ٦٣٥ . سحیلو می اور کیلو می الش_ن ۱۳۰ chylous and chyliform, امع سکار لی ایست م ۱ مرسکار ای ایست ، ۱۷۸ ار نفیت کے علاج میں ہے۔ ، is treatment of hemophilia spiration in treatment of pericard tie. \spiration in treatment of pericard tie. مقامي احداق ، و٣٠ Asphyxia local اساویں کے اسے مساسب ، دعہ میں ، ١٠٠ Aspatin sensitiveress to in astoma FA 403 Asthma, Jaonauta ant. اورشعی التہاں ' ۹ ہ قلی ' ۳۳۳ പോദിഷ, ساری اور معکوس ، ه ه intective undiedles عدم عدمالريه ؟ هد Ately of usus pulmonam, ۱ الكامي ۱ Aldeosis ما تعامي ۱ ۸۹۱ Atheroma ושתפמו Arre Atheromatous ulcer, اتهبروماني قرحه ٢٣٢ Athero sclerosis اتهبرومائي صلاب ۲۳۳ مول عداداسفر ، حکر ۲ مول ، حاداسفر ، حکر ۲ مول ، حاداسفر ، حکر ۲ مول ، وقف الدمي ٢٣٦٠ ischa mic, Atrophy, عت الحاد ، حكركا ، وم sub neut, of liver, مهرماورياح ، ۲۹۳ Auerbach 's plexus,

```
مدم دمویت – نسلسلهٔ سانق
                                          Inamia (cont)
                     اجرياهمي ١٣٣٠
                                           crythroblastic.
                   التهادالاسابي وجء
                                           glossitic,
                                           infantum, pseudo lukernea,
          رسیمی کا دب بیص دمو دی ۲۵۰۰
                        سل معن ١ ٩٩٩
                                           an phthisis
                    كلان حلوي ، ١٣٤
                                           macrocyta,
                         مبلف ۲۳۱۵
                                           permerous
           مين امتحابي موراك ٥٠٥٠
                                             test neal a
                        ثانوي ۲۱٪
                                           secondary.
                    داسی حلوی ۲۴۰۰
                                           sickle cell.
                        طحالي ، وم ،
                                           splenic.
                    یے علامات ' ۲۲۔
                                           symptoms of,
سدم دمویت (ولی) ، عبر کو نادموی ۲۹،
                                        Anamias (deuciem v) anha mopoietie
                  ابلاف اندموی ۲ م.
                                           hamolytic
                    کہ در حلوی ، ہم۔
                                           megalocytic,
                      عیں کی ' ۴۵۔
                                           of childhood,
                حمحره کی عدم حسیت ۲۳،۰
                                        Anasthesia of larvax,
                استها اف علم يريشور ١٠ ٢٦٠
                                        Anaphylactoid parpura,
          استهداف عالت دساست مين ٥٠٠
                                         Anaphylaxis in allerent state
                          اورسا ۱ ۱۹۹۹
                                        Ancurysm.
                       شسکسی ، ۲۵۲
                                           abdomnal,
                        قلےکا ۳۲۰
                                           of heart
                 akalueik 'ror
                                             symptoms,
                 وعائي عصابي ادعاء ٢٥١
                                         Angelo neurotic o dema,
             حالت حساسيت معى ، ٢٩
                                             in allergic state
               د خه ، عبر در ابی حلوی ، ۲۲۰
                                         Vagina, agranulocyfac,
                        صعاره * ۲۱٪
                                           mmor,
                        صدریه ۱۲۱۰
                                           pectoris,
                      وسيثكا ٢١١
                                           Vincent's.
  عبر ديكوين الدموي (فلي) عدم دمورين ٢٩
                                         Anha moporetic (deficiency) and mias,
                     حدق لا تساوى ٢٥٠٠
                                         Anisocoria,
                    حلوی لا تساوی ۲۳۰
                                         Anisocytosis.
                    عصوعدماشها ١٩٥
                                         Anorexia nervosa,
                       شش دحدیث ۲۰۹۴
                                         Anthracosis,
             اورطی کا پیدا شی نصایق ۸۵۸
                                         Aorti, coarctation of, congenital,
                 صدریکا ابورسا ۲۵۱۰
                                           thoracic, aneurysm of,
                      اورطم مرص ۲۹۱
                                        Aortic discase,
                تسدد کے حریرات ' ۲۵۸
                                           obstructive marriars,
               بارروی کے حریرات ' ۲۵۸
                                           regargitant marmurs,
                       بارروی ۲۳۴
                                           reguigitation,
```

```
Agr. Mar + I man succession of " PAR MAR A MAR A
                                                                                          Adecoma be sophul, of pita ters
                      اود رس عده عامیه کا ۹۸۸
                                                                                             chromophobe, of pituiting,
                ا او سيد عده عاميه كا عن
                                                                                             cosmophilic of pituitary
                           mixer, of pituitary,
                                                    آت کا ۱ _ ۲۰
                                                                                             of intestine
                              سمى عددد قبه كا ١٠ ٥٠
                                                                                             toxic of thyroid.
                                   وحماشح يد ١٩٣٠ ، ١٩٠٨
                                                                                         Adoposis deloresa,
                                                      AA. 2. 35°
                                                                                        Altenia
                                                     الدريس معم
                                                                                      chen p.
                     هانڈرو کاوراٹ کیمہ معے ہے۔
                                                                                           bydrochlond in asthma.
                                                                                         A benotical horizons of pitudeix,
مهيج اوق الكبه هاريوير عده عاميه ي ٥٨٨٠
                        عيرمعدوني آوادين تبهسمين ١٦٠
                                                                                        Adventitions so inds in boutling
                                                            بوتی ۲۰۰
                                                                                        Theoplons,
                                                       بلدانجوا ٢٠٠٠
                                                                                       Propher,
                             دنابیطسکا علاح م احد ۱ مراد
                                                                                         Aft a treatment of diabetes
                                    عبر دراتي حله ي د ۴۶ ۲ مم.
                                                                                        Agrardocytic ingmi.
                             عردراني حلويت ۲۹۴ مه ۳۲۸
                                                                                      Agranulocytoms,
                               الے کھی کہست حکرکی ، ۱۳۸
                                                                                        Alcoholic circlious of liver.
                      عبر بيض دمويني ايس دمويت ١ ٢٥١
                                                                                         Meaka mic leuka mia.
                                      ارق ماسفيد دمويت ١ ٣٠٠
                                                                                         Aleuker ha morrhagica,
                                 Alimenta v glv osuria, قبال عدائي شكر بوليت ' ۸۱۹
                                              بسمم الدم ، ۹ ۰ ۰
                                                                                          tox emia.
                                 قلی دمو سکی امراها ۲۸۰
                                                                                      Alkala mer, definition of,
                   حون کے قلوی محموطہ کی تعریف ۸۱
                                                                                          Usali rescrive of blood, refinition of,
                                 اللوى كامرتكي العريف ١٨٦٠
                                                                                         Alkalosis, defin from of,
                       د ا يطس معي اللي كي حود اك ٢٥٠
                                                                                         Allen s diet in diabetes,
                                  حساديم المهاد الأرف ٢٠٢٠
                                                                                       Merge Smith
                                               حالت حساسيت ، وم
                                                                                      Alleraic state
                        حسى صلعه ، محالي اديمامين ، ١٦٦
                                                                                         Alopecia Gontal, in missa lenta,
                                                قاسكا تدادل ٢١٣٠
                                                                                        Alternation of heart
 ار شه دمو ات میں خواہدی ر(C) کی بیما اش <sup>د</sup>
                                                                                          Already CO , measurement of in aidamin
                                                                                          Amaurosis fugax,
                                                 عاردی کمت ۲۳۳
                                                                                       Amphoric breathing
                                                     قدرى لىمس ، ١٦
                                                  اشاآسامرص ، ٦٦٠
                                                                                       Amyloid diserse
                                                    شهوتی ص ۲-۴
                                                                                         Anacrotic pulse
                      عدم دمو بت یه برشه " ساده " ۳۸ -
                                                                                          Anamia, ichlorhyonic, sample,
                                                                                                Addison's,
                                               ایڈ سس کی '۲۶ء
```

uplistic,

chlorotie.

عیر تیکو سی ۲۳۰۰ احمر سی ۲۳۴

اشاریه عملط*ب* حلد دوم

```
شکم عدد ۱۸۸۰
                                     Abdomen, acute,
                کا امتحاں ، ہے،ہ
                                       examination of,
           لاشداعوں سے ، ۱۸۰
                                         by X rays,
                شکمی اورد یا ۲۵۳
                                     Abdominal ancurysm
     < يحره كرعدلات معدد كاشلل ، ٢٣٩
                                     Abductors of laryny paralysis of,
               Aliscoss, modinstinal, حراح ، واسطى ، ۱۹۴
                    759 55-
                                      of liver,
                    شدرکا ، ۱۰۴
                                       of lung.
                                       peu gastuc,
                 حردمهدي ، ٠٠٠
                                       peritonsillar,
                 کُود او ری ۲۰۸
               حلف البلموم ' و ٢١٥
                                      netropharynged,
         ديو أعرائه المها ع ٥٣٤ م. ٣٠٠
                                       subphrenic,
   السيطو ايسطك السد ولول مين ١ ٨٩٩
                                     Aceto acetic acid in urine,
            ايسي لون ، رول مين ، ٨١٦
                                     Acetone in wine.
              فوادكا عدم ارتعاه ٢ ٣٩٣
                                     Achalasti of cardia
                  ہے ترشہ کی ۲۰۰
                                      Achdorhydria.
      ے ترشه عدم دمویت ؟ ساده ؟ ۲۸
                                     Achlochy tric ana mia, simple,
                                      Acholinie perudice,
              مصصورانولي رةان ويهم
                                         acquired,
               ا کتسایی ۹ ۲۸
                حاداني ، ١٣٤
                                          family.
                                      Verdemia, definition of,
          ترشه دمو دت کی تمریف ۲۰۸۰
                                     Acid base bulance of blood, types of
خوں کے ترشہ اساس تو ارن کے عتل هو ہے كى
                                            disturbance of,
              مثالس ، مرء
                                     Acidosia,
                   ترشه سمیت ، ۲۵۹
                 کی تعریف ۲۸۱۶
                                       definition of.
              حواد هي حساسيت ، ١٩٨٩
                                     Acroparasthesia,
    ايدم سلو كس كا علائميه ، ٢٨٣ ٢٨٦
                                     Adams Stockes syndrome,
         ایڈیس کی عدم دمو ست * ۳۹ء
                                     Addison & abremit,
               الديس كا مرس ، ٨٨١
                                     Addison's discuse,
                                     Adductors of larenx, par dysis of,
  حبحرہ کے عصلات متار کاشلل ، ۲۳۲
                       عدوده ۲۱۳
                                     Adenoids,
```